

Ex libris Academiae Valentinae legatis a D. D. Joachimo Lombardi in eodem Medic. Profes.



PLANTARVM

SEV

STIRPIVM

HISTORIA,

MATTHIAE DE LOBEL
INSVLANL

Cui annexum est ADVERSARIORVM
VOLV MEN.

Reliqua sequens pagina indicabit.



ANTVERPIÆ,
Ex officina Christophori
Plantini Architypographi
Regij. M. D. LXXVI.

ADVERSARIORVM ILLVSTRATIONES,
CASTIGATIONES,
AVCTARIA,
CONIECTANEA,

Nominum & opinionum CONSENSVS,
& HARMONIA,
SELECTIORA quædam REMEDIA &
SUCCEDANEA.

Cum GVILLIELMI RONDELLETII
antiballomenon emendationibus tabulis,
nunquam antea excufis.



V N I V E R S I S

G A L L I A E B E L G I C A E

A N T I Q V I S S I M I S , S I M V L E T


N O B I L I S S I M I S O R D I N I B V S , G V B E R N A T O -

R I B V S , D E F E N S I B V S E T M A G I S T R A T I B V S ,

Operis aedificamentum & emolumentum.



NON possum, viri illustres ac totius Galliae Belgicae
 electi, gubernatores ac magistratus clarissimi, hu-
 iusce communis patriae nostrae calamitates piis la-
 chrymis vobiscum serio non deplorare, quae dete-
 stando atque execrabili hoc bello civili tam miserè
 atque hostiliter hinc inde dilaceratur, ut non tantum
 vrbes, & firmissimas munitiones funditus dirutas
 spectemus, multaque hominum millia aquis, ferro,
 fame & incendio extincta, sed etià mutuis populationibus agricolas pas-
 sim profligari, exterminari, & Musarum Pieridumque chorum, qui in
 amoenissima huiusce provinciae viridaria, relicta Graecia & tantum poëtis
 antiquis decantat. Helicone, sua sponte à multis iam annis commigraue-
 rat, ferè hinc infestissimis armis disturbari. Quos casus tam infelices, &
 damna irreparabilia sine summo dolore aspicere nemo vir bonus ac pius
 queat. Est enim tota hæc Galliae-Belgicae nobilissima & antiquissima pro-
 vincia, (quæ iam pridem, sub Flandriae aut inferioris Germaniae nomine
 terrarum orbi inclaruit) tanquam celeberrimū totius Europae emporium,
 in quod quicquid vsquam terrarum est eximium aut expetendum, cumu-
 latè terra marique aduehitur, omnesque Europae, Asiae, atque Africae
 thesauri congesti sunt; præclaris ingeniis, in omni genere artium ac scien-
 tiarum excellentibus, fertilissima. Et quamuis is caeli tractus Septentrio-
 nalis enutriendis innumeris plantis minus sit idoneus, ob frigorum sævi-
 tiam & longas hyemes & continuas durabilesque ei incumbentes caeli
 tempestates, atque iniurias; tamen ea est incolarum industria, sedulitas ac
 pertinax in tutandis à prædictis incommodis tenerioribus plantis diligen-
 tia, ut nulla stirps toto orbe inueniri possit, quæ non improbo labore &
 indefessa opera clarissimorum heroum & virorum illustrium, nullis im-
 pensis parcentiū, nouis hinc artibus educetur, alaturque egregiè: vnde non
 immeritò in excolèda re herbaria, antiquissimo studio, summisq; viris di-
 gnissimo, primam laudem Belgis obtulerim. Nam in hac vna provincia plu-
 res herbarum, fruticum, arborumque diuersitates inuenias, quam in anti-
 quissima Graecia, spatiosissima Hispania, Germania, Anglia, Francia, cul-
 tissima denique Italia, aut aliquo huic circumiacente regno aut provincia.
 Quæ quauis innumeros penè sedulos hortorū cultores habeat; hi tamen
 ex numero mihi cognitorū virorū, & generis stemmate & literis nobiliū, præci-



4
præcipui sunt, D. Carolus de Croy princeps de Chimay, Petrus de Bossu
D. de Ieumont, Carolus de Bossu Bruxellarum vicecomes; pia memorie
D. D. Reuerendissimus Dominus Gilbertus d'Oignies, Neruionu episco-
pus, & Ioannes de Brancion: Carolus de Houchin D. de Longastre, Ioan-
nes Dilsius, Ioannes Boisor, Iacobus Vtenhouius, Philippus Deurnagle D.
de Vroyland, D. Ioannes de Limoges, aliàs Norrius, & Carolus Clusius,
horti Cæsareæ maiestatis Maximiliani Imperatoris præfectus, clarissimus
& exactissimus, vt si quis alius, rei herbariæ seruatorisque regij profes-
sores antiquissimæ & nobilissimæ Louaniensis Academix Petrus de Breu-
ghel, Cornelius Gemma, & Ioannes Viringus; quos, quòd in hoc studio
cæteros ferè præcellant, hinc honoris causa, vt in præfatione est, nomino; qui-
que in hoc concinnando opere, maximò mihi adiumentò fuerunt, sub-
ministratis innumeris raris ac singularibus plantis, quas magnis expensis
Constantinopoli, ex Græcia, Hispania, Italia, cæterisque Asiæ atque Africæ
regionibus, & nuper reperto nouo orbe, instruendorum ditandorumque
hortorum suorum causa cõpararant; aliisque quamplurimis herbis, quas
olim eis ex Italia, Gallo-provincia ac Lingua-gottica miseram, quarum mi-
hi seminaria in turbis Lugdunensibus petierant. Quapropter veritus ne
hisce deploratissimis temporibus, earum quoque quæ mihi sunt reliquæ,
iacturam facerem: in animum meum induxi, hæc nostra Stirpium aduer-
saria superioribus hisce annis in lucem edita, auctiora; & emendatiora
nunc, multisque nouis additis plantis refarcire, dilucidiusque explicare quæ
in priore editione dicta fuerant obscurius, additis herbarum facultatibus ex
Dioscoride, Galeno & priscis, quò scriptis nostris plus accedat auctoritatis
& ponderis; melius enim est à fontibus haurire, quàm riuulos consectari.
Sunt enim recentiorum complures qui profitentur, summèque gloriantur
noua se inuenisse remedia, nouasque præparandorum medicamentorum for-
mulas, è quorum numero tenebricosus suis scriptis est Paracelsus; cuiusque affe-
ctæ; cum tamen in Dioscoridis, aliisque veterum auctorum monumentis, hu-
iuscemodi extrahendarum facultatum herbarum, præparandorumque medica-
mentorum rationem posteris traditam legamus. At ne rem eandem, quorun-
dam more, sæpius repeterem; textum Galeni, Aeginetæ, Plinij, aliorumque
veterum ad verbum descriptum huic nostro opusculo minimè inserendum
iudicauit: tantum lectorem admonui eorum quæ à Dioscoride omissa &
ab aliis addita fuerunt, adiectis tamen honoris causa auctorum nominibus,
ne quenquam, aut ingenij, aut laborum gloria, quod iniquum foret, defrauda-
rem. Quinetiam sæpenumero multos locos Dioscoridis de herbarum viribus,
earumque causis per Galenum explico. Galenus namque testatur nullum
omnium eorum, qui de re herbaria ante sua tempora sunt cõmentati, Diosco-
ride accuratius, aut verius, aut doctius scripsisse; quem vnum sequendum
monet, seque eius interpretem esse pluribus locis fateretur; ei soli totam sim-
plicium medicamentorum scientiam acceptam refert: neque cum pudet
Dioscoridis textum ad verbum passim suis scriptis inferere. Comprimentant
igitur maledicam os suum inepti blaterones, qui eruditissimi Dioscori-
dis, &

dis, & omnium doctorum calculo in re herbaria principis, scripta omnia, nihil nisi empiriam esse cavillantur. Est enim turpissima illa imperitorum hominum consuetudo, ut ea improbent ac reprehendant, quæ ob ingenij tarditatem aut socordiam assequi nequeunt, & propter vitiositatem & superbiam, aliena contemunt, sua tantum admirantur.

Nec tamen interea ubique causarum, operationum & facultatum rationem curiosius reddere studii, aut simplicium medicamentorum qualitates secundas, tertias, quartas, aut etiam occultas explicare, ea studiosi lectoris industriæ brevitatis causa reliquens: quamquam eas qualitates magna ex parte in quambrevissima tabulam redegeram, ac similiter notas comparationes, ac signa herbarum inter se aliquam similitudinem habentium, foliorum, radicum, florum, seminum, fructuum, aut aliarum partium in gratiam tironum: sed horum temporum calamitas & impensæ immodicæ huiusce operis progressum retardant, aliàs tamen opportunitatem nactus & otium, id quoque, Deo fauente, absolutum in lucem dabo. Nunc quoniam in nominibus stirpium, herbarumque magna est confusio, quod unusquisque pro arbitrio, vel maxime exoticis ac peregrinis nominibus, eas nuncupet (quod baptizare isti vocant) adieci in studiosorum gratiam eorundem nominum consensum atque harmoniam.

Cæterum cum apud me haberem succinctum tractatum G. Rondelletij De usu & compositione medicamentorum minoratiuorum, præparantium, purgantium & cradicantium, variis remediorum formulis, cum, quod nunquam antehac in lucem fuerit editus, aut prætermisus in eius libro De internis, hisce nostris commentariis in studiosorum gratiam libenter adiunxi.

Suscipite igitur, viri illustrissimi, has Stirpiû nostras observationes equis animis, quas ad communis patriæ nostræ utilitatem denuo in lucem emitimus. Quas si vobis acceptas esse intellexero, dabo operam ut his locupletissimis stirpium iconibus haud pœnitendus numerus accedat; namque

Excitat ipse fauor studium, laudatæque virtus

Crescit, & immensum gloria calcar habet, ut ait poeta. Deus Opt. Max. huic cultissimæ provinciæ, vobis autem gubernantibus, & magistratus munia obeuntibus, magna cum vestra gloria, rerum omnium felicem successum concedat, & pacem vitamque ad felicem producat senectam.





PERLEGI, inq̄ manus iam terq̄, quaterq̄, resumpsi,
 Artis Matthiæ Doctore Apollineæ;

Perlegi quod opus de pectore promptum
 Publica mox populi mittere in ora par as.

Quam varium, quam dives opus! spectare novarum
 Plantarum formas quot, speciesq̄ datum!

Quot facies florum! vario queis semine natis
 Et vis est impar, dissimilisq̄ color.

Illic tum violas, Amaranthos, tumq̄ Hyacinthos,

Narcissos videas, multiplicisq̄ rosas:

Irida, caelestem qua mille coloribus arcum

Exprimit, & rorem, pratensisq̄ crocos;

Atque alios cetero celebratos nomine flores,

Commendat varius quos odor atque color.

Ipse quidem haud unis depictos floribus hortos

Fingebam lato me per agrare pede;

Dilectos Cereri quondam, quos fertilis Enna,

Quos habet exculto Sicelis Hybla solo:

Huius ubi nata assuetis comitata puellis

Carpebat florum sapiens omne genus.

Gratia debetur tibi maxima docte Lobelli,

Qui ditas plantis Belgica culta novis:

Quas è longinquis sparsim regionibus adfers,

Percurrisse levi quas pede dulce fuit;

Antiqui campos Latij, saturnia regna;

Regnaq̄, qua duplicis verberat unda maris;

Et totam, donat cui Narbo vocabula, terram,

Et quam Francus arat vomere; quamq̄ vaga

Anglorum sedem circumsonat Amphitrite;

Et te Teutonicis terra habitata viris,

Nec satis hoc, vires etiam, dotesq̄ recludis



Natus, & quo quaq; sit orta loco.
 Idq; noua methodo praestas, atque ordine pulchro.
 Confusum ut lector nil reperire queat.
 Ergo tolle moras: poscenti excudere formis
 Calcographo ingenij da munus enta tui,
 Intra qui populosa tuos Antvverp̄a muros
 Inter calcographos regia sceptri tenet.
 Nec mora, fama tui populorum exhibit in ora,
 Fies Eois notus, & Hesperis.
 Tunc noua mi tacitum mulcebunt gaudia pectus,
 Astraq; contingam vertice celsa meo:
 Dum recolam sub me linguam didicisse Latinam,
 Artibus & pectus excoluisse bonis.
 Vnde seges tam leta breui succreuit in auras,
 Quam tuus immenso foenore reddit ager.
 Tolle moras: audi inuenum tot vota precantium,
 Subdit quorum animis ars tua Phœbe faces.
 Nocturni versare ardent, versare diurni
 Quod te fama loquax euigilasse canit.
 Non poteris unus tot longum obsistere votis:
 Pande sinus: portum deserat uncta ratis.

SVMMA PRIVILEGII.

CAVTVM est Regio Privilegio, ne quis alius praeter
 Christophorū Plantinum librū hunc cui titulus est: Plan-
 tarum seu stirpium historia, intra decennium imprimat,
 aut alibi impressum in suas ditiones importet, venalemve
 habeat. qui secus faxit, pena fisco Regio exoluenda mul-
 tabitur: ut latius in Regio diplomate expressum est.
 Dato Bruxella, An. M. D. LXXV. penultima Iulij.

Signat.

L. Blyleuen.



MATTHIÆ DE LOBEL

STIRPIVM OBSERVATIONES.


GRAMINIS OMNE GENVS

Adversarior ut pag. 1^a. 2^a. 3^a. & quarta reddendum.

Vulgatius PRATENSE GRAMEN. pag. 1^a.

Belgic } Gallis, l'herbe de piz, & absolute de
Germanis } gras. l'herbe, quasi omnia: i herbarum vulga-
& Anglis. } tissima, principua, & vj:atissima dicereur.

EXILE GRAMEN durius.



Hi v-iv s femine vuntur medici ad obstructions viscerum imitatione Apulei, qui herbam gramen decoquit, & cum ea florem terit, & in panno lenit, & imposita splenis dolores finit. Folia iumenta & boues pascunt. Diosc.

Veterinæ saginandæ & lactis vbertati longè præcellit dulce: contra improbatum acidum, vulgò Saur & nigro.

GRAMINIS varietates quamplurima.

NATURA portentoso lusu quamplurimæ graminis varietates præcis & neotericis prætermis-
se aut neglectæ; solo, caluo, culmo, folio, radice, iuba, pannicula, spica & coma; maioribus, minoribus; angustioribus, latioribus; gramineis, iuncea, milacea, loliaea, hordeacea, triticea, dumtaxat discretæ, à quibus quia perspicua, supersedendū, vel ea saltem partioribus prosequenda duximus.


EXILE GRAMEN durius.

FOLIOLIS iuncea acidis vnciam & sesquicentiam alis è pusilla filamentis crebris compacta radice




radice oritur fabuletis, ericetis & squallido aridiori; agro Gallie, Anglie, Germanie & Belgij; panicula & semen acerosa, duriora, peco riminus grata.

GRAMEN Typhinum.



GRAMEN Cyperoides.



TYPHINUM iisdem, quibus proximè descriptum, natalibus gaudet, sed maritimis non fecus ac mox subdendum Cyperoides gramen. Radix item pusilla, capillacea: caulis dodrantalis & pedalis.

CYPEROIDES gramen nuncupari potest à radice mutuo cohesu sibi implexa, longiusque radicata, cyperi longi modo, ut ab aliis fecernatur. Folia habet pedem longa Algæ marinæ quadamtenus, & in cauliculo dodrantali & pedali fastigiola vnciam & sesquunciam longa, acerosa Typhini graminis ritu.


GRAMEN Paniculosum Pinalaricoides, Amourettes vulgo.

HISPANIS pulchellum gramen Amourettes quasi amatorium, ob venustatem dicitur: exilis, cirris & fibris implexa radice in dodrantali & pedali culmo, speciosa inbara latiore & lactiore panicula, congesta, per maturitatem candida. Ex Hispania in Belgium semen delatum, opera & fidelitate Caroli Clusij stirpium exoticarum peritissimi indefessique vestigatoris & scriptoris. Ne-
bonensi

bonensi agro nonnunquam occurrit. In Gallo-Belgio etiam frequens iuxta Auxiacū castrum, & vicinis locis passim.

GRAMEN Caninum medicatum. pag. 2^o. Belgis petra & Ierdgras .i. geniculatum. Gallis Chiendent. Hiff. Gramenha & Grama.

GRAMEN paniculosum.



GRAMINIS vires ex Dioscoride, Galeno, Plinio, priscis & neotericis gramineo generi reddenda, Aduersariorum folio primo & secundo.

DIOSC. Triterix radix* illitu vulnera glutinat. Decoctum eius in potu torminibus ¶ medetur, & vrina difficultatibus. Calcisosa etiam vesicae excrementa conminuit: & ab inflammationibus placat. *Decocto additur vinum, ac mel ab aliquibus, & zuri & myrrha & piperis tertiae portiones: rursusq; coquitur in aereo vase ad dentium dolores & epiphoras. Semen vehementius vrinam impellit: aluum vomitionesq; sistit.

* eadem Galenus: modicè enim tam frigida tum sicca.

† & vulneribus vesicae decocta in vino. Plinius addit.

* Plin. Gramini Parnasio hederaceo hæc tribuuntur.

Plura Plin. lib. 24. cap. vltimo, quorum vsus exoleuit.

GAL. Radix modicè frigida est & sicca: mordacitatem quandam exiguam & partium tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo quidem excessu refrigerat, in humiditate verò & siccitate moderata. Porrò semen alibi quidem excessu refrigerat, in humiditate verò desiccatorium, & tenuium partium & subacerbum.


Graminis radix dulcis est & subacerba, moderata, tenuis & exiguè incidentis substantiæ, cuius calfactionem fardus viscerum referat, colluuiem propellit & deterget. Radix vulnera glutinat Apuleio.

GRAMEN Bulbosum, nodosum Aduers. pag. 2^o.

Hisdem temperamento & viribus, quibus Caninum officinarum, peller.

GRAMEN Canarium alterum, Ischami panicula
maximo Gramini marino arundinaceo con-
gener. *Advers. pag. 4^a.*
Vstratus gramen Clusij.

CALAMOGROSTIS *Advers. pag. 3^a.*



RARIUS minusque obuium, vel animaduersum istud intermedium & cognatum cum Ischaemo vulgari & Canino gramine, cuius effigiem & formam, cum radice, tum foliis gerit: sed comosa digitatim sparsa florum tubata fertura, Ischami vulgaris vel graminis Manna: ritu. Eiusdem cum gramineo Canario generis, facultatis & vius Hispanis, Narbonensibus Gallis, Francigenis quibus item *Cobendens* appellatur. Semen acerofum, scabrum.

Varietas.

Narbonensium radicem effigiatura & parilitas adeò appropinquat arundini vallatoris, vt eandem dixeris.

In Gramine sulcato pag. 3. demè & lege culmum Parisi.
In Gramine striato albo inueni 3. demè &.

ISCHÆMON vulgare *Advers. pag. 4^a.*
CANARIA *Plinij Anguillera.*
Et Galli trus Apulei, cuius cacumen est testis pedis Galli.

Apul. Herbam triscā cum axungia & pane domestico imponas, canis morfus mox sanabit. Eadem sic, vt diximus, parata duritias discunt. Idem, in Gramine.


Gramen in se vitareum habens (nam in plura diuiditur) decrefcenti lana sublatum, plicatur.



muta valet ad epiphoras oculorum. Repositum habeto diligenter, exinde lippire incipientibus ad collum ligato, celeriter imminente, epiphoram discutere & sanare dicimus. 13

ISCHAMON.

GRAMEN *Manna esculentum* *Advers.* pag. 4.^a.
Ital. Sanguinella & capriola herba.



Mammarum durities discutere prodirat.

TRITICI genera. *Advers.* pag. 5.^a & 6.^a.

Dioscor. Tritici genera cruda in cibis teretes tinea gignunt: canum moribus profane mansa & impedita. Confectus eorum similitudine panis, plus alit quam cibarius. E trimestrium farina panis lenigens cibum praebet, & qui facile in membra demanderit: farina eorum cum hyosciami succo illinitur adversus veragrum flammam, quam Graeci rheumatismata vocant: item contra interaneorum inflationes, lentiginos ex oxymelle tollit.

Seniorum farina, contra venenatos ichus cum aceto aut vino commotissime illinitur: eadem, si decocta in glutini modum delingatur, cruentis excretionibus proderit. Contra tussim & exasperatas arterias, cum mentha & butyro decocta, effeac est.

Tritici pollen si ex aqua malsa, aut hydrelco decoquatur, omnem discutit inflammationem.

Panis & crudus & coctus cum aqua malsa, inflammationes omnes alitu mollet: cum mollet & gasdantes refrigeret: Sed herbis succisve huic rei accommodatis admisceatur. Vetus panis aridus acie sic commomentibus, citam aluum cohibet. Recentis marta maceratis, alitu vetustas impeditur: sanat.


Glutinum ex similitudine & polline quo charta glutinantur, sanguinem excreantibus prodest: si suspensus ac copiosum cochlearis mensura detur sorbendum.

Tursures autem in aceto decocti & illiti, lepras pellunt, incipientes tamen inflammationes aures leniunt.




SILIGO spica murica.

Germ. Weizen. Angl. Wheat. Belg. Tzwe. Gal. Froment, Bled. Ital. Fourmento, Grano & Salina. Hisp. Trigo.



TRITICVM arisii circumscissum.

Triticum Typhinum Des.



In Ruta verò decocto elixi, turgentes mammæ sedant. Viperarum icibus auxiliantur, & torminosi profunt. Fermentum farinaceum calfaciendû extrahendûq; vim habet, priuatim callos pedum clausûq; extenuat, & cætera tubercula furunculofq; ex sale concoquit & aperit.

* violis, Solano, malua, cucurbita, lactuca, & similibus.

† Rosis, caryophyllis, balauftiis, mefpilorum carne & forborum, myrthi & Rhois.

TRITICI temperamentum ex Galeno.

VT medicamentum foris impostum, primi est ordinis exalfacientium, non tamen nec reficere, nec humectare manifestè potest. Habet verò quiddam etiã lentoris & obstruentis naturæ. Quod ex pane fit cataplasma, vim obtinet magis digerentem, quàm quod ex Tritico, nimirum cum & sale & fermentum adiunctum habeat, quod ex alto trahit, digeritq;. Plura pete ex Gal. Supputat, & calfacit: leniter detergit, sed multò minùs quàm hordeum quod refrigerat & siccit. Pani herbarum admiscetur ad inflammationes leniendas hac remedij formula.

℞. micæ panis lb. f. farinæ hordei ℥. ij. lini ℥. j. f. florum Chamæmeli, Meliloti añ. M. j. foliorum maluarum, violarum, Solani semperuiui vel vmbilici Veneris elixorum in hydrelæo añ. M. j. f. confusis cribratis, adde vitellæ ouorum tria, olei violati ℥. iij. olei Chamæmelini ℥. j. fiat cataplasma.

Inflammationi erysipelatosa adde succi solani hortensis ℥. iij. succi plantaginis ℥. ij. succi hyosciami ℥. j.



Ex fermento in medicamento comprobatum & efficax ad pleuritidem & empiemam cum febris conuulsa.

℞. Radicum graminis canini ℥. iij. Acetosæ cum radicibus M. iij. Medullæ cardui fullonum, M. ij. Cardui benedicti, Scabiosæ, herbarum capillariû añ M. j. passularum mundatarû ℥. j. Glycyrrhizæ ℥. iij. anisi ℥. ij. ficuum N^o. 4^o. quatuor seminâ frigidorû maiorû añ. ℥. ij. florum cordialitû & Hyperici añ. M. l. Fiat decoctio in aqua Borriginis ad lib. j. l. cui infunde fermenti panis cibarij ℥. iij. coaguli ℥. j. l. Thamarindorû ℥. j. Expressioni dissolue syrapi è succo vel infusionibus Papaueris Rhœadis ℥. vj. pro quinque aut sex drâibus. Discutit, abstergit, per urinas & sudores propellit, ab inflammatione tuetur, eademque mulcet, defluxionem cohibet, febrem delet, & collectiones arceat.


Alia verò ratione Papauer Satiuum, quod incrassat, defluxiones sistit, & inflammationes mulcet, initio exhibetur. Rhœas enim, uti agria omnia, magis est tenuium partium; neque per se, sed abstergentibus, attenuantibus, concoquentibus & expectorantibus additur, ne sit vlla suspitio, & excretionis & expectorationis, ut quidam verentur, difficultas.

Ad eadem puls ex fermento.

℞. rad. Alther, vel corticum radice vimini, liliorum añ. ℥. ij. Maluarum, violariæ, florum Hyperici, Chamæmeli añ. M. ij. Coque, conterere & cribra; commixtis fermenti panis cibarij ℥. v. farinæ seminis lini & fœnigræci añ. ℥. j. l. olei amygdalini vel butyri insulsi, olei violati añ. ℥. ij. fiat cataplasma. Lenit, concoquit, collectionesque discutit.

SECALE. Aduersariorum pag. 6^a.
Germ. Saccken. Belg. Rogge.
Ital. Segala. Hisp. Centeno.

HORDEVM Ital. Orzo. Hisp. Ceuada.



Secalium panem eiusque fermentum Antuerpiani Medici potentius digerere, trahere, ab æstus maturare, & rampere tritico pane, experiuntur.

Leges adgerf
li. 4. & sequenti
& sequenti
manifester.

Plin.



Plin. Sordidos efficit panes, agrestibus hominibus idoneos, amarulentos ac lentos prope facile permeabiles; minus alit quam triticum & hordeum.

Culmorum eius aqua subactus & illitus, pedum manuumque rimas sanat Matthiolo.

HORDEVM

Legit fabaceis pag. 7.

Diosc. Hordeum minus quam tritici. In matris, abstergit, vrinam citius in flatu, stomacho adueniunt, & venarum & inflammationes discutit, duritias cum melle, vesica & fimo columbino concoquit. Cum mellito & papaueri calyce dolores sunt, qui latus excruciant. Aduersus intestinorum inflationes, cum lini semine, serpyllato & Ruta, idem tuent. Strumas cum pice liquida, cara, piscis, & impubis pueri vrina ad concoctionem perducit, & cum myrto aut lentisco, aut malucorio, aut silvestribus pyris, aut rubo, alius profluuia sistit. Podagricis inflammationibus cum Cotoneis, aut aceto prodest. Descibe in aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposta, leprosi moeantur. Creuar vero farina ex aqua atque cum pice & oleo decoctus, puri mouendo est. Cum aceto subactus idem, & cum pice contra articulorum deflexiones prodest.

GAL. Primi est ordinis in exsiccando & refrigerando; habet etiam pauillum absterisionis: paulo etiam pius desiccet, quam farina fabacea, cui non infunt corrice. Cetera enim similia sunt foris ventibus. In cibo autem fabis praestat, quod flatuosam naturam exuat. Fabis quantumcunque coequis, flatuosa natura remanet; sunt enim crassioris essentiae, quam hordeum, quamobrem eo etiam pius nutrit.

Geminum hordeum Septentrioni notissimum *καλυστρον* & *διστρον*: Picardis, Artesis, ceterisque Gallobelgis polystichon *Soucrion* vernacule, Germanis *Grosse gerst* dicitur. Autumno ad Malti sine *Mauth* & *Wymauth* confectionem feritur. Radice exit fibrosa, exili, foliis gramineis, stipula binum cubitorum, spica in plerosque versus aristis rigidis & scabris vallata, aestate matura.

Distichon Gallobelgis *Pamelle*, Germ. *kleyn gerst*, id est, minus hordeum, Martio, Aprili, & initio Maij duntaxat feritur, hyemis quippe & frigoris impatientissimum: vniuersa sui parte gracilius, cubitum & sesquicubitum raro superat: aristis exilioribus delicatoribus, molliscellis, minusque rigidis gemino sita spicatum.

Vniuersa Angliad hordei praeparationem quam *Mauth* vocant, hoc solo ferè hordeo vitur, idque polysticho ad Cereuisias Britannicas suauissimas & optimas praefert, quae quilibet septentrionales bonitate longè superant.

Mauth autem inibi paratur, hoc qui sequitur modo. Hordeum maceratur aqua biduo & tribus noctibus: deinde effusa aqua in horreum aceruatur loco ventis minus peruito, quoad germen, per pupillosque radicum cirros & pullulationes (quae hyeme tardius, vere & aestate biduo aut triduo) emisserit. Mox priusquam incalcescat sulcatim dispersum, sesquipalmum densum, ter, quaterue die & nocte subuertitur aperto aere: octo vel nouem dies continuos iterando, perficitur. Tandem in tabulato pertuso, igne subdito vel aperto fornaci vimineo texto calatho acuminato, & superstrato hordeo; igne lento è palea, cremiis vel arido ligno alnato fornacis ostiolo, sesquipalmari internallo ab imo interposito, exiccatur, quoad molis frangi queat; sicque extostum *Mauth* in fornacis capacitatem deicitur: quod ex qualibet hordei mensura ad quartam partem accrescit; & antiquum bonitate, in Zytho componendo, nouum praecellit.

Biera sine Cereuisia compositio.

Normannis & Gallobelgis Bierre & Cernoise. Anglis & Germ. Bier.

xx. Malti molis leuiter contriti modios Anglicos octo, aquae fluuiialis limpidioris fermentis, cui aliquot manipuli fufuris triticei incocti faciant, quantum satis sit explendo dolo Aureliano. Exactè mixta, infusa calidè peribent tres horas: deinde foraminulo palea aut duplicato fundo apertè subterluant. Id quod transmissum est (Belgis & Anglis *woyt* vocatum) recoquitur semihoram, sesquihoram vel aliquot horas vt melius conseruetur, adiectis libris quatuor farum Lupuli salicisij: mox longo latoque lacu vel depressis labris vix pedem altis perfrigerantur. Et huius decocti frigefacti libris octo vel decem, fermenti sine fecis Bierre vel Ale potentioris libra aut sesquilibra adduntur, exactè agitando, loco tepidioris permiscantur, stragulis operiendo, sensimque reliquum liquoris vt commodius fermentescant, affundendo. Quibus absolutis transcolantur: vasa adimplentur: demumque fermentatione absoluta, exactissimè occluduntur.

Eidem Malti nouam affundunt feruidam, transcolant, eoque Cereuisiam tenuem concinnant.

Variis è frugibus, tritico, hordeo, zea, auena sic Maltum, quod ratione conliciendi, Bierre colores inuariant. Triticum & polystichum, supra coctum & excoctum potissimum, rubicundum & subfulcens perentissimum efficit. Hordeo disticho, auena, zea, tritico, commixtis quinis vel senis librae farum fabaceae, albida & limpida redditur. Malti hordeacei partes duae aut tres, auenae & tritici si vna vniuersa aut tres, farinae fabarum quantum tritici quarta pars, aquae quantum satis, pro tenuitate, & potentia Bierre futuro.



*Prima nobilitatis Anglorum ALA suavis & vini saporis potio, cuius hystis precipuus
vfu, quia minus conseruatur.*

Recipit decocti Malti (vernaculè wort) libras ducentas, florum lupi salictarij M. ij. quò Malti dulcem & insipidum saporem exuat. Percoctis & transmissis sensim commisceantur (vt supra monuimus) fœcis bieræ vel Alæ libræ tres, & Staut Anglorum (Belgæ Darrüter vocant) libræ sex vel octo.

Sicut enim fit hoc qui sequitur modo.

℞. farinæ Malti lib. vj. vel octo: aquæ feruefactæ lib. 12. vel 15. quæ agitata & probe sexies die remixta tepente camino, stragulis operio & palea condito nitido vase tamdiu macerantur, donec Serapij lentorem assequantur. Tunc igne sedulo versando ne vrantur, ad pulvis solidioris crassitiem percoquantur.

Zozdr & Curmi Dioscor.

DIOSCOR. Ex hordeo potus fit, cui Zytho nomen est: is vritam cit, venes & nervos tentat, membranis præsertim cerebrum vestimentibus, officium rationem parit, vitiosum succum creat, elephantiasim gignit.

CURMI.

Fit & ex hordeo potus quem Curmi nominant; eodè, sæpè pro potu vritatur. Verùm capitis dolorem mouet, malum succum gignit, neruus nocet. Consimilia etiam potus genera ex tritico fieri solent in Iberia qua Occidentem spectat, & Britannia.

Zythum & Cereuisia Plin.

Ex frugibus fiunt & potus, Zythum in Ægypto, Cælia & Carrea, in Hispania: Cereuisia & plura genera in Gallia, alijsq. prouincijs; quorum omnium spuma cutem fœminarum in facie nutrit.

Quantum ex priscis Plinio & Dioscoride coniecturam facimus de Zytho & Curmi, potiones Cereuisiæ nostris proximas, nec dubiè designasse videntur: præsertim Alam, quæ vini vicem antiquitas supplet Britannis; quorù ipse Dioscorides meminit; referès malū succū gignere & nervos tentare: quibus idem, quod nobis, euenisse potuit, potissimū plebi & Anglicæ rusticæ turbæ, cui ad gulæ delectamenta potentiorè Alam è cauponarijs expetenti, inexaturabilis quæstus gratia illâ ex Malto lixiuio aquæ vice macerato, improbitur; sic enim magis compositam & grano potiorè emenditur; caput ferit, lætamque opiliombus, colonis & naucleris stultitiam conciliat. Nec desunt nonnusquam inexplebiles nummorù vafri homines qui Bieræ pro lupuli floribus catini fuliginè substituunt, aqua falsa Maltum macerantes, vt eo plus sitiantur bieræ, quo plus sint potæ. Harum potionum & consimilium assiduo vfu incommoda Dioscoridi memorata percipiuntur: quæ non possunt sine hepatis & viscerum summo dispendio assumi. Cerebro & neruis inde affectis & sanguine exusto, fit tuberculorum in facie & naso, vti elephantorum, eruptio. inde apud Anglos in hunc vsque diem locus protrito elogio, Ascitit sibi faciem & nasum rubrum, tuberosum, commendationis Alæ. Maxima igitur in Cereuisia varietas: pro ratione, quantitate frugum, mixtione, compositione varias qualitates sortita. Germanis & Belgis Gentiana, Baccæ Lauri, Zeduaris, Saggel, Helenium, Lauendula, Saluia, Hormini flores, Cuculus siue Cucubalus Indianus, (quem insanum seu furiosum solanum faciunt) chamæpitys, coriandrum & consimilia vnâ cum lupulo incoquantur.

Limpidior, potior, bene defæcata biera, cuius quidem faciendæ rationem, vt calidioribus innotescat regionibus, docuimus, suavis & salubris est potio, alimentum bonum præbet, modò probè & ex optimis frugibus paretur & percoquatur.

Tenuis autem quæ grani minus, plus aquæ, recipit; humectando refrigerat, minusque alit.

Acida malum succum gignit: renes, neruos & caput tentat: tormina, inflationes intestinorum, quæ admodum & recentior epota, stillicidium vrinæ, crassum succum, calculum renum & vesicæ parit. Luteriana crassa, dum recens, pessima.

Additur Lupulus Bieræ vel Alæ duplici ratione; cum ob saporè & conseruationem, tum quia crassum succum Zythum procreare literis prodatur, cuius erratum & noxam emendaret, aperiendo abstergeret, per venas crassa pituitosaque excrementa, venarum, renum, vesicæ, citra magnam calfactionem educeret: docemur. n. à Mesue in syrupo è succo Lupuli & Byzantino, alijsq. neotericorù compositionibus Lupulū, non secus ac fumarium, sanguinem purgare & defæcare, citiusque ebullitiones compescere: iecoris intemperiem calidam, internosque feruores, febresque biliosas & pituitosas arcere. Quem eundem effectum præstant turiones siue Asparagi vere erumpentes, cibo & acetarijs.

Floribus tamen, quia temperatè calidi, secus euenit, vti de Coriandro monuimus Aduerariorum pagina 314. Quòd caput feriant, è Cereuisia non reiciendi; neque illis causa rheumatismatum & articulorum defluxionum, vt doctis Anglis per placet, attribuenda; sed potius ingluuiet, crapulæ, mollietis, blanditijs & gulæ oblectamētis, quibus sunt dediti, ascribere debent: quia Ala ipsa potentior, sine eis, aut lupulo pauxillo concinnata, non secus ac vinum, abditissimas permeat cerebri membranas, eademque infert incommoda. Lupuli flores non nocent qualitate, sed quantitate, quemadmodum vinum & opima quæuis temeta.

Ex Malti colamine Caraplasma podagriticis utilis.

NON secus ac Defruto .i. musto quàm dulcissimo Columelie ad tertias, dimidias Plinio decocto, Barani, Frisij, Angli, & Belgæ, optimæ Cerevisiæ wort sine musto pagio, id est, infusi Malti colamine excocto pulvis ad nervorum & articularum dolores faciunt, qui leniendo, roborando & digerendo mirè congruunt.

Recipiant crassamenti Cerevisiæ excocti lib. ij. fel tauri vnum: ebulliant lento igni ad lib. j. postea adde aceti lib. j. pulveris olibani ꝑ. j. pul. florum Chamæmeli, Meliloti, añ. ꝑ. j. f. pul. Rutæ ꝑ. i. mellis & pul. Cimini añ. lib. f. denuò ad crassitiem percoquantur. Hoc medicamentum mihi communicavit pereruditus medicus D. Baylly apud Auxonienses professor Regius.


Pisana.

Ex hordeo Pisana *ἀπὸ τοῦ ἰσχυροῦ*, hoc est, pisendo decorticare. quod omnibus frugibus quadrat, nonnunquã etiam leguminibus Galeno teste de alimētis capite de *παντοκράτω* .i. ex lente Pisana. Cruda priscis dicitur hordeum, auena, & frugum omne genus decorticatum: Cocta verò coctione diuturna in vnum corpus redacta, quæ pisana tota etiam vocatur, à *πρηνε* hordei transcolato varia. Gal. lib. 1^o. alimentorum, capite De hordeo, pisianam crudam etiam fecit hordeum acerosum, quod ad pisanas expetitur.

Hordeum glumis exutum, siue pisana, magis lenit asperitates, nutrit & humectat. Vis deterforia, obstructions referans in acere consistit.

HORDEVUM *spontanæum spurium.*
HOLCVS *Plinij Anguillæ pag. 7.*

ZEOPIRYM *siue TRITICOSPETHVM.*
HORDEVUM *nudum vulgo vocatum pag. 8.*



HOLCVS Plin. lib 17. cap. 10. in saxis nascitur siccis: aristas habet in cacumine tenues, culmo quale hordeum restibili. Hæc circa caput adalligata, vel circa lacertum educit è corpore aristas. Hanc quidem ob id fistidam vocant.

ZEA, Zea, Aduersar. pag. 8.

Germ. Speltz. Gal. Espeautre. Hisp. Spelta. Ital. Spelta & Farro.

Diosc. Plus quam Hordeum alit, ori grata, digeritur in panificia, minus quam Triticum alens.

Gal. Vniuersa sua facultate tritici & hordei media.

Plin. Ex vino ad Scorpionum ictus tepida, & sanguinem excreantibus. Item Arteriarum: cussi cum caprino seuo aut butyro, ex fernogræco mollissima omnium, vlcera manantia sanat.

CRIMNON Diosc. est Semola Gallorum & Italarum.

Diosc. Crassior est ex Zea Triticoidis farina, ex qua pulcem faciunt, abunde alit, facile conficitur; alium vehementius adstringit, si Zea ex qua fit prius torreatur.

* Aegineta & Gal. concoctione tenitur.

SILIGO Tragi. OLYRA Dioscoridis.



Diosc. Zearum generi adscribitur, sed minus aliquanto nutrit, in panes vt Zea cogitur.

BRIZA. Monococcus recentiorum & Dod.

Aduers. pag. 9.

AVENA. pag. 9.

Angl. Oates / Otes & Haut. Hisp. Auca & Auena.



Lege pag. 9.
l. 15. dat. & l.
18. contingere.
Item l. 19.
Aduers.

Diosc. Avena ad cataplasmata vitis, veluti hordeum. pulce huius alius fititur; prodest tussientibus in febri- eadem Gal.
tione succus. & Aegineta


Gal. Illita desiccat & digerit mediocriter, sine morfu, temperiam autem habet paulo frigidiorē; nonnihil etiam astringentis obinet, vt ventris profusua iauet.

Plin. Decocta in aceto nauos tollit.

Vulgas medicorum & plebecula torrefaciunt, sacculis excipiunt milij modo ad colicos dolores, admoventque calidē.


C. Bromo

BROMOS.




Pag. 9. l. 32.
leg. effig. est
Bromus sterilis.

BROMOS
sterilis. 12.




AGRYLOS
Bromoides
Belgicum.



AGRYLOS
Narbonensis.



BROMOS



BROMOS, *Festucago* Gaſa. pag. 9.

Gallie, eueron. Ital. vena vana & auena caſſa, & Orzo ſaluatico.

Iam demum Matthiolo *Aegylops altera*, non prima epi. 843.

DIOSCOR. Bromus herba *Aegylopi* ſimilis, exiccatoriam vim habens, decoquitur cum ſua radice in aqua ad tertias, & inui colato per modum mellis adicitur: rurfus incoquitur, dum liquidi mellis craſſitudo fiat. Linteum ex eo humore imbutum, & naribus inditum, contra graueolentiam vlcerum efficaciſt eſt. Aliqui tritum aloem addunt & eo modo vtuntur. Cum ſiccis roſis cocta in vino grauem oris halitum emendat.

BROMOS ſterilis altera; *Festuca altera* Dod. Germ. *Boze* & *Aulch*. Belg. *Dzauick*.

BROMOS ſterili affinis hæc & perquam ſimilis: apiculis compreſſioribus Canini graminis, ſemè oblongum, aceroſum, Secalino, cuius eſt vitiū, multò minùs claudentibus, in ſecali & agrorum marginibus reperitur apud Belgas.

ÆGYLOPS Bromoides Belgarum: *Aegylops* Dod. Belg. *gebærde eutene*.

ÆGYLOPEM inter & Bromum herbam media eſt hæc, quæ Belgis *gebærde eutene*, qualiſi dicas, auenam ariftis ſiue barbula donatam. Auena caſſa aut *Aegylopi* aſſimilatur. Semen acutum, hirsutum, oblongum, ruſſum, glumis occluſi. In Anglia, Belgio, & Gallia inter hordeum & ſecale nonnuquam occurrat. Num eadem quæ *Ægylops* præſtet, incomperum hæcenus.

FESTUCA ſiue *drylwa* Narbonenſis & calidarum regionum. *Aduerſ.* pag. 10.An *Festuca bordeum* Plinij? Ital. Orzo ſaluatico.

DIOSCOR. Illa cum farina herba * *agylopi* madetur, † duritias diſcutit. Succus farina admiſtus ſiccatur, & eorundem gratia reponitur.

* Gal. eadem.

† quia leniter eſt actis, digerendi vim poſſidet.

PHOENIX *q̄ivē* pag. 10. *Hordeum murinum*, vel *Lolium rubrū*: Belg. *Duuple koren*. Ger. *Wintzen helmee*, & *Wald trohoz*. Gal. *Iaraye ſauuage*. Ital. *Gioglio ſaluatico*.

LOLIUM *Aduerſ.* pag. 10.Germ. *Tuualeh*, ſiue *wepien*, & *Aulch*. Hiſp.*Yoio*, & *Zizania*. Ital. *Gioglio* & *Loglio*.

C 3

DIOSCOR.



DIOSCOR. Phœnix in vino austero pota alui profusivum & emanantem tuina sanguinem sistit, trina hys-
taus isfratas. Sunt qui adalligatam in pino co velere, & suspensam, sanguinem suppressere prodant.

LOLIUM.


DIOSCOR. Nomae molitum, putrescentia vlcera, gangranâsque composcit, cum raphanis & sale illitum
& ex aceto & sulphure, vno seros lichenas & lepras sanat. Strumas quoque discutit, cum fimo columbino & lini
semine decoctum in vino, rumpit que agrus ad coctionem perducuntur. Decoctum ex aqua malsa velissimè ischiadici
illinitur, si cum polenta, thure, myrrha aut croco suffiatur, conceptionem adiuuat.

GAL. Desiccatur, & exalfacit efficaciter, ut propinquum sit acribus, magis quàm Iris: sed non est
perinde vtilis, subtilis essentia. Verùm multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsum quispiam in
primo tertij ordinis exalfacientium; secundi verò in fine exiccantium.

Loliaceam farinam suis soporiferis medicamentis miscent Chymistæ.

VSTILAGO Aduers. pag. II.

CRATÆOGONON Aduers. pag. II.



DIOSCOR. Cratæogonum, inquit, traditum est à quibusdam, hoc si bibat ieiuno ore ter die post menses pur-
gatos tribus obolis in cyathis aqua duobus mulier, ante conceptum quadraginta diebus, & vir modo consimili totidem
diebus ante coitum haeriat, virilis sexus partum futurum.


CRATÆOGONI varietas quorundam & Euphrasia 1^a. Dod.

Quæ floribus suave rubentibus secus agrorum margines erit, aliquanto minor, pedali caulicula
lo, folis Melampyri & Cistiæ gallinæ æ mediis. Euphrasiam secundam Dod. fecit.


M. 16.



MELAMPYRUM, *Triticum vaccinum*
Tragi, Cordi, & Dod.




PSEUDOMELANTHIUM, *Nigellastrum* Dod.
Lolium perperam Fuchsio. *Lichnoides Segetum* Matoni.
Gitago Tragi. *Hisp.* *Negullia*, &
Allipiure. pag. 12.



ORYZA.

pag. 12. l. 36.
de faggeto.
l. 7. l. 7.
de faggeto.



Pseudomelanthium, ut testatur Fuchsius, ex neoteriis lichenibus & psoris sanandis, vii Lolium, efficacissimum; vulnera glutinat, fistulosos ulceribus medetur, sanguinem suppressit.

Num pello subditum menses trahat, ut ex Hippocrate Dod. refert, ignoremus: sed Nigellam vtramque siue Melanthium cum herrense, tum campestre, cuius gemina varietas, melle Martiiali excepta, id prestare non dubito. Cum inter segetes Melanthium sylvestre oriatur, suspitio est Hippocratem per Melanthium ex tritico illud ipsum innuisse.

Quasvis cutis foveationes seminis farina ex melle illita delet.

ORYZA $\sigma\rho\upsilon\zeta\alpha$.


Angl. *Wheat*. *Hisp.* *Arroz*.

Dioscoridi & Galeno mediciter usus, & deum suppressit.

Crassum praebet alimentum.

MALIVM


MILVM.



MILVM
Indicum.



Panicum.



Panicum.



MILVM



MILIVM Angl. *Millets* & *millet*. Hisp. *Mijo* & *Milho*.

DIOSCOR. *Milium in panes coactum, minus ceteris frugibus alis: sicut pulve sua aluum, vrin. & am. est. Torrens.* Plin. & Gal. eadem.

Gal. Primo ordine refrigerat, exiecat vero tertio exoluto, aut certe 2°. intenso. paula lum etiam habet tenuitatis. Aluum humentem desiccet.

Varietas. Semine nigro & latiore iuba ab hoc solum diuersam videas.

MILIVM Indicum Plinianum, Frumentum Turcicum Dod.

Triticum Baſſianum Plin. apud Cordum. *Aduers.* pag. 13. 14.

Germ. *Turchſehen Korn*. Hisp. *Mijo Turqueſco*. Ital. *Fromento Indiano*.

SORGHO, *Melica Italarum Matthioli & Dodonai. Aduers.* pag. 14.

Germ. *Sorghamen*. Belgis, *Sorghaer*.

Viribus Panicis constat: pauperum tabernis & culinis agri Ferrariensis vſtatiffima.

Lege p. 14,
lin. 3. *videtur*
talibus.
Ibidem l. 11,
traſſior ſed bre-
uiter.

PANICVM. *Aduers.* pag. 14.

Angl. *Panick*. Hisp. *Panizo* & *Panico*.

Mel frugum Dioclis, *Anguillara*.

Diosc. *Panicum eſdem quos miſum habet vſus, minus tamen & nutrit & ſtringit.*

Gal. Foris ſiccet & refrigerat.



PANICVM aliud Indicum,
& Hisp. *panicula villoſa*.

Herbariorum PANICVM Sylueſtre.

Aduers. pag. 15.

Perperam *Lolium Cordo*. *Gramen manna alterum* Dod.

Iſchamen Plin. C. *Cluſio*.



Lege p. 15,
lin. 11.

Rarius hoc Panicum superiori anno à quodam cluturgo Bristoliam Angliæ ex nouo orbe delatum,

à vobis

è vulgato diversum nutante panicula, graciliore longiore maximi Amaranthi, pedem æquante, hirsutior spectatur.

Herbariorum Panicum sylvestre.

Aliibus, vti frugum vitia & graminea, expectitur; minimè in cibus, eoquæ Panico quàm gramini Mannæ propius.

LACHRYMA Iobi, Lithospermum Plin. & Diospyros: HOLOSTIVM Ruellij herbariorum & Lutetianorum Aduers. pag. 17.



PHALARIS *vālogis*, Aduers. pag. 16.
Ital. Falari.

Perperam Graminis genus Fuchsio.

Gramen Leucanthemum Dod.

Chamaeissos Oribasi, Italis.

Euphrasia gramen Tragi, & tandem gramen alterum floridum Matth. an Holostium Lacunæ



DIOSCOR. Tanditur, & in aqua aut vino succus ad vesica cruciata vtilissimè bibitur: Semen cochlearis mensura potum, ad eadem efficax est.

Subdit Galenus, ceu in se se habeant quidpiam tenuium partium, & calidum.

Linea 6. & 3. parentesi claudantur (que vtiliores, &c. morum vni.)

DIOSCOR. Holostium herbula quadrantalie, humi repens: foliis viticulis, coronopa aut gramini proxima, gustu adstringentibus, radice alba, pratensis vsque in capillamenti speciem, longitudine quatuor digitorum. Nasitur in collibus terrenis. Vsus eius ad rubra, in vino pota, nam carnes coguntur, decoctionibus addita.

Eandem hæc herbulam foliis, flore stellato & viticulis, in marginibus agri sabulosi Antuerpiani, sed minoribus multo, etiam Autumno florentem hoc anno videre meminimus.

Holostium alterum, aduersariorum pag. 17. est Filix sacra Tragi.


Holostij Monspeliaci varietas, inter Plantagineas.

Varietas

PHALAN-
GIUM
CAULIS.



PHALANGIUM non ramosum. Adarrf. pag. 18.
Ital. Falangio.



PHALAN-
GIUM
CAULIS.



Aliud quoddam Phalangium voluptatis ergo
in hortis Belgicis, Italicis, & Anglicis colitur. Prio-
ri Phalangio ei omnia similia præterquam sum-
mus petalis cauliculus, quem sine ramulis in pe-
diculis lactei stellati flores, & semina in pericarpis
antedicto similia, sed maiora, ambiunt.

PHALANGIUM Creta Salmensis. pag. 18.
Alphodelus minor Clusij & Dod.

Nisi à frigoris iniuriis defendatur, emoritur in
Belgicis hortis hyemis sæuitia, est enim frigoris
impatientissimus.

DIOSCOR. Poina, semen, flos, cum vino pota, auxi-
liantur contra scorpiones. * Phalangiorum, illius: tor-
mina quoque discentium.

* Gal. quia facultatis tenuitatis partium desic-
cantis.

Manna. *Aduersar. pag. 23. 24. 25. 26.*

MESVE. Temperata est, aut paulò calidior, guttur, thoracem, ventriculum lenit, terget, bilem clementer purgat, sitim sedat. Quoniam verò imbecilliter vacuat, præsertim cruda (cocta enim citius agit) thymo & hyssopo, vel alio, vis eius vt cassiæ intenditur: Valentibus autem medicamentis mista, eorum actio nem reddit meliorem: cum suo dulci sapore illa nature magis familiaria reddat. Ob id eam Galenus scammonio miscuit, quod à posterioribus est laudatum: alij deinde turbiti, alij aliis. Datur à drach. sex ad drachmas quindecim: annum seruat.

DE ARVNDINIBVS *Aduersar. pag. 27.*

Kánu & *sive Calamus.*

Gal. Roseau. Belg. Siet. Germ. Rortz.

Ital. Canne a far siepe.

Vallatoria sive phragmites Diosc.

ARVNDO *Donax sativa nostras, sive Cypria.*



Aduersar. pag. 27.

Gal. Canne. Hisp. Caña. Germ. Rortz. Belg.

Spaenscy Siet. Ital. Calami à far conocchie.

Lege pag. 26.
lin. 10. anelura-
na. & paulo
post scilicet.

Lege pag. 27
lin. 10. gra-
tiss.



DIOSCOR. Vallatoria sive phragmites trita radice per se, aut cum bulbis suis illita, siccis aculeosq; corpore extrahit. Luxata, lumborumq; dolores cum aceto mulcet. Virentia sola tusa & imposita, ignibus sacris venduntur, & ceteris inflammationibus. Corticis cinere peruncta cum aceto alopecia sanantur. Panicula lanugo, si aures intraverit, exsurdet.

* Gal. Cuiusdam trahendi vis ei inesset, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque acrem.

Paulus cadē. † Gal. Cortex verò combustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur cum nonnulla absterfione, vt exiccet & calefaciat, tertio quodammodo ordius, plus tamen siccet quam calefaciat.

* Gal. Adeo tenaciter hærens affigitur, vt auelli non possit, auditurque viset.

Radix

Radix squammas ossium extrahere creditur.

Arundinis folia melius substituantur pro teneris palmæ pululationibus in emplastro diachalei-
teos, quam radices.

Agineta, Phragmites abstergit; folia eius viridia moderatè refrigerant.

CALAMVS odoratus Libani, κάλαμος ἀρωματικός.

DIOSCOR. Melior est fulvus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula, albicans, len-
tus in mandendo, & adstringens, ac cum quadam acrimonia amarus. Urinam potu cit, & quare cum graminis aut apij Plin. cad.
semine coctis, in aqua subter cutem fusa morbo renum vitis, stillicidio urina, ruptisq; commodè bibitur. Menses & po-
tu & appositu pellit. Tussi suffitu medetur per se, aut ex resina Terebinthina, hausto per arundinem fumo. ad mulieres
infectus decoquitur, & chysteribus imponitur. Suffusionibus, maledematibusq; odoris gratia commiscetur.

Memini me vidisse Venetiis ad Angeli symbolum Calamum aromaticum, quem Alepo Syriæ Se-
quinus Martinellus doctus & industrius pharmacopœus, fortè delatum ex lacu inter Libanum & il-
lum ignobilem montem Plinio lib. 12. cap. 22. memoratum miserat. Arundo erat geniculata, nitida,
crassitudine paruum digitum æquans; color fulvus, ni labat memoria, saturior; odoratus, parum lentus
in mandendo, subacris & amarus.

Iacobus Vtenhoutius generosus Gandauensis; stirpium & artis medicæ peritissimus, Calami aro-
matici dodrantes cannulas araneorum telis plenas, fulvas, geniculatas, digiti minimi crassitudine,
gustu planè aromatico, amaricante, Schœnantho præstantiore, Balneolis vulgò *Baignol* Galliæ Narbo-
nensis nactus est inter Schœnanthi festucas, quas Massiliam aduectas ex lacu Plinio memorato asse-
rebant.

Multò maiores habuit præclarus vir Augerius D. de Bousbecke Flander Insulanus, Cæsareæ mai-
statis Constantinopoli legatus, stirpium exoticarum peritissimus.

Albicans] quia fulvum prius dixit Diosc. videtur
referendum ad araneosam illam substantiam, qualè
in aliis arundinibus cerne est, nisi velit ex fulvo al-
bicantem significare. alij radici tribuunt.

Urinam potu cit, cū graminis aut apij] Semina diure-
tica addit, ut medicamento acrio inueter, & sit mag-
is destinatum hydropicis & nephriticis; quando
lotium ob affectos renes vel vesicam supprimitur,
stillicidiumque fit quod stranguriam appellant.

Menses & potu & appositu] quia aliqua sunt quæ
pota menses, nō apposita mouent: vel quia nonnulla
imposita menses eiicere possunt; quæ nō intro assu-
muntur; quæ ichores absorbendo menses retinent,
potius quam mouent: aut quæ sunt amara, aut odo-
re ingrata imponuntur, nec nisi vrgenti & maximo
affectu propinātur: Cuiusmodi sunt Lachrymæ fœ-
tidæ, Sabina, Bitumen, Assa fœtida, Galbanum &
consimilia attrahētia medicamenta simplicia vel cō-
posita; quæ intro sumpta ventrem laxant: pessari-
ij autem modo subdita, sanguinem attrahunt, què
etiam medicamento acrimonia expultrix facultas
irritata expellere cogitur.

Tussi suffitu medetur] Fumus aërem inficit, quem
quia pulmones hauriunt; siccando, humores ablu-
mendo, & defluxiones sistēdo egregiè curat. Quod
commodius ut fiat, scitè Dioscorides Terebinthi re-
sinam addit, quo plūs vaporosæ fuliginis reddat,
quæ potentissimè catarrhos & vlcera pulmonum
siccat. Tamen fœctis pulmonibus difficillimè spi-
rantibus affatim per infundibulum aut arundinem
hi vapores minimè, ob suffocationis periculum, in-
tromittendi; nisi prius medicamento purgente ex-
crementorum copia imminuta, in cubiculo vel le-
cto occluso fumum sensim hauriant.

ARVNDO Indica florida. Cannarum quorundam
Advers. pag. 28.




Malagmaticis odoris gratia commiscetur] Non solum odoris gratia malagmaticis, hepaticis, stomachicis & v-
terinis additur, sed ob illas dotes quas habet.

Gal. eadem.

Agineta ex secundo calfacientium & arefacientium à temperatis excessu, subulioris nonnihil & astringentis est potentia, vitam ergo proritat.

Plin. lib. 14. cap. 11. & lib. 12. cap. 22. subdit.

Illæ quæ in India Syriaq; nascitur odorum vnguentorumq; causa, cit & menstrua, admota medetur convulsis, duobus obolis pota: Iocinori, renibus, hydropi, tussi etiam suffitu, magisque cum resina. furfuribus vlceribusque manantibus cum vino radix decocta: excipitur & succus eius, fitque elaterio similis. Efficacissima autem in omni arundine quæ proxima radici, efficacia & genicula.

ACORVS. *Aduers.* pag. 29.ACORI *exactior effigies altera.* pag. 29.

CERTÈ cum huius exoticæ & peregrinæ elegantis plantæ prior effigies è fragmentis aridæ herbæ fuerit depicta, priusquam Acorum nascentem nacti essemus, & quia minus rectus, sed aridus duntaxat nobis visus, ei exactiorem ad viuum expressam iconem annectendam operæpretium duximus, cuius virentem plantam inspectione assecuti sumus hoc anno 1575. Liex Belgarum, munere C. Clusij huius historiæ clariss. scriptoris, in cultissimo & amœnissimo paradiso D. Ioannis Dillij, rei herbariæ, omniumque naturæ miraculorum, perquam auidi & periti: folijs Xyridis, sed oblongioribus & angustioribus, sesquicubito maioribus, nitidis, atrovirentibus, constricti radici eximia fragrantia predictis, quæ Iridis siluestris ritu hyeme marcescunt & vere nouo pullulant. Radices habet quales in officinis præstant nomine Calami aromatici implicatas, nec in rectum, nec alium actas, sed cespite summo in obliquum (ve appositè annotat Diosc.) sparsas, subius numerosa coma fibratas, albicantes foris, intus candidas, gustu acres & amaras, geniculis distinctas, è quibus vtrinque alternatim, alarum rursus apparentur pullulationes. neque caulem neque florem edidit. quinimo asserit Clusius, relato C. V. D. Caroli Ryni & D. Augerij de Bousbecke Cesaris ad Turcarum imperatorem oratorum, nullum vel florem vel semen, etiam vbi sponte nascitur, in magno quodam lacu ad radices montis præcelli iuxta Pausilam.

Prassiam Bithyniæ urbem, proferre: sed duntaxat quædam nucamenta, nucis Pondicæ iulis similia è ramulis ex leui caule prodeuntibus.

DIOSCOR. *Radix vis calfactoria. Decoctum potum vrinam cit: prodest lateris doloribus, & ictericis atq; thoracis: item torminibus, vulsis, ruptis: liene absumit. vrina scilicidie & serpentis ictibus auxiliatur. Insidentibus ad multos affectus, Iridis modo, vtiliter imponitur. Oculorū caligines succo discutit. Antidotis radix magno vsu commiscetur.

Plin. * & **Gal** † Consistentia tenui: & hinc lienes induratos inuat, ceratodis crassitiem deterget & extenuat: sed ad hoc melior est succus. Omnino verò siccificum esse clarum est. Et sanè ordinis esto tertij, in calefaciendo & siccando.

* **Plin.** contra suffusiones & caligines oculorum succo eiusdem epoto, contraque serpentes. Omnia vesicæ vitia sanat. Testium tumores, radix decocta in vino, tritaque & illita, mirè discutit. Duritias & collectiones omnes sanat, decocto herbæ fouentibus. Contusis & euersis pota duobus obolis in muli cyathis tribus radix prodest.

Radix Acori siue Calami aromatici officinarum amarulenta est; Galeno tamè Acorus amaricat: quare Galāga maior pro Acoro præferenda; & Calami aromatici radicē pro Calamo odorato Libani vsurpabimus: Galenus Vīneam substituit quā ὀπάριον vocant, è cedro vel larice, vel populo præstantissimam.

Per triduum radicis decoctum potum vrinam mirificè diducit & stranguriam sanat Apuleio. & herba in vase apum suspensa, nunquam effugient, neque examinabunt.

ACORVS nostras palustris. *Advers.* pag. 29.

Butomon Theoph. Valeando. Pseudiris & Iris lutea Dod.



Belg. geel liscy. Gal. glaycul & flambe bastarde.

Ger. gel schwertel & Drachentwurtz.


Angl. Gladden or false Acorus.

GALANGA maior.

Perperam officinarum Acorus. *Advers.* pag. 30.



Galanga maior



Galanga minor

ACORI nostras radix constringit, roborat, cogit, & contrahit: dysentericis utilis, menses sistit.

Alium in Bohemix hortis luteis floribus coli tradunt; Iridem que luteam appellant.

GALANGA vtraque. *Nec ruidendo facile cedit.* *Advers.* pag. 30.] Acori radices frangendo faciles esse

esse vult Plinius, quod Galanga non convenit: proinde hæc Galanga, non est Acorus.

Astringendo ventriculum & viscera roborat, & à flatibus vindicat; concoctionem iuvat; coliacos, colicos, & à flatibus ortos dolores mitigat. Stomachicum & cephalicum est medicamentum.

Naribus pulvis inditus cerebrum expurgat, sterturamenta movet. In calfaciendo & siccando tertij est ordinis remissi.

IRIDES. *Aduers. pag. 30.*

IRIS vulgaris. Belgis blanlisch ouer 3ee. Gallis, flambe ou glayeu! *Angl.* Flour de Auce/ or flour de Aprc. *Ital.* Giglio celeste, & Giglio pavonazo. *Hisp.* el Lirio cardeno, lirio decor de cielo .i. decus cali.




IRIS vulgaris varietas.

Flore caruleo obsoleto, cinereæ; alioqui nec ita ab similibus omni sui parte, sed maior in viretis nostris occurrit.

IRIS Dalmatica maior.

Aspectu hilaris perennius foliorum exortus, lateratim traiectus, & radiatim alas pavonis explicatas imitans: floribus pluribus ex vno caule multis concavo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis nitentibus senis foliolis, altero parim etiam repandis. Vireta Belgica hanc in delitiis habent munere clarissimi medici Panij Ducis Ferratiensis. Semen profert in siliquis angulosis,



DAIMA


IRIS Dalmatica minor.

Biflorae Iridi facie, omnique sui parte persimilis, sed tota minor, & flores dilatiores aliquantulo. Alfonso Pancij medici Ferrariensis doctissimi munere missa & Belgij inquilina facta.

IRIS biflora Lusitanica.
An astragaloides Aetij?

Perpallida IRIS latifolia.
Aduers. pag. 32.

Lib. 1. ca. 3.



IRIS biflora Lusitanica.

Nostris Belgio, Hispanico delata solo, etiam inquilina facta est; vere & autumno florem odoratum violaceum singulis caulibus cubitalibus & sesquicubitalibus singulum aut alternum villosa candore fimbriatam proferens: densa breuique radice, frangenti que contumace; facie & foliis Dalmaticae similis, sed magis sparsis. Flos ut plurimum singularis tantum reperitur.

IRIS Lusitanica verna.

Aliud inuenitur genus, Dalmaticae Iridi maiori cum foliis, tum caule, & ternis quaternisque floribus simile; sed colore omnino violaceis seu purpureo saturioribus: cuiusmodi me vidisse inuat hoc vere in antecessis viridariis illustrissimi D. Ioannis vander Dill, & Mariae Scherz.

Perpallida IRIDIS latifolia varietates.


Chamaeiris, ex quo eam è Monspelliensi agro in Belgium & Angliam transmissi, frigido humerit; solo excepta, non secus ac innumere calidarum regionum peregrinae stirpes, soli & caeli temperie, varias subit mutationes. Caulis illi quippe dodrantalis, nonnusquam pedalis; flores albi aut lactei, aut violacei; alibi caule vidui, dilute rubentes, violacei, striati, & ex luteo pallentes, obseruantur.

Irides Austricas humiles speciosis rubris floribus, & violaceis odoratis, clarissimo viro D. Brancioni Viennae misit elapso anno C. Cladius vna cum Chamaeiride purpureo odorato flore.

IRIDIS

Iris Perpusilla sylvestris angustifolia.

Alterum Iridis genus iamdiu descripserunt, & vocarunt Chamæiridæ herbarij nostri, foliis graminis, rigidis, spithameis & pedalis, pusilli gladioli similibus, floribus expansis, ceruleo-violaceis, aliquando, purpuroviolaceis, novè foliolis conflatis, caulis palmatis & dodrantalis. radix gracilis, minimo digito duplo minor, acris, gustu Xyridis: in Germania & Belgio frequentior prouentus.

*IRIDIS angustifolia sylvestris varietates.*


Belgarum sedulitate in nostris hortis cultura, videntur angustifolia & latiore folio sesquicubitali Irides. Sed vtrique flores terni & quaterni iuxta cauliculi cubitalis ramulos, ceteroquin cum superiore haud ab similes. Eas videntes primùm videnti copiam fecit in suo viridario peritissimus Alardus Ruerius doctor Medicus Insulanus: postea Ioannes Douze, alias Bogelsang: alique non pauci.

IRIS Lutea variegata.


Adducenda & huc sanè quàm rara Iridis species. Flores sunt lutei Chamæiridis Monspelliacæ, tribus repandis foliis peregrina elegantia striatis, obscure violaceis. in Belgij hortis prouenit munere doctissimi Clusij.

IRIS Chalcidonica maxima, variata.

Vidisse & meminisse iuvat superioribus diebus Iridis florem Bruxellis delatū luculentæ magnitudinis, maculis fortuitis, transversis & obliquis, gluis, cinereis & puniceis variatum, foliis tantillum gladij citu videntibus. Cætera cuncta Iridi vulgatae aut Dalmaticæ similia. Hanc debemus C. Dominae Dindeuelde, quæ hunc luculentum florē alebat studiosè in horro D. Tisnac.

Iris lutea
variegata.

Iris Chalcedonica.



IRIDIS varietates quamplurimas.

Iridis complures adhuc varietates habemus, munere clar. heroinæ Catherinæ de Brimeu vxoris D. Conradi Schetz, Colonia, Lugduno, & ex Hispania delatas, sed mihi necdum floruerunt.

DIOSCOR. Radix dum tenditur sternutamentum mouet. *¶* In omnibus excaesatoria, extenuans, contra tussim efficac: humorum qui egre reiciuntur, crassitiam digerunt vel attenuant; bilem, crassamq; pituitiam ex hydromelite drachmis septem epota purgant. Somnū conciliant; lacrymas ciunt; torminibus medentur. Eadem pota ex aceto serpentium icibus auxiliantur, lienosis conuulsis, perfrictionibus, horribus, & quibus genitura effluit. Menses ex vino pota pellunt. Decoctum earum feminarum fortibus vititer imponitur, ad emolliendos losos, laxandaq; in eis venarum spiracula ischiadicis infunditur. Fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glandis modo subdita partus extrahunt; quinetiam colica & illita strumas veteresq; duritias emolliunt. Sicca quoque viscera replent, & cum melle purgant. Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo magna cum visitate illinantur. Admota cum albo veratro, & duobus mellis partibus, lentigines & vitia cutis in facie à sole contracta emaculat. Pessus malagmaticus & acopis inferuntur. In vniuersum, magni ad omnia vsus.

Legit ipse
etiamque. Et
paulo post l.
sentit fadaris.

Et caput purgat Plin. ^a crassa & choleras. ^b & araneorum; scorpionum, in pane vel aqua, addit Plin. ^c genituras absumit, Plin. ^d & lumbis cum resina illinitur Plinio. ^e sarcotica est.

^f Glandis modo, sicut collyrij modo vertunt. ^g Succo duritias omnes emollit. Plin.

^h capitis præcipue suppuraciones veteres. ⁱ Egineta eadem asserit.

Addit Plin. Infantibus eam circumligari salutare est. Dentientibus præcipua est, tinearumque vitio laborantibus instillari. Contra canum morsus ex oleo imponitur, & contra perfrictiones; sic & neruorum doloribus. Dolori capitis cum cotoneis malis aut strutheis illinitur. Crapulas quoque & orthopneas discutit. Vomitiones cit duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit imposita cum melle. Ad paronychias farina eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet, alarumque vitia. Sedis rimas & condylomata, omniaque in corpore excrescentia sanat.


MESSE. Radix est calida sicca ordine tertio, acris: terget, coquit, resoluit, lenit, aperit obstructa, sedat dolores, pituita crassam, & mista illi bilem purgat, ac præter hæc aquas serosas, idq; clementer. Materiam crassam, lentam, hæreticam in thorace, ac pulmone, coquit, tenuat, ac prompte educit, visceraq; omnia expurgat. Hepatis quoque ac lienis, & vicinarum partium tollit obstructions: affectus ab ea excitatos, hydropem, dolorem, tumorem, duritiem, & similes sanat, aut lenit. Omnes quoque tumores etiam duros, & strumas digerit; præsertim neruorum & iuncturarum: maximè cum betæ vel brassicæ succo, vel vino, & melle, & oleo chamæmelino. Cephalalgiam veterem sanat: præsertim cataplasmate imposita, & succo eius in nares attracto. Hic enim sternutamentum mouet, & per nares detrahit vim maximam excrementorum in partes alias, per meatus occultos alioqui defluxurorum. Succus autem ex ea vt absinthio extrahitur. Cum sapa autem tussim veterem ab humore crasso, lento factam, multum iuuat, & ab eodem spirandi difficultatem. Vterum præterea expurgat. Pessus quoque supposita vel emplastro admota, vteri dolores sedat, menses euocat, abortum facit. Vlcera antiqua, sordida, putrida purgat, terget, carne proba implet, quale etiam ossa nuda vestit. Ischiadi salubriter aut clystere iniicitur, aut emplastro imponitur. Os si collinitur aceto cui incocta fuerit, dentium dolorem sanat, & rheumatismum sistit: supposita item hæmorrhoidas aperit. Inuitam seminis vacuationem sumpta cohibet. Succus eius cum farina fabarum & cinerum illitus, faciem expurgat, eiusque maculas deterget. Oleum denique irinum neruos & iuncturas firmat, spasimum ex repletionem, cephalalgiam, dolorem hepatis, splenis, renum, vteri, iuncturarum, thoracis & podagræ, pleuritidem, peripneumoniam oblitum iuuat, catarrham coquit, somnum conciliat temporibus inunctum: augium dolorem instillatum auti, narium graueolentiam ipsis iniectum corrigit. Fit autem ex floribus iridis, & radicum dimidio, vt rosatum oleum & violatum. Ne ventriculum lædat, sumatur ex mulla & pauca spica, vel cum sero lactis melle, maltiche: ad affectus autem thoracis & pulmonis, cum sapa, vt dixi, propinatur.

¶ In omnibus excaesatoria] omnes vi. calfaciendi pollere ait; quod Egineta sine aliqua gradus limitatione docet; ait enim abundè calefacere, abstergere & concoquere siue maturare. Intellexit fortè ad secundum gradum, vt coniectura fert, quia sarcoticis annumeratur; quæ talia esse solent, & ultra secundum gradum calfacere & siccare non debent; ne materiam generandæ carnis aptam & necessariam absumant; nisi superflua caro adsit. Alij ad secundum completum vel initium tertij excessus; minimè quartum, quod tamen doctissimus Dod. credidit, recens potissimum; eius purgandi facultas in calore minimè consistit; sed succo abstergente, attenuante, nitroso, crudo, satulento, ventriculo & visceribus molesto, nisi probè castigato.

Calfacit 2.
& exsiccat 3.
Euch.
Calida & sicca ordine 2.
Anticoma
sarcotica.

Extenuans] Dioscorides addidit facultates secundas & tertias. Est enim medicamentum non solum calidum; sed etiam tenuium partium, quemadmodum succus sijnonum, oxalidis, berberis, agrestis siue omphacij, reliquorumque acidorum, quæ extenuant crassos & lentos humores citra calfactionem.

Contra tussim efficac] Cum tussis à diuersis causis fiat, in qua tussi efficac, distinguere oportet præteritum est:



Tussis.
Sternuta-
mentum.
Nausca.

est: Nam tussim ex collectionibus & tumoribus sub septo transverso minimè curare manifestum; quæ à septi compressione fit, non secus ac illa quæ ab hepatis inflammatione deprehenditur, Tussis enim ab acerbis humoribus irritatio est in membris & organis respirationi seruientibus facta, ut expellat infesta excrementa, sicut sternutamentum, capitis; & nausea, ventriculi.

Neque conuenit in defluxione pulmonum vel arteriæ à tenui materia, cum sit attenuans medicamentum; densare enim opus est: si calida materia, frigidis condensantibus, papauere, opio, vel lentis; spissis, Gummi Arabico, tragacantho, si frigida, tenuis, Iumbis, Sebesten, & aliis moderatè calidis, Penidiis, semine lini, fœnigræci, radice altheæ, maluæ & similibus: aut medicamentis compositis Symplicis Ziziphorum & de Hyslopo, qui conspissantia lenta recipiant. Tussis à sanie exudante ab inflammatis pulmonibus, costis, trachea arteria vel eius ramis; quæ si tenuis, incrassanda; si crassa, extenuanda, uti in empirumare. Quæ duntaxat à refrigeratis pulmonibus fit; solo halitu retento, qui calfacit, curabitur, si leuis sit. A lentis crassisque, vel diuturniore mora densatis, pulmonibusq; infarctis educendis Iris efficacissima. Minus conuenit tussi post materiæ eductionem, ob facultatem irritatam expultricem, cui narcotica ad sensum minuendum vel leniendum; potiora sunt.

Humorum qui agrè eiiciuntur attenuant.] Cur ad tussim & in qua tussi valeat, Diosc. indicat: quæ difficilè è thorace exeruntur, attenuat, quibus extenuatis facilè reiciuntur. Fortè aliquid viterius significare voluit his verbis, qui agrè eiiciuntur, siue è thorace, ventre, renibus educenda sint excrementa. Extenuant & incidunt Irides omnes, vi calfactoria & partium tenuitate: quare paulo post subdit, *menses, vrinas, farctus hepatis & splenis.*

Crassa & choleras purgat.] Crassâ extenuando ad supradicta referuntur, vel ad ea quæ reiciuntur; duo significare volens; humores purgare & eosdem purgare in maiore quantitate. Iris enim cholagogum medicamentum est, quæ cum hydromelite bilem crassam vel pituitam extergendo & attenuando, euacuat. Hydromel enim medicamentis purgantibus additur, ut educationem faciliore reddat: eadem qua ratione Aloes bilem purgantibus, extenuantibus & incisiuibus commixtis in Hierapicra Galis pituitam crassam euacuat.

Epota] quasi dicat, non impositæ: quod de recenti intelligendum; sicca enim non purgat.

Drachmis septem epota.] Drachmis septem legendum, quia crassa, euacua. difficilia. Plinio lib. 21. cap. 20. aluum soluit drachmis duabus cum melle; tussim, tormina, inflationes pota, lienes ex aceto, contra serpentes & araneorum morsus. exposita valet; contra scorpiones duarum drachmarum pondere in pane. Cholicum medicamentum docent Plinij verba, qui aluum duabus drachmis purgare dicit, & drachmas duas sufficere ad scorpiones. Sed aduersus venena oportet maiorem quantitatem exhibere, vt vis medicamenti venenum superet.

Mesueo laxat aquam citrinam, humiditates viscosas & melancholicas: aperit oppilationes; verum mœsticiam infert; sed quando miscetur aliis medicinis oppilationes reseruantibus, iecur & viscera roborantibus noxa minuitur. Aqua & melle cocto castigatur. Dosis in decoctis ab aureis duobus, ad tres vel quatuor; & sicæ contusa à ʒ. j. ad ʒ. ij. ex melle cocto.

Nostris practiceis hodie succi recentis hydropicis propinatur ab ʒ. j. ad ʒ. ij. cum tantillo cinnamomo, asaro, nardo, caryophyllis aut Symplicis cichorio Nicol. Igne excocti succi aut densati à drachmis duabus & semisse ad ʒ. iij. & quatuor, recentiam erudus potentius agit.

Somnum conciliat.] odore suauis caput replet, & cerebri ventriculos vapidis fumis imbuat, non secus ac vini, ciborum repletio, labor & alia multa: non siccitate & calore, quæ potius vigilias inducunt. Neque in morbis acutis, aut calidis & siccis corporibus, sed in humidis; vel dissolendo humiditatem, vel capiti vapores offundendo; ut crocus, myrrha, anethum, ocyminum & huiusmodi nonnulla, quorum maximus est vsus, in quibus valde humida & narcotica stupefactoria dare non licet, ut in pleuride, peripneumonia & aliis affectibus in quibus expectorandum. Symplicis è papauere albo vel nigro, spatum & omnem pectoris excretionem compescit: quare eo parcendum, vel illi Iris addenda, quæ & somnum conciliabit, & humorum cum incrassationem impedit, tum expulsionem & excretionem iuuabit. Nam introsumi vel imponi debeat, nihil Dioscor. Dicitur etiam & intro assumptam vel temporibus impositam, ut videt Mesueus, prodesse.

Lachrymas ciuit.] Lachrymas ciuit quæ cerebrum comprimunt, vel acrimonia feriant, vel dolore afficiunt. Iris quia acris, lachrymas cit, vicepe & acris collyria dolorifica; & visus, comprimendo oculos; & splendor nimius, violentia quadam.

Horroribus, conuulsis, ex aceto pota.] Acetum (nisi aqua dilutam,) neruis noxiis; acris & molestum; ideo aptius conuenire videtur cum oxycrato siue posca perfrictionibus refrigerationibus & horribus in quibus nerui afficiuntur; quia Plinius contra serpentium & araneorum morsus ex posca valere scribit, & ex aceto ad lienosos, quibus aceratim optimè conuenit; cuius beneficio ad partes remotas peruenit; & crassum succum extenuando lienem minuit.

Quibus genitura efficit.] quia genituram absorbit exsiccando; gonorrhœa; siue resolutioni vasorum spermaticorum etiam medendo; nam refrigeratis & conuulsis conuenit.

Menses in vasa.] Si menses ob venarum vteri obstructionem à lentis & viscidis humoribus sanguini crassiori permixtis, supprimantur.

Iscbiadici infunditur.] clystere infunditur, quia intestina per peritonium cum parte affecta consensum habent. Iberis, Cardamine, Nasturtium & eiusmodi, consimili modo infunduntur, quia calfaciunt, attenuant & digerunt materiam frigidam impactam, à qua fieri solet Ischias.

XYRIS, Eupis. *Aduers.* pag. 32.



Zingiberis siliqua cum granis suis.

ZINGIBERIS: *Aduers.* pag. 33.

Dioscor. Radix contra capitis vulnera fracturae, efficax est; aculeos & spicula omnia citra molestiam extrahit, * adiecta floris aris tertia parte, & radice centaurij ac mellis quinta, tumoribus & collectionibus illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, strangurias, & alui profluvia. Semen tribus obolis potum, urinam vehementius impellit; & cum aceto † lienem absumit.

* Gal. quia tenuium partium, attractoriae, digerendi, ac nimirum etiam desiccandi est facultatis; tum multò etiam amplius fructus; qui quidem & urinam ciet.

† Gal. Lienes induratos sanare potest.

Plinio strumas vel panos vel inguina discutit.

Ad alui profluvia bibitur Diosc.] Non secus ac Rhabbarbarum, & Asarum ventris fluores, materiam per urinas deducendo & auertendo, supprimit: ceterò quin opilionibus, & rutilicorum plebi in praefectura Sommerseti Angliæ, huius radice decoctum aut ex Ala infusum, purgationes Iridis modo, incutitur.

In Belgio, ob soli & cæli humidum superfluum, in folia abit, marcescit, flaccescit, tandemque emoritur Zingiberis radix: eapropter ceparum & bulborum quorundam ritu effodienda. & uti vitis pampinis spoliata, emissariis aliquot stolonibus propaginibusue effractis transferenda videtur. Semen aromaticum subastringens gustu, Zingiberis colore album; cardamomo maiori ferè per, sed oblongius, minusque feruidum, ia triquetra item siliqua, rugosa, duriuscula, villis quibusdam & verris obducta, chamiziridis pusillæ siliquæ non dispari. De eadem *Aduersariorum* pag. 443. in Cardamomi historia.

Dioscor. Zingiberis cibo conueniens est; & cum condimento assumitur. Excalcfactoria vini & excoquentem habet; aluum leniter emollit; stomacho vilis est: efficax aduersus ea quæ oculis caly, in eis ossundunt. In antidota addi solet. In summa, piperis viribus responder.

Aginetæ Zingiberis radix potentèr quidem excalfacti, neque primo tamen statim occurfu, inuictæ cuiuspiam humiditatis, & crassioris essentiae (quàm piper, Gal.) Gal. eadem. particeps est: Ideò terebinibus facillè tentatur, sed constantem seruat caliditatem.

Gal. *Humiditate inuicta*] illaboratam humiditatem & crassam, quemadmodum Piper longum, in se retinere videtur; quare diutius perseverat quæ proficiscitur à Zingibere aut pipere longo caliditas, quàm quæ ab albo aut nigro. Porro vbi totum corpus



corpus calfacere celerimè consiliū est, ea tunc exhibentia sunt quæ & celerimè à calorē nostrī contactu incalescant, & promptissimè vndequaquē ferantur. Verūm ubi partem quamvis refrigeratam calfacere studemus, contra agendum: nimirum quæ tardè calefcentia plurimō tempore perdurent, ea præbendo.

Stomachicum, cephalicum, hepaticum, & veneris incentium, potissimum recens vel conditum, calidum & humidum adhuc est medicamentum; exsiccatum verò, calfaciens & desiccans ordine tertio. Obstructiones hepatis à crassa pituita incidendo, digerendo, calfaciendo, siccando reseruat; Intestinatorum, ventriculi, & pulmonum fæctus abstergit & dissipat. superuacuo humore absumpto, cerebrum & memoriā roborando iuuat. aciei caliginosæ oculorum medetur.

CYRCVMA officinarum, Cyperus Indicus Diosc. Aduers. pag. 33. & 34.

DIOSCOR. Manducatum croci vim reddit, gustu amaro sensitur, & illitum præsentem psilothri vim exhibet.

COSTVS omnis. Aduers. pag. 34.

DIOSCOR. Vis ei excaustoria, urinam ciet: menses pellit: vitis qua vuluam malè habent, tam impostu quam fotu & siccitu auxiliatur. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: isem aduersus pectoris dolores, conuulsa, inflationesque, ex vino & absinthio, venere ex

COSTVS cum caulis ferulacei frustulo radice pulla, num Diosc. Indicus Costus?
Costus Indicus Clusij.

multo stimulat, * latus ventris timor ex aqua pellit, horroribus ex oleo, ante febrium accessiones, & heruorum resolutionibus oblitus. vitia cutis in facie, cum aqua vel melle illius, emendat. Additur in antidota & malagmata. Sunt qui admittit belenij comageni præduris radicibus adulterent: quod à rebus facile est, siquidem neque gustu feruet belenium, neque validum odorem vibrat, ut caput tenere possit.

† ob amaritudinem Galeno.

Ægineæ, pauculæ, idem amaritudinis, plurimæ verò acrimoniæ & calidæ qualitatis particeps.

Gal. * Horroribus } ob acrem plurimam & calidam quā in se qualitatem simul & facultatem obtinet, adeo ut exulceret: sic etiam in ischiadicis atque in summa in quibus excaustore partem quamvis aut ex alto in superficiem extrahere aliquem humorem est opus, ad costum confugitur; idèd urinas & menses prouocat: ad rupta, conuulsa & laterum dolores conuenit.



COSTVS facie radice Centaurij maioris.

Iam decem & quinque annis elapsis Venetias adferri cœpit Costus ille nigrior, facie & concretione radice Centaurij maioris vel Gentianæ, grauis, odoris eximia leidis suauitate, mixta tamen cum tantilla turci grauescentia. Cuius exterior cortex pullus; deorsus verò ex sinereo flauescit. Num sit ut ferula niger Dioscoridis Indicus Costus, penes doctiores iudicium esto. Antidotis minimè excludendus, & si gustu peramarus, & ingratus.


ZERYMBET Serapionis & ZEDVARI A, eiusdem radice partes. Aduers. pag. 35.

SERAP. Excaustore Zeduaris & siccatur ordine secundo, status discutit, & propria quadam facultate impinguat. Post assumptam graue animæ virus, quod allium, capra, vel vinum exortauit, abigit. Venenotum animalium moribus opitulatur, alui fluxiones sistit, vteri abscessus resoluunt, vomitiones reprimunt, & coli cruditatis tollit, itemque ventriculi alui tincas quascunque enecat, & in antidotis additur.

Restituo Aduers. pag. 35. lin. 25. & utraque ut nominis, hoc eundem radice partes merito dixerim nec locus iuuat differre, quā Cyperus rotundus vel longus à suis coherentibus radicibus differat.



ZERYMBET Serapionis & Zedneria ciusdem radicis partes.



caibus spectantur; cuiusmodi videndi & habendi copia fuit Antuerpiæ in Myropolio simplicium ditissimo Francisci Pennini. Eoque Serapio, &c.


Item pag. 36. lege, & huius partem Zerumbet.

Et paulò post, veriores esse cum fib. mutuo cohereant. Et demè, per omnia similiores; ut Castani bulbi cum cæteris cænantibus; exemplisque aliis superius ostensum fuit.

ZERYMBET Serapionis.
Belg. Bloek Keduar.



CYPERVS.



CYPERVS. Aduers. pag. 57.

Hisp. Iunca cheyrofa, Iunca auellanada.

Iuncus { quadratus } Colsi.
{ angulosus } Plinij.
{ triangularis }

Dioscor. Calida vis inest; venarum spiracula laxat, vrinam citè ad calculos aquamne subter cutem viliissime bibitur. aduersus Scorpionum bitus remedium est. Perfrictionibus vulvæ & proclivionibus foris prodest. Pellit menses. Contra vicera oris, etiam si depascant, vorant quæ farè. Paulus eadè na eius efficit. Malagmaris calfacientibus, & unguentorum spissamentis bene adhibi solet.


Agin. Calidus pariter & siccus temperamento est, absque erosione: qua de se vberibus quæ præ nimia humiditate egre coalescunt, cicatricem mirabiliter inducit.

Pellit menses. Gal. quia calfacit & siccatur sine mordacitate, & quidam astringens habet.

Agin. Inest præterea Cypero quedam secandi facultas, qua lapillos arerit, & totia menses que prolicia. Farinam dicit, quia Cyperus rotundus in farinaccum puluerem facile abit.

CYPERVS

Cyperus longus odoratus.
Belgic & Angli Wilden Salegaen & Selinga.
Hisp. Iuncia olorosa.




Cyperus aquaticus septentrionalis.

Scrobibus item & riuis ad Scaldæ amenissima fluente pone nouam Antuerpiam urbem, iisdem foliis & iubata pannicula prouenit. Radix nonnullas, sed paucas, teretes, oliuares, oblongiores, instar filipendulæ emittens glandulas, gustu astringentes, nulla odoris gratia.

Cyperus rotundus litoreus inodorus.

In Angliæ borealis & Belgij fluminū litoreis, ieffluentorum que riulorum, & maris alluionibus, Cyperi genus non inelegans, radicum longè lateque sparsa sobole, multis & bicubitalibus implexarum filamentis, Cypero rotundo parium, oritur. Folia angulosa; caulis cubitalis, & sesquicubitalis, nitidus, triquetrus, in quo racemosa iuba, congesta. Gustu subastringit radix frigida & sicca: odoris & saporis expers.

CYPERUS
aquaticus.




CYPERUS
rotundus.



Tab. 402


TRASI Ve-
ronense.



TRASI cum
Rote.



SPARGA-
NIUM Cu-
tuno Theo-
phrafi.



SPARGA-
NIUM al-
teum.



TRASI Verosensium sine esculenti Cyperi. *Aduers. pag. 37.*

Dulcissimum Gaillardini.

Cyperus dulcis Theoph. Dod.

Ital. Trasi dolce, & dolzolini.

Humenti Belgico solo complures capillares radices edit.

Venerem stimulant, abstergunt moderatè humectando; eoque expectorationem iuuant.

PAPYRVS. *Aduers. pag. 38. 39. 40.*

DIOSCOR. Papyrus qua charta sunt nullis non cognita, precipua in medicina vilitatis ad laxandas fistulas, madefacta lino inuoluitur, usque dum inaruerit. constricta enim atque immissa in bñatam humore completur, & intumescendo fistulas aperit. Habet nescio quid alimenti radice. Itaque Aegyptij eam mandunt, succum tantum deuorantes: & mansam expuunt, ipsis radicibus pro ligno vtuntur. Cremata papyri cinis depascentia vlcera cum omnium partium, sunt oris maximè, cohibet. Verum melius id combusta charta praestat.

Eadem Gal. Macerata aut vsta vtilis efficitur: Igitur oxycrato, vinoue macerata, recentia vulnera glutinat; maximè in circulum circumposita. Verum hic quidem est, ceu materia quae medicamina fantia accipiat. At vbi vsta fuerit, medicamen est* exiccatorium velut & chartae combustae cinis, nisi quatenus inferior est quam papyri.

*AE. pineta
eadem.


ΤΥΡΗΛ, Τύρον. *Aduers. pag. 40.*

Bel. Aischdoden & Doulen, quae lanugo eius in aures incidens, serdos efficit. Ger. Aatenkolben, Moskolben. Hispan. Behordo, seu Iunco Amacorodaco.

IVNCVS odoratus. Σχοιν & ἀπομανθός.

Schœnanthum. Aduers. pag. 42.

Ger. Camdischheuu. Officinis, Belgis, & Italis Schœnanthum. Ang. Squinanthum. Gal. pasture de Chameau.



Plinij lectis
deprauau.

Leges
Schœnanthum
liber nō tam

Leges pa. 47.
H. A. Gencaesi.
L. Thom. pino.

DIOSCOR. Typha flos seillo adipe eloto exceptus ambustis medetur.
Efficcat moderatè & abstergit. Sanguinis fluores imposta sistit.

IVNCVS


IUNCUS odoratus

Diosc. Ignea mortacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radiceq; est usus. Vinu vrina cienda habet, menses pellic, discutit inflationes, caput aggrauat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu vitis sanguinem reuertentibus. doloribus stomachi, pulmonis, iocinoris, & renum, miscetur antidotis. Radix astringentior est, ideo fastidiis stomachi, hydropicis, conuulsis, z. vna, cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vulua inflammationibus, ad desiderium forus, vtile est.

*Quia modicè calfacit & adstringit Galeno, cum partium tenuitate. Flores hodie asportantur euanidi, idcò calamulis vti præstat.

Marinus gramineus IUNCUS. *Aduers.* pag. 42.
Pseudoschœnanthum.

IUNCUS leuis vulgaris, *z. v. & Aduers.* pa. 43. & 44.
Germ. Wijnen Schmelen. *Belgis* Biefen. *Anglis* Sautches. *Gal.* Iunc. *Hisp.* Iunco. *Ital.* Giunco.



Huius Schœnanthi speciosos flores papposos Iunci odorati quadamtenus, densè congestos, in vulpina caudam quincunciam & sex uncias longam, sericeo argenteo niture, alopecuri ritu fastigiatos collegit Franciscus Penninus, Stirpidum & Pharmaceutices peritissimus, in lit ore mediterraneo Monspelliensis agri pone Aquas-marianas siue Aquas-mortuas, vernaculè Aiguesmortes, via qua itur Bescaire.

NARDUS, *Nardus & Nardov raxi.* *Aduers.* pag. 43.

Gallis & officinis Spica Nardi. *Germ.* & *Anglis,* Spickenarde. *Hisp.* Azumbar aut Espigehal. *Ital.* Spigo & Spigo Nardi. *Nardus* Ganguis Anguil.

Dioscor. Vinu habent excofictoriam, & exiccantem: vrinam mouent, alium potu sistunt, vulua proflantia sanientq; apposita supprimunt. Nausæ ex aqua frigida auxiliantur, & stomachi roboribus, inflationi, iocinori, regio morbo, & renum vitiis. * Aqua autem in colica sota ad infessum, vulua inflammationibus medentur: ad glabros oculorum genas valent, siquidem eas ad densorem pitum reducant, perfusis humore corporibus insurguntur. Miscetur antidotis, & in siliis non picato ad ocularia medicamenta recendantur, tria in farinam, & cum vino in pastillas concta.

†* GAL. Quia Nardi spica exalfacit excessu primo, desiccatur secundo ismi completo. Composita est ex astringenti sufficienter substantia & acri, calida non multa, & quadam leuiter amara. In ventre ac intestinis consistentes defluxiones desiccatur, ad hæc & eas quæ in capite & thorace.

IUNCVS leuis vulgaris.



DIOSCOR. Vriusque Iunci semen tostum, ex diluto vino potum, sistit alium † & rubra feminarum profusio. vriam cit: capitisq, dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangi-
orum morsus. Aethiopiici Iunci semine somnus allucitur: sed modus in potione seruandus est, ne sopor fiat.

† GAL. Quod composita sit earum temperies ex terrea videlicet essentia leuiter frigida & aquea, leuiter calida vt & inferna desiccare possint, & sensim frigidos ad caput vapores mittere, quibus somnolentos efficiant.

Leg. elychni.
In Iuco ma-
ximo pag.
44. 102. Perant
regulas li. 8. &
li. 11. Neuro-
plasterumque
102016.

*IUNCVS aquaticus minor capitulis equiseti,
Reddendus proximè Iuncum aquaticum maximum.*

*IUNCVS Cyperoides floridus paludosus. pag. 44.
Gladipus palustris Cordi, & aquaticus Dod.*





Hæc alter congener, sed multò minor, lacustribus & lenè fluentibus aquis Austroyel paguli in agro Antuerpiano, maximo prouenta oritur, radice innumeris implexa fibris & culmis nudis, leui vulgato iunco paribus, sed racemosis capitulis Hippuridis aut Asperagi citu fastigiatis, & ad itum singulis geniculis donatis.

*IUNCVS boni iacini. Advers. pag. 44.
Tomentum & Iuncus pratense Cordi. Gern. 1316. 1317. 1318.*

Confert ex vino coctam torminibus ventris Cordi.

SPARTVM


SPARTVM alterum C. Clusij. Hisp. Albardin.

SPARTVM
1^a Clusio.SPARTVM Plin. Clusij. Provincialibus Elpho
Hispanica. Hisp. Sparto.

Posteritati exactissime Spartum patefecit C. Clusius, cuiusmodi Bruxellis me vidisse memini in horto Stirpium amenissimo & ditissimo egregij & doctissimi viri D. Ioannis Boisot, cubitalibus compressis, iuncea, atroirentibus foliis, que successu temporis contrahuntur, rotundumque iuncum textrina aptum referunt. Stipulae sesquicubitales, & lanosi comosique flores arundinis ritu. Semen scabrum & acerosum. Pluribus Valentini agri & Baeticae locis oritur prope Carthagenouam.

SPARTVM alterum Plin. C. Clusio.
Hisp. Albardin.

Est & aliud quoddam Sparti genus non admodum dispar, quod etiam debetur C. Clusio exoticarum Stirpium peritissimo, qui scripsit haec exactissime significauit. Molliore, tenuioreque iunco quam primum; panniculam fert breuem Martio, & pericarpio quodam siue membraneo folliculo, ut Narcissi, cepae & similia ferè flores, inclusam. Nascitur Muricano regno humidioribus locis. Sportularum textrina minus aptum, sed ad lineos saccos, quos lectis subternant, implendos accommodum.

SPARTVM nostras, Spartum 3^m. Clusij.
Maris occidentui Angliae, Hiberniam versus, Gibu-
lotisSPARTVM
2^a Clusio.

leis semimerfa hæc tanta feracitate luxuriat, vt rigidis mucronatis foliis, iter illac facientiu cruribus fœ-
piffimè cruenta vulnera inforat. Radice iuncea arenæ cumulis depacta, folia rigida, fequipedalia,
& dudrum pedum, in mucronem durum fastigiata, Schoenanthi sine ignei marini. In caule bicubitali
flos lanofus & acerosum femen arundinis vallatoriz, cui parit omne petus, & veterina.

ASPHODE-
LYM minore
album, vide
fup inter
Phalangij
differentias.

ASPHODELYS maior albus. Aduers. pag. 45.
ἀσφὸδελῶν. Hipp. Gamones & Gamonites.

ASPHODELYS luteus minor. Aduers. pag. 45.
Iphyon Theoph. Anguil. & Eriz. arabac
Arabum quorundam.

In caule de-
siderantur
folia.



ASPHODELYS maior.

eadem Ae-
tus ex vino
pota.

DIOSCOR. Radices subiacent oblonga, rotunda, glanilibus similes, gustu acres: qua excelsiunt, urinas & menses epot & citat, lateris doloribus, ruptis, conuulsis, & tussibus, drachma pondere pota ex vino, medentur. Ea vero vomitiones adiuuat, tuicri tali magnitudine conuanducata. a serpente demorsis datur aptissime, verum trium drachmarum pondere: foliis, floribus & radice ex vino, morsus illinire oportet. item vlcera forata depascunt, mammarum quoque & testium inflammationes, tubercula, surunculosq; deolectis in sacro vini vmbis, recentibus in stagnum, et hinc ex potentia auxiliatur. Radix succo adiecto veteri vino dulci, myrrha & croco decoquitur, siq; perquam vile oculis medicamentum: id purulenta aureis per se cum thure, melle, vino & myrrha tritus, prodest, in contrariam aurem infusus, dentium dolorem mitigat. Cinis * e radice illius, alopecias ad pilam restitit. Oleum in excelsis radicibus igni decoctum, illis exulceratis permionibus & ambustis igni, conducit, si diluatur in aqua, auxiliatur. Candidam vitiliginem, linteo ante perfrictam in sole, illis radix emendat. Semen flor esq; in vino poti: scelopondiz & scorpionum venenis mirum in modum resistunt: aluum purgant.

* GAL. Quia calidior & exsiccantior subtiliorque, ac digerere potentior efficitur.


GAL. Radix vtilis est sicut Ari & Draconis, nempe extergentis & discutientis facultatis.

APVL. Ad dolorem tibiaram vel pedum, radicem succo & oleo amygdalino vnges quod dicit, mirificè sanabitur: etiam si tumores fuerint, ipsam tulam & sibaactam impones.


Herbae asphodeli radicem decoque, & ex aqua mulsâ potui dato, hepatis dolorem mirificè tolles.

ASPHODELYS


ASPHODE-
lus minimus
scorifolius
luteus, palu-
stris. Aduerf.
pag. 46.



LUTOSPHE-
DELVS lute-
us Lilliflorus.
Aduerf. pag.
45.
Lilium non-
bulbosum
Dod.



ASPHODE-
lus Hyacin-
thinus, forte
Gal. Aduerf.
pag. 46.



ORNITHO-
GALVM Ipi-
catu Mont-
pellienum
Hort. Latino.



Lilium

LIRIOSPHODELVS phariceus.

Varietas.

Huic ex insiniato flauente flores rutilant, foliis porri, asphodelo albo vel LIRIOSPHODELIO vegetioribus, latioribusque, sed retusis supernè. Caulis item rotundus, durior; binos ternosque cubitos interdum superans, cuius summo liliacei itidem flores striati, liliam puniceum minus, æquant. Radix tuberosa, teres, Asphodeli lutei minoris.

Ephemerū
& Hemero-
calis.

Sunt qui Ephemerum & Hemerocalidem dixerunt à conditione fugacis fibris, quem parum diu & aliquot horas duntaxat seruat.

ASPHODELI Galeni cre. liti & ORNITHO-
CALI maioris Monspel. discrimen.

Galeni Asphodelo flos intus forisque ex albo flauescit, neque candore lacteo, ut Ornithogali flos tenidet; neque auersa parte herbidas. Radix verò minor, oblongior Ornithogali spicati.

ORNITHOGALVM spicatum minus.

Huius alteram speciem omni sui parte longè minorem Belgica vireta cultiora alunt, cuiusmodi Licet D. Ioannis Dilhij & D. Mariæ de Brimeu uxoris D. Conradi Schertz.

Theocriti & Poetarum HYACINTHVS Anglicus
flore triduo, cuius eadem effigies Aduers pag. 47.
quam pictor non bene exorescit.

1315 bulbosa Dod.

Ang. Flout de luce & Gladiolus maior.

Hispanicus poetarum HYACINTHVS.

1315 bulbosa angustifolia flore raris Clusij.

Hisp. Lirio Illyrico.



Hispanicus poetarum HYACINTHVS.


Nec ita dissidet ab Anglico quem natura dædala ex Hispaniæ Castiliæ coelibus, vulgo Valle-Dolys, nobis

his largitur, foliis rigidis Asphodeli & Porri mediis, canulatis & aversa parte striatis: In caule singulari, sesquicubitali flos suavis odoris ut plurimum unicus, plerumque geminus, & interdum ternus, alternatim fugax, Xyridis latior, tribus foliis repandis, albicanibus, medio luteis; supernis totidem caeruleis intercurrentibus lineis albis: semine Gladioli paulò maiore, & siliqua Poetarum Hyacinthi Anglici nostri exiliore. Hunc unà cum plurimis rarioribus plantis non modò alit in horto Guilielmus Driesch, perindustrius & peritissimus pharmacopœus Antuerpianus, munere Raphaëlis de Coxia Flandri apud Machliniensis eximij pictoris, sed etiam plerique elegantiae studiosi suos cultissimos hortos hoc ornant.

Variat hæc aut flore breuiore, aut saturiore aut dilutiore colore, breui item longioreq; radice.

HYACINTHVS Poetarum luteus.
Iris bulbosa luteo flore Clusij angustifolia.
Hisp. Reilla Bucy.

HYACINTHVS Poetarum luteus semine in
siliquis pregnans.



HYACINTHVS Poeticus luteus Lusitanicus.

Alium Belgio nostro inquilinū factū videas, à superiore duntaxat luteis floribus dilutis, nonnunquā saturatis, diversum, & foliis exilioribus & pallidioribus; floribus latioribus, inodoris, & contractis Anglici Poetarum Hyacinthi modo. Collibus petrosis ad Tagum supra Olysioponem pingui solo spontè Varietas. oriri author est Clusius, qui eius bulbos inde ad amicos in Belgium misit.

Poetarum HYACINTHVS latifolius. Iris bulbosa latifolia Hispanica Clusij.

Dusitanic & Hisp. Lirio espadanal. à ensiformis. videtur congener cum Hermodactylo non venenato.

Multo minus frequens hic Septentrionalibus: maioribus & latioribus Pancratij foliis alternatim & imbricatim implexis, in angustum desinentibus: flos summo colliculo caeruleus, nonnunquam candidus


didus, nouem constans foliolis. Radix barbosa, gustanti dulcis, Hyacinthi Poetici Anglici ferè. In Belgio ab elegantiarum amatoribus studiosè alitur, tamen nec florem nec caulem ibidem loci edit, quàmvis frigoris iniuriam ferre potius sit. Sponte oritur in Lusitania Beticæque collibus non procul ab Ana flumine, & copiosè circa Antequeram & Cordubam; floret istic Ianuario & Februario mensibus, Clusio auctore.

HYACINTHVS *Postarum latifolius.*

HYACINTHVS *Poeticus Hiss, gemino Gladioli*

reticulato bulbo.

Silybichium Cordi, Dod. & Clusij. Hiss. Nofelha.




Hyacinthi poetici 5^a. conspicua varietas, quem perbellè Silybichium Dodonæus hærtolatur. Flores Iridis, vniue vel alterius horæ, citissimè euanescentes, & marcescentes, quatuor aut quinque alternatim fugaces, imis tribus repandis foliis Iridis cæruleis; tribus medio & ad basim luteis; cætiocribus item ternis fissis, bipartitisue. In caule dodrantali folia bina in tertiam reflexa. Radici gemini bulbi, Gladioli modo. Semen item tubrum in folliculo oblongiore Gladioli, sed minus. Opiliones Hispani radicem lubens esitant, & Nofelha vocitant, quasi nuculam auellanam. vnde non immeritè esculentis bulbis Balsibæ, quis eam annumerarit. Pensilibus hortis Belgij in delitiis est, beneuolentia Clusij qui bulbos misit ad lenti. canicos è vicinis collibus Olyssiponis.

NOSELHA

κροκίον Theoph. Clusio.
 NOSELHA minor: Lirio & Maculas Hisp.

IRIS tuberosa Dod. & Belgarum.
 Lonchitis prior Diosc. Vlysi Aldroandae.
 Advers. pag. 363.
 Perperam Hermodactylus verus Math.



Nulla sui parte dissimilem; sed tantum exiliorem; minorem fecerunt. perperam aut nihil discrimi-
 nis animaduerit clarissimus vir D. Ioannes de Brancion, in cuius orto raris stirpibus ditissimo vi-
 dimus.

Inuenitur hoc Valentino regno & Murciano, Clusio asserente.

Ad ventris tormina vtile incolarum auditione refert Clusius, sed illico saltandum & corpus exer-
 cendum ei qui eius radicem deuorauerit.

IRIS tuberosa Belgarum.

Eandem, quam nostri nosse Isidem tuberosam nancupant, cum doctissimo Aldroando peritiores
 Itali plerique Dioscoridis priorem Lonchitidem sanxerunt, quod nulla extaret planta propius Lonchi-
 tidem adumbrans. Folia illi Hyacinthi poetici, porracea, striata, rigida, quadrangula, in macrostem
 cuspidatam fastigiata. Flos quaedam tenus iridis; cuius foliola repanda, seu galeatici hantibus comicis
 perianthis similes, obscurè virentes, fimbriis nigricantes. Semen involucri clausum, (Lancea simile, trian-
 gulum, Diosc.) angulosum. Radix tuberosa variè depacta; quæ in plures digitum, flore marcido, propa-
 gatur: unde Hermodactyli nominis occasio. Quem ad vinum depingi Bononia curavit beneuolen-
 tia clarissimi præceptoris Vlyssis Aldroandi, eruditissimus D. Nicolaus Espileus Insulanus medicus.
 ab hac nostrate tantillum variare videtur.

DIOSCOR. Radix in viiq. pota^o vinam ciet.



Hermosa-
 Ayus.

Gal. de fer.

G 1 GIADIOLVS

GLADIOLVS *Narbonensis.*
Advers. pag. 47.

GLADIOLVS *italicus* binis *florum ordinibus*
circat. Advers. pag. 48.



Dioscor. Superior radix cum thure illita, admisso vino, spicula & aculeos e corpore extrahit: panos cum lo-
 ly farina & hydromelite discutit, qua de re huiusmodi emplastris inferi solet. menses imposita trahit. superiori radice
 ex vino pota, venerem stimulat, & inferiore sumpta, sterilescere tradunt. superiores quoque viriliter infantum entero-
 caelis cum aqua potui dari precipiunt.

GAL. Xiphij radix, & maximè altera quæ superior est, attrahentem, digezentem & exsiccantem
 facultatem etiam possidet.

Varietas. Nonnunquam multis adnatis bulbulis & folio angustiore cernitur. Albo item flore repe-
 ritur in Hispania, sed rarius.

aliàs auzeni.

APVL. Ad fistulas quæ in corpore nascuntur. Herbae xiphij radice vncias sex, amyli vncias sex,
 aceti cyathos duos, adipis vulpini vncias tres ex vino pisabis, in panno lines & impones, miraberis
 effectum.

Herbae Xiphij radice superior pars sicca trita & æquis ponderibus mixto vino, capitis ossa fracta ex-
 trahit: aut si quid in corpore suppuratum fuerit, vel si pedibus calcata sint ossa serpentis, contra ea ve-
 nena efficax est.


Ad vesicæ dolorem, & ad eos qui vrinam non faciunt. Herbam gladiolum effodias, siccatum cor-
 ticem radice eius conterito, & cum vini cyathis duobus & aquæ calidæ cyathis quatuor immisce, &
 sic potui dabis, miram rem experieris.

Ad splenis dolorem. Herbam gladiolum maturissimam lectam & siccantam & in pulverem mollis-
 simum redactam, & in vino leuissimo mixtam potui datam, mirificè dicimus splenem desiccare.

Ad coli vel præcordiorum dolorem. Herba gladioli baccas tritas ex caprino lacte, melius si asini-
 ano, tepesactas dato bibere, desinet dolere.


HYACINTHVS

HYACINTHVS Germanicus liliflorus, stellaris.
Aduers. pag. 48.




Varietas.

HYACINTHVS Angli-
cus & Belgi-
cus. Aduers.
pag. 48.




Hyacinthus
non sericeus
Dod.

HYACINTHVS autumnalis.
Aduers. pag. 48.



HYACINTHVS autu-
nalis maior.



HYACINTHVS Germanicus hyliflorus, stellaris. Flos martius stellatus Germ. Aduers. pag. 43.

Narcissus caruleus Tragi. Saryrium Erythronium Dod.

HYACINTHVS bifolius Theoph. Saryrium trifolium Dod. Belg. Sterrekeus, diminaquind.

Varietas.


Huius minor species folio vt plurimum gemino, & flosculis stellatis caeruleis non absimilibus. sed omniam nota.

HYACINTHVS autumnalis maior.

Pensilibus etiam Belgij hortis alitur hic Hyacinthus superiori similis, sed radice, foliis latoribus, floribus, item & caule procerioribus & habitioribus.

HYACINTHVS Orientalis Gracus. Aduers. pag. 48. HYACINTHVS orientalis maior polyanthos.

Expunge
Hyacinthos al-
teram Orien-
talem.



Varietas. } Quem Zumbel Indi vocant caule habet Serpenteria modo maculosum, & tortilia folia.
} Constantinopolitani Hyacinthi, vbi defloruerit dūtaxat maculis viperis caulis variat, cuius
} triplex differentia folio & flore Angustifolius, latifolius, & polyanthos altes, siue minor.
} Praeox diluio est flore. Serotinus autem satiore, hilari, caeruleo, amano.

HYACINTHVS Orientalis maior polyanthos.


Orientalis A medio cubitali caule ad summum vsq; in vnam partem vergente florum peramatorū caeruleo-
altes metib; rum ordine, luculente magnitudinis, calathi aut alabasticuli similitam, spectatur. Folia latoria. Bulbus
& depraui- Narcissi par. Horto generosi viri D. Ioannis Brancionis inquilinas.

Johann G.



Hyacin-
thi ma-
ior.


Hyacinthi
maioris
quasi vilitur
in Gallopro-
vincia.



HYACIN-
THUS como-
sus minor.



Dryas
Chalcedoni-
cum.



Dryas
canadensis
flos.



Idem D. G. HYACINTHVS Dioscor. comosus maior. Aduers. pag. 49.
 Germ. Bunting; bianch metzenblum. Hisp. maños flores. Gal. vaccet.
 Hyacinthus neotericorum Dod. Hyacinthus maior Tragi. Syluest. Hyacinthus Cordi.

* alij legunt
 caliac.

DIOSCOR. Hyacinthi radix pueris cum vino albo illita, impuberes seruire creditur. Siftit aluum: pota urinam
 impellit, phalangiorum moribus auxiliatur. Semen astringentius est Theriacis expetitur: regium morbum emendat cum
 vino potum.

HYACINTHVS comosus minor. Aduers. pag. 49.
 Hyacinthus neotericorum primus Dod. & Bulbus esculentus. Hyacinthus Syluest. Corā.
 Hyacinthus exiguus Tragi. Hyacinthus Botryoides Herbariorum.

DIPCADi Chalcedonicum, & Italarum. Bulbus vomitorius Matth.

Hyacinthi
 comosi va-
 rietas.


Radix cum maxima, adulti Narcissi bulbum magnitudine superat, cui pro gracilibus & tortilibus fi-
 bris, duriusculæ lignosæ, crassiores, fœniculi æmulæ, subsunt viuaces & contumaces radices, porrectæ
 humiq; insertæ; quæ etiam biennium & triennium bulbo effracto D. Brancionis horto virentes perstite-
 runt. Foliis est procumbentibus, ima basi latioribus in acutum fastigiatis: Flos pallidus ex luteo herbaceo
 & cinereo purpurascit, qui expansus & apertus duntaxat suauissimum spirat odorem.

DIPCADi candidis floribus varietas gemina,

Varietates { Quæ niueo candore, nonnusquam & purpura diluta conspiciuntur, folia supernè latiora
 ferunt.
 Floribus cæruleo uirentibus alioqui superioribus similis in hortis nostris visitur.

ERIOPHORVS sive BVLBVS Bombycinus
 commentitius.

Bulli ERIOPHORI genuina effigies.



Posteritatis memorie triū peregrinorū bulborum icones portentosas hic inserere consiliū fuit à D.
 candi-




candidiss. De dono literis proditas, Antonij Cortusi, exoticarū stirpū indefessū vestigatoris, munera; quæ benevolentia & solito candore generosi viri D. Brancionis parafactæ, rarū sui mihi præbuerunt spectaculum. Is tamen nō solum elapsis annis effigies coloribus suis penicillo expressas; verū etiam bulbos Eriophori eidē præclaro D. Brancioni miserat; penes quæ egregiè crevit & propagatur Cæpæ aut Scillæ squammosis tunicis quadam lanugine intertextis compactili radice; è cuius umbone crassior fibrarum coma porrigitur: minimè dehiscens squammosis cuticulis, aut veluti nucleis, stipata, ut pictura adumbrat, sed multis teretibus adnatis bulbis: Folijs verò oblongis Pancretatij marini Monspaliensium, quæ in villos discernuntur. De bombycino flore diu ambegimus, sicutque suspicati sumus, aut alterius exoticæ plantæ florem rebamur, quemque frustra multis artibus & lenocinijs elicere studuimus cum in Italia, tum in Belgio. Verū cū anxij animi quid de eo statuendum foret, essemus; tandē paucis elapsis diebus nobis dubiū exemit Carolus Clusius noster, ut mox dicitur.

Bulbi ERIOPHORI genuina descriptio.

Cū plurimum differat ab illo exotico bulbo Eriophoro effigies illa tomentosa vnā cum suis bulbis Cortuso missa, florem perspectum non habuisse liquidò constat: hincq; licet documentum videre imbecillæ humanæ sedulitatis. Sed ne deinceps temere inductionibus argutisue picturis credamus, & fallamur à quibusdam, qui audacter, nec res visas, nec auditione cognitæ peruertunt potius quàm produnt, bulbi Eriophori flores genuinos omnibus rei herbariæ studiosis palam fecit clarus, fidus, & exactus herbariæ scriptor Clusius noster, ut qui res ipsas inspectione notas habuerit eius verba paucis & perspicuis huc adducere memoriæ nostræ subsidio, instituti consequatione & serie, operæ precium duximus. Ex foliorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rectus, Scillini caulis æmulus, læuis, nudus, virescens, superiore verò parte ad cæruleum colorem tendens: in summo veluti oblongam ac densam fert spicam in denos vel plures versus distinctam viridem primū, sed paulatim (dum sese explicat in flores) cæruleum colorem contrahentem: constant flores senis foliolis stellatim expansis, triangulo umbone in medio promberante, Hyacinthi Autumnalis floribus propemodum similes, inodori. colore cum suis pediculis cæruleo, & internis staminibus, quorum apices initid purpurei sunt, & ubi se explicant, veluti pallecente quadam farina aspersi. Incipit florere ab imo, uti Scilla solet.

Eriophori meminit Theophrastus lib. 7. histor. cap. 13. cum in litotibus nasci, lanamque sub primis tunicis habere, ex qua togæ & aliæ vestes conficiuntur.

TIGRIDIS flos, an Dracunculi species?



Rarior multo exoticus flos Tigridis vocatus, quem nunquam nobis visum fatemur. Illius iconem coloribus affabrè expressam piæ memoriæ clariss. D. Ioannes de Brancion pro nostra amicitia communicavit: virentibus oblongis angustis & acuminatis folijs è pullo radicis bulbo: flore luteo, exiguis quamplurimis notulis fortuitis punctibus variato; è cuius medio suauè rubens stilus exeritur. Omnibus herbariæ studiosis ipsa planta hæctenus incognita. Eiusbulbus edulis fertur.


NARCISSI Advers. pag. 50. 51. 52.

Gall. Narcisses & Iaconettes: Ital. & Hisp. Narcisso.


Dioscor. Radix casta, siue esca siue bibitar, vomitoria est. ambustis igni prodest, cum exiguo melle trita, proficos nervos illitu glutinat. luxurians malicolas, diuturnisque articulorum doloribus, trita ex melle & nuposita, subuenit. vitia cutis in facie, vitiliginesque cum semine vitice, & aceto emaculat, cum aruo & melle, viscerum foedes expurgat. abscessus recipit concoctioni repugnantes. infusa corpori extrahit, sicut cum lolo, furtiva & melle.

Gal. Radix vsque adeo exsiccandi facultate pollet, ut & maxima vulnera glutinet vel ad incisiones vsque


NARCIS-
sus posticus
medicoro-
ceus & me-
dio purpu-
reus. Dod.
Hisp. Lilio
blanco & Ce-
bolina. Ad-
verf. pag. 59.





NARCIS-
sus medio-
luteus.



NARCIS-
sus totus
albus.



NARCIS-
sus albus
polyanthus.



vsque que citra tendones accidunt. Habet verò quiddam absterforium, & attraforium.

Facilitates Hyacinthi & croci habere videntur; digerendo, constringendo, glutinando & sopiendo. Ad præcisios nervos, hernias & morbos verinos vtebatur Rondeletius. Radix quia viscida, nervos glutinat cum equiseto, centiadio & consimilibus siccioribus medicamentis. coque non secus ac Symphytum ad hernias, vesicæ & renum vlcera, commendatur.

APVL. Ad vulnera que ex se nascuntur. Herbe narcissi radix còrta cù oleo & farina vice cataplasmatum imponitur vulnere, & sanat mirificè. Ad phthificos vel colicos. Herbam narcissum rufam & porri datam, colicis vel tussientibus prodesse dicimus. Si autem volueris oleum facere, herbe narcissi florem in oleum mittes, & perunges infirmum, mitaberis rem certam.

NARCISVS *mediolutes*, pag. 51. Hisp. Lirio.

Varietas { Huius speciei Narcissum præcoem faciunt herbarum peritiores Belgæ cum Clusio nostro, latioribus floribus & folijs.

NARCISVS *totus albus*. Hisp. Inquillos blancos.

Narcif. me. { Nonnunquam omnino candidis floribus visitur, cæteroquin cum superiore haud ab-
dioluci va- { milis.
rietates. { Hic paucioribus floribus & folio albedo, rigidoque variat. Belgicis hortis vterque etiam inquilinus factus opera C. Clusij qui bulbos euulsos ex Lusitanie & Bæticæ vdis locis & maritimis ad amicos misit.

NARCISVS *albus polyanthos*. Chalcædonicus elegantior, hilarior & rarior.
an Narcissus octauus Matth. non descriptus?

Posteritatis sedulitate antiquis & Dioscoridi indictus nobis innotuit, qui Constantinopoli missus à Carolo Rym, equite Fládno D. van Eekenbecken, viro familia & literis clarissimo, & apud Solimanum oratore Maximiliani Cæsareæ maiestatis, exoticarum stirpium parentis benemeriti Ioannis Brancionis horto in delitijs habetur, floribus multiplicibus & foliolis aspectu iucundis, niueis, peramænis; corona media lutea orbatis; cuius sem multiplex floram fertura supplet: quodam tamen lutei specimine permisso inter foliola dispersè adseruato.

Varietates. { Ibide loci tortilibus, reflexis folijs, prolixioribus & latioribus variat. Visitur etiam angustioribus folijs, flore ex luteo pallente.

NARCISVS *totus luteus montanus* Theoph.

Pseudo Narcissus Clus. & Dod. luteus syl.


Aduers. pag. 51.

Bulbus Codion Theoph. non Cordiaminum, vt vertis

Gaza.

Hisp. Campanilla.

NARCISVS *luteus multiplici flore*.



H a

N a m



NARCISSI
Montani Theoph.
 Varietates

Facie nō dissimili, sed latioribus folijs, maioribusque floribus omnino luteis: croceis ut. cætera eadem planè. Hæc alūt cum mox subdendo Narcisso Ioannes Baillet Insulanus & Mutonus harum peritissimi & sedali inuestigatores. Interdum & multò minor spithameo vel semipedali cauliculo: flos item nostratis Narcissi, sed minor, & oblongior magisque luteus.

Xyridis modo purgare asserunt radicis decoctum rustica plebs & opiliones. vomitiones moliri certum.

NARCISSVS Luteus multiplici flore.

Huius lutei Narcissi è multiplici floris factura varietas Belgicis amicorum hortis visu digna: cætero quin omnia profus eadem. Tornaci primùm repertus in horto cuiusdam pauperis.

NARCISSVS luteus unciifolius praxox. an Bulbus vomitorius? Advers. pag. 51.

Hisp. Ionquillos.


Non procul à Toletò sponte oritur in pratis montanis, Clusio auctore.

DIOSCOR. *Bulbus quem vomitorium vocant, folijs habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus, radicem similem, cortice nigro. Ea radix mansa aut decoctum eius potum vesicae malis medetur vomitiones mouet.*

Gal. multo est calidioris temperaturæ quàm esculentus bulbus.

NARCISSVS unciifolius serotinus paucioribus folijs & floribus duntaxat diversus.

NARCISSVS
 luteus
 unciifolius
 praxox.



NARCISSVS
 luteus
 aurealis

NARCISSVS
 aurealis
 parvus



NARCISSVS *Autumnalis parvus Clusij, Batavis, Tomada.*

Vncialis plantula est: Octobri mense flos albus, medio luteus, odoratus, Narcissi: è gracili cauliculo exit. Radix item Narcissi luteifolij minor, mucro prægnans. floret sine folijs ad Anam flumen in Turdulis, Clusio afferente: Belgis hæcenus incognita.

NARCISSVS *omnium minimus Hispanicus.*

Hæc omnium minimo foliis exilia & rotundiora quàm autumnalis Hyacinthi ad terram reflexa: flosculus albus, lutei montani Narcissi æmulus, sed longè minor in cauliculo palmari. E radicibus montium Pyrenæorum versus Oceanum occiduum in horto studiose alit Ioannes Muttonus pharmacopæus Neruiensis peritissimus.

NARBONENSIS *Lilionarcissus luteus montanus,*
Tulipa species minor Monspelliensis herbariorum.
Advers. pag. 51.


BONONIENSIS *LILIONARCISSVS luteus,*
sive Tulipa.



Bononiensis Narbonensis, folio, caule & flore proximus; omnia tamen vegetiora & grandiora: quandoque flores in caule bipartito geminos stellatos & nonnusquam ternos vides, iucundo leucioj lutei odore.




LEUCO-
NARCIS-
SOLIRION
pratense.





STIRACIVM

LEUCONARCIS SOLIRION pauciflorus
florib. Adverf. pag. 52.
Leucoium bulbosum hexaphyllum Dod. *Narcif. septimus*
Mattb. non descriptus.



LEUCO-
NARCIS-
SOLIRION
minimum.



LEUCONAR-
CISSOLIRION mi-
nimum autumnale.

*Leucoium bulbosum mi-
nimum autumnale*
Clusj.

Similis verno mi-
nimo. sed florem
sex foliolis Leucoij
bulbosi hexaphylli
nutantem, vel orni-
thegali, autūno edic.
folia exilitiora viri-
dantia autumnalis
Hyacinthi. Radix
aliorum more cepa-
cea concretionē.
Nascitur non procul
à Badajoz, sic retēus
Novembri & Octo-
br: Clusio authorē.
In Belgio depatēti
bulbi perierē.



LEUCONARCISSOLIRION pratense verius. nam VIOLA alba Thespis.
vel Moly? Rondellio Multiflora. Advers. pag. 52.
Leucoium bulbosum polyanthou Dod.

LEUCONARCISSOLIRION minimum. Advers. pag. 52.
Leucoium bulbosum triphyllum Dod. Narciss. 6. Mart.
an Herbaceus Plin.?


LILIONARCISSI varietates quamplurimae: an Purpureo-Narcissi Plin. Advers. pag. 52.
reddenda. Turcarum Cafe Lale, Zampul & SATYRIUM quorundam.

Naturæ luxu & lusu huiusquæ multas venustissimas florum varietates in delitiis habent D. Carolus de Croy serenissimus Princeps de Chymay, magnæ spei adolescens; præclari & generosi viri D. Ioannes de Brancion, D. Ioannes vander Dill, Domina Maria de Brimeu vxor Conradi Sctez, Georgius Rye & Ioannes Muttonus. Eas igitur quia me vidisse memini elapso anno benevolentia D. Brancionis magnæ in hac parte petitiæ, & patenti benemeriti, ob florum peramœnam venustatem, concitè perstringere visum fuit.

Omnibus Tulipæ, siue Lilionarcissi speciebus foliorum numerus in caule pedali & sesquipedali ternus, quaternus; quandoque quinaris, septenus & octonarius: flores senis foliolis; interdum pluribus, quorum vngues flauent, calathum effigiantes, constant: quorum alij præcoces, alij autem serotini.

LILIONARCISSVS DARDANEVS.


LILIONARCISSVS Chalcedonicus totus
istems, sanguineo puniceo par
& similis.



TYLIPAN sive Lilionarcissi luteus latifolius, obtusus,
phoeniceis rubentibus oris.

LILIONARCISSEYS luteis oris, flore patulo.

LILIO-
NARCIS-
SI Aduerf.
pag. 52.
lege / oris folio-
sis lin. 33.




1 Flos sex foliis obtusis purpurei sanguinei Lilionarcissi constat. Radix item & caulis persimilis, in quo quatuor, & nonnunquam plura folia, liliaceis & porrinis media interdum innatum bulbum in folio notauimus apud D. Ioannem vander Dill; cuiusmodi in Moly Homeric.

2 Luculento pendente flore, supremis foliorum oris & fundo ad basim luteis pallentibus, medium cingente sanguineo subfusco: calyculorum oris & media carina foris luteis: cetera cuncta sanguineo fusco exolero similia; medio intus stamine nigro, staminibus croceis obducto. Semina, vti reliquorum, compressa in ob longo tripartito membraneo anguloso folliculo; qua itidem sua colorum varias subeunt mutationes, & saepe degenerant, vt longo vsu diligentissime animaduertit clarif. vir D. Ioannes Boissot.

LILIONARCISSE
praeceis aut serotini san-
guinei purpureus & flore
varietates septem.

1. Eriophori vocati radix cepaceo inuolucro obducitur, molli sericeo toto facta, castaneorum riuus flos vt reliquorum; sed calathi fundus sive foliorum vngues atri & medio lutei conspiciuntur.
2. Luteo, & medio pullo, fundo.
3. Maculoso, medio fusco, folio.
4. Sanguineus toto calathi fundo pullo.
5. Vagae toto luteo.
6. 7. Vagae pullo, triangulis luteis: flore odorato, aut inodoro.




Totus luteus maior Chalcedonicus, sanguineo puniceo par, & similis: odoratus
 Croci emulacione & inodorus: præcox & ferotinus aut pallidus.
 Niueo candore & rubore confusus coccineus.
 Purpureus sanguineus, puniceusve obsoletus, candidioribus oris, carinam in-
 tercurfante albo rubore mixta & diluta linea, imo ad basim crocco vngue.
 Purpureus coccineus, rubentibus oris, medio folio exteriori candidat; vnguis
 luteolus, summo medio tenus coccineo luculento cruore.
 Coccineus purpureus punicans, tribus exterioribus mucronatis foliis; internis
 verò retusis.
 Rubellus pendente flore in acutum modicè fastigiato.
 Rubidus candore mixtus, nitidus, niueis oris.
 Niueus, extremis & summis rubidus oris, vndantibus in caule foliis.
 Candidus, striatis suavè rubentibus oris.
 Parulus, rubidus, candidans.
 Rubicundus, rutilans, luteola carina.
 Sanguineo, puniceove saturo liuescens, summis candidantibus oris, expansis,
 folio latiore, mucronato.
 Obsoleta purpura, summo albicans, purpurante medio.
 Imo & summo luteus amœnus, medio coccineo, sanguineo.
 Luteus striatis rubentibus oris.
 Rubellus niueis oris striatis.
 Luteus hilaris oris phœniceis.
 Niueus totus, fundo tantillum luteo.
 Luteus, phœniceo confusè mixtus.
 Luteolus p. æniceus, dilutus.
 Luteus coccineis rubentibus oris.
 Cand. & rubore confusis, Rosæ dehiscens pallidæ colore.
 Luteophœniceus luteouirentibus oris; septenis peramplis foliis.
 Purpuroviolaceus.

*Lilionei præcocis
 multiplex è colore &
 figura differentiæ.*

FRITILLARIA.

FRITILLARIA sive *Lilionei purpureus variegatus.*
Meleagrus flos Dod.



E Lilionei Fritillaria est; agro Aureliano ori-
 riuda; è quo delata studiosè à Ioanne Matone per-
 bono & perito apud Neruios Myropola, alibi que
 passim Belgicis cultioribus stirpium que ditiori-
 bus hortis alitur. E bulbo Narcissi veluti bipartito
 & tenui pedali & sesquipedali caule folia procedunt
 oblonga angusta Croci vel Ornithogali: flore v-
 nico aut duobus luculento, nutante, deorsum ver-
 gente, Tulipæ, fenis villis staminibusve luteis pai-
 lentibus, totidemque foliolis, labeculis & notulis
 pullis & dilutè purpurantibus, variato. Facultates
 hætenus inexploratæ. Semen albidum, compres-
 sum siliquis Hemerocalidis minoribus, Tulipæ Bo-
 noniensis paribus, clauditur.

CROCUS sive *flos.* *Advers. pag. 53.*
Hisp. Agastan.

DIOSCOR. Fritillaria ipsam tantum odoratum
 esse voluit. alij eximiosum, tribus draconis, ex aqua rosæ,
 Præculdatis vini coquant, emolliendi, atque substringendi
 habet. vrinam cit. Eleganter colorens præstat. qui ex passo
 biberint, crapulam non sentiant. oculorum fuciones illis cum
 humano lacte, colidit. additur in potiones, aut in se-
 necorum causa temperantur. ad valuatiam sedisq; ca-
 pta sumta, vultus indicat. venenam remoueat. vnguentis
 ad ignem sacrum inflammationes imicos, auricularis col-
 lectibiles.


lotionibus utilis. Quo facilius conteratur in calido felle sole siccat oportet, celeriter & versari. Urinam mouet radice expressa posita.

CROCOMAGMA.

DIOSCOR. Fit etiam expressu vnguenti crocini odoramentis, & in formam digestum, quod crocomagma vocant. Optimum est odoratum, modice myrrham olens, graue, nigrum, ligni expert, laue, subamarum, quod madefactum croci colorem reddit, gustatumq, vehementer dentes ac linguam inficit, multis durans annis, quale est quod à Syria deservitur. Habet suas vires ad delenda quae caliginem oculis obuersant. urinam cit. calfacit, concoquit, & emollit. Vires croci proportione quadam tantum repraesentat: quandoquidem plurimam croci partem sibi crocomagma vendicat.

CROCUS sine flore.

CROCI flores.



*Acori & Gal. Paulolum quid ascribens obtinet Ga. quod frigidu, terrenaque.

Crocus in calfaciendo secundum, in exsiccano primum sortitus ordinem, & altringendi & concoquendi virtute pollet. Proinde concoquendi vim quandam habet, adiuuante scilicet in hoc & pauca astringitione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum calfaciant, pauca adest astringitio, ea parum habent facultatem essentis emplasticis nominatis, quas cum iunctas caliditati non vehementer contigerit, concoquentes esse constant.


Exultans, tribus & ex aqua portis.] Calore aut frigore, ut Euphorbium, Cicuta, Hyosciamus, minimè exultans. Serapioni magna quantitate assumptus, ad tertium ordinem calfacit, & desiccatur ad 1^m. Tres drachmae potus tanta hilaritate homines conspergunt, ut nimio risu exoluantur. Inebriat potentissimè ex vino potus, & hominem ad ad-latum reddit, ut in sanitate efficiat. Tussientibus & pleuritidis valis, obstructions reseruat.


Caput petere & ferite tellis est Gal. lib. natè roris. g. v. croci in Hierapiera satis esse asserens.

Quae ad ad exhilarant, sanguinem spiritalem cordis in extremas partes diffundunt, itaque anocatis spiritibus, lipotimia & mors sequuntur.

Plura in Croco syluest. Aduers. pag. 53.

CROCUS





CROCUS *Montanus autumnalis*. *Lusit. & Hispan.*
etiamq; nostris vulgo, Pie de Botro,
id est, Pes asininus.

A domestico croco distare sulcatis foliorum lineis vtrinque, albis, notum est: alioqui radice & floribus non vlla sui parte dissimilibus, sed dilute purpurantibus, è quorum medio luteus stylus, tribus flammis phariceisve flaminibus cinctus, exeritur. Belgis hortensis & inquilinus factus, è matissimis Lusitanie collibus delatus.

CROCI *fyl. montani varietates*. *Advers. pag. 53.*
Hisp. & Lusit. Arcafran salunge.

In Calcaris, vulgo *L'esperon*, algido Norbonensis Gallie præcelso monte, Septembri mense, pascuis pone iugariola & lares rusticas, inter Meum, Gentianas, & Helleboros florentem album vna cura purpureo fyl. Croco me vidisse memini.

Albus duplex.

1. Eadem istis differentiis quæ Nozilicæ maiori & minori. Flores illis albi, purpureis violaceis lineis striati. Eos ex Italia præclarus vir D. Brancionus accepit.
2. Albus tertius, violacea purpurea basi est.
3. Totus violaceus purpureus.
4. Purpureum obloletum, pulvis lineis striatum, D. Brancion Alfonso Pancij Ferrariensis medici doctis. benevolentia & munere alit.

Valerandi Donai
munera.

CROCI *fyl. verni & autumnalis* è colore & flore differentia septem.

Minor 1.

Flore Croci violaceo ex pediculo vnciali sese pendente, medio foris luteo pallido, staminibus viduo: virentibus foliis oblongis, perangustis gracilibusve. Semen pericarpio clauditur, fulvum. Radix auellanam æquans, subadstringens.

CROCUS *vernus secundus* Clusij.
Hisp. Cebollina. i. parva Cepa.

CROCUS *vernus* *Hisp. duplex*, nobis item communicatus à Clariss. viro D. Brancione.

Huius aliud genus obervant C. Clusius in Beturicæ collibus, Lusitanie conteminitis, foliis & radice cortice externo persimile, sed flore paulò minore, ex albo purpurante, vixque è terra prominente, qui octenis foliolis cõpositus esset; quatuor exterioribus paulò maioribus; gemina candida radice, vna alteri incumbente. Superior habitior & firma est, edulis & dulcis; inferior languida & flaccida.


C. Clusij
munera.

Minor 3.


Alter iuncis surrectis interdè foliis, minus procumbentibus, vnico aut duobus flosculis minoribus multò & cœnulis, sed extremis tribus foliis ex vitidi dilatis. Radix non absumilis, sed habitior. Hæc Gadibus iuxta priorè eruebat Clusius.

CROCUS

CROCUS vernus serotinus primus,
Flore purpureo rubente, violaceis lineis striatus.




CROCUS vernus albus secundus, carnium vris,
sparsis in latera foliis.




CROCUS sylvest. vernus tertius,
Flore albo purpurviolacea basi. Advers. pag. 53.

CROCUS syl. minor Hispanicus, flore patulo:
*vulgo Nozallia minor, & nozallas i. nucula. à
 radice forma quam etiam gustu refert.
 Crocus vernus minor primus Clusij.*

CROCUS
 vernus pur-
 purviolaceus totus,
 quatuor Va-
 lerandi. Ad-
 versar. pag.
 53.
 Albo colore
 variat, pedi-
 culo ceruleo,
 alias albo, in
 Oiteasi valle
 ad radeses
 proceli Ber-
 nardi n. d. is.



Crocus sylvest. Hisp. vulgo Nozilicha maior.
Crocus vernus tertius Clusij.




Καλζονδύ COLCHICVM sive strangulatorium
EPHEMERVM. Advers. pag. 53.


Ger. Teitlofen, & wild safran. Belg. Teytlofen.
Ital. Zaffirano salustico.

Narcissus purpureus Plinij & Virgilij D. Ioan-
ni Boissot, apud Theoph. florens autumnno post ar-
cturum circa æquinoctium.

Perperam Moly H. Trago, quia huius flos mi-
nimè lacteus.



COLCHICVM candido flore Anglicum. pag. 54.
An Moly Homericum radice nocua?




COLCHICVM Lusitanicum serotinum.

Bulbus adnatum sibi annexum habet; flos albi-
 dus, nitidus, tantillo summis foliis rubore confu-
 sus: alioqui persimilis effigie & magnitudine vul-
 gato nostro Colchico, quale Lieræ Brabantorum flo-
 ruit Septembri & Octobri in amenissimo, cul-
 tissimo, stirpiamque exoticarum distillato paradiso
 D. Maria de Brimeu uxoris generosi viri Con-
 rardi Scherz, munere clarissimi D. medici Alsati
 Nonij Antuerpiani harum studiosissimi & peri-
 tissimi.




Colchicum Syria-
ei Alexandri-
num. Ad-
uert. pag 54.




Colchicum minus floescens.

Colchicum montanum Clusij.




Colchicum minus
semine pre-
gnans.




Huius minorem speciem olim latissimis pra-
tensibus pascuis ad motis Lupi Norbonensis radi-
ces, ad diuerforiū publicum, via qua Gangē vrbe-
culā itur, collegimus. Septembri flosculus stellaris
croceus, aut Colchici vulgatis, purpuroceruleus,
erumpit, sed minor. Idem esse audio eum Colchi-
co montano Clusij nostri, quod olim seuerat in
horto clarissimi D. Brancionis pro Erythrono,
foliis croceis, angustioribus, in caudiculo vix pal-
mum aequante, & interdum etiam maiore. Sem-
men subrotundum Colchici vulgatis in siliqua tri-
quetra.

Dioscor. Colchici radice comesta suagorum mo-
re strangulatio enecat. Remedia sunt eadem que fungis.
Bubonis etiam lac potum auxiliatur.



HERMODACTYLI non venenati officinarum.
COLCHICVM Illyricum sive Gracum non
venenatum Anguillara.



Venetis munere Alberti Martinelli Alepo Syriae euulias à fratre Cequino habui Colchici Anguillara plantas, pronis palmatis septenis, denis & duodenis foliis Colchici, striatis, mucronatis, reflexis, in angustum fastigiatis, imbricatis, & lateratim stipatis; è quibus in pusillo pediculo flores exeruntur lutei, pallentes, terni vel quaterni Colchici parui minores, staminibus item concoloribus. Siliqua non dissimilis. Radix foris cepae concretionem; intus euuida & vieta; quia in caulem, folia, flores, fructum & semen vis tota eruperat. Anguillarae & Cequino assentiendum, quibus acceptam refero. mihi tantum siccata aridaque visa.

Ephemeris non lethalis Diosc. facultates.
Adversar. pag. 33.

Iris agrestis Gal. sive Ephemerum non lethale, folia & caulem Lilio similem obtinet: radicem oblongam, non rotundam ceu Colchicum, digiti potissimum crassitudine, adstringens, & bene tenuisque odoris. Ex quibus palam fit facultatis temperataeque esse vis, nempe repellentis, & halitu euaporantis. Testificantur opera quae particularim edit. Siquidem non inefficaciter radix † eius in dentium doloribus colluitur. Tum phytanum augmento & statui folia congruunt. Operatur enim ea in vino decocta priusquam pus moueas, stilinere.

† Quidam volunt esse radicem Pentaphylli, sed folia reclamant.

MISVA. Calidus est ac siccis ordinis secundi initio; cum humiditate tamen excrementosa, fluctuata, nauseabunda, qua ventriculo nocet, praesertim quando in eum ex partibus aliis excrementa confluunt. Pituitam crassam, praesertim à iuncturis trahit, ob id podagrae, & aliis arthritidibus differentiis confert, non sumptus modò, sed etiam cataplasmate admotus, praesertim cum vitellis ouorum, & farina hordei, vel mica panis. Impinguat, spermia auget, vlceribus confert, quia terget sordem coram, & carnem in his putrem consumit. Cuminum, zingiber, piper longum libylicum, menthastrum, malliche mista, Hermodactylum prohibent, ne suo humore excrementoso & flatulento ledat ventriculum, neque flatus crassos & nauseabundos in eo excitet, aut multa in ipso excrementa colligat. Si verò Hermodactylum cum pauco zingibere, & succo raphani, vel cum scilla aslara, aut scillae iucco, & zingibere, & pauca spica, in trochiscos fingatur, purgat celeritè & plenitè: (per se enim tardè & imbecilliter vacuat). Myrobalani quoque roborando stomachum hermodactylos citò deturbant, & humorum in ventriculam affluxum prohibent. Datur ab aureo vno ad aureos duos: annos tres seruat.

Idem pag. 55.
Muenli 41.
Dant à 1669.
dovengnail.
la & in 42.
que. 304.



Colchicum luteum, an Ephemera non venenata
 Dioscoridis congener?
 Narcissus autumnalis Marcelli Virgilij Mutano,
 flore luteo pallente.
 Narcissus autumnalis quorundam Clusio.
 Lirium alterum Theoph. Dod. vulgò Cibollina Albo-
 rana. Hisp. Açuçenas amarillas. i. Liliium luteum.


Radice, caule, flore, folio, ortu, totaque planta
 propior facie Colchico, cui flos par in spithameo
 caule senis foliis stellatus, sed luteus, qualem
 Ephemeri non venenati sine Hermodactyli officina-
 rum Rondelletius assererat. In Lusitaniae mon-
 tosis spontaneum est. Belgij hortis autumnò una
 cum Colchico floret. Italis pèsilibus hortis alicur.

Varietas. { Angustioribus foliis & cauliculo de-
 drantali surrecto duntaxat variat in hor-
 tis nostris.


ὄρνιθόγαλον, ORNITHOGALON candidum
 vulgare. Aduers. pag. 55.

Belg. wit veidapupn. Gal. charles & oignon
 blanc champêtre. Hisp. Leche Gallina, id
 est, Gallinaceum lac.

Bulbus Leucanthemus minor Dod.



Leges pag 56.
 lin. 3. castr.



ORNITHOGA-
 LON luteum.
 Aduers. pag. 56.
 Ger. Schei sel;wi-
 ber, & ackertwi-
 ber.
 Bulbus Syl. Fuchf.
 & Tragi.
 Sisyriachion Cordi.
 Bulbus esculentus
 Lacune.

Varietas. Huius
 ornithogali lu-
 teti species mul-
 to minor, foliis
 logè exilioribus
 & angustioribus
 in viridariis no-
 stris prouenit.

ORNITHO-



ORNITHOGALON *caruleum* *palens*.

Ornithogalis qualibet sui parte valde cognatum & affine, sed flos caruleus, Hyacintho autumnali penè par & similis. Ex Turnacensi vrbe primum D. Brancioni muneri missum.

Dioscor. Ornithogali radix editur cruda & cocta. Emollit, discutit.


Ornithogali lutei radix sub cineribus cocta, addito melle, trita & imposita humidis & depascentibus vlcibus, prodest. Duros tumores emollit & discutit.

LILIONARCISSE *polyanthos*. *Lilium Alexandrinum* Neoteritorum. *Ornithogalon minus* Dod.
Narcissus quartus pictus Matth.

Ital. *Hyacintho del pater nostro*, propter glomerulos floris.

Inter Lilionarcissos & ornithogala media est hæc venusta planta: radice quippe Ornithogali: folia oblonga Narcissi prodeunt, inum caulem glabrum singularem, pedalem & cubitalem ambientia, in summo alis diuisum, quibus liliacei, lactei candoris calicis instar senis foliolis radiati flores Iunci aquatici, Allij vsini longè maiores, Tulipæ minores obtasi, è quorum fundo glomerulus pullus protuberat. Semen pericardio tereti Ornithogali clauditur. Stamina luteola glomerarum fundum pullū ambientia. Belgij hortensis vt rarus, ita vsuincompertus. Odor suavis, aromaticus. Huius radicibus m. Aluarus Nonius, magnæ spei & eruditio. D. medicus Antuerpianus.

BULBUS ESCULENTVS, DIOSC.
Hisp. Bulbo bueno para comer.



Diosc. A nobis estur: stomacho & aluo-vilis, rufus, & qui ex Africa desertur. Amarus verò & Scillanus, stomacho aptior est, & concoctionem adiuvat. Bulbi omnes acrimoniam habent, excalfaciunt, venerem stimulant, linguam tonsillâsq; exasperant. multum alimenti præbent, carnes creant, inflationem pariunt. luxatis, fractis, articulorum doloribus efficaciter illinuntur. spicula extrahunt, gargaras & podagras ex melle, aut per sese: hydrocorum tumores, & canum morsus, cum melle & piperis polline illiti cohibent, sudores compefcunt. stomachi dolores mitigant, furfures & vlcera qua in capite manant, cum tosto nitro abstergunt, sugillata varosque per se aut ex oui luteo, & lentigines cum melle vel aceto, emendant, fractis auriculis vnguibsq; ex polenta medentur. hydæ calidis cineribus torrefacti, tollunt ficus: item cum cinere è manarum capitibus, impositi, cremati verò & cum alcyonio missi, vitia cutis in facie, atrâsq; cicatrices, in sole illiti, emaculant, faciunt adrupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiore eorum cibo abstinendum: quoniam nervos tentant.

GAL. Frigidior & crassior est, lentumque succum procreat: nam & cocta difficilis est & flatuosa, & venerem prouocans: at tamen illitus, ob amaritudinē simul & adstrictionem, abstergit simul & glutinat & nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum amaritudinem in extergentibus esse substantijs, adstrictionem verò in glutinantibus: at siccitas vtramque consequitur.

Κεφάλιον, CEPA. Aduers. pag. 56. Hisp. Cebolla.

Diosc. Cepa longa acrior est quàm rotunda, item flaua quàm candida, & sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus pignunt, appetitum mutant, siuri noceant, & extenuant, fastidium pariunt, & expurgant. aluo viles sunt. ea detractis purgamentis in oleum coniecta, haemorrhoidas, reliquosque excretionum excretus referant, subacta pro balanis. Succus cum melle illitus, oculorum haemorrhoidas, & betudini.


*betudibus, argemi, nabeculis, & incipientibus suffusionibus auxiliatur: Angina eodem perunguntur. suppressas
 menses pellit: caput purgat, naribus infusum. canis morsibus cum aceto, ruta, & melle ulinuntur. cum aceto autem
 perunctas in sole vitiligines sanat. & cum pari spodio, scabras lepraudines sedat.* varos cum sale reprimis. con-
 tra calcamentorum attritus, cum gallinaceo adipis utilis est. cina alio prodest. in auribus sonitū ac gravitatem omen-
 talem Gal. dat: ad parulenti aureis, & elicendam eandem aquam valet. alopecia Tearum succo perficitur. qui celerius
 quā alcyoniū pilos euocat. largiore cibo cepa capitis dolores ciet. coctaque vehementius vrinam pellit. eos lethargicos
 efficit, qui valetudinibus aduersis, ea etiam cocta, plus aquo vescantur. elixa, & cum passu vini & fico illita, tuber-
 cula concoquit, & celerimē rumpit.*

* quia succus aqueæ & acræ caliditatis Gal.

GAL. Ex quarto est ordine excalescentium. Essentia autem eius potius crassarum est partium. Vnde etiam hæmorrhoides aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, admodum terree substantiæ est, eiusque calidæ. Totæ cepa flatuosa est manducata. Itaque quæ temperatura sunt sicciore, minus flatuum gignunt.

E cepa antidotum longè optimum ad luem pestiferam, quo pax memoriæ Valerandus Donrez Flauider Insulanus multos liberauit.

CEPA.



℞. Cepam magnam incauatam, cui inco-
 quantur sup. ch. ros. Thetiæ vel Mithridati,
 Terebenthinæ Venetæ vel Cypriæ añ. ʒ ij. folio-
 rum Rutæ M. f. Deinde teruntur, & ex aceto op-
 timo, per cribrū cernuntur, pro potu. Dosis vncie
 tres & quatuor. Residuum eo modo quo cataplas-
 ma, loco affecto imponitur. Postridie assumen-
 da est selquidrachma Electuarij sequentis.

℞. Boli Armeni rosacea loti ʒ ij. ʒ ij. Ra-
 dicum Tormentillæ, fol. Rutæ, aloës añ ʒ iiii. f.
 Cinnamomi & granorum Iuniperi añ ʒ vj. Ga-
 langæ, Caryophyllorum, seminis oxalidis, cor-
 nu Cerui, Scordei, Coralli rubri añ. ʒ iij. Radi-
 cum Gentianæ, Helenij, Aristolochiæ longæ, Ze-
 doariæ, vel Costi añ. ʒ. v. Conseruationis Ro-
 sarum, Buglossi añ. ʒ. ix. Theriacæ Androm-
 chi veteris ʒ iij. Mellis despumati & percocti lib.
 quatuor, additis succi putaminū Nucum vel flo-
 rum Iuglandis ʒ. quatuor; & aceti Rosati ʒ vj.
 misceantur, fiatque opiæ instar.



pag. 53. in Cepa Astalonitide, Anglis Scalspon
 vocata, lege stada, lin. 21.



SCILLA sive CEPA MARINA Hispanica, sive
 flos. carinato lili & Pancreatij medio folio humis
 proeminente. Aduers. 57.
 lege Hifp. Cebolla albarrana & cepa marina.

SCILLA Hispanica flosculi stellati, Ornithogali
 Monspeliaci.

75



lege hinc
 flos filia-
 ris Ornithogali
 & deinde pro-
 gressus.

DIOSCORIDIS verba, quæ in proxima leguntur
 pagina, hæc reponenda.

GAL. Admodum incidentem facultatem ob-
 sinet; non tamen admodum c.; sed secun-
 dum hoc eam quispiam secundum c. † censet
 excalfacientium. præstat autem eam assam, aut
 elixam sumere: sic enim virium eius violentia ex-
 soluitur.

† Incidit, calfacit & desiccatur ordine 2°. Æginetæ.

MESVE. Scilla, autore Galeno, bifariam v-
 tilis, tum quòd humores expelli apparat, tum
 quòd apparatus vacuat. Melior est, quæ alteri cõ-
 nexa eruitur (sola enim & singularis, ut etiam pro-
 pe thermas orta est venenosa) sapore dulci, acri,
 amaro, luminis splendentibus, ex agro liberò, ca-
 lida ordine tertio: sicca prope tertium. Substantiam habet superficialiam igneam, acrem admodum:
 ac terream adustione amarâ: aëriam denique mediocrem, eamque dulcem. Humores crassos ac
 lentos, & bilem atram incidendo, tenuando, tergendo, ut promptius expellantur apparat, & ma-
 ximè oxymeli ex ea scillites, & eisdem ipsa purgat. Quapropter capitis affectibus (cephalalgia, ce-
 phalæ, epilepsia, vertigini, scotomati) neruorum, & iuncturarum, pulmonis & thoracis, præsertim
 electarium ex succo ipsius & melle sumptum lambendo, confert. Idem vocem clarâ reddit, & oxy-
 mel scillites, & acetum scillites. Eadè splenis obstructione & tumore sanant, putredinè in corpore pro-
 hibent, ob id sanitatè tuentur, iuvenile corpus diu seruant, sed emaciant. Gingivas quoque laxas sanat,
 dentes commotos ore colluto acetum scillites firmat, oris factorem tollit, & halitum reddit odori-
 ferum, dolorem ventriculi sedat, coctionem iuvat, corporis colorem commendat, corpus molle &
 laxum confirmat, quouis modo vsurparum: scilla enim tenuat, incidit, terget, foras trahit, resolu-
 it materiam crassam lentore partibus adherentem: à putredine vindicat, vicerat, vrit. Assata scilla
 facilis soluit; immissa autem aceto, humores crassos, lentos, alius meris expelli promptos red-
 dit, laminæ autem ipsius mazâ: separatim inuolutæ sub cinere calido quantum sufficit, co-
 quantur, exoluuntur, in vsum veniunt: vel ipsæ laminæ vase luteo vitrato, sursum stricto, ope-
 culato, pergamenò includuntur. Dies quadraginta per æstiuos dies insolantur vase identidem ver-
 so, ut ex æquo vndique calcet: extracta vsurpetur, vel cum æquali farina orobi fiant trochisci, quan-
 do opus est, vtendi. Ex his sic assatis etiam fit acetum scillites; vel cum paulo mox vbi à scilla exem-
 ptæ sunt laminæ, aceto mersæ, insolentur in vase simili à Veris initio ad Æstatis finem, post vsurpe-
 tur. Datur autem potio à drach. quinque ad drachmas duodecim: oxymeli autem scillites ab aur.
 sex ad vnc. tres: trochisci autem à drachmis duabus ad drachmas quatuor. Mediocrem ferre coctio-
 nem potest scilla.

APVL. Ad hydroposim. Herbae scillae bulbis torretur, deinde circumpurgetur, & medium eius in aqua decoquitur, cum bene coctum fuerit eximitur, & ex eo tres oboli potui dantur cum melle & aceto hydropico, & euacuatur per urinam. Scillae quod est in medio eius cum oleo commodè feruefacito, atque ea quae dolorem exhibent perungito, sanabuntur. Radix pisata cum aceto & pane imposita panaricium misericè sanat. Scyllae folium subiectum linguae, sitim compescit.


SCILLA rubentibus radicis tunicis folio Aloeae carinato. Aduers. pag. 57.

Panocratum verum Clusij.

PANCRATII marini è floris colore varietas.

Aduers. pag. 57.

Hemerocalis Valentina Clusij. Narcissus Constantino-
politanus Matth. non descriptus, vt ex imagine suo
more apparet: Ital. Giglio marino. Hisp.
Amor myos, & Squilla menor.



Diosc. Scilla vim acrem atque feruentem habet. assata ad multa vitiores esse constat. Polline ad crustam subalto, aut luto oblita, in clibanum conijcitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficienter intosta fuerit, qua exempta, si non emollefcit, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadem qua prius fuit, nam quae ita non assatur, interaneis maxime noxia est. Torretur ite in olla, indito operculo, qua in furno demittatur. Sumi etia solet quod maxime est mediu, directis vino tenui tunicis, quod frustatim confectum coquitur mureta saporis aqua, donec ipsa nec amaritudinem nec acrimoniam habeat, traiecit aque lino frusta siccantur in umbra, ita vt ne vlla quicquid parte se contingant. his scilla segetibus ad oleum, vinum, aut acetum scillimum vtuntur. Ad rimas pedum, interius parte cruda scilla in oleo feruefacta, asit cum resina liquofacta, imponitur, decocta in aceto demorsis à vipera. Cataplasma est, ad singulas assa partes adultis obsonis tosti salis, cochlear vnum aut alterum, autem ieruris, ad emolliendam ab-

* Hic prepara-
randi mo-
dus ignavia
& infecia
pha imaci-
riorum exo-
leuit.



cum in potu aciem & odoratis medicaminibus, & quibus urinam ciere volumus, hydropicisque & stomachicis, quibus inerat atibus, regio morbo, torminibus, in tussi vetere, suspiriosis, & ore reijcientibus, tres obolos, in delictu ex melle sumpsisse satis est. coquitur cum melle, & estur eorundem gratia, maxime ut concoctionem adiuuet. strigmenta per alium extrahit. cocta, & simili sumpta modo, eosdem prabet effectus, sed cauendus scilla usus, his qui intestinum sentiunt vicus, ad pensiles verrucas & perisiones, tota efficaciter illinitur. Tritum semen & in carica aut melle deuoratum, alium emollit. Scilla tota in limine ianua suspensa, mali medicamenti noxam arceat.

PANCRATII marini è floribus colore varietas.

Prorsum Pancratium Monspeliense idem; sed huic flores luteolos Hispanica littora dant; qui etiam interdum purpurei, & quandoque panicantes produntur.


DIOSC. Pancratium, quod aliqui scillam appellant, radice est magni bulbi, subrufo colore, aut subpurpureo, gustu amaro ac feruente: foliis liliij, sed longioribus: Scille vires & preparationem habet. eodemque pondere in morbis efficaciter assumitur, cui tamen mitior quam scilla facultas inest. Radicis succus cum erui farina digeritur in pastillos, qui hydropicis splenicisque cum hydromelice commodissime dantur.

Afouzenas de las Indias.

Pancratium Monspeliaco similis est bulbo & semine: num eadem sit, asserere non ausim, ut cuius flores nondum apparuerint. in hortis pensilibus Iohannis Mutoni Neruiensis pharmacopœi fidissimi & doctissimi exit folio Narcissi.

SCHOENOPRASON; Afcalonina
Math.

PORRUM vulgare. Ital. Porro.
Hisp. Puerro.



DIOSC. Inflationem facit, noxium succum creas, tumultuosumque foranium parit; urinam ciet, alio accommodatur, extenuat, acniorum aciem bebetat, menses pellit: sed ladit exulceratam vesicam, renisque. Cuius ptisana verò coctum usu pectoris vitia extrahit. Coma eius in aqua maris & acrotoctia, in desensionibus ad proclusiones

classenes pulmo & dicitur vitu habetur. Porrum hic aqua mutata collum, tum frigida maceratum, dulcescit
 & multo minus inflat. Semen acrius est, & quaedam astrictionem vim habet. Quare succus cum aceto, ad-
 dito thure, aut manna, sanguinis profusio filit, maxime si naribus erumpat. Venerem diluatur. Contra omnia tho-
 racis vitia, tabenque pro delinctu efficit. Arteriam esu purgat: sed si assidue estur, visus obscuritatem inducit:
 stomacho aduersatur. Succus ex melle potus, aut illius, contra bestiarum morsus auxilio est. Ipsum quoque cum
 aceto aut Thuris polline, lacte aut rosaceo vituliter acutum doloribus, & sonitu instillatur. Varos tollunt folia illi-
 ta cum Rheo, qua ad obsonia vtuntur. Epiphytidi medentur: crustas ex sale illita rumpunt. Veteres sanguinis
 reiectiones cohibent seminis drachma bina cum aequali baccarum myrti pondere pota.

^a Subdit Gal. quanquam ne sic quidem vim perdit extenuandi.

^b Semen calcaciendo, extenuando.

^c Pli. phthisicis, destillationibus longis, regio morbo vel hydropicis, vel succus, vel ex ipso ci-
 bus prodest.

^d Cum felle caprino. Plinio.

^e Et alijs viceribus cum melle trito. Plin. Epiphytidi] viceribus aciem hebetantibus, & in ocu-
 li angulo perpetuo humori emananti. Plin.

Eadem quæ Diosc. Paulus, Plinius, Aëcius & Gal. qui subdit, Corpus calcacit, & crassos in eo
 humores extenuat, glutinososque incidit.

Plin. capitis dolores, si in aures fundatur, dormiturusue in aurem duobus succi cochlearibus, vno
 mellis.



E succo Porri looch ad anginas pituitosas aliosque catarrhos frigidos fauces precludentes effica-
 cissimum. Recipit Amygd. dul. mundatar. ꝑ. iij. ficuum numero quattuor, Bdellij mollis ꝑ. f. sac-
 chari candi, & succi porri in duplici vase dissolutorum, & in serapiu coctorum, q. f. excipiendis præ-
 dictis. Succu Glycyrrhizæ ꝑ. ij. misceatur. vtatur lambendo & fauces tangendo intincto Porri capitulo.

PORRUM *fluestre inodorum.*

Omnia Porro similia sunt; sed exiliora & inodora. Lieræ Br. orum in horto D. Ioannis Dif-
 sij alitur.

PORRUM *Tonsile & capitatum. Aduers. ꝑ. 8.*
Hisp. Puerro cabeçudo.

AMPELOPRASON, *ἀμπελόπρασον, siue Porrum*
fl. Ger. Wild Rauch. Angl. Wilde Ireh. Hiss.
 • Puerro saluage. Ital. Porranaillo.



Ampeloprason vinetis, aruis, marginibus, fenticetis & dumetis Galliz & Belgij gaudet. folio exte Allij sylvestris tenuifolij nō abfimili, sed maiore & acriore, in bicubitali caule. Radix bulbosa, nō ex nucleis, sed singulari capite cōstans, porri minor, durior, acrior, nōnullis adnatis sese propagās. Flore, & nucleis, seminis vice, triticeis granis paribus in glomeratis capitulis nō disparibus allij syl. tenuifolij.

Diosc. Ampeloprason stomacho magis aduersatur quā * porrum; plus autem calfacit. Urinam, & menses vehementius ↑ ciet. Id contra serpentium morsus esse conuenit.

* Gal. Quia acrius & siccius est domestico, sicut agria omnia reliqua domesticis.



† Gal. Sed & crassos & lentos humores potentius incidit, valentiusque infarcta organa obstructione liberat. Hac quoque ratione urinas sepe prouocauit, ubi à crassis & lentis retinebatur humoribus. Ad eò verò est calidum, ut illitum cataplasmatibus modo, exulceret. Dicitur est autem antè, quòd quæ eum in modum sunt calida, extremi sint ordinis.

SCORODOPRASSUM. Szapod'negrov. Germ.

Herknoblauch. Gal. Ail porreau. Ital.

Agliporro. Hisp. Aio porrano.

SCORODOPRASSON alterum.



Belgicis hortis hodie inquilinum factū, folio Porri latiore, caule quaternum & quinum cubitorum è bulbo crassiore, nucleis quinis & senis è squammatis cuticulis coacto: odoris tepidiori, Allij, vegetioris.

Diosc. Qualitatem Porri & Allij particeps, unde promiscuas sibi vires ex utroque vendicauit, effectus Allij Eadem Gal. & Porri præbens, inefficacius tamen. Collum porri modo dulcescit, & in olertum vicem transit.

SCORODOPRASSON alterum.

Gracilioribus & longioribus nucleis bulbus stipatur membranaceis involueris atro flaventibus: flos & folia allij exilitiora: odor & sapor Scorodoprassi. Hoc in meis Italicis peregrinationibus in sper- tulas conieceram.

Szilpodes.

Exhibitor. ALLIUM. Bel. Iosck. Gal. All
& aux. Ital. Aio & Aglio. Hsp.
Ayos.

ALLIUM *versinum.* Advers. pag. 59 Germ. Wets.
Gundz knoblauch. Ital. Aglio de gli
orli.



* sicim re-
primis Ae-
lio.



DIOSC. *Vis Allij acris est; excalscit, mordet, excernit, aluum turbat, inflammationes facit; stomachum exic-
cat: sitim gignit, flatum permouet, summam corporis cutem exulcerat, aciem oculorum esu hebetat. Magna in
allio utilitates contra aquarum mutationes; vocem clarificat. Veterem iustum crudum coctissimue lenit, potum autem
cum origani decocto, pediculos & lendes enecat. Cremati cinis illius sugillationibus cum melle, & alopecijs
cum Narano ynguine, medetur. Eruptiones papularum cum oleo & sale sanat. Virilignes, lichenas, lentiginas,
vlcera capitis manantia, lepras & furfures cum melle exprimit. Cum thure & tada decoctum, dentium dolorem
leuat si in ore contineatur. Contra venenatos muris aranei morsus cum ficulneis frondibus & cumino illinitur.
Feruofacta coma ius saminarum defesionibus adduum menses & secundos partus extrahit. Allium eiusdem
gratia suffitur, factum ex eo & nigra oliua intritum, quod graeci *μυρωδον* vocant, esu cit yrinam, ora vena-
rum patefacit, † hydropicus vile.*

† P. L. Diocles. Hydropicis cum Centauro, aut in fico duplici, ad euacuandam aluum, quod ef-
ficacius praestat viride cum coriandro in macro potum, Contra anginas imponi tritum, & gar-
garizare prodest: odore serpentes abigit.



OPHIOSCORODON *Advers. pag. eadem.*
Allium Serpentinum. It. al. Aglio serpentino.

MOLY *Dioscorideum putatum.*
Advers. pag. 59.



DIOSCOR. Eosdem effectus prebet anguinum, quod & Ophiocoron dicitur. Latas ventris tinea in cibo sumptum abigit. urinas detrahit. contra viperarum ictus, & priuatim haemorrhoids prodest; ita ut non aliud magis, si cum vino iugiter assumatur, aut tritum in eodem ebibatur. Contra rabioforum morsus, & illis & cibo valet.

Allia desiccant & calfaciunt Galeno 4°. ordine, eademque cum cepis facultates habent.


Frigidissimis & pituitosis morbis conuenit, colicisque inde cruciatibus ortis. lumbricos, & flatus pellit; venerem stimulat, quibus frigore extincta. calidioribus natura minuit exsiccando.

Temperamento calidis, capiti, oculis, pulmonibus & renibus perniciosum, uti pręgrantibus & lactantibus, menses educendo.

MOLY *Dioscorideum putatum.*

DIOSCOR. Bulbosa radice mirum in modum valet ad valis apertiones, si trita cum Irico rieguento in pefso ^{alijs legunt cum Moly facta} subiciatur.



Moly Serpentinum vocatum.


Dioscorideo Moly persimile ortu; folio ad terram item reflexo, odore & bulbo. sed flos candore rubens, cui subiacet bulbuli nitidi Indici Moly riu. Radix cepaceo praeduro inuolucro obtegitur. caulis pedalis & sesquipedalis. Belgis hortense est.

Moly foliis NARCISSI.


Alterum proceritate, & caule non absimile, sed floribus caeruleis, & foliis compressis Narcissi similibus, & ferè paribus; oblongis, & albis radicis bulbis porraceis simul implexis & cohereribus magno capitulorum stipatu: allium odore praefertentibus, cuius aliquot bulbos adhuc habemus munere Raphaelis de Coxia, summe humanitatis & stipium magni admiratoris, qui non modò exoticarum stirpium haud pœnitendum numerum, sed & easdem assabrè arguta manu summoq; artificio pictas, vt si quis alius apud Belgas, nobis dederit.

Moly Liliiflorum; bulbum in folio gerens,
Theoph. & Homericus serbè.
Aduers. pag. 60.

A 2 VI. Herba moly contusa & imposita, dolorem matricis aufert potenter.



Moly foliis
Narcissi

Moly Liliiflorum



CAUCASON, Moly Indicum vocatum.

LILIVM candidum. Advers. pag. 60.
Belg. Witte lilia. Angl. White lily.
Lilium sive Rosa Isioris Apul.



Indicum Moly, quod nos Lutetia vidisse primum superioribus annis meminimus in horto Castellani, summo caule bulbos spherico per amplo pericarpio membranaceo oclusos gerebat: quide pacti facile propagantur. Folia, bulbus & reliqua, cum superiori similia.

LILIVM candidum.

DIOSCOR. E Liliis vagantem temperatur, quod aliqui lirinum, alij susurum appellant, nervos, & primum vulva duritias, emolliens. Folia herba illius contra serpentium ictus auxiliantur. seruesacta, ambustis proficiunt: aceto condita, vulneribus opitulantur. Succus adiecto melle aut aceto, in ereo vase coquitur, conuenienti medicamento vetustati ulcerum, & ad rocentia vulnera. Inassata radix & ex rosaceo trita, igni ambusta sanat. vulnum emollit, menses cetera, in capite manantia expurgat. abstergit faciem & erugat. teritur in aceto cum hyoscyami foliis, & farina tritici, mulcendis testium inflammationibus. Semen potum moribus serpentium aduersatur. ignibus sacris semon & folia cum vino illinantur. Tradunt & rubra esse lilia in Syria autem, & Pisidia Pamphilia efficacissima vagantem nascuntur.

Igni ambusta.] Quia siccant, abstergunt, & digerunt moderatè Galeno.

Vulnam emollit.] Quia citra morsum digerit & emollit Gal.

Faciem erugat.] Galeno cum melle, vt potentius abstergat. Primi ordinis est abstergentium. In Galen. sique medicamen ad omnia quæ exsiccari postulant absque morfu, cetera vulnera omnia ingentia, & maxime quæ in capitibus musculorum eueniant; & quæcunque vlcera humida, flaccidæ & diuturna sunt, quæque agrè ad cicatricem perducuntur.

Lilij flos temperaturam mixtam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrea substantia.

Plin. ad clauos pedum in vino radices decoquit.

APV I. Ad morsum serpentis. Herbae lilij bulbum conterito, & expressos succos potui dato: ipsum etiam bulbum tritum morfui adponas, mirabiliter sanabitur.

Ad luxum. Herbae lilij folia tusa & imposita efficaciter sanant; & si tumor fuerit, sedant tumorem.


Lilium purpureum italicum.
Aduers. pag. 60. & 61.
Bulbus cruentus Hippoc.
Lilium croceum Fuchs.
An Hemerocallis, sine syl. Lilium
Diosc. aut congener?
Germ. Goldgillen. Hisp.
Lirio amarillo.



Lilium purpureum minus. pag. 62.



Lilium cruentum bulbos
gerens summo alis
diviso carle.



Lilium cruentum quartum, facun-
geri caulem bulbulis donatum.



Lilij cruenti
varietates.

Martagon, cui flores rutilant, bulbos nucleis stipatos summo caule alis diuiso pro-

fert.

Polyanthos, folia habet deorsum repanda.

Martagon tertium, foliis est virentibus, Lilij cruenti modo.

Quattum Lilio purpureo maiori subpar; flore Martagonis rutilo: & secundum caulem sesquicubi-
talem bulbulis à medio ad summum vsque ornat.

SULTAN SAMBAC.

Propter amoenitatem & floris decus, Sultan Sambac, vel fortè magno Sultano dicatum, Lilij hoc
genus appellatum videtur. Radix illi lilij cruenti, sed notulis labeculisque purpurantibus variata, qua-
lis, munere D. Aluari Nonij medici C. Antuerpiani horum studiosissimi, peritissimi, & perquã auidi, à
nobis alitur in horto Guilielmi Driesch perboni pharmacopœi. Florem nondum videre contigit; vt
cuius radix nuperimè Constantinopoli missa Sultan Sambac nomine.

MARTAGON candidum Chalcedonicum.

Indidem delatum visendæ venustatis, vt si quod aliud, istud lilium asseritur: folia lilij albi nostratis
candidiora, & radix item cognata. Neque florem tamen, neque semen in Belgio videre datum ha-
ctenus.

LILIUM Montanum. Aduers. pag. 61.

Lilium syl. Dod. Hemerocallis herbariorum.

Hyacinthus post. ar. Tragi. Asphodelus semina Fuchs.

MARTAGON Itolorum & Matthioli.


Gal. Lis iaulne, Aradici colore. Belg.

Zelle van Caluarie. Germ. Gold

wurt; weiblt.

HEMEROCALLIS Chalcedonica


Purpurosanguinea polyanthos.



Admodum rara
hæc Belgis: quam
propter florum lu-
culetam fœturam
& peregrinam eie-
gantia in deliciis
habent, & summa
diligentia in ficti-
libus alunt claris-
simi viri D. Ioan-
nes de Brancion &
D. Ioânes vander
Dilf. E bulbo nu-
cleisquammatim
cõpacto Lilij can-
didi, maiore; ma-
ximo Martagoni
pari, & concolori,
caulis cubitalis,
quem ab imo ad
summum vsq; li-
liacea folia cõfusè
& fornitò stipât.
Flôres hilares pur-
purosanguinei; Li-
lij montani ritus ad
pediculi extrema
item reflexi, pera-
mœna fœtura sũ-
mum caulem de-
corantes.


DIOSCOR. Hemerocallis radix trita & posita, aut cum melle & lana in passo apposita, aquam & sangui-
nem inducit. Folia trita & imposita, mammarum ex parte & oculorum inflammationes mitigat: sed & radix & fo-
lia ambustis vesicæ imponuntur.

LILIVM PERSICVM.



LILIVM Persicum, vulgo Pennachi Persiano.


Rarius Germaniæ, Galliæ & Angliæ; Lienz Belgarum solum visitur in horto-amœnissimo stirpiumq; exoticarum diuissimo generosi viri D. Ioannis Dilfij. Caulis ternum cubitorum, quem fusè ambiunt folia cæruleo-uiridantia, mucronata, Liliis cruentis paria. Flores nutantes nolas effigiantes obsoleta purpura nigricant. Radice bulbosa fissâ, minimè squamis loricata, albida, auersa parte tessili & plana, porrectis subtrus fibris obscure flauentibus. Cuius sit facultatis, neminem periculum fecisse intellexi.

LILIVM sive CORONA Imperialis,
TURFANI & LALE. i. sive herbariorum.


Nec multum à Liliis abest Chalcædonicum Lale, quod in eisdem Belgij hortis Lienz D. Dilfio, & illustri heroiæ Mariæ Schetz, de re herbaria benemeritis, prouenit: sesquipedem alto caule, foliis longioribus Liliij montani. Flores ru dentes nutantes Liliij Persicorum nolas effigiantes, quales pictura docet, non potuimus obseruare. caulem quidem edidit hoc anno, qui tamen summo statim marcescere cepit. Radix cæcæa concretione terræ & virosi colenici, vti tota planta, odoris. In Belgium missum Lale, Turfani & Coronæ Imperialis nomine.

LILIVM

LILIUM conallium, vel vernum Theophr.
Perperam Ephemerum non lesbale Fuchf.



CYNOSORCHIS maioris secunda species.
Aduersf. pag. 62.
Cynosorchis altera Dod. Angl. Doggis coddis.



Lilij conall. è fioris colore differentia.

Agri Louanienfis, qua itur Thenas Brabantorum
 vrbeim, fyluosis flores ediz candore & rubore con-
 fuse mixtos.

FUCHS. & DOD. cor roborare, iecur & cere-
 brum prodidete: item succum decoctumue ad syn-
 copas, apoplexias, vertigines, comitiales sine epi-
 lepsias, paralyses, oculorumque caligines discen-
 tiendas. Suauissimum flos spirat odorem, cuiusmo-
 di oxyacanthæ, cuius iudem stillatitia ad epilepti-
 cos insultus commendatur.


ORCHIDES.

CYNOSORCHIS Morio. Aduersf. pag. 62.

Germ. gepfengt knabbenkraut.

Orchis mas angustifolia Fuchf. Satyrion Apulei.

Orchis delphinia palustris C. Gemme.



Maculis pullis variis Morio testiculus mas neo-
 tericorum, flore delphini, propendente corniculo.

A PVL. Ad vlcera difficilia & cicatrices nigras.
 Radix tusa & imposta, vlcera expurgat, & cicatri-
 ces curat. Herba succo cum melle optimo oculos
 inuges, & lippitudines & dolores tollit sine mora.

Si quis ad maluriam non poterit affectari, obli-
 gatus. Herba præparandi radicem, id est testiculæ de-
 xterum, qui maior est, teres cum piperis albi granis
 quadraginta septem, & in se habeat semunciam cui
 herbæ superripit, & in ollis viciis & quater, &
 in vino optimo medicamentum soluet, & pondo
 scrupulorum novem per multum fumes: ad mu-
 lierem affectaberis copioso.

CYNO-

CYNOSORCHIS
Morio femina. pag. 62.
 Perfamilis mari, sed
 aliquantò minor: Flo-
 ribus cuculatis casti-
 dis hiatis specie, por-
 recto corniculato sta-
 mine.

Orehis del-
 phinia mon-
 tana C. Gem-
 ma.

* Eadem
 Aegineta.

Diosc. Eduntur
 radices cocta, vt bulbi; ex
 quibus si maiorem edant
 viri, mares generari di-
 cuntur: si immorè femi-
 na, alterum sexum. Ad-
 dunt, in Thessalia mollè
 mulieres in lacte capri-
 no bibere, ad stimulandos
 coitus: aridã verò, ad in-
 hibendos. & alterũ alte-
 ri potu resolui. Nascitur
 in petrosis & sabuletis. *


* GAL. Radicius **TESTICVLVS** *bircinus. Aduers. pag. 62.*
 bulbosæ ac geminæ vis
 inest humida & calida,
 ac gustantibus dulciuf-
 cula est. Cæterũ maior
 radix multam videtur
 habere humiditatẽ ex-
 crementitiã, & flatuo-
 sam; quapropter epota
 venerem excitat *. Al-
 tera verò, minor vide-
 licet, è contra, nimirũ
 admodũ elaborata: vt
 fit eius tẽperamentũ; ad
 calidius & siccius ver-
 gēs. Itaq; hæc radix tã-
 tũ abest, vt ad coitũ sti-
 mulet, vt etiam planè
 contrã cohibeat ac re-
 primat. Eduntur bul-
 borũ more toste.



TESTICVLVS
 vulpini varie-
 tates. Aducr.
 pag. 62. Sera-
 piades Fuchf.
 & Dod.

TESTICVLVS *vulpinus secundus.*

Testiculus
 vulpinus
 primus.
 Angl. Hares
 Ballones.
 Hsp. Saty-
 rion.



Videntur
 godes C.
 Gemma.




ORCHIDES.

Neusquam posthabenda de Orchidū differētiis sententia Clariss. viri Cornelij Gemma professoris regij in celeberrima Louanienſium Medica ſchola; qui certè non modò sex & triginta Testicalorum icones arguta & propria manu affabrè effigiatas, mihi liberaliſſimè communicauit; verum etiam eorūdem Syluam & Natura opes preſtius ex minutiarum obſervatione & perſpicuè digeſtis literis incomparabili modèſtia & eruditione plenis pro ſtudio atque amore erga me, cum iam hac Orchidum familia excuderetur, ſignificauit. Cuius ſanè iudicio, & quarum elegantia oblectatus nō abs re futurū iudicari, ſi poſteritatē ab obliuione vindicārē, ut eas illi mecum acceptas ferāt, illuſq; tanti viri coniecturas, quæ Dioſcoridis delineationi aptius congruere viſa ſunt, minimè reſpuant rei herbariæ ſtudioſi; cum tamen è tam varia Orchidum tribu arduum ſit appoſitè Dioſcoridis genuina Satyria proſteri. Sed hanc anxietatis plenam diſquiſitionem miſſam faciamus, quando opera noſtra natura ditanda & illuſtranda hiſtoria ſtudet, utq; nominum & opinionum doctiſſimorum viro- rum conſenſum, & quam aggreſſi ſumus methodum, minima queque digerendo (nullum enim vel deſpicatiſſimum natura operum noſtra cognitione indignum) proſequeremur; exordium à maiore mox ſubdenda Orchide ſumemus, quæ, ut uſu potior ſic & verior recepta eſt.

SERAPIAS Dioſc. Cornelio Gemma, ſive Baſilica
Syderites vel Erythraea ſoris omnino purpureis
& aliarum omnium facile
princeps.

CYNOSORCHIS noſtra maior.
Aduerſ. pag. 6.



SERAPIAS Dioſcor. 2^a. C. Gemma, ſive Orchis
Baſilica altera Syderites flore candidiore, thyſoq;
magis compreſſo, & foliis latioriſus uſque ad ver-
ticem inflexis, circa caulem argenteis.

CYNOSORCHIS maior altera noſtra.
Aduerſ. pag. 62.



ORCHIS Saurodes vel *Scintophora*, *Lacertarum emulacione*, *Cornelio Gemma*, sine *Tragorchis* altera.

vulgaris *Testiculus Hircinus*, seu *Tragorchis* & *Leporis testiculus nostras*. *Aduers.* pag. 62.


Floret circa finē Maij, ac ferè vsq; ad mediū Iunij. prouenit in collibus muscolis, præsertim inter conualles vmbrosas.



TRAGORCHIS minor & verior *C. Gemma*, sine *Coriosmites* vel *Coriophora* flore inſtar *Cuminum*.



ORCHIS Melittis, sine *Apis cadaveratum* exprimens. *Belg. Biscn.*



ORCHIS *Myodes prima* *C. Gemma*, floribus muscum exprimens. *Serapias 3^o.* *Dod.*






VULPINUS Testiculus, sine Orchis Myodes lutea Narbonensis, congener cum minimo Testiculo Vulpino, floribus factum, colore & effigie præferentibus. Advers. pag. 62.



Sphogodes C. Gemma. Gal. mouche-guespe. Belgicè, Wespe.

TESTICULI Vulpini varietas. Advers. pag. 62.

Huius è sola magnitudine, & floris intensi & remissi colore varietas gemina conspicua.



ORCHIS Myodes altera C. Gemma, folio latiore & flore grandiusculo.



ORCHIS Ornithophora, vel Ornithes, folio lati C. Gemma.

TESTICULUS Vulpinus noster papilionis alas expansas referens. Advers. pag. 62.

STIRPIUM

ORCHIS *Ornithophora* foliis
maculosis C. Gemma.
Sunt huius speciei differentia ac-
cidentales plurima.

Floribus { purpureis
 { luppurpurascentibus
 { albis.

Fo-
lis { prægrandibus,
 { parvis,
 { ovalis figura, (bus
 { ex lato in acurū desinēti-
 { ex acuto
 { in amplū
 { & rotan-
 { dum.

Floret medio
Aprilis ferè &
quandoq; sub
initio vel finē
Martij mensis



ORCHIS *stratiotica*, vel *Stratiotes maior*, sine
Militaris C. Gemma, quam merito
Basilicam tertiam li-
ceat vocitare.

ORCHIS *Stratiotica minor* C.
Gemma.



ORCHIS *Batrachites*, vel *Batrachioides* C. Gemma. Belg.
hospitens à ranula à floris fi-
gura.

Ex eorum genere quæ sexus
ambigui sunt, ut & Herma-
phroditicū testiculum nō ma-
lè appelles. Sunt enim mediæ
inter *Serapiades* & *Cynosor-
cheis*, maxime quoad formam
radicum.



ORCHIS
Hortagabra
detica secun-
da C. Gem-
ma, sine Or-
chis Psycho-
des diphylla.




TESTICU-
LVS odorat-
us. Adanf.
pag. 53.
Orchis spira-
lis C. Gem-
ma.



TETROORCHIS, vel Triorchis alba
Spiralis vel autumnalis C. Gemma.
Testiculi odorati varietas.*



ORCHIS
Frisia-
toralis.



TRIORCHIS lutea
3. C. Gemma.
Terziahuius diffe-
rentie effigiem sub-
dit C. Gemma, sed
oblongioribus radi-
cis oliuaribus bul-
bis.

* Non aliud à superiore, sed pluribus
ve plurimum oliuaribus oblongis bul-
bis donatur.

Pumilum testiculum facie, ortu & fo-
lio Ophris Pliniana, sed rotundiore alit
in fidelibus D. Dilsius manere Clusij
nostri, qui eius bulbillos Vienna Austriae
in Belgium transtulit. florem nondum
conspexi.

TRIORCHIS lutea altera C. Gemma, folio rotundio-
re & latiore quam superioris, virens quoque trifida, &
nonnulli hirsuta & pilosa eadem aut congesta cum
ORCHIDE Frisatoralis.

Que gemina inferiore folia bifida, plantae quibus
latifolia angustiora caudis, & in dodrantali caulicula
herbaceos sui. ortu virentes foliolos in horto
D. Brancionis.

M. C. GEMMA



ORCHIS minor Leodienfis.
Triorchis lutea, flore luteo C. Gemmae,
 sine Basilica minor.

Serapias & *Triorchis* quorundam.

Terna folia, angustiora, Quinquener-
 uita Plantaginis amula promit; laeure
 & viriditate Auriculæ vrsinæ, vti supe-
 rior. Flos iridem in cauliculo exili Te-
 sticuli odorati pari. Radix ternis & qua-
 ternis pufillis pendulis testiculis subest,
 quibus diuaticatur & propagatur. Col-
 libus agri Leodienfis gaudet.

Triorchis lutea C.
 Gemmae.



SERAPIAS ma-
 ni folio, floribus dilute
 purpureis notulis con-
 spicuis. Satyrium Ba-
 silicum primum Dod.
 Palma Christi herba-
 riorum. Belg. hande-
 kene ruyt. Germ.
 Crutz-
 blum.

SERAPIAS fe-
 mina pratensis, foliis
 notulis in spersis, sine
 Palma Christi. Ad-
 uers. pag. 63.
 Satyrium Basilicum
 alterum Dod.



*SERAPIAS candido flore
montana maculatis foliis.
Cynosorchis montana folio
maculoso C. Gemma.*



Præsertim eadem
niæco flore crebra vi-
situr; cetera haud ab-
similia.

*SERAPIAS minus rubello
nitente flore, angustifolia,
nullis interspersis punctulis.*



*SERAPIAS patustris latifolia,
Cynosorchis palustris platyphylla,
folio lævi latoq; flore albo sub-
purpureo ascensu C. Gemma.
Præcocior est violacea
Cynosorchis.*



SERAPIAS palustris altera leptophylla.



Cynosorchis palustris altera
C. Gemma.

Serius florens, coma vio-
lacea, foliis interdum laui-
bus, interdum maculosis.



SERAPIAS montana foliolosa.
Cynosorchis montana foliolosa
C. Gemma.



CYNOSORCHIS Dracon-
tae foliis & floribus impense
rubris C. Gemma.

Floret circa finem Aprilis aut
initia mensis Maij. Nascitur
in humidis &
vliginosis, pre-
fertim vbi ni-
grior terra est,




CYNOSORCHIS Ma-
crocaulos vel Conopsea
sive galericulata.

C. Gemma.
Floret circa medium
finemq; mensis Maij
vique ad Iunij ferè
medium.




SATYRION castra-
tum vel Eunuchum ex ge-
nere Cynosorcheas Cornel.
Gemma.



CYNOSOR-
CHIS pala-
stris lanifolia
& angusto
seu leptophyl-
la omnium
vilissima C.
Gemma.





ORCHIDVM genera.

Primum genus est Cynosorchidum: secundum Serapiadum, tertium verò Dactylidum vel digiti v-nius atque alterius speciem aptius præferens.

Cynosorchides voco duobus ordinibus præditos pectinum ritu, ut singuli velut singulas manus præferant interdum duobus digitis, interdum pluribus; qui si à radice reliqua præferentur tanquam processus meri vel apophyses, optimè congruent Dioscoridis notæ, ut Cynosorcheos vel canini testis nomen imponi possit. atq; ad hoc vnicum genus infinite species relegantur, quâquam quæ sub eodem insigni militant, potius fœminei sexus ideam quàm masculam repræsentent.

Serapiades autem exactè virilis testis imaginem referunt, atque in hac præcipuè animalculorum diuersissimorum species mirabili Naturæ fœcunditate atque ludibrio depinguntur.

Medium inter hæc genus est à Dioscoride quoque sub Cynosorchide comprehensum, quòd etiam oliuis oblongioribus siue compressis bulbosæ partes illarum optumè congruant, nisi non similes esse putemus, quia in oblongiores digitos eneruentur.

De generibus Cynosorchidum.

Cynosorcheon primas Oreades feci siue montanas. Crescunt sæpius inter quercæta locis asperis atque umbrosis. erumpunt Martio mense quandoque & sub Februarij finem. florent sub finem Aprilis, & initia Iunij mensis, interdum cubiti altitudine flore odoratissimo, interdum candido, interdum penitus maculofo: folia supernè viridia subter argenteo fulgore conspicuo, qui membrana quadam detracta tenuissima protinus exolefcit: fibras prætenues habet secundam totam longitudinem expositas.

Nereides vel palustres admodum varietate sunt. placuit tamen solas essentielles differentias, nimirum ex forma vel illius imitatrice figura cum in foliis, cum in floribus desumpta discrimina recensere. Equidè hæctenus propè vndeicim numeravi.

Xiphoides omnes florent paulo ante initia Maij vsque ad medium Iunij mensis.

Harum miranda maximè est Dracontias, quam puto ad Erythronium proximè accedere, si feminis ratio à Dioscoride designata congrueret, ac bulbus tantum vnicus foret. verùm quis scit an depravato codice Græco pro λιβωστέρησι sit legendum λιθοστέρησι vel λιθοστέρησι atque quod est in descriptione alterius Satyrij πίζον βαλβουδίου ὄσπερ μέλλου, valde ambiguum est, num quantitate, num alia ratione fundem volit, ut etiam prius illud Satyrium Psychocidi nostro non penitus dissimile videatur. nam & πίζον foliis dici potius quàm tutilum credo, atque hoc βαλβουδίου significat aptè candorem rubore tinctum; quod in Psychodi altera in foliorum ambitu (cùm primùm emergunt) sæpius observavi.

Ea verò que mucrone acutiore prædita est, accidentarias differentias præter numerum habet, id est, coloris, odoris, magnitudinis, leuoris & macularum specie ac notis interstinctas. Essentiales reliquæ ex tabula patent.


Pterophylla foliolato laciniato elegans planta sæpe ad sesquicubiti altitudinem surgit, flore violaceo, floret semis, ac circa initia Iunij mensis: gaudet valde limosis atque palustribus.

Conopsea vel Macrocanthos ad duorum cubitorum altitudinem sæpè peringit: flores illi purpurei admodum elegantes & odorati, ut in Serapiade basilica prima, atque secunda, nisi quòd color Conopsee magis dilutus, & hæc alterius velut fœmella propria videatur. Gaudet pratis, sed tamen non vsque adeò humidis, ut priores: quin potius medio quodam solo ac temperato.

De Serapiade.

In Serapiadum genere principes sunt regales triplici differentia à nobis exarata, dantur hoc nomine ob regalis sceptri diadematis ac trabeæ similitudinem.

Maiores



Major tum prima tum secunda foliis constat exactè virentibus instar porri, oblongis, pinguis paulo latioribus, interdum leuiter inflexis; testiculi exactè rotundi, cauliculus dodrantalis sæpè procerior; flos venustissimus, exactè purpureus, interdum leuiter subpurpurascens, dispositus ferè in umbellæ dilatæ speciem, nulla tamen odoris gratia, planta rara admodum, à me primùm in mœnium Lo-uaniensium conuallibus deprehensa.

Altera flore minus purpureo, magisq; in aciem explicato: floret vtraque à principio Iunij mensis sæpe vsq; in medium Iulij constante specie & venustate mirabili. erumpunt folia circa Solstitium hyemale, gaudet vmbrosis & asperis, muscoso solo & maximè graminetis. coniunx istorum est Conopsea.

Conopsea.

Proximè sunt Strateumaticæ vel Anthropinæ quæ tamen iudicio plurimorū cæteras pulchritudine vincunt. flores vt galeæ vel galeati homunculi truncis duntaxat manibus pedibusq;.

Prior eminentiore caule, folio amplissimo, id est, longè simul & lato & subrotundo inter initia, flos intus candidus, maculis purpureis interstinctus, foris velut fibris purpureis ac citrinis impèctus rubès: huius proventus vberior in syluula Floridæ vallis, erumpit mense Decembri, floret à Maij auspiciis ad finem vsq;.

Cognatum huic alterum genus, folio quidem lato, sed breuiore, coma magis propendula, propiusq; confertis floribus, & ad vnum lauis nutantibus galeis: color foris ex albo & cæruleo nonnihil cineritio mistus: intus habet maculas coloris puniceæ. hi ad nos è montosis & asperis non procul à Bruxellensi ciuitate mittuntur. Flos apprimè venustus vtrique generi, sed inodorus.

Militares.

Præter has Strateumaticas vel Militares vidi aliquando & tertium genus folio lato, lilij foliis quàm simillimo, oblongo scilicet & in mucronem subrotundum desinente, cui flos lilij lacteus planè columbarum esagiem alis exporrectis pedibusq; quam optimè repræsentans. Hanc à multo tempore non visam mihi etiam vt vellem pictam accuratius dare non potui. Gaudet montosis & aridis: floret eodem tempore cum Anthropinis.

De Vespiis & Apibus nihil addam particulatius, eo quòd à cæteris herbariæ rei cultoribus exarata & in Serapiadum genera sint relata: quanquam Crabrones ab Apibus non vsquequaque distinxerint, vt nec apicularum genera duo, ac rursus duo muscarum, foliis ac fructuum specie differentia.

Ornithophora.

Satyria Ornithophora sunt permulta, sed tamen aptius auicularum nomen maiores obtinent, quibus purpurei flores vel volucrum alis expansis, vel delphinæ cauda protensiore delineant. alteri istorum folia sunt maculosa, alteri plana & porraceo virore perfusa. Florent ambo mense Aprili, & ferè reliquas Satyriscorum species anteuertunt. Folia primùm erumpunt in Februatio. Gaudet vmbrosis, & maximè coryletis, terra porosa & musco obita.

Delphinia.

Delphinia minores nostra quoq; commentatione non indigent, cum ab aliis neotericis abundè sine explicata.

Tragorchis.

Tragorchim duplicem pinximus: Minorem flore fuliginoso, cuius tamen est magna varietas, figura, color & odor Cimicis, folium non absimile minori Delphinio Satyrisco. gaudet irriguis, floret cum Delphiniis.

Scincophora.

Altera quam Scincophoram diximus, à Remberro & aliis delineata est, frequetior in mœnibus Lo-uaniensium.

Pumilio.

Minor Basilica siue Pumilio flore luteo nonnihil herbaceo instar regij diadematis, odore fragrantissimo: vis ad excitandam Venerem præ cæteris admiranda. Hispani proinde *Amor didoua* iure appellat. testes parui, rotundi, solidi, cortice rufo obducti: folia emergunt prius Maio mense vel circa finem Aprilis: floret mense Iulio vsque in Augustum, valde se multiplicat sub terris. Gaudet montosis.

Spirale Satyrium.

Alter Pumilio flore candido odorato, rectè Spirale Satyrium vel Autumnale vocetur. Estque vt plurimùm Triorchis aut Tetorchis, oblongis bulbis instar oliuæ compressæ: folia Rhombotide, impense viridia cum fulgore subatro. Flores in spiram aptè dispositi, forma diadematis, vt priori. Erumpunt folia mense Septembri, flore iam marcescente; ac perseverant vsque in Maium, inde verò per æstatem oblitescunt. erumpit autem cauliculus mense Augusto, florens vsque in Septembrem. Quis testan alter horū sit planta, cuius meminit Theophrastus, forsan & odoris fragrantia & virtus idem docent, si soli natalis felicitas conspiraret.

Ptychoides.

Inter Dactylides Ptychoeides, maiores tantùm ab aliis exarantur, nos præter illas & duas alteras vidimus, vnam folio grandiore, interdum triplici aut quadruplici genus insecti referens, quod Papilionem vocant. Minores sunt odoratis, flore, montosis & aridis valde proueniunt inter erycas. Florent circa medium Iunij & aliquoties circa initia.

Hermaphrodita.

Hermaphrodita oblongis cruribus, solo gaudet palastro: flos erumpit mense Iulio, omnino candidus, tener qualis Oreadum.

Actidoides.

Actidoides vel Locustephora caulem & florem omnino consimiles ferè cum Satyrio abortiuo di-phylo, sed plura folia, foliorumque species alia, & alius ordo & radices geminae vt in Ptychodi. Flos barbæ hircinæ, Locustæ aut Cicadæ similitudine, gaudet mediocri solo, patris hyuosis, aperit flos medio mensis Maij.

Diosc. Testiculus alio nomine Serapias, Andreae auctore, vocatur, quoniam radix multifida sit: folijs est porri, latioribus, oblongis, pinguis, ex alarum sinu inflexis: caule palmeo: floribus penè purpureis: radice testiculis simili. Quia illa humores discutit, ulcera purgat, & serpere eadem non patitur. abolet fistulas, & illam inflammationem. arida radices homias inhibent. sanantq; putredines, & oris vlcera cacochæ. alium sifunt d'vino pota. De hac, eadem qua de testiculo canis, produntur.

Aegin. Orchis quem Serapida cognominant, aliqui verò triorchin, vehementiùs quàm superior, deliccet; quapropter laxos humores discutit: ulceraque sordida & putrescentia expurgat. Herpetibus medicatur: terrefacta multò impensius deliccet. Quia verò leuiter astringit, ventrè quoque cum vino T pota compescit.

ERITHRONII è floris colore & folijs differentia. pag. 64.
Satyrium & Dens caninus Belgarum. Hermodactylus
& Pseudohermodactylus, it. d. & Matth.



SATYRIUM Aiuersif. pag. 64.

Diosc. Radicem in vino nigro austero bibere conuenit, contra epistotozum. Vendum es, dens concumbendi incesit cupiat, ut siquidem ea prouores ad venere fieri affirmant.

Ob Baruosam & excrementitiam humiditatem, Gal. teste.

SATYRIUM ERITHRONIUM.

Diosc. Venereus, ut produat, si omnino mans teneatur, radix stimulat, eoque magis si bibatur in vino.

Aut flos purpura rubet, aut candore micat, aut purpura & candore confert pallet.

Hermodactylus & pseudohermodactylus Italorum putant folijs conitar infernè angustis; qua radice cervici inuituntur.

SPARGANION alterum superius reddendum proximo effigiem suam Observationum pag. 41. vbi omissum fuit.

In Brabantino agro, simpliciori, aliis viduo caule minore: ex intervallo per verticillos distinctis. Varietates. quo florum globuli oriuntur molliores minutque spinosi & echinati.

HOLERA & HOLERACEA.

N

RAPVM



RAPHANUM *radix orbiculatum*. Aduerf. pag. 66.
Hisp. Nabo redondo.



RAPHANUM
radix orbiculatum
radice aduersa
versisq.

RAPHANUM
radix orbiculatum
radice aduersa
versisq.

Diosc. Decocta Raphi radix alit, inflationem pavit:
dumentem ac fluxam carnem creat. Venere stimulat. Deco-
cto podagra, perniciosaque fomentur: contritioque vapo-
ratque imposito iuuantur. si excanata radici rosaceum cer-
atum adigatur, & seruenti cinere liquescat, exulceratis per-
nionibus proficiet. Cyina eius decocta manduntur, & vri-
nam ciunt. Semen antilosis & theriacis, praesertim qua
sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est.
Potu contra venena salutare est. Venere concitat. Ra-
pium. muria conditum, minus alimenti sufficit; sed multo
magis appetentiam recreat.


Fluxam carnem creat.] Gal. concoctus difficilis
si crudior edatur, bis cocta aptior.

Venere concitat] vtpote spiritum flatuosum
procreans, sic & radix. Gal.

Raphi sacui saccus, in corpus digestus, tempe-
rato crassior est, ideoque crudum saccum in venis
congeret.

RAPHANUM sili.

Diosc. Additur in medicamenta quibus ad de-
tergendam cutem in facie, totiq; corpore, vrimur, pra-
sertim qua ex lupini aut orui, tritici aut loiq; farina, fi-
si solent.



RAPHANUM
sili non
botan.
1807. No.
salurg.
uerisq.

RAPHANUM
sili non
botan.
1807. No.
salurg.
uerisq.

RAPIS
 radix arbor.
 Adverf. pag. 66.
 Scitium
 Math. Dod.
 & Mart.
 Germ. Gue
 thranck.
 Angl. Cade
 ioh. & h. d.
 iohs.



NAPS
 Adverf. pag.
 67. Hsp.
 Nabe com-
 mun &
 Naps.

RAPHANUS
 radix major
 Adverf. pag.
 67. primus
 Math. Hsp.
 Romano &
 calice.
 Ital. Rafano.
 de p. lin. 5.
 Plin. 197.



RAPHANUS
 radix minor
 purpureus.
 Adverf. pag.
 67. secundus
 Math.



Diosc. *Costa napi radix instat. modicum alit. semen eius potum ventrorum vires hebetat. arthritidis admiscetur. Conditur salsoradix.* Gal. Easdem, quas Rapa, vires obtinet. secundo ordine calfacit, & humectat primo.

RAPHANI OMNE genus. Aduers. pag. 67.

Tertis RAPHANI e colore differenti.

Belgis & Italis frequens Raphanus est, radice foris pulla, intus vero candida.

Diosc. *Radix, que Græci rhaphanus dicitur, excalfacit. flatus pignit. oris suavis est: sed stomacho aduersatur. vultus ciet. vrinam pellit. aluo aptior. summo tamen cibo sumi debet, quod magis eius distributionem adiuuet. cum autem praesumitur, cibum suspendit. quare vomitionis commodissime datur ante cibum. sensum aciem excitat. decocta contra veterem tussim, & pituita crassitiem in pectore, efficax est. cortex ex aceto mulso, colerius vomitiones mouet. hydropicis commodissime illinitur. lienosis verus. sugillata cum melle rapit: & nomas amolitur. contra viperarum ictus auxiliatur. alopecias ad pilum reducit. lentigines cum loliacea farina emendat. his qui sanguis strangulantur, tam cibo quam potu salutaris est. Semen vomitiones facit. vrinam mouet. menses cit. lienem extenuat. Cum aceto illitum gangrenas validissime emarginat: coctum cum aceto mulso, anginis per quam vilitur gargazizatur. Contra Cerastris morsus, potum ex vino auxilio est.*

ARMORACIA Dioscor. Raphanus syl.

Diosc. Tam folium quam radix in olera recipitur: sed hec excalfacit, vrinam concitat: astuosa est.

Astuosa est. Raphanus syl. calidior est Lunaria græca.

Gal. Excalfacit excessu tertio, desiccatur secundo, & extenuat. Agrestis autem in utroque efficacior. quin & semen ipsum planta efficacius est. Facultas ei inest digerendi. Itaque ad sugillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem conducit. Sarii radice sola crudaque vrbans hominibus vt plurimum prima mensa ex garro sumitur, alui ducendæ gratia: pauci autem acetum admiscunt.

Rustici vero frequenter cum pane esunt, non secus ac Allia. Ceterum cum medicos, tum idiotas illos mirari subit, quia cruda eas edunt, concoctionis iuuandæ gratia. Ipsi quidem id se experientia abunde compertum habere dicunt; nullus tamen eos citra damnum potuit imitari.

Plin. Raphani decocti mane poti ad termos cyathos comminuunt & eiciunt calculos. Hydropicis profunt ex aceto & sinapi sumpti, & lethargicis. Hippocrates eos mulierum defluos fricari Raphanis, & super umbilicuro imponi contra tormenta vuluæ dicit.

SINAPI satium Eruca aut Rapi folio.
Aduers. pag. 67. Hisp. Moltaza.


SINAPI agrese Apij aut potius Laueris folio.
Aduers. pag. 68.



SINAPI

SYNAPI *sinestrominus Bursa pastoris folio.*
Hisp. Mostaza saluage.
Advers. pag. 68.

ERVCA *sativa; Erysimum Gesneri.*
Hisp. Oruga. Ital. Rucheta.
Advers. pag. 68. 69.



Diosc. Ad calfaciendum, extenuandum, extrahendum, efficax est. ad eliciendam capitis pituitam^b māditur. contra praeuros consiliarum tumores, ac veterem callosamque arteria scabritiem, succus ex aqua & melle, conuenienter gargarizatur. seruat ament ariet, tritum & naribus admotum. comitialibus^c quoque auxiliatur. feminas vulua strangulata oppressat excitat. lethargicis, aërao capite, illinitur. cum fico^d admixtum, donec rubescat locus, & ad coxendicum cruciatu impositum, ad lienes,^e & omne genus dolores confert, cum permutanda valetudinis causa, ex alto vitia extrahenda^f sunt. alopecij illitum medetur. faciem purgat. fugillata cum melle, adipe aut cerato rapit. sera impetigines, & lepra, eo cum aceto perunguntur. contra febrium circuitus ayienm bibatur, aut potui, polenta modo, inspargitur. extrahentibus emplastris, scabiemque extenuantibus, vtiliter admisceri solet. eriazum, granitati aurium & sonitui, cum fico impositum prodest. Succus ad^g hebetudines oculorum & generum scabritias magna vtilitate illinitur. expressus recentis semino succus in sole siccatur.

^a Calfacit & siccat Gal. ordine quarto.

^b Tenetur in ore aut gargarizatur cum aqua multa Plin. ad dentium dolorem manducatur: ad vnam gargarizatur cum melle & aceto.

^c Comitialibus] cum fico & cumino tusum Plin.

^d lethargicis, retanicis & opisthotonicis Plin.

^e Plin. Semine & radice musto madefactis.


^f Lienes] ab humiditate & flatibus, Plin. subdit, Thoracis & omnis generis.

^g Eadem Plin. caustica vi pustulas faciendo.

^h Hebetudines] cum melle caligantes oculos Plin. qui subdit: Ad seorsionem icus & serpentionem tritam cum aceto illinitur. Fungorū venena discutit. Stomacho vtilissimum contra omnia vitia, pulmonibusque. Excreationes faciles facit in cibo sumptam.

N 6 ERVCA

ERUCA.
 Syl. Adueril.
 pag. 69.
 Hisp. Oruga
 syluestris.



ERUCA syluestris angustifolia.*



ERUCA
 Nasturtio co
 gnata tenui
 folia, Na
 sturtium syl.
 Clusij.



* Propter ordinis consecutionem, communes & affines naturam, & effigiem inter Erucam & Iri-
 onem, hic inferenda fuit. Promit quippe inflexis
 cubitalibus cauliculis flores luteos Erucæ sylue-
 stris. cornicula siliquarum sinapi sunt aut Nasturtij
 syluestris, ubi semen acre, uti folia angustiora, Erucæ
 syluestris concoloria, sed minimè diuisa. Tara-
 conis ferè paria, quæ Erucam aut Iri-
 onem sapit; quibus idcirco affinis natura putatur. In horto
 Coldèbergij nostri nõ vulgaris peritiæ viri oritur.

ERUCA Nasturtio cognata.

Erucæ minas frequens & obuia hic inferen-
 da. Folijs exis laciniosis, altiusque incisus quàm
 Nasturtij hortensis, Cakile Setapionis, Erucæ
 maris dictæ, similibus & concoloribus. Caulis
 multis concavis alis, hirsutus, asper, pedè æquans.
 Flosculi pallentes, & semen secundum ramulos, to-
 ros acris saporis Nasturtij in vaginulis. Deo hæc
 hæc C. Clusio, qui eam in Valentino agro, Martio
 florentis, & femine prægnantem, reperit.

Diosc. Cruda Eruca ventrem largiore cibo concitat. semen eodem effectu prodest. urinam cit. concoctioni prodest. alio perquam commodata. semine ad conasmenta utuntur. quod, vii in longum tempus assruetur, ad solto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum sylvestris eruca, maxime in Iberia, qua occidentem spectat. cuius semine pro sinapi incola utuntur. urinam vehementius pellit, multo satius acrior.

Ventrem concitat] quia flatulenta, Aeginetæ; recens potissimum.

Gal. Olius hoc manifestò calfacit, adeò vt non facilè solum absque lactuca edatur. Caput magis dolore afficit, si solum edatur.

Temperamento Erysimi similis.

Plin. Concitatrix Veneris: idcirco iungitur lactucis fetè in cibus, vt nimio frigori par feruor immixtus temperamentum æquet. Eius semen scorpionum venenis & muris aranei medetur. Bestio- las omnes innascentes corpori ardet; vitia cutis in facie cum melle illitum; lentigines ex aceto. Cicatrices nigras traducit ad candorem cum felle bubulo. Semen attrahit potentissimè & digerit. Eadem qua sinapi ratione alopecij medetur.

ERVCA GERATINA dicta Italarum. an Sophia Belgarum: an non potius Matthioli Erysimum?

Aliam tradunt parietinis & muris, virgis longioribus, exilibus Erucæ sylvestris, floribus luteis & corniculis fœnigræci exilibus, vbi semen acre Nasturtij, quod cancris mederi asseritur.

IRIO sine **ERYSIMVM** Aduers. pag. 69. Nobilis Eruca & Irion Cordi. Cleome Octavi Horatij Anguillara, Germanorum & Fuchs. Verbenæ foemina, vernaculè Epsenkrant weiblin. Lusit. Rinchaum.

Deme Ang.
Cadiola &
ked loht.

* Eadem Gal.

* Galidem
fendit.

Diosc. Semen contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extussumtur. regio morbo & coxendicibus prodest. contra venena in delinctu cum melle datur. illinitur ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatibus, parviti- dibus, duritijs mammarum, & testium inflammationibus. in totum extenuat, & calfacit. mitius t̄ multo ad cly- steres fiet, si aqua madescat atque torreatur, vel linteo illigatum, pimsica farina oblitum peraffotur.

Gal. Irionis semen, sicut gustu Nasturtio simile apparet, ita facultate igneum est & excafactortum. vtile est cum eclegmaris ad promouendas crassio- rum lentorumque in thorace & pulmone humo- rum eruptiones.

Subdit Plinius. Datur pleureticis, torminibus celiacis. infantibus quoque vtilissimum: item sedis vitij & articularijs morbis cum melle & fico. Medetur & suspuriosis. Item fistulis cum axungia veteri, ne intus addatur.

Ischiadicis cum Iberide & Nasturtio iniicitur.

Syr. de Erysimo efficacissimus; cuius beneficio iuenculas decennio raucedine laborantes, per- curauit.

℞. Erysimi totius recentis M. vj. Radicum Helenij, tuasilaginis succo adhac prægnantium, glycyrrhizæ añ ʒ ij. borraginis, cichonij, capillo- rum Veneris añ. M. i. f. florum cordialium, an- thos, stæchadis vel Beronicæ añ M. f. auisi ʒ vj. pal- sularum mundataru ʒ ij. incisis & contusis fiat om- nium decoctio ex arte insufficienti q. aquæ hor- dei, hydromelitis, & ʒ. vj. succi Irionis, ad lib. duas vel tres. expressioni dissolue sacchari q. s. fiat syrupus: quo diu & continuo vtendum, pur- gatio corpore.



ERYSIMVM
Matth. site-
ru. Aduers.
pag. 70.

ERUCA species quatuor vna hinc tamen esse videtur, posse substitui pro Irione, visum efferitate affeuerant: sed Erysimū Matthioli neque alterum, neque primū Dioscoridis Irionē folio Erucæ syl- uestris vel domesticæ rieu diuiso indicantur. Huic enim alteri folia Lapsanæ, sed minora, Botrydi paria, & falcata cornicula, stipatim ab imo summō tenuis cauliculus sesquicubiales ambientia. flosculi intei, & semen suauē vētis gustus, persimilia alioqui genuino Erysimō Erucæ folio, cuius cornicula in cacu- mine cauliculorū conspiciantur, vt Diosc. ait. Antærpiæ in horto stirpiam diuissimō Petri Couden- bergij pharmacopœi doctiss. semel satum, semet ipsum suo semine ferit, & singulis annis renascitur.

Semen sesquidrachmæ pondere ex ovo forbili tribus diebus continuò de uoratum, seminis profu- uia cohibet Matthiolo. Contra in vino potum, calculos renum pellit.

LAMPSANA *Aduers. pag. 72*

BARBAREA *sive Pseudobunias, Aduers. pag. 70. 71*
Angl. Wildt Setwall.

lege lin. 33.
plantæ.



Diosc. Syuestre olus plus alit quàm rumex, & Romacho vilis. Cuius folia, cauleque coquantur in cibo. Gal. Esa succos prauos creat: cæteram illita abstergendi nonnullam digerendique potestatem possidet.

BARBAREA.

Calida & sicca initio secundi existit; terreæ substantiæ nonnullius particeps, ideo gargarizatur ad anginas pituitosas & vias relaxatas. Succus commodè clysterni vice & ritu extensorijs siue Munda- dicationis vulgò vnguentis ad fordida vlcera, miscetur. Urinam ciet, calculos & fardus vesicæ de- cocto aut cibo pellit, vii lauer, cuius ferè par gustu.

BARBAREA minor. *Herba S. Alberti Botanienstem.*

In Gallia, Germaniæ, & Belgij hortis visitur herbuia folijs a trouirentibus Buguis, blattaris & Ho- tidis syluest. minoribus, nigrioribus: floribus & corniculis copiosis longè minoribus Pseudobuniaz- dis siue Barbarez. hæcenus vsus nullius.

SIVM alteram Olasatri facie.




Hæc referenda alia non ita abſimilis planta, ſtagnantibus item vdiſque ſcrobibus & lacuſtribus, pone novam urbem Antuerpianam oriunda, iuxta Scaldæ ameniſſima fluente. Radix innumeris implexa gracilibus & tortilibus fibris pullis glebæ limosæ inferitur; è qua cubitales & ternum cubitorum caules Cicutæ aſſurgunt. Folia Lauris Dioſcoridei, ambitu ferrata, ſpecioſa. Flos in umbellis è lateoviridi pallescens: Semen apio hortenſi ferè par; quod guſtu ad Cuminum, Daucum Creticum & Citrei mali corticem accedere, & pluſculum caloris habere videtur.

SION ſive LAVER.

DIOSC. Colicum eroduntur calculosumpit & ex-cernit; menſes & partus extrahit; vrinæ cit. Dyſentericiſ in cibo auxiliatur.

GAL. Excalfacit tantum quantum guſtu odo-ratum, atque digeſt.

SION ſive
LAVÆ.
Adverſ pag.
er. Sion o-
doni Tra-
gi. Gal. Ber-
to. Belg. Ma-
ter oppen.
Ger. bunnē
porelin.
Hiſp. Raha-
madra. Ger.
pocuro.



CRATEVÆ
S. ON erod-
colum.
Adverſ pag.

Silybrium
aquaticum
Munſ. Na-
ſtaru aqua-
ticum Tra-
gi. Gal. Cr. ſon
deven. Ger.
Zinn hreſſ.
& waſſer
kurſ. Belg.
Watte herſ
fr. Anel.
Watte tres-
ſin.





Sic in Mat
caudi & Ital.



Sic in Matthioli & Italicum.
Matthioli Sic provenit riguis & rivulis vbi Cardamine, folio ad Nasturtium hortense & Cardaminen accedente. Cauliculi pedales & interdū cubitales. Flores albi, & cornicula Sij Cereosæ, gustantiarres. Plurima hæc Taurinis Pedemontanis collium & montium rivulis, vbi collegimus cum Petro Rapalino pharnacopæo Taurinensi simplicium peritissimo.

CARDAMINE, siue Sifymbriū alterum Diosc. 74. 71.
perperam Nasturtium agreste, siue Iberis Eublio.
Cardaminum Apulei & Nasturtium Italicum.
Nasturtium syl. Corai, & pratense Tragi.
Germ. Sauchblum.

CARDAMINE altera, siue Sifymbrium Cardamine secundum.



Legenda

Diosc. Cardaminem cunctis facit, vbi et montes: est in cretibus, per gentes, in montibus, vbi in facie, montibus inpositum, & ceteris, & detrahitur.

GAL. Nasturtium simile quoddam gustu præfert, cum siccat semen, tertij ordinis expulsiuentium & desiccantium, humidum acris & vnde, secundum.

APUL. Herba Nasturtij succum variis vitiis, caput deplet & de oblogmate purgat. Hoc Nasturtium non scribitur, sed verum senescit circa impaertum. Semen vixit & cum oleo anise in mixtura, albidionem sanguinis de carne elicit, & herbæ & pulgum ex aqua decoctam bibe datur, quoniam dabit & desiccat crudum. Ad strumam, & hanc cum lino mîrâ sub strumam impones, super quo to folio oleis. Ad facculos sanidos, herba nasturtium cum fermento imposito: concoquit de sima.

CARDAMINE



CARDAMINE alera, *sive Sifymbrium Cardamine secundum.*

Herb. & agror. ardensm. Pash. Germ. Catechidium & Wildervärs. Flores cuculi Dod. alia ab armeria patens.


Belg. d'apri waterkerf, & Catechier dicere. Gal. passerage sauvage, à caloris acrimonia.

Exit alera Cardamine praevis Angliae, Belgij, Germaniae, & frigidarum regionum, ubi Cardamine, quam foliis inis refert. In pedali caule ut plurimum singulari folia exilia Nasturtij hortensis sive Cardami similia. Flores lactei purpuratos Eruct aut Napi, Cardamines prioris maiores, gultu, ut vniuersa planta, & viribus Sifymbrii referentes. Clysteribus & cataplasmatibus, Lepidij, Nasturtij, Sinapi, & congenerum herbarum rita, coxendicorum, commode miscetur.

CARDAMINE trifolia.*

NASTURTIVM. *Advers. pag. 72.*

Gal. Narbanoeflos Nasturtij. n. acer torquens, ab efflu. Ital. Maliverco.



* Quibusdā Belgij cultioribus & stirpū ditioribus hortis, reperitur facilius Nasturtij Cardamines gultu & facie plantula palmaris, folio quadamtenus Sifymbrij Cardamines, sed positu terro Oxy-Plimoniaque citu, humi procubēte. Flores in pediculis albus Ilopyri vulgaris aut Cardamines, Radix multū fibrosa.

NASTURTIVM.

DIOSC. *Nasturtium optimum constat esse Babilonicum. Omnia semina est acra, ex assiduo somno adu-
fatur, alium turbat sine se excusat. hanc in nimis parva exanimat, mentes et venerem sicut. Sinapi & eruct
sunt esse. lepras & impetigines ab seget. illud cum melle hanc extenuat. faves expurgat. & alium vicia ex
bit, febribus in colidum, serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat. capillorum defluvia colidit. car-
buratior ad suppurationem perducit, & rumpit. coxendicibus cum polenta commode ex aceto illinitur. tumores colli-
clivanti, discenti, omniū furunculorū, illud cum muria. Herba ad omnia eadem efficitur, licet minor.*

GAL. Adurentis facultatis particeps est, sicut sinapi: proinde coxendicibus & capitis dolores, atque adeo quodcumque aliud rubificationem postulat, eo perinde atque sinapi eruct faciunt. misceturque quae quae tenacitas asthmaticorum, tanquam scilicet id quod crassos succos valenter incidere valeat: vult & n-
gash nam omnia ei simile est. Porro & herba arefacta similem semini vim possidet. Humida verò ad-
huc & viridis, propter aquae humiditatis admissionem, multo semine interior est: adeo que sic in-
daptas eius moderata est, ut cum bene ea ut liceat, con oblenito.

Hoc Galenicū sic cuique theorema vniuersale, quoties nimia caliditatem, & ariditatem vertitur. N-
mae igitur virentibus adhuc & tenerioribus, pullulantibusque, quoties acri & robori natura remittit.


THEASPI
Draac folio.
Aduers. pag.
73.



THEASPI
vulgatum
Yacobi
No. Adm.
737.



THEASPI
Candide v. a.
belli et Isc-
ridis folio.
Aduers. pag.
75.



THEASPI
necnon
Meditan-
a.

THEASPI
fr. med.
quatuor.

Albifloribus
in hortis no-
stris variat.



THLASPI
fruticosum
fo. Leucoij
marini mi-
noris.




THLASPI *incanum* Mechliniense.
Finitimo Mechliniæ ruri Thlaspi genus alic-
rum frutescens oleæ foliis, multisque summo diuisis
hirsutis ramulis, pedem & sesquipedem longis. Flos
albus, & in pericarpis rotundiusculis summâ caulē
ambientibus exiguum semen minus cæteris acre.

THLASPI *fruticosum folio Leucoij marini min.*
Virgæ numerosæ sparsæ, crebribus leucoij mi-
noribus foliis: flores candidi copiosi, & semen com-
pressum Thlaspi parui. Radix lignosa, fibrosa, in
Belgij hortis.

THLASPI *fruticosum spinosum Narbonense.*
Senticosum hoc nõ nisi sterilibus caulis rupi-
bus prope Nemausum & MonsPELLIÛ frutescat,
dodrantalibus ramulis, multis alis diuisis, nonnihil
spinosis & sinuosis Poterij ritu. Folia oleæ, pusilla,
albida. flores candicant. Semen acre glumis oc-
clusum.

THLASPI *fruticosum alterum.*




Folio est Thymbre hirsuto, & rigido: cauliculos
emittit plures, pedales, fruticis specie, è quorũ sum-
mis flores albi, & seminam compressis folliculis.

Dioscor. Calfacit, bilem per superna & inferna Sanguinolent
purgat, acetabuli mensura potum. Sibiaduis in clystere ta coarctatio
infunditur. Potum sanguinem de sic & interiores absces- Itebadiis
sus rumpit. menses cit, & sacus necat. pectus, Au-
gib, Gland, & hinc.

BURSA

THLASPI
fruticosum
spinosum.



HYSSOPUS
florib.




BURSA pastoris. Aduers. pag. 76.

Pastorea bursa trita carpis imponitur, addita pillagine ad tertianas (punas, purgato prius corpore.

RESEDA maxima, eiusque varietates. Aduers. pag. 76.
Perpetram Pucnonon Anguli.



CAXILE Sc-
rapionis.
Aduers. p. 77.




Strenuo pur-
gare afferte
Anguillara.

RESEDA varie-
ratis e sola magni-
tudine.

Majoribus foliis, floribus, & cau-
tibus bicubitalibus, & ter-
tium cubitorum diutinat va-
riat, praesertim maxima, quae
elegantie studio apud Belgas
in hortis feritur, & superiore
torulibus ramulis dimaricatis
iucundo spectaculo de-
nunt. interdum & duodecim
cubitorum & foliis magni-
tudinis diversa.



Iberis Cardamomica.




IBERIS Cardamomica. Gal. Cresson sauvage, & Passerage sauvage. Angl. Stachis kreffe, & wild kreffe. Ger. wilder herb. Hist. Mastuerzo sauvage. It. al. Naitort salvatico. *Aduers.* pag. 77.

Lege lin. 32.
res cuius nomi.
m.

Diosc. Radices calfacientes & adurentes sunt: ipsa enim Ischiadicis cum salse axungia emplastri modo utiles, quaternis horis alligata, ut dein in balneo descendatur, & postea oleo cum lana locus perungatur.

ARABIS, sive DRABA. *Aduers.* pag. 78.



Diosc. Herba cum piceis sequitur in Cappadocia maxime. Semen aridum pro piperis obsonis admiscitur.

MYACRYM. *Aduers.* pag. 78.

Sesamū Cordi, & *Tragū Match* vni d. p. vilius Sesamū. *Eysimūm* Gal. & *Theop. Dod.* Ger. Stachsdortel, & *Inquidortel.*

Diosc. Semen acutissimè punctum, posuisti virgū ad hanc aram lacina venitur. Hoc unguis Sabotias corpus lacryari, ut que expoliari onstat.

GAL. Emplastica vim obtinet.


MYACRYM

Myacrym.



MYAGRUM alterum Thlaspi effigie.

SENECIO, *sive ERIGERON* *Adust.* pag. 79.
Gal. Senefion. Angl. Spounfeli. Ger. Citutz
Wurtz. Hisp. yerua cana, Cardo morto, &
Bon varon. Ital. Spelliciosa.



Anglis & Belgis hortenſis eſt; folio paruo Narbonenſis Thlaſpi puſilli ſive Alyſſi, vel Leucoij mari-
ni miniſi. Floſculi conferſim ſtipati umbellam exprimentes, ſtellati lutei Eryſimi vel Thlaſpi. Iiſdem
quibus Cameline oritur natalitiis.

SENECIO, ſive ERIGERON.

DIOSCOR. Folia cum floribus refrigerandi vim obtinent: quapropter cum exiguo vino aut per ſe illita ſolia, te-
ſtitâ, ſediſâ, inflammationes ſanât: quin & ex manna thuris cum reliquis vulneribus, cum neruorum quoque medentur.
Iuſti per ſe cû aceto pappi idem munus præſtant. Verùm recentes epoti, ſtrangulant. Totus autem caulis ſi coctus in paſſo
potui detur, ſtomachi dolores à bili contractos perſanât.

Miſcetur foementis lithotribis & vterinis patietariæ modo. Hyeme folia acerariis miſcentur.

PLIN. ſubdit. Lanugo eius cum croco & exiguo aquæ frigidae trita illinitur epiphloris. Toſta cum
mica ſalis ſtramis. Erigerum quoque cum farina ſive manna Thuris & vino dulci, teſtium inflama-
tiones ſanât.

ÆGIN. Refrigerante & modicè diſcutiente mixtis conſtat viribus.

APVL. Herba ſenecion tuſa & ſubaſta cum axungia veterè, & impoſita, mirificè ſanât vulnera.

Ad vulnera, ſi mane eam adorans ex terra colligas, & tuncas cum axungia veterè, in plagam im-
poſita, plagam aperit & expurgat. Item ſi eam ſimili more poſt meridiem colligas, & cum axungia ve-
tere miſceas, impoſita plagæ, aperit & perſanât. Piſtata cum axungia veterè, pedum dolorem tollit, &
neruorum potentiffimè ſanât. Floſculi cocti bene & ſubaſti, imponantur vt malagma ſtomacho, ſum-
me dolorem ſanât.

Ad lumborum & coxarum dolorem. Herba ſenecion per ſe trita & ieiuno in potu data, validiffimè
prodeſſe fertur. Ad podagram. Trita cû ſale, & vt malagmatis genus appoſita pedibus, æque prodeſſe
certum eſt. Si quis ferro percuffus fuerit, herba tuſa cum axungia veterè ſine ſale, & facta quaſi perotium
& in plaga impoſita, facillimè vulnus ad ſanitatè perducit.

INCANA SENECIO.

Syluoſis & ſebuloſis agrorum marginibus Erigeri ſpecies ſenecionis oritur: à vulgata careto quaſi
non ita diuerſa. Brabantino agro & Neuienſi familiaris.



ERICERON tomentosum alterum.

Calidarum regionum hanc Senecionis species indigena. Rard in Belgio nec nisi in horto D. Bracconi reperitur folijs altioribus acinijs serratis, Serridis fylvestris, tomentosiss: radice, flore, & paposa casaria Senecionis.

IACOBEA Senecio Adans. pag. 79.

Ital. Carduncello maggiore. Senecio sive Erigeron major.

Ad anginas, tonsillarumque inflammationes perutilem gargarizantem experientia docet. vascibus & depercentibus viceribus fistulisque medetur. & ne serpens, cohibet decocto & succo.

BOTRYS. Cal. purpurea & millequins. J. sp.

bien guarada. Ital. Silius Adans. pag. 80.

Diosc. Orithon apollina in troponis.

Aegia. Planta insigniter odorata esse quae cum vino pota non nisi secta ceruice spirantibus, quos orithonicos appellant, opitulatur.

Hoc de re commendatur & primam laudem sortitur Zigerus Cabotus O. Senator Medico Annapoliano experientia. Sentes & vanae morae, reultate partium, facidendi & absurgendi vi.



SERIS sylvestris, Ambubera. Hisp. Almerones & Cicoria. Ital. etiam Tornafols. Leg. Aug. Wild. Lichoye. Ger. Wilde wegwarten, quasi viarum custos. Aduers. pag. 82.

SERIS sativa. Ital. & Hisp. Cicoria domestica. Aduers. pag. 82.



lege pag. 82
l. 9. dicitur
tinnit.

SERIDES.

Diosc. Vtraque refrigerat. & adstringit. Stomacho vilissima. alium sicut cocta, si cum aceto assuatur. † sylvestres Stomacho moliores. quandoquidem astuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. cardiacis, per se, aut cum polenta, vtiliter illinantur. podagris & oculosum inflammationibus auxilio sunt. herba cum radice illita, percussa à scorpione subuenit. igni sacro cum polenta modetur. succus cum cerusa & aceto, valet ad illius eorum que refrigerationem desiderant.*

* item iecinori & renibus Plin.

† Urine tormina soluit Plin.

Plin. Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Regium morbum in multo si sine febre sit, discutit. Vesicam iuuat. Mulierum purgationibus quidem decoctum in aqua adeo prodest, vt emortuos partus trahat. vtilis quibus genitura effluit, alterno dierum potu.

Simeo Seribus.

Obstructiones auferendi vim habet, vt nullum aliud olus. sanguinis fluxum sedat, & inflammationes iccoris discutit, & icteros iuuat. Iocur proprietate quadam roborat. Mediocriter somnum inducit. Venoris appetenciam extinguit, & semen genitale, in ijs qui frigidam habent temperaturam, minuit. Semen febres ex flaua bile ortas iuuat: at lieni nocet.



HEDYPNOIS Plin. *Aphaca* Theophr.
Aduers. pag. 82.

CHONDRILLA *terulea*, Cichorii fyl. laciniosis folijs: Gallie
nannellis Lasteron. Ital. Terracrepolo. Hisp. Lietugas &
Liechugas dentre los planos. Aduers. pag. 84.



HEDYPNOIS.

Plin. Stomachum dissolutum adstringit cocta, crudaque sistit aluum; & dysentericis prodest magis cum lacte. Rupta & conuulsa utroque genere inuantur. Item quibus geitura valetudinis morbo effluit.

CHONDRILLA.

Diosc. Inramulis gummi Malliches similitudine faba inueniri solet, quod cum myrrha tritum, & limbo appositum inftar oliu seminarum menses trahit. Fusa cum radicibus herba adieclo melle dividatur in pastillos, qui intro admitti virilignis emaculant. Gummi inordinatos pilos replicat: quod item tenera radix efficit: si intincta succo acupilis admoceatur. Contra viperas in vino pota proficit. Succus decocta in vino, aut per se potus, aluum sistit.

Inrybis & Lactucis Gal. refertur.

CHONDRILLA altera Diosc. Dens leonis Dod.
cui tamen radix longa non rotunda subest.



Diosc. Aliud habetur Chondrilla genus, folium serens oblongum, circumscriptum, humi sparsum: caulem secro madensom lacteo: radice tenui, rotunda, leui, vegeta, flauescente, succosa, omnis & casili & foila concoquentium vim habens. Succus incommodos palpebrarum pilos restitit. Nascitur in lacis & culis.



CHONDRILLA var. *purpurante flore, semine nitido deciduo: an Chondrilla altera Matth. Belg. Crupina, detorto vocabulo à Cruppen, hoc est repere, quia semen manu contritatum se subactis ac prorepat.*

VERRUCARIA Chondrilla, Chondrilla prior Diosc. Clusij, Zacyntba Matth. Ital. Cichoria verrucaria, & Mazza di Cavalliero, & Mazza ferrata. Angl. Summe succorp.

Hinc anonymos in. Aduers. descripta & depravata pag. 189. proxime Superbiam recentiorum, dicenda.



Hetruriae, Syriae & agri Norbonensis collibus non procul à Lupo monte plantula non inelegans exit, quae Chondrilla referenda videtur. Dodrantales & sesquipedales geniculatos cauliculos erigens, superiorum chondrillarum consimilium; nec flores ita dispares gerit, purpurantes in capitulis squamulis compactis Chondrilla purpureo-oceruleae Boigarum. Sed semen lacer aut Carthami sive stris, nigrum, pellucidum.

VERRUCARIA Chondrilla.

Folia habet crassiora Hieracij, incana, circinatae Erucae aut Eryngij lacinijs, sed minus profundis in multifidis dodrantalibus & pedem aequantibus cauliculis glomerata, & veluti torulis capulata seminum capitula clavam exprimentia: ideo Mazza di Cavalliero & Mazza ferrata Italici dicitur, & Zacynthia verrucaria, è Zacyntho Graecum delata. Flores luteus, parvus Hieracij, radiatus, simplex, pappi diffuens. Univerſa planta succum fundit fulvum, qui aliquando praeſtat in ipsis cauliculis, ideo vocatur Anglis Summe Succorp.

Præmorſis à cane rabido eius decoctam veſiter exhiberi tradit Cluſius.



MONSPELLIENSIVM *dentiosius Asphodeli bul-*
bulis, an Chondrilla altera Diosc. Advers. pag. 83.
Cichorium Constantinopolitanum Martb.




IXOPUS Cordi.

Seris Longifolia Martoni. an Chondrilla altera Diosc.

Cordi. Intybacea herba est: canumerosa emittitâ radice capite folia, longitudine dodrantali, latitudine vnciali, acuminata, & vndique per terram strata, parum etiam in obliquâ erectare quorum medio vnus atque alter aut nonnunquam plures exeunt dodrâtales, & interdum pedales & cubitales coliculi, teretes tenerique: in quorum cacumine, circa veris medium singuli sunt orbiculati flores multis luteis capillamentis vni calici infidentibus, constantes: qui deinde in pappos resoluti auolant, vna cum oblongo & inferius annexo semine. Radice nititur perenni, pedali dum digitorum crassitudine; foris nigra, intus candida, carnosâ & fungosa: quæ præcisa copiosum mittit liquorem, colore in lacteo modicè cinereum, qui digitis tractatus aut gustatus, substantia visco similis fit, & in longum auellit, siccus verò rufescit, postquamq; nigrescit. Tota herba gustu dulcis est, chondrilla prioris modo. Liquor nõ ignauiter etiam adstringit odore verò nullo commendatur. Nasctur odus apricis, montanis locis.

Hâc quam solè & affabrè deliniet Cordus plurimum fûit huiusmodi Nerulorum agrorum super & macerata.



Dane iconis vulgi. Advers. pag. 83. Offic. Taraxacon. Corona. & caput Monachii. Chondrilla Galeni Anguil. Ital. Piffa a ferro. & Pite dicane. & Piffa diâ. Riff. Diente de leon. L. 19. luge. Cienilla. Chondrilla altera Dado-nij. Succus sippi-tudinibus & oculorâ in inflammationibus modera.



INTYBVM
 farinam latifolium, Endiu & Scirpula officinarum. Advers. 85.

Intybum farinam latifolium, Endiu & Scirpula officinarum. Advers. 85.



ENDIVIA
 vulgarior of-
 ficinarū, Se-
 ris domesti-
 ca altera la-
 ctucina
 Diosc. amara
 angustifolia.
 Aduerf. 86.
 Lactuca fyl.
 Fuchf. &
 Marth.



SONCHUS *lactis tenerior lactifolia.* Aduerf. pag. 37
Hisp. Corayas. Ital. etiam Lactucella, Cripini, &
La quisoli. & Galis, Palais de lieure.
Angl. Cicerbita.



SONCHUS
 tenerior acu-
 icis ASPER-
 RIOR aut
 horridiuscula
 Aduerf. 87.



Deme mios-
 tibus. l. 19. &
 quæ sequun-
 tur. & leges
 vni folia la-
 ciniosa Dēris
 Leonis, alteri
 vero lactuca-
 cea sunt, Di-
 psaci magni-
 tudine, &c.

Diosc. Viriusque vis refrigerat. madicè adstringit.
 yda astuanti stomacho & inflammationibus illi profunt.
 Succus eorum stomacho stonnes sorbitione mitigat. Lac eli-
 cit in vello appositus sedis, ac vulua collectionibus apu-
 latur. ram herba quam radix illis a vibratis à scorpionis idē-
 bus subuenit. Alter sonchus tenerior, arboris instar, lacte
 conuans folijs, caulem in ramos exsertem folia distin-
 guunt. sed ad eadem potest.

Gal. subdit. Terrestre eius temperamentum,
 postea quàm restecans fuerit, redditur, modicam
 habens caliditatem.



SONCHVS alter folio profundè lacinijs sinuato
hederaceo.

SONCHVS
leuis vulgo-
rum folijs lac-
inijs Dent-
is Leonis.



SONCHVS alter folio lacinijs sinuato hederaceo.
Alius laciniata folia habet, quorum summa
Hederæ folium referūt, anersa parte rubentia, nul-
lis spinulis hirta: flos Endiviæ sylvestris, caulis bi-
cubitalis; in rudibus & ruinosis Nerviorum, &
Brabantorum frequens: radice fibrosa.

HIERACIVM minus Achers. pag. 88.

Ang. Haishe wedde.

Diosc. Refrigerandi vim habet & mollicè adstrin-
gendi, idèque astuanti stomacho & inflammationibus il-
litum prodest. Succus erosionem stomachi in sorbitione
mitigat. Herba ipsa cum radice illita scorpionum ictu in
auxiliatur.

HIERACIVM minus præmorosa radice.

Advers. pag. 88.

Diosc. Vim suam ad eadem ad qua superior, im-
pendit.

Plin. Succus sanat omnia oculorum vitia cum
lacte mulierum: arce nubesulas, cicatrices adu-
sionesque omnes, præcipuè caligines. Imponitur
etiã oculis in lana contra epiphoras. Item suc-
cus aluum purgat in posca potus ad duos obolos.


HIERA
CIVM
minus.




HIER-

HERACIUM
civm mi
nispugnant
fa radice. Ad-
verf. 88.


Vilem La-
gopus de fa-
ctura Conu-
ria Tragi
& Apulei.



HERACIUM
civm mi
nispugnant
fa radice.
pag. 88.



HERACIUM
civm Sa-
haudem.
Aduer. pag.
88.



HERACIUM
civm
Narbona
facere fia
qua.

Marginibus
nihil frequen-
tius agri An-
tuertiani.




*HIERACIUM Narbonense falcata filiqua, Calendula semen & pedem alauda
exprimente.*

Notissimum Monspellienfibus istud: vbi inter segetes & in agrorum marginibus Boute-
netto finitimis luxuriat, folijs oblongis Hieracij vel Chondrilla marinae: gracilibus alis multis
dignis cauliculis, & floribus luteolis Lampfanae similibus: semen in falcatis paruum calendulae ritu
exilibus corniculis radiatim ab vno petiolo aptis, alaudae cancri vel aranei pedes praeferebantibus.

*LACTUCA sativa folio Scariola; Germ. Lattich.
Belg. Lettawe. Gal. Laitues. Angl. Lettuce.
Hisp. Lechuga & Lettuga. Ital.
Lactuca. Aduers. 89.*

*LACTUCA capitata crispis Brassicae folijs.
Aduers. pag. 90.*



lege immata.

lege pag. 89.
in 8 Lactu-
ca capitata
& sativa
firmamenta-
no

item 126. in
lactuca syl-
log. imaginari
egressi sunt.

Diosc. Lactuca sativa, quibus natura refrigeratrix inest, stomacho grata habentur, somnum conciliant, et-
erum emolliunt, lac euocant, verum decocta magis alunt. Stomachicis illas esse prodest. Epotum semen^m assiduas
libidinum imaginationes in somno, compescit, & veneri refragatur, ipse vero frequentiore in cibo, claritati oculorum
officiunt, inflammationibus & ignibus sacris opitulantur, maria conduntur, cum in caulem exierunt, vim quan-
dam nanciscuntur succo aut lactis sylvestris lactuca similem.


* quia geniturae profluvium cohibet Gal.

Gal. Humidum & frigidum olus, non tamen extremè; siquidem edendo non foret, verum ma-
ximè secundum aquae, ut sic dicam, fontanae frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas accommo-
dum est, & ad parua & leuia erysipelata non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiam edu-
lium sitim arcens.

Plin. subdit: frequentior in cibo usus claritati oculorum officit.

LACTUCA sylvestris. Hisp. Lechuga salvaje.

Diosc. Sylvestris lactuca sativa similis est, amaro gustu est, & viribus aliquantulum paventi similis, vnde
lactem eius succum aliqui in etonio permiscuerunt. Aquam per alium elicit, potus in aceto misso succus ad duos obo-
los.



† Gal. rofe.
† Gal. ca. lem

los. argentea & caliginemque repargat. contra aduersiones efficaciter illinitur, cum lacte mulierum. in summa, femur alicuius doloris leuamentum praestat, menses trahit. contra scorpionum & phalangiorum melle bibitur. Semen non aliter quam satius, libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venereis arcet. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius antea, vt in alijs liquaminibus moris est, insolaturus.

LACTVCAE syl. varietas.

Eadem agro Romano folijs nigris maculis variata vifitur, qualem Coldenbergij nostri ditiffimae hortus alit.

Aeyl. Ad oculorum caliginem. Dicunt aquilam quum in altum volare voluerit, prospicere rerum naturas, lactuca fyluatica folium euellere, & succo eius sibi oculos tingere, & maximam inde claritudinem accipere. Herbæ igitur lactucæ fyluaticæ succum cum vino optimo vetere & melle acapno, quod sine fumo collectum est, mixtum in ampullam vitream condito, & eo vtaris, summam medicinam experietis.

† Alias Ant.
92.

BRASSICA vulgaris satina. Germ. Broel. Angl. Kale & rofe. Gal. Choux verds ou colletz. Hisp. Colhes. Ital. Cauole liscio. Aduers. 91.

Diosc. Brassica satina alio est idonea, si modo leuiter seruesacta edatur. nam percocta aluum sistit, sed multo magis bis cocta, aut qua in lixivio coquitur. stomachum autem male habes. acrior est astina. in Aegypto propter amaritudinem non estur. caculentibus, & tremulu esse prodest. summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. melior stomacho cynia: sed acrior, & ad ciendum urinam validior. ea condita stomacho inimica est. aluum conturbat. Crudus succus cum niuro & uide deuoratus, aluum emollit. cum vino quoque eporus viperarum morsibus auxiliatur. cum feni graeci serma, podagris & articulorum vitis illinitur. prodest & sordidis vlcerebus, & vetustis, illatus. caput purgat naribus insusus, menses extrahit, cum loliaea farina inditus. Folia per sese illius, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, & tumoribusque. epyrctidas, ignem sacrum, leprasque sanant. carbunculos ex sale rumpunt. fluentes capillos retinent. cocta, addito melle, aduersus depascentia vlcera, gangrenasque valent. lienosisque, ex aceto cruda proficiunt. mansa, deuorato succo, retusam vocem instaurant. Decoctum eius potu aluum & menses ciet. Flos post conceptionem in pefso subditus, partum abortu vitiat. Semen eius, praesertim qua in Aegypto nascitur, potum tinea repellit. in antidota theriaca additur. faciei cutem leniginemque expurgat. Virentes cauliculi cum valace cremati, & adipe porci vetusto excepti, diurnos laterum dolores mitigant.

idem Gal.

Gal.

Gal.

idem Plin.

† corrigi. Simeon Sethus. tho. quodam tollitur Plin.

Si modo leuiter seruesacta.] succus eius aliquatenus purgat corpus verò eius ventrem sistit.

Caculentibus] cum Attico melle angulis solum tactis. Plin.

Cibo sumpta.] anteedente in cibus caueri ebrietatem, postea sumpta crapulam discuti. Plin.

† Quia quiddam in se absterforium habet. Gal.

Leprasque] Lepras & pforas cum alumine rotundo ex aceto. Plin.

Lienosis.] ex vino albo per dies 40. sumpta. Plin.

Vocem instaurant.] Simeon Sethus idem. In Aegypto] quanto ea sicciore scilicet et temperata: Gal.

Leniginemque] & quæcunque alia quæ modicam absterforionem postulant, adiuuat. Gal.

Cremati] Caules brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet iam vim adurentem participant: hac ratione ei veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam valenter digerens medicamentum efficitur. Gal.

Capillos retinent.] cum alumine & aceto. Plin. Vocem instaurant.] Simeon Sethus idem. In Aegypto] quanto ea sicciore scilicet et temperata: Gal. Leniginemque] & quæcunque alia quæ modicam absterforionem postulant, adiuuat. Gal. Cremati] Caules brassicæ combusti, cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet iam vim adurentem participant: hac ratione ei veterem adipem commiscentes, ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, adhibent. Nam valenter digerens medicamentum efficitur. Gal.

Brassica efcaletata desiccandi vim habet; tum esa, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem: alioqui & vlcera glutinat & mala vlcera sanat.


Gal. Semen lumbricos interficit. Sanè amare qualitatis particeps semè est, sicut videlicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt.

† Depascentia vlcera, gangrenas.] Plin: etiam carcinomas, quæ nullis alijs medicamentis sanari possunt, foueri prius aqua calida iubet; & bis die tritam imponi. Sic etiam fistulas eluxatas & tumores reuocari, quæque discuti opus sit. Insomnia etiam, & vigilas tollere decoctam, si teipsum edant quamplurimam, ex oleo & sale, cum vino, polenta: si ita sumatur sine pane magis proficiunt.

egol 8. pag. 91. in n. i. i. o. s. o.



Gal. & Plin.



BRASSICA
capitata.
Ital. Cacio
appiccato,
appuzzino.
Austri. St.



Leg. lin. 29.
Kraepelin.

BRASSICA
florida bo-
trytis. Bel.
Blornkes.
Ital. Gal.
Chouffroy.
Ital. Cacio
fiore. Ad-
ucti. St.



turam. Inter reliqua bilem detrahit per vinum nigrum pota. Quin & urinā eius qui brassicam est-
tarit, asseruari iubet; calefactamq; nervis remedio
esse. Auribus quoque ex vino succum brassicæ te-
pidum instillari suadet; idque etiam tarditati au-
dientium prodesse asseuerat; & impetigines eadem
sanari, sine vlcere. Græci* biles detrahere non per-
coctam putant: item aluum soluere; eandemque
bis coctam sistere: vino aduersari, vt inimicam vi-
tibus. Lactis vbertatem cibo facit Hippocrati.
Cōtra singultus cū Coriandro, anetho, melle, pipe-
re & aceto. Illirā quoque prodesse inflamma-
tionibus stomachi. Sugillata verò & alios liuores pu-
raillita. Epicharmus testium & genitalium malis
hanc vtilissimè imponi asserit. Efficacius eadem
cum faba trita. Item conuulsis cum Ruta.
Malum & melancholicum succū procreat Simeo-
ni Setho. Visum hebetat, & somnium per contrariū
insomnia interturbat. Cocta cum pingui carno
plurimum noxæ atque viciij amittit.


*Gal. follices
& asij.

BRASSICÆ fimbriatæ varietates.

Floridæ Brassicæ vice institores & hilitotes Itali
geminam Brassicam ad nos miserunt: quarū prior
foliorum nervo medio tenus laciniatas incisuras
Artemisiæ, Eryngijne campestris, habet.


Alterius verò fimbriatæ magis, laciniōsa minus,
sunt folia. Vtramque alebat sedulus & perbonus
ciuis Antuerpianus Ioānes Douve, aliōs Vogelvang,
stirpium, fruticatos, & arborum per tissimus &
amantissimus.

BRASSICA
trifoliola la-
mifera.
Aduersipa.



BRAS-

BRASSICA
frimbriata.



BRASSICA
frimbriata.
des. Ital. Sc.
tab. Aduerf.
pag. 51.



BRASSICA
Aduerf.
pag. 54.



BRASSICA
Aduerf.
pag. 54.



BRASSICA



BRASSICA fl. DIOSC. *Marina monosperma*. *Advers.* pag. 92.

DIOSC. *Cyma in lictu cocta, sive non infusa. Folia illitu vulnera conglutinant; & inflammationes, moroseque discutunt.* lege Tunc.

APVL. Ad tumores quoscunque. Herbae brassicae sylvaticae folia cum aungia vetere pisata, & comixta quasi maligna induces linteo grosso aut in aluta, & impones; sanabitur. Ad lateris dolore. lege lin. 39. anse. ibidem radice.

Herbam brassicam sylvaticam impones ut supra. Ad podagram. Herbam brassicam conficies ut supra. Quod si vetustissimus dolor fuerit, eo magis efficacior erit salus.

BETA. *Advers.* pag. 93.

DIOSC. *Nigra coquitur cum lenticula, ut ventrem efficacius fistat, multoque magis radice. Candida alio vitis est. Vtraque vero propter nitrosam humorem quem habet, mali succi est. Unde succus earum cum melle naribus inditus caput purgat. Aurium etiam doloribus auxiliatur. Decoctum radicum & foliorum, fistulas & lentes deterget. Perniones foris mitigat. Crudis folijs vitilagine nitro prius perfritos, alopecias prurientes, atque depascentia vicia illini prodest. Eruptionibus papularum igni facto, ambustisque, cocta medetur.*

* leniter coquitur Beta Plin. addito aceto, ut ventrem molliat. validius cocta fluctuationes stomachi & ventris fistit. Ad sistendum videtur melius convenire ex aceto percocta.

* efficacius] ob iunctam adstrictionem aliquam. Gal. * extergendo. Gal. * infusis ijs. Plin. * eadem Plin. Alopecias] cruda illiuntur Plin.

Gal. Nitrosae facultatis est particeps, quia tum extergit, tum digerit, & per nates purgat. Caeterum cocta nitrositate omnem exuit, sitq; facultatis phlegmonis auctrix, leuiter discutientis. Porro ad detergendum digerendumque validior est beta alba: idem aluum ad excretionem stimulat, & nonnunquam stomachum mordicat ijs quibus ille sensilior obtigit. Huius ceu aliorum olerum exigua est alimonia. Iecoris obstruccionibus, quam malua, aptius accommodatur; magis autem ubi cum sinapi * estur aut aceto. Lienosos item similiter manducata, mirificè iuuat. Sinapi nostri hodie cum Zingibere.

Plin. Candida beta cocta, & cum allio crudo sumpta; contra tineas, ciet urinam. medetur dyentericis iniecta, & morbo regio. Dentium dolores sedat illitus succus: & contra serpentium ictus valet; sed radice duntaxat. pernionibus occurrit decocta. Albae succus opiphoras sedat, fronte illita: aluminis pauco admixto, ignem sacrum.

BLITVM. Hi. Bredos, & Bledos. Ital. Biedoni, Blito, & Gelofia. *Advers.* 94.

BETA Sylvestris spontanea marina. Sabuletis maritimis angustiore folio & crassiore sponte oritur sylvestris Beta nigra, gustu salso & nitroso, caeteroquin haud absimilis.

BLITVM.

DIOSC. *Estur oleris modo, alio vitile: nullius in medicina usus.*

Plerique hodie Galli pharmacarij Blita cum Beta clysteribus ex medicorum praecipis miscent.


Plin. Ventrem adeo turbat, ut choleram faciat aliquibus. stomacho inutile. Dicitur aduersus scorpiones potum è vino prodesse; & clavis pedum illini. item lienibus, & temporum dolori ex oleo. Hippocrates menstrua fisti * illo cibo putat.

Gal. Blitum olus est esculentum, humidum, frigidaque temperatura in 2° excessu. Qui porro Attiplicis, Blitumque gustabilem qualitatem intelligit, brassicaeque saporis commemorat, lactucam in Brassica, ac horum olerum medio esse non diffitebitur. Siquidem illa egregie desiccatur: haec contra planè humida aquosaeque sunt. Quapropter non ex solo oleo, garoq; sed addito aceto sapius meliusque assumuntur; auras namque stomacho infesta sunt. Diximus autem eiusmodi olera non nihil ad leuigandam aluum momenti afferre, maxime si cum humiditate glutinosam lubricitatem sortita sint. Alioquin id ipsam perquam exiguum est, quoniam nulla ipsi acris nitrosae adest quantitas, quae aluum ad excretionem irritare possit.

* quemadmodum hodie Amarantho, Bliti specie.



BRASSICA
Sumbriata.



BRASSICA
Sumbriata.
Hort. Bor.
das. Ital. Sic.
var. Adon.
p. 81.



BRASSICA
Adonci.
p. 84.



BRASSICA
Adonci.
Hort. Bor.
das. Ital. Sic.
var. Adon.
p. 84.



BRASSICÆ fl. DIOSC. *Marina monosperma. Aduers. pag. 92.*

DIOSC. *Cyma in lacinia cocta, crum non insuauis. Folia illius vulnera conglutinant; & inflammationes, tumoresque discutiant.* lege Tinnu-
19-179.

APVL. Ad tumores quoscunque. Herbae brassicæ syluaticæ folia cum axungia vetere pisata, & cõmixta quasi malagna induces linteolo grosso aut in aluta, & impones; sanabitur. Ad lateris dolorum. Herbam brassicam syluaticam impones vt supra. Ad podagram. Herbam brassicam con- lege lin. 39.
aut ibidem
iudee.

BETA. *Aduers. pag. 93.*

DIOSC. *Nigra coquitur cum lenticula, vt ventrem efficacius sistat; multoque magis radix. Candida aluo vtilis est. Vtraque verò propter nitrosam humorem quem habet, mali succi est. Vnde succus eorum cum melle naribus induratis caput purgat. Asarium etiam doloribus auxiliatur. Decoctum radicum & foliorum, surculos & lentes deterget. Perniones solum mitigat. Cruda folijs vtiligines nitro prius perfrictos, alopecias prurientes; atque depascentia vlcera illius prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro, ambustisque, cocta medetur.*

* leniter coquitur Beta Plin. addito aceto, vt ventrem molliat. validius cocta fluctuationes stomachi & ventris sistit. Ad sistendum videtur melius conuenire ex aceto percocta.

* efficacius] ob iunctam adstrictionem aliquam. Gal. * extergendo. Gal. * infusis ijs. Plin. * eadem Plin. Alopecias] cruda illinuntur Plin.

Gal. Nitrosæ facultatis est particeps, quia tum extergit, tum digerit, & per nates purgat. Ceterum cocta nitrositate omnè exiit, fitque facultatis phlegmonis aduersæ, leuiter discutientis. Porro ad detergendum digerendumque validior est beta alba: idè aluum ad excretionem stimulat, & nonnunquam stomachum mordicat ijs quibus ille sensilior obigit. Huius ceu aliorum olerum exigua est alimonia. Iecoris obstructionibus, quàm malua, aptius accommodatur; magis autem vbi cum sinapi * estur Sinapi nostri hodie cum
Zingibere.

Plin. Candida beta cocta, & cum allio crudo sumpta; contra tincas. ciet vrinam. medetur dyentericis iniecta, & morbo regio. Dentium dolores sedat illius succus: & contra serpentium ictus valet; sed radice duntaxat, pernionibus occurrit decocta. Albæ succus epiphoras sedat, fronte illita: aluminis paucò admixto, ignem sacrum.

BLITVM. *Hi. Bredos, & Bledos.**Ital. Biedoni, Blito, & Gelosia.**Aduers. 94.*BETA *Syluestris spontanea marina.*

Sabuletis maritimis angustiore folio & crassiore sponte oritur syluestris Beta nigra, gustu salso & nitroso, ceteroquin haud absimilis.

BLITVM.


DIOSC. *Estur oleris modo, aluo vtile: nullius in medicina vsus.*

Plerique hodie Galli pharmacarij Blita cum Beta clysteribus ex medicorum præceptis miscent.

Plin. Ventrem adè turbat, vt choleram faciat aliquibus. Stomacho inutile. Dicitur aduersus scorpiones potum è vino prodesse; & clavis pedum illini. item lienibus, & temporum dolori ex oleo. Hippocrates menstrua sisti * illo cibo putat.

Gal. Blitum olus est esculentum, humidæ, frigidaque temperaturæ in 2° excessu. Qui porro Atroplicis, Bliti que gustabilem qualitatem intelligit, brassicæ que saporis commemorat, lactucam in Brassicæ, ac horum olerum medio esse non diffinitur. Siquidem illa egregiè desiccatur: hæc contra planè humida aquosaque sunt. Quapropter non ex solo oleo, garo que, sed addito aceto sapius meliusque assumuntur; alias namque stomacho infesta sunt. Diximus autem eiusmodi olera nonnihil ad leuigandam aluum momenti afferre, maxime si cum humiditate glutinosam lubricitatem sortita sint. Alioquin id ipsum perquam exiguum est, quoniam nulla ipsi actis nitrosæ adest qualitas, quæ aluum ad excretionem irritare possit.

* quemadmodum hodieci Amarantho, Bliti specie.



AMARANTHVS. Ad-
uerf. 95. per-
perā Circa
Trago.
Phlox sine
flamma
Theoph. An-
guil.

Amazāhi re-
fugerant, ad-
stringunt, &
siccant.

lege fermen-
tum,
idem, im-
mō rariſſima.



AMARANTHVS
trago.
guil.
simpli-
cā pan-
cula.



AMARANTHVS maior
floribus pan-
niculosis. spi-
catis. Rarum
maius Matt.
Aduerf. 95.



AMARANTHVS holo-
fericeis, lan-
guineis, reci-
colaris flori-
bus, hilario-
re stipula.
Aduerf. 95.



AMARANTHVS angustifolius simpliciflorus paniculata paniculata.

Ab imo summo tenus singulis spicatis floribus coccineis saturè puniceis luxuriat. cuncta reliqua non dissimilia, sed folia angustiora, exiliora. Hic primùm nobis indicatus & communicatus ab illustrissimo & nobilissimo viro Duce Arenscotio.

AMARANTHVS Tricolor. Celosia Tragi.
Aduers. pag. 95.



ATRIPLEX sativa. Ital. etiam Reppice, & Hist. Armuelles. Aduers. pag. 96.
*Chrysolachanon, siue olus aureum. **



* *Diosc.* Estur eletum modo electum, aluum molle: crudum vel coctum illitum puros discit. Semen eius potum cum aqua malsa morbum regium sanat.

[*idorvam regium.*] Semen eius abstergentis est facultatis; proinde ad morbum regium ex fecoris obstructione ortum utilis est Plinio & Galenò.

Gal. Frigida 1° ordine, humida 2°. Celeriter ob lubricitatem ventrem permeat: parum autem omnino eius est, quod digerendi obtinet facultatem. Phlegmonis & phlygeris quidem incipientibus, crescentibus, & mollibus adhuc, ac veluti feruentibus, hortenſis; videntibus verò, declinantibus & indurſcentibus commodior est sylueſtris.

PLIN. subdit: Coquitur difficile. Stomacho aduersatur, lentigines & papulas gignit. vulvarum vitis infunditur cum beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas bibendum dedit. Utiliter illanitur podagricis. Ungues scabros detrahare dicitur sine ulcere. Sunt qui dent semen, arterias & tonsillas nitro addito perficent, aluum moneant, cocto aut per se, aut cum malua aut leaticula concitant vomitiones.

* *Vomitiones.*] semen drachmarum pondere vel trium vomitiones molitur. Scrap.

Sylueſtri capillos tingunt, & ad supradicta vtuntur medicina.

PES ANSERINVS, Atriplex sylueſt.

Pedem Anserinum vicem solani hortensis supplere ait Fuchs. *Aduers. pag. 97.*

ATRIPLEX
syl. vulgarior
sinuata. Ad-
mont. 97.



lege atriplex.

ATRIPLEX
sylvatica
Tet. Arab.
R. K. 1800
Atriplex
Mont. 97.



ATRIPLEX
marina re-
pens. Ad-
mont. 97.



ATRIPLEX
marina repens
Tet. Arab.
R. K. 1800
Atriplex
Mont. 97.



TOYA
BONA
Spinaciae fa-
cc. Scaerli.
pag. 97.



ATRITIEZ
yl. Polygo-
ni aut Hel-
xine foliis.
Aduerf. pag.
98.



POLYSPORON Cassani Bassi Anguillare.

A feminis florisque muscosi botrydi no dissimili fetura, quibus onasti numerosi cauliculi, polyspermon vocata videtur. sed cauliculi sesquicubitales, exiliiores & numerosiores: imis foliis Solani, aut Atriplicis syl. summis minoribus multo & delicatioribus. Hac mirè capiuntur pisces, auctore Cassano Baso, cui subscripsit Anguillara experimento nixus. Radix alba gracilis.

ATRIPLEX Halimoides.

Æstiva est, caules edens ternum & quaternum cubitorum; & folia Halimi: flores & semina racemosa cæterarum more. Mihi primùm visa in viridario Ioannis Mutoni Neruiensis pharmacopœi peritissimi. Semitas & rudera amat.

TOTABONA, spinacia facie. Aduers. pag. 97. Runciis tertium genus Euchs. & Turneri secundum. Belg. Aammekens cozen, & goede Heyndrick.

HELXINE sive Parietaria. Aduers. pag. 98.

DIOSCOR. Folia refrigerandi spissandiq, naturam habent, qua ex causa sanant illitu sacros ignes, adusta, condylomata, panos incipientes, tumores, inflammationesq. Succus eius cum cerussa, ignibus sacris, & vlcibus qua serpunt, commodè illinitur, imponiturq, podagris cum hircino adipe, aut cerato cyprino. veterem tussim emendat in sciatibi haustus, confillis inflammationem sentientibus vitulæ & gargarizatur, & oblitur. aurium dolorem cum rosaceo instillatus lenat.

* Gal. Vis ei inest abstergendi, & leniter constringendi, cum humiditate subfrigida.

† Gal. & Plin. In initio & augmento vsque ad flatum. Idem Plin.

‡ Gutturâ incipientia turgescere Plin.

Gal. subdit: Incipientibus etiam phygetis cataplasmatis ritu illinitur. Succus quoque eius ad dolores phlegmonosos mediocriter profuerit. Gargarizandum. item nonnulli exhibent ad paristhmia. Aliqui etiam medicorum his qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerunt. Euidens certè extergendi experimentum præbet in vasis vitreis.

Exterit alopecias & impetigines Aëtio, priuatim assiduè illita. Sedis hæmorrhoidas aperit: fistulis medetur, & sinus cohibet trita, cum modico sale apposita.

Hæmorrhoidas conficatas, extergendo aperit. Clystere, decocto & stillatitia epota urinas ciencalculos terit & peilit.

APVL. Ad podagram. Herba perdicæ coquitur in aqua, & ex eadem aqua fovebis pedes vel genua, deinde ipsam herbam usam cum axungia impones pedibus panno inductam, vel super genua, sanabit mirè.

PHYLLON sive sœ Arrhenogonon, & Theligionon femina. Aduers. pag. 99.

DIOSC. Arrhenogonon potu, masculi sœnis sacre partus, vs theligionon femineæ præstat. Historia Cæteras confiam cor arbor est: sed huiusmodi historiæ, mihi produxisse visum est.

In parte Theophr. 100 l. 1. c. 2. confiam cor sedent. Theophr. 100 l. 1. c. 2. sem hant.



MERCVRIALIS mas. *Advers. pag. 100.*
Hisp. Mercurial.



MERCVRIALIS femina.



Dioscor. *Vtraque in oleribus manditur: ad alium ciendam*, colla in aqua epoto iure, bilem aquamq, de-* * Idem Gal.
uabit. Constat vt mares gignantur hunc facere: vt femina, illam, si à purgatione bibantur, & trita folia genit a libus
admoventur.

Mares & femina gignantur] Hoc contingere si à conceptu succus protinus bibatur in passo, edantur- Plin.
ue folia decocta ex oleo & sale, vel cruda ex aceto. Decoctum dari iubent & herbam ipsam in cibo, al-
tero die purgationis mulieribus per triduum; quarto die à balneo coire eas. Hipp. miris laudibus in mu-
lierum vsu prædicauit illas. Easque ad hunc modum adhuc medicorum nemo nouit. Ille eas vultæ
cum melle vel rosaceo, vel irino vel lirino admouit. Item ad ciendos menses, secundasque; hoc idem
prestare potu fortique dixit. Instillauit auribus surdis succum, inunxitque cum vino vetere. Alio folia
imposuit; epiphoris, stranguriæ & vesicæ. Decoctum eius dedit cum Myrrha & thure. Alio quidem
soluendæ vel in febli, decoquitur quantum manus capiat in duobus sextariis aque ad dimidias. Bibitur
sale & melle admisto; nec non cum vngula suis, aut gallinæ decoctum salubrius. Purgationis causa
putare aliqui vtramque dandam, siue cum malua decoctum. Thoracem purgant, bilem detrahunt,
sed stomachum ledunt.

Gal. Digerentis admodum facultatis in cataplasmate quisque esse experietur.

APVL. Ad ventris duritiam. Herbam mercurialem coques, & tritam ex passo dabis, statim detrahet,
& stomachum purgabit. Aut semen eius tritum ex passo dato: idem detrahet & purgabit.

Ad menstrua cienda. Herba mercurialis cum oleo irino vel rosaceo admodum, mox prouocat san-
guinem menstruum. Ad epiphoras oculorum. Herba mercurialis folia cum vino albo vetere im-
pone. Si aqua in aures introierit: herba mercurialis succum tepefactum in aures stillabis, mox li-
berabis eam.

R. C. CHYOCRAMPE

CYNOCRAME. *Advers. pag. 100.*
Gal. Chou de chien, & Mercuriale sauvage.
Germ. Wildt bingskraut, & gundskol. Belg.
Wilde Mercurial, & Bingskraut. Angli.
Wild Mercurp. Hisp. Verca perruna. Ital.
Mercorella bastarda.



HELIOTROPIVM *maius. Advers. pag. 101.*
Barbar. herba cancri. Angli. Decipiens tapia.
Ital. Heliotropio.



DIOSCOR. *Folia cum caulibus epota aluum ciens: oleribus commendantur. Ius decocti & picuitari & bilium,*
aquamq; detrahit.

HELIOTROPIVM.


DIOSCOR. *Decoctum herbae ex aqua, fasciculo manus plena, potu picuitari biliumq; per aluum extrahit: con-*
tra scorpionum ictus ex vino potum, & illucum prodest. ad alligatur ad conceptus arcendos. Alium per hunc vna
ante accessiones, semina gram. quatuor cum vino quartanas fiant: tria vero certanas. Illucum semper formicari-
tes verrucas pensil. sc. & thymos, & spinthidas ericcat. Folia, infantum de stillationibus, quas serajis vocant, poda-
gra, luxatioq; vilissimè illuminatur. menses sicut, partus trita & imposita pellunt.

Aegin. eadē.
Lege foliis
cygni. & li. 23.
pau. tosi sero-
bides.



HELIOTROPIVM parvum Diosc. *Heliotropium minus* Clusij. *Triccon* Plin. *Aduers.* pag. 101.

SOLANVM hortense. *Aduers.* pag. 101. *Cubebalum* Plin. *Dod.* *Hisp.* Morella, & yerua mora.



DIOSCOR. *Herba cum suo semine pota, adiecto nitro, byssopo, nasturtio, & aqua, letas tinctas toretq; excusat. Pensiles verrucas, qua acrochordones vocantur, cum sale illita tollit. Scorpionides herbula est, foliis paucis, seminis cauda scorpionis effigie. Illita scorpionum ictibus praesentaneo est auxilio. Ad caneros depascentes efficacissimum.*

SOLANVM hortense.

DIOSCOR. *Natura ei refrigerandi, quare folia viceribus qua serpunt, & ignibus sacris, conuulsiuenter eque pollui potenta illinuntur, agilopa, capitisq; dolores trita & imposita per se sanant. astuanti stomacho auxiliari et, peroridas, cum sale detrita, illitu discutunt. Valer succus eius aduersus ignem sacrum, atque plera qua serpunt, cum cerussa, rosaceo & argenti spuma: ad agilopas, cum pane, infantium adustioni, quare strigilia vocant, cum rosaceo persusos proficit, in collyris, aqua vel oui vicem exhibet, contra acutas functiones illius, aurium dolori instillatus prodest. Idem sium abundantiam silit, in vellere subditus, succus fuluo gallinarum corticum sine subactus, & limbo appositus, agilopie praesentaneo est remedio.*


Ribitur stillatitia ad febris ardores.

Refrigerat & adstringit Gal^o. 2^o. ordine: medium autem absolute in humectando & exiccando.



Solanum hirsutissimum. Advers. pag. 102.
Solanum vesicarium, quoniam vesicae & calculis
 prodest Plin. Hist. Acarreador de fueño,
 Vexiga de perro.

Solanum somniferum. Advers. pag. 103.
 an *Soporiferum* Plin. Hist. yerba mora mayor
 y acarreadora de fueño.



DIOSCOR. *Vim usumq; bortenfis Solani habet, verum cibi nequaquam expeditur.** Regiam morbum pro-
 gat, semine potu; & urinam pellit. Ex utraque herba succus extrahitur, qui siccat in vitra; reconditur, ad eadem
 valens.

* Quisicur & viscera obstructione liberat. Gal. eadem.

SOMNIFERUM Solanum.

DIOSCOR. Radicis cortex, in vino drachmae pondere potus, somnificam vim habet, opio mitterem. Semen
 vehementer urinam cit. Corymbi duodecim, hydropicis dantur: si quid numero adiciatur, alienationem mentis facit.
 Remedio est aqua copiosa malsa, potui data. Succus pastillis inseritur, & medicamentis qua dolentis leuamentum pra-
 bent: decoctum in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus atrocissimis, radicis succus, cum utroque illius, ventris hie-
 betudines tollit.

Tertij ordinis est refrigerantium Galeno. Si quatuor eius drachmae sumantur, mortem inferunt: si
 pauciores, insaniam. Vna si foris corpori illinatur, vlcera maligna & deyrasentia curat, sed ad talia indi-
 cis cortex optimus est.

Plin. Etiam opio velocius ad mortem. Praesentaneum remedium etiam ad dentes mobiles firmos-
 dos, si collinerentur: huic tamen exceptionem addidit, ne diutius id ferret: delirationem enim gignit
 eo. Radix trita ex oleo percussis auxiliatur.

Fastid. Gal.
 & Plin.

SOLANVM menium Diosc. *Erucaefolium: an Christophoriana Herbariorum?*

Dioscor. Radix drachma unus pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginesq; non iniucundas, obscur. Idem Plin. ser. sed duplicata hic motus, ad tres vsque dies mentis alienationem affert: quadruplicata, interimit. Remedio est quia multa copiosius pota, & vomitione reiecta.

Radix cortex refrigerat 2°. ordine incipiente. Gal.

SOLANVM Somniferum Clusij foliis Hyoscyami lutei.
Somniferum Verticillatum Matth. Hisp. Yerua
mora que acarrea locura.

SOLANVM Pomiferum herbariorum.
Piper de Guinee vulgo, quatuor minime vrat.



In solo semine in Belgij hortis, egregij viri & generosi D. Brancionis, & Coldenbergij, folio, facie, & caule Hyoscyami lutei solanum videri me memini. sed flosculi luteoli summo caule bicubitali, alabastricula poculaue exprimentes, brevioribus petiolis, inherentes. Semen rubrum, solano hortensi par in pericarpio quadamtenus Cucubali recentiorum ritu.

Malacæ in raderibus sponte oritur Clusio auctore.

SOLANVM Pomiferum herbariorum.

Nec hinc dissimile, sed fructu siue pomo phœniceo, iucundissimo spectaculo, Glaucio pictato, siue amaris pomo dicto serè parifolio Hyoscyami lutei, solani maiori, flosculis item solani hortensis. Pliniano semine iacobo Platea Neruenti stirpium audissimo & perito primùm creuit penultima ætate. Deinde in cultissimo horto C. viri D. Joannis de Limoges, alias Nonnio, ætibus est planta, vti hortense Solanum.



STRAMONIUM per-
grinum. Ad-
vers. pa. 103.
Lycoperdion
Gal. *happu-*
zavatas
Dodon.
Hyoscyamus Peru-
nicus Cordi.
Nux Me-
tel. Matth.
Et Italorum.
Ger. *Stroh-*
offel. *Welsch-*
Doyle appel.
Ital. *Paraco-*
culi.

Vis *Stro-*
nia.



Stramonium
pergrinum
Advers. pa. 103.
Lycoperdion
Gal. *happu-*
zavatas
Dodon.
Hyoscyamus Peru-
nicus Cordi.
Nux Me-
tel. Matth.
Et Italorum.
Ger. *Stroh-*
offel. *Welsch-*
Doyle appel.
Ital. *Paraco-*
culi.

Legenda
117. 200

AN CACUBA-
LUM Plinij?
Advers. pag.
104.
Cyclaminos
altera Luca
Chini.
Alfine repes
C. Clusij.



1004.
1005.
1006.
Cyclaminos
altera Luca
Chini.
Alfine repes
C. Clusij.



Drosop.


CIRCEA Monspel.

Diosc. Radix odorata, exsiccata. Nascent in apricis, saxis, & vento perflatis. Radicis rufa pondo quatuor, in sextarijs tribus vini dulcis, per diem & nocte in macerantur, postquam triduo vulnus exstergans. Semen in sorbitionibus datum, lacte in mamma nutritum explet.

Præcipitatis & ruptis etiam muliercularum experimentis, medetur.
Floribus albis nonnusquam in Anglia variat.

SOLANVM tetraphyllum, sine Herba Paris. Aconit.
Pardalianches putatum Fuchs. Angl. Onebertie.
id est, unico acino. Solanum Monococcon Gesf.
Aconitum Monococcon Cordi; ædè non
Atticus Tragi. Advers. 105.

CIRCEA Luteiana.




Circeâ Luteiani dixerunt plantam, Solani, Perficariæ aut smilacis foliis, in cubitali gracili, nitido colore, Xerampelino cauliculo; & flosculo racemoso, concolori albido, Atroplicis. Angliæ, Francia & quibusdam Belgij hortis spontanea.



MANDRAGORA *verque. Angl. etiam Mandrago. Hisp. Mandragula & mandracola. Ital. Mandragola. Aduers. pag. 106.*

MELANGENA, *vel Mala insana. Hisp. Veranagenas. Ital. Melongena & Pettranciani. Melongena Auerbois & Auitenna. an Mandragoras. Theoph: Aduers. pag. 107.*



FRUCTUS FOEMINE

FRUCTUS MARI

Diosc. Mandragoram, aliqui Antimelum, alij Circaea vocant, quoniam videatur radix ad amatoria conducere, pomorum cibo, aliquantum opiliones soporantur. Succus fit e cortice recentis radiceis iusto, & praelo subiecto: qui insolatus ubi concreuerit, stillis reconditur. Malis quoque succus depromitur sed aliquanto ignauior. Deliratur radix, & traiectus lino cortex; ad usum suspenditur. Aliqui radices in vivo ad tertias coquant, & defecatum ins seruant. cyathoque vno vtuntur in perurgijs, & doloribus, & ante sectiones visionisque, ne sentiantur. Succus duobus obolis ex mulso potus, vt veratrum, per vomitiones bilem atram, pituitamque extrahit. verum potu largiore, vita admittitur. medicamentis ocularibus, & his qua dolores fruant, pefus quoque emollientibus, admiscetur. semiboli pondere inditus, per se menser & partus expellit. subditus sedi pro balneo, somnificus est. Radix ebur emolliro fertur, qua senis horis cum eo decocta sit: & ad accipiendam, quam effingere optaueris formam, ipsum facile prestat. Folia recentia conuenienter ocularum inflammationibus, & collectionibus, quas vlcera citant, cum poienta illuminant, duricias omnes, & suppuraciones, strumas, & tubercula discutiant. Stigmat a sine exulceratione delent, si quinque senis diebus, sensim perfricentur, folia seruantur in murijs, eosdem ad vsus. Trita radix ignibus sacris ex auro, & serpentium istibus ex melle aut oleo, medetur. strumas atque tubercula, cum aqua dissipat. articulorum curiagum, cum potentia sedat. Fie citra coctionem vinum e cortice radice, ad hunc modum: Ternamino in vini dulcis metretam, coniunguntur. Dantur ex eo ternis cyathis, quis setari aut ambari debent, vt ante dictum est, siquidem nullo tunc afficiuntur dolore: sed vterno quodam preffi, torpescunt. Mala soporem afferunt olfactu, & etiam suauiantur. item expressus ex eis succus, nimio tamen odore percussus, obmutescunt. Semen malorum potum vltimas purgat. appositumque cum sulphure ignem non experto, rubra foeminarum profluuiis silitu. Scarificat a punctisque mulisariam aperit a radice, erumpens lacryma, cano v. sa recipitur. liquamentum autem succo lacteo praestantius est, sed non vbiq; vt experientia docet, radices lacteam succum dela brynant.

Gal. Tertij ordinis refrigerantium: veruntamen & cuiusdam caliditatis particeps est; & in pomis humiditatis: proinde soporem conciliandi vim ea habet. Radicis cortex cum sit valentissimus, no tantum refrigerat, sed & dulcicat: reliquam quod intus est, imbecillum existit.

MANDRAGORA Merion.

Diosc. Alium tradunt esse Mandragoram, nomine Merion, in specia iuxta specus enatum: folijs albi v. r. dr. gora, minoribus, albis, dodrantalibus, radicem ambientibus: qua mollis est & candida, paulo maior palmo, pedis longaque crassitudine aequat. Tradunt eam in parte, ossa obsonibus, drachmas pondere & uocant. usum rationis hinc capere. Ob dormisus enim homo eo serè quo comederit habitus, sensus impositus, ternis ansternis, in quo data est. Ita eodici vtuntur, cum scindendis, vtendisque necessitas adesi. Antiquorum esse voluit radicem, cu in anico iuliano potera

¶ Etiamque
l'plenis Ron-
del cum fri-
gida & Coca
fit, calidissimi-
fecur & ma-
lactiois vt
spica, asarū,
crocus, vitex
& lacrymaz.


lege lin-
zanej.

Edem C
& Pua.

Eade

Hyoscyamus niger. Angl. Dumbarn. Hisp.
Velienno & Meimendro. Aduers. pag. 107.

Hyoscyamus albus.
Aduers. pag. 107.



Diosc. Ambo insaniam gignunt, & soporem: ideo in communi usu damnantur. tertium genus, ut quod mitissimum esset, medici receperunt, pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisque, in maritimis rudibusque nascens. cuius occasio si non adsit, rursus usurpari oportet. niger, ut deterrimus, improbat. Recenti semine, caulibus foliisque tussis succus in sole exprimitur, & exiccato humore, vsus ad annum vsque prorogatur. nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso, & expresso. liquamentum autem succo lacteo praesentius est, & magis dolores sanat. Contusa herba recens, addita trimestri farina, digeritur in pastillos, & reconditur. Liquamentum primum, & quod a sicco semine exemptum est, collyriis qua doloris sensum auferunt, commodissime inferri solent. contra acutas calidasque fluxiones, dolores aurium, † atque vulua mala, profunt. cum farina autem aut polenta, oculorum, pedum, ceterarumque partium inflammationes placant. Semen eadem prabet. tussi, desillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus, efficac. contra mensuram abundantiam, & erumpentem abundantiam sanguinem, oboli pondere cum papaueris semine & aqua mulsis, bibitur. podagris subuenit. testibus inflatis, mammis que tumensibus a p. n. tritu ex vino illuntur. alijs quoque cataplasmatis, qua doloris leuamentum praestant, admisceri solent. Folia omnibus medicamentis dolores sedantibus, per sese, & ex polenta, vtilissime imponuntur. recentia, ad mitigandos omnes generis dolores, oblinuntur. cum vino ternis, quaternisve pota, sanant algidas febres, quas epialos vocant. colla olerum modo solia, si acerbis mensura mandantur, medicorem insaniam gignunt. eadem efficere ut aqua: si colo vlcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta dentes in dolore colluantur.

† Oleum ex semine auribus infusum tentat mentem, Plin.

Albus tertij ordinis refrigerantium: reliqua duo venenata.

A p. v. l. Eius succus similis est Meconi herbae. Herbae succus tepescens cum oleo rosaceo & in aurem instillatus, aurium dolorem mirifice tollit & si vermes fuerint, necat eos. Herba symphoniacae cum stercore ouillo & modico aceto, factum quasi malagma, imposita tumorem omnem tollit. Ad inguinum dolorem: eiusdem radix alligata pedum dolorem tollit, & tusa omnis cum sua radice & super pedes imposita mirifice tumorem tollit, & dolorem pedum auferit. Herbae symphoniacae succum da bibere, cum summa admiratione iocinoris & pulmonis dolores sanabit. Ad malitiosum pectinis dolorem. Herbae symphoniacae succum mixtum cum croco dabis in potionem, & miraberis effectum. Ad vulnera, chironia & araneorum morsum. Herbam apollinatam cum axungia veteri sine sale libra vnaretes, & vinum vetus cyatho vno, sine fumo simul commisces, & facies quasi malagma, & vulnere impones, sanabitur mirifice.



Oleum Hyoscyami circulatorum.

Liquamenti genus è nigro hyoscyano, quod oleum vocant, agyrta audaculi, versutiorisue impostores vult pant; eludenda plebeculæ, doloribus sedandis accommodum, stupefaciendoque longè optimum, presentissimisque viribus. quod quia celant, hic monere libuit. Tasam Hyoscyami vniuersam plantam Iulio & Augusto mensibus (* superstitiosè inter duas Diæ virginis ferias) fictili vasi inditam, cui subtus foraminula, & aliud vas excipiendo liquamento aptum, iniunt; circumlinitis operculo & furaculis inhumant. Patrescere sinunt, vsque dum subtus liquor extillarit; quem vsibus medicis recondunt.

* quia preparandum, quando herba est in suo vigore.

Molis etiam effractum semen, pressu oleum reddit, dentum aliosque quoslibet dolores mulcens.

Dubius HYOSCYAMVS luteolus solanifolius.

HYOSCYAMVS niger Matth. & quartus.

Ital. Iusquiamo nuouo. Aduers. pag. 107.

Potius calfacit quam refrigerat, vt minus rectè Matthioli scripsit.

POMA AMORIS, an Glaucium Diosc.?

Aduers. pag. 108.

Lycopersicum quorundam.



GLAUCIUM.

Varietas. { Surrectis cubitalibus cauliculis Hispano semine in hortis nostris variat. omnia non dissimilia, sed minora multo.

Diosc. Folia in olla siccili semirigidis cibariis calfaciunt indigena, vsque dum flaccescant; deinde contritis succum exprimunt. Cuius est vsus ad oculorum medicamina, vt pots enim inter initia refrigeret.

Gal. Adstringit cum quodam fastidio: tum adeo manifestè refrigerat, vt solum sepe crispelata, vti que si valentia non fuerit, curare possit. Mistura eius composita est ex aqua terreaque substantia: vtraque sanè frigida: verum non summe; sed ceu aqua fontana.


PAPAVER
 corniculatū.
 Hifo. Dor-
 gistera. Ital.
 papavero
 cornuto.
 Aduers. 109



PAPAVER *cornutum* flore phæniceo. Aduers. pag. 109.
 quod floris colore rubro in Belgicis hortis variat.



PAPAVER
 Corniculatū
 vulgare
 Ital. perpa-
 uero. Cor-
 culatū Aus-
 tro. Nar-
 bonensis
 in Ital.
 quod floris
 minus tene-
 rissimis in
 Aduers. pag.
 111.



PAPAVER *corniculatum* n.

Diosc. Radici ea vis inest, ut in aqua decocta
 ad dimidias, coxendicium & iocineyis affectus, potus
 sanet †. prodest his qui crassa quadam, aspera, aut araneolis
 cum lotio reddunt. Alium leniter purgat semen, acetabulo
 in aqua malsa potu. Crustas* emarginant, Mita ex oleo so-
 lia: floresq; argema ac mudeculas in uentrem, per mē-
 absterguat. Sunt qui Gl utrum hor papaueris genere sa-
 litari existimant, falsi quaedam foliorum cognatione.

† Gal. Ob vim incidendi & abstergendi.


Gal. Folia & flores foetida admodum & mali-
 gna vlcera iuuant. Sed ab his abstinere oportet,
 vlceribus iam expurgatis: adeo enim abstergere
 valent, ut & pura quoque carnis non nihil eliquēt.

* Hoc vitium robore non sordem duntaxat, sed
 & crustam vlceribus detrahūt.

PAPAVER sativum.
Advers. pag. 110.

PAPAVER album & nigrum polyanthum sive
multiflorum.

Popaver ni-
grum a me
satum alb im
etiam sicut
Ipsi & me: a
morj. hosi.



Diosc. E sativi papaveris genere, quod hortense est, semen in panem densatur, qui sanis in usu sit. eo etiam ex melle pro sesama utuntur, thylacium vocant. capitulum habet longum, & semen candidum. Sylvestre vero, caput infidens demissumq; & nigrum semen; quod pituitis nominatur. nonnullis tamen & ipsum rheas dicitur, quoniam eius scapo lacteus succus emanat. Tertium magis sylvestre, & ad medicinas valentius, multo his longius, productiore capitulo. Omnium in commune natura refrigeratrix. quare si capita ipsa & folia decoquantur in aqua, somnum fore conciliabit. bibitur decoctum contra vigilias. Calyces cum polenta triti, & cataplasmati admisti, ignibus sacris, & inflammationibus prosunt. mundantur quoque virides, & digeruntur in passillos, qui siccati ad usum reconduntur. Capita quoque per se in aqua coquantur ad dimidias, iterumque adiecto melle, dum humor coeas in eleganti lenorem, id medicamentum in rursu arteria fluxionibus, & caeterorum affectu, doloris lenamentum praeber. Efficacius tamen redditur, addito hypocistidis succo & acacia. Papaveris nigri semen tritum cum vino bibitur, contra citam aluum, & semina arum profusiva. In periculis frontis temporibusque illinitur, ex aqua.

PAPAVER album & nigrum pleno flore.

Et ille duplo maior, niveo candore nitens, & tanto pulchrior flos, quem horri Belgij in delitijs habent ad coronamenta: non sanè alius generis à simbriato albo aut nigro sativis; nisi florum incisura & lacinijs profundis, saturam perelegantem sortitur; quae multipla serie maiores & confertiores, rosarum dehiscensium amula gratia, visum oblectantes, ipsis valde hortensis pares floribus cernuntur. Color tenidet albus; aut coccineus, sanguineus, aut niveo candore & rubore confusus: interdum ora cristata ex albo purpurascunt. Seminibus me donavit maximè & optimè spei non mindis peritus quàm nobilis Carolus de Croÿ princeps de Chimay, studiosissimus & summus stirpium admirator.

ORIVAS

OPIUM, & Meconium. Advers. pag. 111.

Diosc. Opium eius, magis refrigerat, inspissat, siccatque sumptum crui magnitudine, dolorem finit, concoquit, & somnum allicit. tussis atque coliacorum valetudini auxiliatur. verum si copiosus hauriatur, nocet, cum letargicos efficiens interimat. ad dolores capitis, cum rosaceo persusum efficax est. aurium dolori, cum amygdalino, myrrha, & croco instillatur. inflammationibus oculorum cum torrefacto oui luteo proficit: igni sacro & vulneribus, cum aceto, podagræ, cum lacte mulieris & croco. Somnum accersit, subditum sedi pro balano. Opimum habetur grave, & densum, gustu amarum, odoratu soporiferum, quod facile aqua diluitur. locus candidum, neque asperum, neque grumosum, quod inter colandum non ut cera coeat, & in sole diffundatur. dein admotum lucernis, non atra luceat flamma, extinctum denique, odoris vim conseruet. Sed opion glaucio, gummi, aut sylvestris lactuca succo, adulterant. Verum glaucio fucatum, in dilutione croci colorem reddit: lactuceo succo fictum, exiliter spirat, & asperius spectatur: gummi vitiatum, splendet, & infirmum est. Nec desunt qui eò dementia deueniant, ut adipem ei admiscerent. Fictili nouo torretur ad oculorum medicamenta, dum mollius, atque rufius appareat. Diagoras, ut Erasistratus auctor est, usum eius damnauit, oculorum lippitudinibus & aurium vitis infundere vedans, quoniam visus aciem debetaret, & soporem gigneret. Addidit Andreas, illis eo protinus excacari, si non adulteraretur. Mnesidemus usum duntaxat ostendendi probauit, quoniam ad conciliandum somnum conueniret, alioqui nobis ut noxio interdicit. Quæ conuenientia esse, experimento deprehenduntur. siquidem effectus, virium huiusce medicamenti, fidem faciunt. quare non alienum fuerit scriptis mandare, quoniam modo is excipiat succus.

MECONIUM.

Aliqui capita ipsa & folia tundunt, & pralo exprimunt, terentisque in mortario, digerunt in pastillos. id meconium vocatur, multum opio ignauum. Porro opij faciendi ratio hæc est: Cum ros in eo exaruerit, cultro decussatim in stellas, ne penitus adigatur, ex obliquo in rectum summam cutem incidere oportet, lachrymam exeuntem, digito in concham abstergere: nec multo post redire, ut concreta inueniatur etenim: quæ tum, aut postero die etiam offenditur, in vetera pila teri debet, & in pastillos cogi. Cum tamen inciditur, retrocedendum est, ne vestibis succus decedatur.

PAPAVER Rbæu. Hisp. Amapolas, Roseila, papolas. Ital. Papauero saluatico rosso.

Advers. pag. 111.



Rhæadas flore albo Carolus de Houchin D. de Longastre stirpiū auidissimus & doctissimus indagator in Gallobelgio reperit. etiamq; multiplicatis floribus in agro Brabantico secus Lietam collegit illustris vir D. Ioannes vander Dill.

Diosc. Hinc capita quinq; aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mensura ex aqua mulsâ pota, alium leniter emolliunt. ad idem præstandum mellis placetulis, & dulciarius hinc admiscerentur. Folia cum calycibus illita, inflammatione sanant: eorundem sotu & persusione, somnus allicitur.

Gal. Validius sentem refrigerat, ita ut nequaquam eo quis innoxie solo uti possit, sicut sanuo siue domestico melli admiscens. Admodum verò si ita sumptum sit, somnum conciliat.

Non modò incrassandi vim obtinet, & irruentis humoris insultum inflammationis sue cõpescit; sed etiam quadam partium tenuitate & digerente facultate pollet, non secus ac pleraque agris satius acriora: quod manifestò ex succi vel syrupi valido diuissimè persistente aut permanente odore, diudicatur; idèò collectionis thoracis discutit. Idque efficacius ut præstet, coagulū ei permiscetur aliante pro morbi implicatione, & partis affectu ratione, ut montimus superius in fermēti panis tratione. Amicus in hoc sanè non carebat, & satius, periculis se-
centarijs eadem.
pius factò, præferēbat præceptor noster, magnæ eruditionis & experiētiæ. Rôdellius. Eoque retinendum suadet, non ut empiricorum more perperam abutatur.


APVL. Ad epiphoras oculorum. Herba papaueris syluatici fructus, id est, calyculos cum suo semine

pisatum cum aceto oculis impones, sedabit dolorem. Ad hemicranium & capitis dolorem. Herbam papauer syluaticum pisatam cum aceto fronti impones, sedabit dolorem. Papaueris syluatici succo si quem perunges, somnum ei cum sopore obijciet.

ARGEMONES duplex è capitulo differentia.

ARGEMONE capitulo torulis canulato,
Argemone Lacina. Adnerf. 112.

ARGEMONE capitulo longiore.
videtur idem cum Argemone Cordi.
Adnerf. pag. 112.



Diosc. In totum Papaveris sylvestri similis est: folia habet Anemones, divisa: florem purpureum: caput in cauliculo Papaveris Rhœadis oblongius & summis partibus latum, radicem rotundam. Succum croci colore acrem dimittit. Argemone & nubeculas expurgat. Folia illius inflammationes compefcunt. Abstergit, digerit Gal.


Eadem que
Minor Anemone per-
peram Mon-
pellientium.
pag. 117.

Gemine plantæ Papaveris Rhœadis primo inventa in Angliæ Sommerſetæ & Gallo-Belgiæ legenti-
bus, radicem, florem & folia hirsuta in canle pedali & sesquipedali ostentant. Flores verò purpurei Pa-
paveris Rhœadis minores, decidui: quarum minori * capitula Rhœadis angustiora, longiora, & hirsuta
line codio. Maiori item echinata & hirsuta, sed glomerata & torulis canulata capitula, in cuius verti-
ce specimen quoddam cupuli aut codij relinquit. utriusque semen Papaveris Rhœadis minus.

Arvi. Herba argemonia viridis per se trita, & si arida fuerit in aqua calida imincta ut facillimè teri
possit, illita siccillationes & liuores oculorum maturè discutit. Ad ventris dolorem: herbam viridem
cum sua radice tritam, & potui datam, prodesse dicimus & in omni loco iuuare. Si autem arida fuerit
aqua tepida infusa, idem proficere creditur. Herba viridis trita & appolita, omnia vulnera, vlcera &
canceromata facile sanare apta est. Si autem arida fuerit, aqua tepida infusa, idem proficere creditur.


Herba contrita & appolita mirè doloribus vel tumoribus ex luxu concitatis succurrit. Argemonia
drachmis duabus in vini cyathis duobus potui data, mirè discutit verberum. Herba contrita &
imposita percussuram ferro aut sude factam sanat. Verticem, in aceto trita & imposita, rosum in cibo
sumpta spem consumit. Ea que secunda sunt, herba contrita & imposita, aperit & periclitat.

ANEMONE tuberosa radice. Aduers. pag. 113.
Anemone angustifolia altera Clusij,
Anemone tertia Dod.



Legit. pag.
 1. 113. 3.
 Anemone tuberosa
 Dodonaeus.

ANEMONE flore multiplicato coccineo,
Anemone quarta Dod.
Angustifolia tertia multiplex Clusij.




In Belgij hortis flore purpureo, violaceo, vel albo variat.

ANEMONE flore multiplicato coccineo,
Anemone quarta Dod.


Suauiſſimo aſpectu perelegans cognationis conſequutione hunc ſibi locum vendicat. Rarius occurrat, niſi in cultioribus viretis Belgicis, foliis, & cauliculo ſuperiori ſimilis. Flos multiplex foliorum ſatura radiatus & duplicatus, purpura coccinea rubens. Radix tuberofa vnciam craſſitie aequat & ſuperat. foris pulla & rugoſa, ſubtus aliquantulum fibrata, intus candida: qualem primùm Conſtantinopoli delatam vidimus in ſtirpium exoticarum diſtiſſimo horro piaſ memorie C. V. D. Ioannis de Brancion; deinde Lieræ hac æſtate iucundiſſimo ſpectaculo florentem in horro D. Ioannis Diſſij.






ANEMONE maxima polyanthos Chalcedonica,
vulgò *Gioul catemer.*

Aliud etiam Anemones genus Byzantio delatum, omnium sanè maximum & speciosissimum Belgij nuper inquilinam factum. Foliis ad vulgatum violaceam Anemonem accedit, sed latioribus, habitioribusque, acerrimi gustus; & floribus multiplici peramœna figura, initio viridantis, per maturitatem dehiscens Rosæ æmula gratia, rubido rubellœve nitore, medio centro glomerati, externis verò foliis viridi & tantillò rubore confusi, spectantis oculos allieit; cuiusmodi meminisse iuvat me vidisse in hortorum deliciis illustrissimi D. Ioannis Dilij, & clarissimæ matronæ Mariæ de Brimeu, vxoris magnifici viri Conradi Schetz: radice tuberosa, crassa, bulbocastani colore & cœctione, citris fibrata, gustu austero, ingrato. Cauliculus pedalis, & interdum maior.



ANEMONE tuberosa, bulbocastani radice.
An Anemone lutea Gal. & Advers. pag. 114.
Prima Dod. Latifolia altera Clusij.

ANEMONE latifolia prima Clusij.



Inter exoticas Anemones species in Belgio frequentior & vulgatio tubicante radice & foliis altius & minutius divisis Geranij bulbosi, aut aconiti facie batrachoidis herbulæ. Flos diluta purpura rubet; nonnunquam candidat, duodenis, plus minus, foliolis radiatis: quibus fastigiata succedunt capitula cincinnis & cirris villosa, Ranunculi.


ANEMONE latifolia prima Clusij.

Hanc ingenuè fateor me non vidisse, quam tamen ordinis consecutione hinc ipsiusque verba subdenda duximus, cum Clusio nullus scriptor exactius, pressius aut doctius hanc historiam posteritati patefecerit.


Satis amplis foliis circinatæ ferè rotunditatis, per ambitum serratis, duris & firmis, longoque pediculo fultis, supernè intensus virentibus, infernè plerumque purpurascens, ut cyclaminis (siere odorato) folia propemodum feruidissimi gustus: radice (nam florentem non vidi) tuberosa & longiuscula, Tormentiillæ vulgaris æmula, fibris aliquot dependentibus, foris nigra, intrus alba, solida, ingrati admodum saporis: quæ nauseam mouens, quodammodo strangulet, deinde linguam aliquantulum vellicans. Lapidosis quibusdam Lusitanicæ collibus iuxta Teguntatq; etiam inter vepres iacenti. Exiit Decembri & Ianuario. Hactenus Clusius.



ANEMONE tuberosa Geraniifolia.
Anemone secunda Dod. &
Tenuifolia Anemone tertia Clusij.



ANEMONE tertia Matthioli, flore albo,
luculenta magnitudinis.




Rarior multò hæc nec vsquam in Belgio, sed duntaxat in hortis cultioribus generosi D. Brancionis & Georgij Ryensis Mechliniæ mihi animaduersa: radice itidem tuberosa Tormentillæ, aut superioris Anemones æmulatione. Folia & cauliculos profert geranij Robertiani, Ranunculi nemoralis vel pratensis vulgatiore, media: floribus cyaneis, albis aut rubris medium luteolum Asteris atuci riu cingentibus: semine glomerato, taceoso, Ranunculi.

ANEMONE tertia Matthioli.

Et hæc non absimilis folio Ranunculi albi siue Aconiti batrachoidis quinque-partito, sed aliquanto minore. sesquipalmaris & dodrantalis cauliculus, floribus albis Elleboro nigro æmulis & paribus quinque foliis radiatis: tenui fibrata radice Astrantiæ nigre aut Ranunculi. Rarior hæc nec nisi in cultioribus Belgij hortis.



ALABASTRITES *sive* DENTARIA *alba*
D. Brancensis, Anemone trifolia Dod.
& herbariorum.



Pulsatilla rubra. Aduersf. pag. 114.



Pulsatilla vulgaris.
 Ger. Hoesten
 kraut, &
 Kuchen
 schen.
 Aduersf. pag.
 114.

Pulsatilla
alba.



ALABASTRITES sive DENTARIA alba D. Brancionis.
Anemone trifolia Dod. & herbariorum.

Huc itidem accersenda, quam à terno crenato folio Meliloti Germanici, trifoliam Anemonen dicere herbariorum nonnulli. In cauliculis palmatis & sesquipalmatis flores initio lactei; deinde marcescentes & dehiscentes niueo mixtos confusè candore rubentes; quales esse solent Ranunculi nemorosi, cui etiam radix non absimilis. Tam ignotæ vires, quam rara planta minusque obuia. In Belgio nisi in viteto elatis. Brancionis mihi visa.

DIOSCOR. *Vis utriusq; Anemones acris; ea de causa succum naribus infusus, caput purgat: commanducata radix pituitam trahit. decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus. Cicatrices eorumdem & hebetudines emendat. Sordida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum prisana decocti edantur, copiam lactis præbent. Menstruæ cicutæ, vellere appositæ: illita quoque lepras extirpant.*

[*Pituitam trahit*] Gal. quia attrahendi & extrahendi & ora vasorum referendi facultatem obtinet.

Phœnicei floris Anemopen impostam, ulcerate auctor est Plin.

PULSATILLA vulgaris, perpetua Anemone Cordi. *Herbaveni* Tragi. *Aduers.* pag. 114.

PULSATILLA alba.

Maior hæc aliquantum foliis, maiorisq; elegantiæ floris albi, peramæni, hortu D. Dilij etiam orianda, opera seduli investigatoris Raphaelis de Coccia apud Mechlinienses summi artificis pictoris, stirpiumque admiratoris.

PULSATILLA varietas. *Aduers.* pag. 114.

In flore cæruleo perpetuè clauso conspicuam differentiam videndi copiam fecit Coldenbergij distissimus hortus. Cæteroquin cum superioribus re ipsa una, nisi folio esset superuienti. Ranunculis viribus subpar.

Recentiorum ADONIS. *Aduers.* pag. 115.

Videtur præ Theoph. à floribus flammeo ignebus colora.


Inter vernos flores Theoph. recenset cap. 7.

Anemone tenuifolia Cordi.

Et anthemum Gesneri & Dod.

LAPATHVM sive Rumex. *Aduers.* pag. 117.

LAPATHVM acutum, Oxylapathum. *Ger.* Siden-
 gelwurtz, Gyndwurtz, Streiffwurtz, Litter-
 wurtz. *Belg.* parich, & perdidich. *Angl.* Dock.
Gal. pabelle. *Hispan.* Romaza, paradella &
 Lappaça. *Ital.* Rombice.



HYDROLAPATHVM *maius*. *Advers.* pag. 117.HYDROLAPATHVM *minus*.

Importato proventu lenè fluentibus aquis, riualis agri Antuerpiani ad portam Lutofam, & portam Rubram, alibiq; passim vdis provenit. Ortus, modus & vsus Lapathij acutifolij sine acuti vocati, sed folia angustiora exilioraque, & radix fibris magis capillata scapos emittens dodrantaes, pedales, cubitales & nonnunquam sesquicubicubiales, ramulis multis divisos, copioso semine onustos.

DIOSCOR. Omnium decocto olera alius emollitur. crudi illius, mollicerides, rosaceo aut croco adiecto, discutuntur. Sylvestris & oxylapathi, & eius quam exalida nominant, semen ex aqua aut vino vtiliter bibitur, contra dysenterias, & coeliacorum affectus, stomachi fastidia, scorpionum ictus, quod si quis in potu profurnat, nihil molesti ex illis patietur. Radices ex aceto cocta, aut illita cruda, lepras, impetigines, & scabrosos vngues persanant, sed antea locus aceto & nuro in sole persiccandus est. pruritus corporis decoctum earum sedat, si fouetur, aut in solis balneo cum conficietur. cocta in vino & infillata, aurium dentiumq; dolorem mulcent. strumas parotidasq; discutunt. lienem cura aceto extirpant, aliqui amolendis strumis radicum gestatino vtiuntur, eas collo appendentes. trita & etiam a scorpionum profusiva sistunt. cum vino autem pota, regio morbo medentur. calculos vesica comminunt. menses evert. scorpionum ictibus auxiliantur.

haec sunt
perque in v-
luni reuoca-
22

HIPPOLAPATHON. *Advers.* pag. 117.

DIOSCOR. Hippolapathon olus est magnam, in paludibus nascens, easdem habet vires quas supradicti, utriusque genera. Sed imbecilliores Gal.

Feminarum profusiva. Gal. Semen eorum quandam manifestam etiam adstrictionem obtinet; adeo ut dysenterias & diarrheas siue profusiva sanet, & maxime Oxylapathi.

Gal. Lapathum moderate digerentem fortisum facultatem est: at Oxylapathum mixtam, nam simul cum eo quod digerit, non nihil quoque repercutit. **HYDROLAPATHVM** plus catenit adstringit.

APVL. Si qua duritia in corpore orta fuerit: Herba oxylapathon cum oxungia veteri & suilla pistata, & ex pane domestico facta ut malagma, & imposita, mirifice sanat. Ad paniculam quae in inguine nascitur: Herbam lapathon contundes cum oxungia veteri sine sale, sic ut oxungia dupla sit ad herbam, & his bene commixtis facies exinde velut rotundulam, & inuolues in folio colicelli, & partes earum sub cinerem calidum; & cum caluerit, tunc impones super paniculam, & panno ligabis lineo. Hoc enim eximium est & valde optimum. Herbam lapathon tusam cum oxungia, & factam quasi malagma, iocuces in linteolo mundo, & impones super apostema, mirifice aut spargit aut facit collectionem, & aperit vlcus.

HIPP

HIPPOCRATUM *facium latifolium.*
Rha monachorum, Patensis vulgi.
Aduers. pag. 117.




HIPPOCRATUM *potunifolium.*
Pseudorha recentiorum.
Aduers. pag. 118.



PONTICUM *Rha. Aduers. pag. 118.*

DIOSCOR. *Id eorum facit, ad inflationes, stomachi imbecillitatem & omnia genera dolores, ad convulsa, li-
 nosos, hepaticos, tormina: ad renum vesicae & pectoris vitia: aduersus interea praecordia, & vultus mala, haemorrhoidum
 dolores, sanguinis excretaiones, suspiria, singultus, dysenterias, & calicorum affeetus; contra febrium crecitum, &
 venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem quo agaricum pondere & cum eis in liq[ui]oribus; si febris
 careant, in melle: sin aliter, ex aqua mellea. Si tabem experientur, ex passo: si lienis exercet, in aceto melleo: si dissolutio
 est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, manditur, & sine sorbitione vlla deuoratur. Lixentia, lichenasq[ue] tollit, cum
 aceto illitum. Inflammationes omnes veteres ex aqua obtusum dissipat. Summa eius vis adstringens, cum aliquanti-
 to calore.*

* Ad sanguinis excretaiones in Rha pontici locum radix Rhabarbari nostri cholagogi, & radix Cen-
 taurei maioris perpetam Rhapontici credita irreperant.




RHA capitatum folio Enula, Centaurei maioris
facie. Advers. pag. 118.

RHA Ponticum abiesium angustiore folio.



Valde affine superiori capitato Rheo, ex Italico semine habent D. de Brañcion & Georgius Ryensis; sed folia angustiora multo, acuti Lapathi paria, aversa item parte incana; & caulis rectus, capite fastigiatus squamulis loricato, ac staminibus purpureis Cynaræ aut Cardui concoloribus pleno. Semen Cnici syl. compressum ægrè maturat in Belgio. Radix Centaurei maioris, fungosior.

M E S V E. Rhabarbarum etiam clemens, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purganti maximè expetitas complexum. Calidum siccum ordine secundo positus, quam primo, substantia duplici constat, vna aquea, terrea, adstringente, corpus dante, profunda: altera aërea, & ignea (à qua rarè efficitur) superficialia, quæ suam terream essentiam adurendo amarum effecit, & purgatoriam, & obstructa liberantem. Has autem substantias macerando separamus, vtralida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem verò pituitamque illà vacuat, præcipuè à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructions liberat, & affectus inde natos sanat, icterum, hydropem, splenis tumorem, febres putidas, etiam diuturnas, dolorem hypochondriorum puncturium. Hac verò hæmorrhagiam pulmonum, vel aliarum partium sistit: ex casu quoque aut ictu contusa, rupta, fracta, interna, & externa sanat, si eius drach. vna cum melle granis duobus, & rubiæ tinctorum grano vno & diuidio, & vino austero bibantur. Oleum quoque eius contusis & contractis musculis vtiliter illinitur: singultum item & dysenteriam sanat, præcipuè assum, & cum succo plantaginis & paucio vino austero potum. Inoxium est Rhabarba-



HIPPOCRATUM sativum latifolium.
Rhamonachorum. Patientia vulgi.
Aduers. pag. 117.



HIPPOCRATUM rotundifolium.
Pseudorha recentiorum.
Aduers. pag. 118.



PONTICUM Rha. Aduers. pag. 118.

Dioscor. *Tâ eporum facie ad inflationes, stomachi imbecillitatem & omnes genus dolores, ad conuulsa, hepaticos, hepaticos, tormina: ad renum vesica & pectoris vitia: aduersus intona præcordia, & vultu male, concussionem dolores,* sanguinis excretiones, suspiria, singultus, dysenterias, & colicorum afflicti; contra febrem circens, & venenatorum morsus. Datur in singulis valetudinibus eodem quo agaricum pondere & cura essentia prioribus si febris careant, in misso: sin aliter, ex aqua mulsâ. Si tabem experiantur, ex passo: si lienis exeret, in aters uniso: si dissolutio est stomachi, id est, cum cibi tenax non est, mandatur, & sine sorbitione ylls dener arser, Linctua, lichentia, talia, cum aceto illiunt. Inflammationes omnes veteres ex aqua oblitum dissipat. Summa eius vis adstringens, cum aliquantulo calore.*

* Ad sanguinis excretiones in Rha pontici locum radicis Rhabarbari posici cholagogi, Scordix Cerauntai maioris perperam Rhapontici credita irrepserunt.



RHA Capitatum folio Enula, Centaurei maioris
facie. Advers. pag. 218.

RHA Ponticum alterum angustiore folio.



Valde affine superiori capitato Rheo, ex Italico semine habent D. de Brañcion & Georgius Ryensis; sed folia angustiora multo, acuti Lapathi paria, aversa item parte incana; & caulis rectus, capite fastigiatus squamulis loricato, ac staminibus purpureis Cynaræ aut Cardui concoloribus pleno. Semen Cnici syl. compressum argè maturat in Belgio. Radix Centaurei maioris, fungosior.

M B S V E. Rhabarbarum etiam clemens, & excellens est medicamentum, multas dotes medicamento purganti maximè expetitas complexum. Calidum siccum ordine secundo potius, quam primo, substantia duplici constat, vna aquea, terrea, adstringente, corpus dante, profunda: altera aërea, & ignea (à qua rarū efficitur) superficialia, quæ suam terream essentiam adurendo amarum efficit, & purgatoriam, & obstructa liberantem. Has autem substantias macerando separamus, vt calida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem verò pituitamque illa vacuat, præcipuè à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructions liberat, & affectus inde naros sanat, icterum, hydropem, splenis tumorem, febres putidas, etiam diuturnas, dolorem hypochondriorum puncturum. Hac verò hæmorrhagiam pulmonum, vel aliam partium sistit: ex casu quoque aut icu contusa, rupta, fracta, interna, & externa sanat, si eius drach. vna cum munitæ granis duobus, & rubiæ tinctorum grano vno & diuidio, & vino austero bibatur. Oleum quoque eius contusis & contractis musculis vtiliter illinitur: singultum item & dysenteriam sanat, præcipuè assum, & cum sacco plantaginis & pauco vino austero potum. Innoxium est Rhabarbarum.



rum, omni tempore tutò datur, omni est ætati salubre, atque aded pueris & prægnatibus. Efficacius autem agit sumptum ex sero lactis, præsertim caprini: aqua quoq; intybi & apii, vel plantaginis cocta, & colata maceratum, idque omninò cum spica nardi, actionem eius imprimis iuuante, expressumque. Quòd si ad liberandas obstructions propinandum est, vini albi, puri, & odori modicum macerando admisceatur, expressumque eius tunc sumatur, & cum detersione & purgatione opus est. Quòd si post purgationem viscera adstringendo roborari volumus, puluis eius triti datur: si adstrictio maior expeditur, assam datur: si maxima, vitum.

EXTRACTVM RHABARBARI,

vulgò ESSENTIA RHABARBARI purgatrix, Catapotiorum, caterorumq; purgantium medicamentorum, qua tantilla quantitate blandè euacuat, nunc in aulis principum vsu longè frequentissimo, optimo.

Tusum vel minutim concisum Rhabarbarum, sole vel igni inter papyros siccatum, spiritu vini optimi (minimè aqua vitæ è facce vini vel zythi distillata) per diem & noctem tepidiorè loco maceratum; postridie confectum manibus expressum, medico cinnamomi addito, quantitate qua volueris sumas. Humor dein phiala operculo occlusa excipiat. Mox iterum nouus vini spiritus affunditur; tertio, quartoque exprimitur, donec spiritum vini colore minus inficiat. Demura mixti liquoris vitæ vase circumlinito in balneo vel potius vapore aquæ calentis distillantur; postea crassamentum ad usum reponitur; cuius dosis ʒ. plus minus, pro ægrotantis natura. Spiritus vini in alios usus seruetur; in quo vis laxandi minimè conquirenda; quia experientia comprobauimus, stillaricos, Diaphænici, Indi, confectiois hæmæ, medicamentorum purgantium liquores, etiam ternis & quinis vncijs, plus turbare quàm purgare. Quinimo nuper Iulianus de le Cambe heru peritissimus apud Anuerpienses pharmacopæus assererat Syrupi rosari ex infusionibus vitæis organis percocti, stillaricam aquam summè adstringere, dentes tremulos firmare, oris halitum commendare, aphthis & quibusvis oris vlcibus mederi.

Eadem ratione & modo quæuis alia medicamenta purgantia pro delicatis concinnari possunt: quorum operatio egregiè iuuatur & acceleratur spiritu vini, noxaque minuitur pro medicamenti natura & sæpe Medici.

RHABARBARI extractum per spiritum tartari Theophrasticè & chymicè.

LAPATHVM sanguineum. Advers. 119.

De liquore Tartari & spiritu vini cap. De vice.

Cinnamomi electi libra, liquoris sæcularum vini preparati, vulgo tartari, libræ duæ, aquæ cætarum minoris lib. ʒ. & semis; aquæ rosarum seculæ libra. hæc in ampulla per diem & noctem macerantur, distillanturque ex balneo, eo usque dum omnis humor prolectus fuerit. In hoc Rhabarbari electi libra maceratur dies octo: deinde sacculo imposita sub prælo validè exprimitur, & abiecta radice, liquor excoltus iterum ampullæ infunditur, & addita Syr. ros. sol. vel è florib. Perfici se libra ad mellis spissitudinem incoquantur. Datur iunioribus sesquidrachma, adultis semuncia ex iusculo pilosum vel ciccerum modicè cochorum.



Oxalis siue *Lapathium Oxalida*. Gal. Ouseille
& Aigrette. Gallobelgi nostris Surelle. Hisp.
Azederas, Azedas & Agrelles.
Aduers. pag. 119.

Oxalis tuberosa.



Oxalis tuberosa.

Minimè prætermittenda illa radicibus tuberosis filipendulæ vel ornantes, perquam spectabilis
oxalis exotica, etiam folijs, caule & semine hortensis quam toto habitu præfert. In Belgio rara, & ge-
neroso D. Brancioni à Doct. Pancio piæ memoriæ Ferrariensi medico munere missa.

BISTORTA quævis asseritur Britannica. Dracontia Plin. Fuchf. & Limonium Gesnero.
Dracunculus Plin. Dod. fol. beta à dracunculus natura diuersa. Germ. Rastwurts.
Belg. Dertx tonghe. Gal. Bistorte. Hisp. Biltorta.

Diosc. Britannica vim habet astringentem; priuatim depascentibus oris, & consillarum vlceribus accommo-
datam. Valet etiam ad reliqua, quibus adstrictione opus est.

Astringere etiam asserit Gal. qui subdit; Quidam reponunt tanquam inter stomachica medi-
camenta efficacissimum. Vulnerum glutinacoria, frigida & sicca.



ORALIS
verticillata
tenuifolia
sinuata.
F. al. Aceto-
sella & lan-
nicola.
Adver. 120.



ORALIS
Sicuti nunc
torrensibus
reputat. Ad-
ver. 120.




BISTORTA
que affertur
Britan-
nica.



Cochin-
n. & A. R. P.
in. Germ.
Kochian.
Belg. Rey.
cult. Ar.
ver. 121.


Telephium
Lucas.

Thalictrum
N. & M.
officin.



Coch.


COCHLEARIA *Sriemnica*. *Adverf.* pag. 112.



Pyrola,
Limonium
Cordi & Ger-
manorum.
Belg. *Witte*
terguyen.
Ital. Sam.
bucca. *Ad-*
verf. 112.

Exsiccat ex-
cessu tertio,
refrigerat
secundo.

LIMONIUM, *Beben rubrum Cordi.*



TRIPOL-
LIUM vul-
gare.



LIMONIVM, *Beben rubrum* Cordi. *Ital. Bietola saluatica.* Aduers. pag. 122.

Diosc. Semen adstringit: tritum ex vino acetabuli mensura potum, dysentericis coliacisq; prodest: rubra fe-
minarum profusa sistit.


TRIPOLIUM *luteum.*

Luteo flore alit Mironus munere præclari & generosi viri D. Caroli de Houchin D. de Longatte,
stirpium admiratoris summi & doctissimi, lectum littoreis Gallobelgij.

TRIPOLIUM *minus*
Aduers. pag. 123.

HERBA DORIA.
Aduers. pag. 124.

Jege lin. 31.
mutatorem.



Folia in tra-
le prodest.
picton. in
Aduers. pag.
124. minor
antidote.
fa.

Tripolij va-
rietas.

Ad Padi ostia longè minus prou nit Montpellieraco, minorem Considem folio, radice & flore vis
æquans.

Diosc. Radix odorata, calidi gustus; qua drachmis duabus in vino pota, aquam vinasq; per alium extra-
hit. In medicamenta digeritur, qua venæ arcent.
Acri radix, & calida 3°, excessu Gal.

CONSOLIDA *ærea* nonnulli Limonij folio; Aduers. 123. Conuenit cum *Asphate blattis* & *Chrysanthemum*
luteo Dod. In Frisia secus Zuyphen & Blackfort, frequentissima.



VIRGA AVREA *Herba serrato folio.**

* Tantopere huic effigie, habituque toto convenit, ut neutram ab altera discernere queas, nisi magnitudine & foliorum divisione: assurgit namque hæc procerioribus duplo caulibus maioribus, magis serratis folijs: Belgis hortensis est, Italique semine orta putatur.

AVREA VIRGA Villanovani. Gal. Verge d'or.
Aduers. pag. 125.

Leucographis Plin. & Herba scripta Anguillaræ, à conspersis nonnullis notulis, quibusdam locis potissimum, conspicuis.

Bibitur ad rupta, vulnera, præcipitationes, ^{legitimum,} hærnas & alui fluores, aphthis, deperascentibus oris ulceribus & anginis, medetur. dentes tremulos firmat.


SOLIDAGO *Sarrasquica.* Germ. Weidnichwondkraut. Belg. Wopdensteyen wondenkrout.
Gal. Consouide sarrasquica. Aduers. 125.

Hepati & visceribus dissolutis, robor addendo & obstructions referendo; morbis hæc in ore, Regio morbo & diuturnis febribus, medetur.

Legitimum

AQUATICA PLANTAGO. sive ALISMA sive
DAMASONIVM. Limoniare Anguill.
Ital. Plantagine aquatica.
Aduers. pag. 126.

ALISMA pusillum angustifolium muricatum;
sive Plantago aquatica minor.



Diosc. Radix acris, odorata; cuius si ʒ vna aut altera bibatur, bis conuenit, qui lepore marini deuorauerunt, aut à
Idem Plin. rubetis ranis demorsi sunt, aut opiū hauserunt. Torminibus atque dysenteria, per se aut cum pari modo seminis Dau-
ci, potui datur. Convulsis & contra vitia vulua prodest. Herba sistit aluum. Menstrua pelit, tumores illius mitigat.

Gal. Quod autem constitutos in renibus calculos aqua, in qua decocta fuerit, pota comminuat, ca-
su experti sumus. Ex quo liquet, quòd abster soriam quandam facultatem obinet.

Plin. Strumis imponitur ex aqua caelesti foliū tritum, vel radix cum axungia tusa; ita ut imposita
folio suo operiatur. sic ad omnes cervicis dolores, tumoresque quaeunque in parte.

ALISMA pusillum angustifolium.

Minutis Quinqueneruæ Plantaginis angustioribus foliis, deorsum versus reflexis, perpulehra
planta. Cauliculus gracilis, sesquipalmaris, è fibrosa radice sparsa speciosa coma referta, numerosis
muricatis exilibus capitulis tribulicieu. Hanc primus rasilii ostendit eruditus medicus Thomas Pen-
neus Anglus, locis vdis Angliæ oriundam, ab hac non diuersam, puo illam esse quam in serobibus
hoc anno floribus Aquaticæ Plantaginis pone nouam urbem Antuerpiæ reperi.



TRISANA
Miponis, &
in P. 127
SAGITTA-
ria aquatica.
Advers.
pag. 126.




Advers. 127.
In P. 127
pag. 126.



Lege li. 5. m.
que aquatica, &
paulo post
minoribus.

BIFOLIUM. Advers.
pag. 127.
Pseudorchis bifoliū Dod.
Gramē Parnasi querūdā.
Belg. zweeblad.
Ger. Dweeblad.



MONOPHYLLON recentiorum. Advers. pag. 127.
Germ. & Belg. Einblad.
Gramen Parnasi Cordi & Leoniceri.




Radix trita luis pessifere bubonibus mederi fer-
tur neotericis, si statim subito diadema pondo, ex
aceto, vino aut aqua sumatur.


Recentiorum.




Recentiorū
CALCOTVS
MARIS. Ad-
uersi. p. 127.
Damasconiū
notū Dod.



PLANTAGO
vulgatissima
Sola.




PLANTAGO
maior inca-
na. Aduersi.
pag. 127.





PLANTAGO
rotunda
Cultiva.



PLANTAGO





ROSEA *Plantago pinnatifida* sparsa. Aduers. 128. *Sarcobrodes*, & *Corematophora*, siue *Scoparia C. Gemina*. Sola differentia Belgicis agris & horis, in pannicula spicatum sparsa, onusta innumera foetura herbaceorum flosculorum racematim coherentium.

MARINA *Serpentinis* propior, propter notulas rubras, in foliis transversas, obliquas & fortuitas. Fraxus Rupbe vocatur, qui estant ex lacte & pulicula, ventrem solvere & flatu discutere asserentes.

PLANTAGINES. Aduers. pag. 128.

Angletiam *warphjedes*. Hisp. *Llante*. Lusit. *Chantage*.

DIOSCOR. Duo *Plantaginis* genera, multo utilior magna est. Vm habent folia exicatoriam, constringentem, quare omnibus malignis vlceribus, & fluxioni opportunis atque elephantiaci, sordidissq; illa profunt: profutua sanguinis, & vlcera quae serpunt, epinyctidas, carbunculos, nomas q; cohibent. vetera vlcera & inaequalia cicatrice obducunt. chlorosis sanant. sinus conglutinant. morsibus canis, ambulis igni, inflammationibus, panis, perocitibus, strumis, agilopis, illa cum sale profunt. Collum cum aceto & sale olus, dysentericis, coeliaci q; sumptum subuenit. datur & in locum betae cum lentiana coctum, & adaquam inter cutem, cui leucophlegmatica nomen est. datur & herba decocta post aridas epulas, sic vt media antecodat. comitialibus & susi virosus data proficit. Foliorum succum collecta subinde vlcera purgat. cum cin. alia acet. cerusa igni sacro medetur. fistulis insusus prodest. lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. additur quoq; in oculorum collyria. gingivis cruore suffusis, & sanguinis reuersionibus, potu conserit. chylis dysentericis insun. latur. contra tabe datur in potu. aduersus stragulationes vuluae, in vlcera subducitur, etia si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potu alui fluxiones & sanguinis excreationes sistit. Decocta radix & macerata, & collatio no, dentium dolores sedat. eade cum foliis, vlceribus renis & vesica in passo datur. Ferit tres radices cum tribus vini cyathis, & pari aqua modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Snt qui radice gestantur, discutidus strumis vlatur.

Gal. *Vlcera maligna*.] Quaecunque medicamenta cum hoc quod refrigerant, vna etiam adstringunt, ea & ad vlcera maligna omnia, & ad fluxiones & putredines profunt, atque etiam adeo ad dysenterias: nam & sanguinis eruptiones sistunt, & si quid aduratur, refrigerant. Sinus quoque glutinant, & alia vlcera recentia simul & vetera. In omnibus ferè id genus medicamentis primas tenet, aut certe nulli secundum est arnoglossum, idque temperatura symmetrica. nam siccitatem obinet morsus expertem, & frigiditatem quae nondum obtupefaciat. Semen eius & radix similiis sunt facultatis, attamen siccioris, & minus frigida. Semen etiam subtilium est partium; radices autem crassiorum. Et huius herbae folia exsiccata subtilioris & minus frigida facultatis sunt, nempe distillato ex eo ac digesto excremento aquo.

Rosea Plantaginis varietas.

Rheumatica sistit Plin. & stomachum roborat sampta. Eade Plin. Succus sanguinem vomitibus datur Plin.

Idem Plin. Idem Plin.



Hac ratione radicibus vrinunt ad dentum dolores. præterea ad iecoris & renum obstructions non has tantum adhibent, sed folia quoque & multo magis semen. Hæc enim quandam abstergendi in se facultatem habent, quam & in herba viridi inesse satis conici potest, verum ab humiditatis copia vincit.

Refrigerat simul & desiccatur, & in utroque secundi recessus à mediis est. Mixta est temperatura: habet enim quiddam aqueum frigidum, & austerum quiddam id quod terreum est, siccum, frigidum.

A P V L. subdit: Plantaginis radix in collo suspensa, capitis dolorem mirificè tollit; succus tepesfactus fomentando ventris dolorem tollit. Et si tumores fuerint, tusa herba & imposta tollit tumorem: succus potui datus, & interiora sanat, & thoracem hominis purgat mirificè. Plantaginis semen tustum & in pulverem redactum & in vulnera aspersum, sanabit ipsa vulnera. Et loca ea quæ à nimio calore vruntur, ipsa tusa & imposta refrigerat & persanat. Ad lumbricos: herbam Plantaginis contundes, & succi eius cochlearium vel ligulam dabis bibere. Ipsam quoque herbam tusam umbilico imposito. Si qua duritia fuerit in corpore, Plantago pisata cum axungia sine sale, & factum quasi malagma, imponis id duritiæ, & discutit. Ad podagram & omnem neruorum dolorem & tumorem: herbæ Plantaginis folia contusa vel pisata cum modico sale & imposta, optimè facere certum est. Si cui pedes tument ex itinere: Plantago contusa cum aceto imposta tumorem tollit.

HOLOSTEIVM Salamanticum maius Clusij. pag. 18.
Idem congener cum Monspelliaco, sed multo maius.

POTAMOGETON, sive Fontalis.
Aduers. pag. 128. & 129.
Germ. Zamkraut. Nostris Fontepucrupe.
Hisp. Espigada & Vezina de Rios.



Et sola magnitudine differre facit Clusius quod aridis collibus Salamanticæ vicinis provenit, & iuxta Valentiam Hispaniæ secus vias. Cuiusmodi etiã meminimus in agro Monspelliensi, ni la bab memoria.


POTAMOGETON, sive Fontalis.

Dioscor. Refrigerat & adstringit; pruritis, vlceribus vortusis & iis quæ nascendo serpunt, conserit.
Similiter Polygono Gal. sed essentia eius crassior, quàm Polygoni est. Plin. eadem ferè.

MALABAR

Μαλαθάριον. MALABATHRYM. Aduers. pag. 119.
Tamilapatta Garcia & C. Clusij.

GENTIANA maior. Aduers. pag. 119.
Hisp. Gentiana.



Fructus. T. 6.
Sed exigue
pando figi-
to. lino. ca-
pitate qua-
drato mē-
tore.



Gentianam
transmissis
purpureis
floribus C.
Clusius.

Leg. pag. 130.
lin. 9. Strick.
lin. 10. eadem
abr.
lin. 11. Lencq.
foues.

DIOSCOR. Easdem Nardo sortitur vires. sed efficacius omnia prestat; urinam vehementius ciet, ac stomacho magis prodest Malabathri vis. Lippitudinibus, inflammationibus tritum, & in vino seruesactum commode illinitur. Subditum lingua, oris halitum & suavitatem commendat. Vesliam quoque odorem interposseum seruat; & ab erosione tuetur.

Gal. Malabathi folium cum spica nardi simillimam facultatem obtinet.

GENTIANA maior.

DIOSCOR. Vis radice exaltatoria, & adstringens contra morsus serpentium, duobus drachmis, cum pipere, ruta & vino pota, auxiliatur. extracti succi drachma. laterum doloribus, & ex sublimi decubatis, ruptis, & conuulsis, prodest. hepaticis & stomachicis, pota cum aqua subuenit. radix collyrii modo subdita, partus eicit, imposita, ut cytum, vulneraria est, & vlcera cunicularum depascentium medela. succus precipue eodem effectu prodest. oculi inflammatione Liberantibus illinitur. pro meconio collyrii acris immiscetur. radix viruligrem abstergit. Succi extracti ratio hac est. Contusa radix quinque diebus aqua maceratur. postea in eadem rarisser decoquitur, dum extent radices. & vbi reserxit aqua, linteo excolatur, mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat: siccisq; reconditur.


Gal. Radix admodum efficax, cum opus est extenuatione, purgatione, absterfione, obstructionis liberatione. Nec mirum si hac possit, cum impense amara sit.

Plin. subdit: Prægnantibus non bibenda. Tanta huic vis inest, vt iumentis etiam non sufficientibus modo; sed illa quoque trahentibus auxiliatur pota.

APVL. Ad aures malas: herbe Gentianæ si dederis vt supra potum, miraberis virtutem eius.

X 3

GENTIANA



GENTIANA minor, Cruciatæ. Aduers. pag. 130.
Lege Ger. Speerenstich, Crestswurtz, & Modelgeer.
Gal. Gentiane croiceæ. Ital. Gen-
tianaminore.



PNEUMONANTHE Cordi.
Aduers. pag. 130.
Gentiane minoris species.
Calathiana viola Plin. Dod.



Ulcibus fistulosis illinitur. venenis, contagiosis & pestiferis morbis auxiliatur. Thoracis viua emendat, & eadem quæ Gentiana, præstat, sed inefficaciùs.

PNEUMONANTHE Cordi.

Gentianæ facultates, sed imbecilliores, refert.

E floribus colore varietas.

Vnam duntaxat & sui similem, sed floribus albis alit hortus eruditissimi professoris in Academia Louaniensi Petri Brughelij.

GENTIANELLA siue Pneumonanthes varietas.

Ab hac non admodò diuersa; nisi frigidior tota, quæ humentibus Brabantia ericetis oritur, Autumno & Augusto flores caeruleos promens.




GENTIANELLA minima. Aduers. pag. 131.

Prouenit etiam copiosè in Angliæ, Belgij & Gallie Septentrionalis collibus, vbi floribus albis aliquando, sed rarò occurrit.

GENTIANELLA Alpina. Verna Clusij. Cantabrica quorundam.



Heluetiæ nostræ Gentianellæ, campanulæ flore similima. Flos amœnus, cæruleus, singularis, oblongior, calathi effigie, foliis quinis partitus. Folia, ortus & gustus Centaurei lutei. Radix gracilis, fibrosa, implicata. Celsis montium iugis gaudet: vbi etiam, vñ superior Heluetia, vere flores.

GENTIANELLA verna Clusij.*HELLEBORVM album siue Veratrum.*

Aduers. pag. 113.

Angl. Hellebor. Hisp. etiam Vedegambre blanco. Norbonensibus Verue.

ELLEBORVM album floribus atrorubentibus præcox.



ELLEBORVM



Variat flore { Albo
subuividi.
& atrorubenti in horto Mutoni.

HELLEBORVM album floribus atrorubentibus praecon.

Ante aliud germinat foliis etiam maioribus, latioribus & longioribus. Ex horum medio caulis exit, tricubitalis aut amplior; in quo flores non albi, sed atrorubentes, stellati, quibus succedit fermen foliaceum, alterius amulatione. paucioribus fibris radix longior donata.

DIOSCOR. Galaticum & Cappadocicum candidiora, & pulvere quodam obfusa celerius strangulatus mouent. Vomitione autem varios extrahit humores. collyrii admiscetur, qua caliginem oculorum discutiunt, partus impositus necat, menses pellit. sternutamenta excitat. mures interficit, cum melle & polenta subactum. absumit carnes, si coquatur vna. datur per se ieiunis, & cum sesama, aut ptisana succo, aut halice aut lentis cremore, cum aqua mulsa, aut pulre, aut quavis alia sorbitione. Cogitur cum pane, & ita inmassatur. Preparatio corporum, ac victus ratio, diligenter tradita est, cum ab his qui de medica eius portione scripserunt, tum maxime à Philonide Siculo Ennensi, cui nunc assentimur. Quippe longum nimis esset, in hac praesertim editione, de materia, simul medicam curandi rationem exponere. Dant nonnulli in pulre sorbitione, aut copioso halice cremore: aut paucum antea dari cibum praecipientes, statim veratrum offerunt, ut praesertim quibus strangulationis suspicio imminet, aut si valetudo corpus infirmat. Hoc enim modo deiectio nihil periculi minatur, quod cibo munitis non intempestiue medicamentum corporibus offeratur. Vomitiones concitant subdita, ex oleo balani, cum aceto.

* Causasque morborum extrahit. Constat hoc medicamentum comitiali morbo mederi. Plin.

^b Plin. idem. ^c idem Plin.

Aegin. Tam candidum quam atrum iuxta calfaciendi, siccandi que vim in tertio excessum ordine possidet.


† Aegi. eadē. Gal. Excalfacientis simul & extergentis facultatis est. Quamobrem ad alphas, impetigines, scabies, lepraque accommodatus est. Quinetiam si in fistulam callo * indurata infundatur, duobus tribus diebus callum detrahit. Dentibus si cum aceto colluantur, prodest.

* nigro tribuit Aegin.

Plin. Optimum quod celerrime mouet sternutamenta, sed multo terribilius nigro, praecipue si quis apparatus potuorum apud antiquos legat, contra horrores, strangulatus, intempestiuas forni vires, singultus infinitos aut sternutamenta, stomachi dissolutiones, tardiores vomitus aut longinquiores, exiguos aut nimios. Sed antiquorum vitium erat, quod propter hos metus parcius dabant, cum celerius erumpat, quo largius sumitur. Themison binas non amplius drachmas donauit. Sequentes & quaternas† dedere, clero Herophili praconio, qui Elleborum fortissimi ducis similitudini aequabat. Concitatis enim intus omnibus, ipsam imprimis exire. Praeterea mirum inuentum est, quod incisum forficulis, cortex remanet. Hoc inanito, medulla cadit. Haec in nimia purgatione data, vomitiones sistit. Cauendum est felici quoque cura, ne nebulo detur die, quippe impatientes cruciatus existunt. Nam aestate potius quam hyeme dandum; non est in dubio, corpus septem diebus praeparandum cibis acerbis, abstinencia vini, quarto & tertio die vomitionibus, pridie carnae abstinencia. Album è dulci datur, aptissime verò in lacte aut pulre. Nuper inuenere dissectis raphanis inserere Elleborum, rursusque comprimere Raphanos, ut transeat vis, atque eo lenimento dare. Reddi post quatuor fere horas incipit totum opus septenis peragitur horis. Medetur in morbis comitialibus, vertigini, melancholicis, infantibus, lymphaticis, elephantiae albae, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, incipientibusque tympanicis, stomachicis, spasticis, clinicis, ischiadicis, quartanis, quae aliter non desinant, tussi veteri, inflammationibus, torminibus redeuntibus. Vetant dari senibus & pueris. Item mollibus & feminei corporis animaeque exilibus, aut teneris, & foeminis minus quam viris. Item timidis, aut si exuicerata sint praecordia, vel tumeant, minimeque sanguinem excreantibus, vel latere vel faucibus. Medetur extra corpus eruptionibus pituitae, cum axungia illitum. item suppurationi veteri. Muscae necantur albo citato, & cum lacte sparso. Eodem & phthiriasis emendatur.

Messv. Elleborus duplex, albus & niger, idemque salubrior albo: quia & albus symptomata terribilia minatur: niger autem corpus incolume, & velut iuvenile tenet. Eligendus in eo genere est sapore acri, gustantem mordente, colore asari, fragilis, medius simplici & gracilis, recentis & vetusti, grauis & leuis, aut potius leuior quam grauior: leuis autem ac sine asperitate. Radix eius est praestantior, & in ea fibratum ac radicularum cortices. Vere aut aestate colligatur. Albus autem minus est tum acer, tum mordax: neque mox actimonia eius apparet, si amarior est nigro. Caetera nigro facultate est similis, nisi quod diutius seruari potest. Niger est calidus siccus ordine tertio, tenuat, terget, resoluit, carnem ulceribus supercrescentem exedit. Adde, quod si is ad arboris alicuius radices crescat, fructus ipsius purgatorios reddit. Albus autem calidus siccus in medio tertij, similiter terget, mordet: sed vomitu multo purgat, & sternutamenta violenter mouet. Vitandus autem hic est, quod strangulet. Niger autem omnium consensu fiamendus, praesertim castigatus natura & arboris robustis & animosis dandus, & Vere ipso. Datus auserit, quando & cui conuenit, temperamentum facit melius: ob id motus

† quatuor drachmas & nos dedimus.



quoque probatior reddit, & corpus incoluere, ac velut iuvenile efficit. Hæc enim propria ipsius sunt opera, Hippocrate auctore. Corpus enim totum excrementis corruptis expurgat: clementer ac sine molestia vacuat bilem vitamque, & pituitam: sanguinem proinde puriorem reddit, attrahendo scilicet excrementa in venis sanguini mista, non à solis cavitatibus partium, sed à toto corpore, ac etiam remotis partibus, & cute ipsa. Ad cerebrum quoque purgandum, & caput totum, & sensuum instrumenta, & nervos, & viscera, & vesicam & uterum, est efficacissimus: cerebrique affectibus, ut cephalalgia, hemigrania, mania, melancholia, vertigini, epilepsia, paralyti, aquarum in oculos defluxui apertè confert: iuncturarum quoque morbis, ut nodis, & tumoribus scirrhosis aliis: strumis etiam. In summa, est velut iheriaca, & per antonomasiam medicina elephantia, cancri, herpetis, erysipelatis, exanthematum, phagedænarum. Pulvis quoque tenuissimus ellebori nigri, visum roborat. Acetum quoque cum hoc decoctum, auri instillatū, tinnitui confert, & auditum roborat. Idem acetum si os colluat, dentium dolori confert: præterea splenis affectibus, febribus diuturnis, quartana biliosa, reliquis affectibus melancholicis sanatu contumacibus: vitam, & menses movet: corporis colorem & odorem bonum efficit, ac etiam oris, cutis affectus, albos vitosque quous utendi modo sanat: ex aceto affricus cuti, eius scorditatem & panos delet. Albus autem vomitu immodico & violento symptomata excitat terrenda: foris autè affricus cutis vitia, scabiem, impetiginos, lentiginos valenter iuvat. Vterque autem fistulis & viceribus putridis ac malignis medetur. Albus igitur quia huius tempestatis corporibus est molestus, quin & velut venenum, præsertim suffocans, vitetur. Nigri autem virtus ad nostra vsque tempora est tolerabilis, licet etiam difficilis. Sanis enim corporibus elleborus est molestus, inquit Hippocrates, arte autem & industria nostra castigatum, quando & cui oportet, rectè propinamus: atque salubriter. Filius autem Zezar manna mellis simili tepida quantitate corticis radicularum ellebori aptam horis octo macerat, colatum dat, in quo virtus est ellebori. Idem fit in melle vuato, aut iure gallinarum vel carniū, aut oxymelite, aut vino dulci, aut condito, aut syrupo, aut sapa aliqua, superadentes polentam vel orizam, aut pulvem, & sorbitioni per se datur. Vtriusque verò ellebori virtutem ex corpore deturbat mulla decoctum vuatum passarum, aut hordei, aut gallorum, aut gallinarum, cum oleo nucum, vel amygdalarum dulcium, vel simili: pulverem verò ellebori sumere tutum non est. Datur autem à siliquis sex ad tertiam drach. vnius, vel vsque ad drachmam vnam.

HELLEBORINE sive Epipactis recentiorum
 & Belgarum. Aduers. pag. 132.

EPIPACTIS, sive HELLEBORINE.
Alisma quorundam Cordo.

VARIETAS.

Flore stellato ex violaceo rubello secus Smerpont Picardie inter Pulsatillas sedula manus præclari viri Caroli de Houchin. D. de Longastre, hanc studiosissimi & doctissimi, legit.

HELLEBORINES *rara species.*

Hanc benevolentia eruditissimi medici D. Hermetis Clerici nactus sum, è suis Italicis



peregrinationibus. Elleborastro nigro affinis ea admodum est floribus herbaceis stipatim confertis: folio tamen plantagineo helleborines albae ad Sigillum Salomonis accedente.

NARDVS Celtica, *Salunca officinarum* Gallie, Germania, Hispania & Anglia.
Nardos καλτμή. Aduers. 132.


DIOSC. Ad eadem qua Syriaca, pollet: sed vehemens vinam cit, & stomacho vitius est. Inflammationibus iecinoris, & felle suis auxiliatur. Contra stomachi inflationes, cum Absinthij decocto bibitur; item aduersus lienem; renum & vesicae vitia, & venenatos ichus, ex vino. Additur in malaginata, poriones, & calfacientia unguenta.

Nardi Celticae radices atque cauliculi abiectis folijs vsurpantur Diosc. Galeno vero flores in tercio Andromachi medicamento.

NARDVS Celtica altera, videtur *Caltha alpina* Gesneri. *Plantago Alpina* quorundam.
Aduers. pag. 133.

MIRCVLVVS, *Nardo Celtica* similis herbula.
Aduers. pag. 133.

SAPONARTA. Belg. *Seeptrupt.*
Aduers. pag. 133.
Sivuthium siue radicula est *Candet Aricen.* *Valerando.*
Calida & sicca est.



PERSICARIA vrens *Hydropiper*. *Crataegonum* Cordi.
Germ. Wasser pfeffer & muckenkraut. Belg. Wa-
terpiper. Gal. Culrage. Ang. Sacmfritha. Hisp.
Pimienta aquatica. Ital. Pipo aquatico.
Advers. pag. 134.

PERSICARIA filiquosa nostra, NOLI ME
TANGERE vocata, est *Esula* *hylandii* Trogii.
Advers. 135.

PERSICARIA pusillarepens.



DIOSC. Folia una cum fructu imposita, oedemata & durities veteres discutunt, ac sugillata delent.
Calida & sicca Gal. minus tamen quam piper.

Oleum *Hydropiperis* ad nodosam tophaccamue podagram chymicum & empiricum arca-
num.


Recipit succorum *Hydropiperis*, *Leuistici* vulgaris, & *Pastoriae* bursae añ. q. l. quinque ver-
uecum nigrorum capita, & ranas quindecim. Ebulliant in balneo in lib. quatuor olei ad ossium
dissolutionem, & transfusa ad usum reponuntur: potenter digerit, & ex alto trahit imposita herba,
idedè tophis & oedematosis tumoribus illinitur vtiliter.

PERSICARIA mitis. Germ. Weerkrant / flochkrant. Belg. Weesche crupt & bloochrupt.
vulneraria est pota & illita. *Advers. pag. 134.*
Floribus albis Antuerpia ad portam Rubram & Lutofani provenit.


Pusillarepens PERSICARIA.

Antuerpiani agri giareois fabulosisque veis quadruplo minor huius repit flosculis aliis candidis,
aliis purpurantibus, reliqua facie similis.

In agro Neruicensi altera multò maior provenit folijs hirsutis, gustu acerbis, floribus albis, aut pur-
pureis, quidam Britannicam appositè dixerunt.



BALSAMI-
NA LEMNOS
perfoliata.
A. duRoi. 1734.



Capsica
piperita
Linn.



Capsicum
baccatum
Linn. var. Ad-
soni. 1734.



Rhaphan-
istrum
Linn.



CAPRICUM, Piper Indicum longioribus siliquis. Germ. Indianische Pfeffer. Belg. Wyrtlic peper. Gal. Poivre d'Inde & de Bresil. *Advers.* pag. 134.
Piperis Cordi. Siliquastrum Plin. & Tragi; peperam Piper longum Diosc.

Utilitas & usus non dispar hydropiperi ad duros & frigidos tumores. Cutis fradationes delere ex melle illinum proditur.


RAPHANVS sivestris officinarum, Lepidium Aegineta. Germ. Pfefferkraut.
Gal. Pallerage. Ital. Piperella. *Advers.* pag. 135.
Lepidium minus Cordi, & Tragi.

Diosc. Vis foliorum Lepidij acris & exulcerans, quapropter, ischiadicis trita, presentissimum est auxilium, si cum Helenij radice, quarta hora parte, illinatur. Lienosis simili modo prodest: lepra eximit. Radix appensa collo, dentium dolorem liberare existimatur.

Clinicæ & obstetrices radicem potui puerperijs ad facilitandum partum exhibent, eo que ab illis studiose alitur.

Crassa radice **RAPHANVS** Rusticanus, Lapatij folio. Thlaspi & Sinapi Persicum: Armoracia Tragi: Thlaspi Cratena Diosc. Gal. Raiffort sauvage. Ital. Raffano & Rauano.

Raphano Rusticano lacte aut Zytho macerato ad stomachacem, Scorbutum nuncupatum, Frisij feliciter utuntur.



DENTARIA Rondelletij. *Advers.* pag. 136.
Lepidium Aegineta Monsp. Molybdana Plin.

Carpis imposita ex sale, corpore purgato tertianam notham soluit; horroresque quartanæ cum oleo Rutaceo & è pipetibus, inuncta dorfi spina.

Plinio, Molybdana commanucata, si oculus sabinde liniatur, plumbum, hoc est morbi genus, ex oculo tollitur.

LEPIDIVM annuum.

Herbacea est quæ à simili cum Legumina, tum ortu foliorum, Dentillariæ Monspeliaciæ Lepidij cauli incumbendum, herbarijs nostris Lepidij dicta. Caulis ite bicubitalis multifidus: Flores albi, & semen foliaceis Thlaspi involucri clausum, acre gustu: radix fibrosa. In Belgio horten- se; hyeme virens, folijs Lepidio maioribus.




BALSAM-
NA PERILOSA
perisifolia.
A duobus 174.



Capsicum
Dipentem
174.



CAPSICUM
Laciniatum
Siquis. Ad-
ver. 174.



RHABD-
NOS FL-
SIBIBO-
DABO.



CAPSICUM, *Piper Indicum longioribus siliquis*. Germ. *Indianisches Pfeffer*. Belg. *Wijllic peper*. Gal. *Poivre d'Inde & de Bresil*. *Advers. pag. 134.*
Piperitis Cordi. Siliquastrum Plin. & Tragi; perperam Piper longum Diosc.

Ueilitas & vsus non dispar hydropiperi ad duros & frigidos tumores. Cutis fardationes delere ex melle illitum proditur.

RAPHANVS syluestris officinarum, *Lepidium Aegineta*. Germ. *Pfefferkraut*. Gal. *Pallerage*. Ital. *Piperella*. *Advers. pag. 135.*
Lepidium minus Cordi, & Tragi.

DIOSC. *Vis foliorum Lepidij acris & exulcerans, quapropter, ischiadicis trita, praesentissimum est auxilium, scum Helenij radice, quarta hora parte, illinatur. Lienosis similimodo prodest: lepra eximit. Radix appensa collo, dentium dolorem liberare existimatur.*

Clinicæ & obstretices radicem potui puerperijs ad facilitandum partum exhibent, eoque ab illis studiose alitur.

Crassa radice RAPHANVS Rusticanus, Lapatij folio, Thlaspi & Sinapi Persicum: Armoracia Tragi: Thlaspi Crataea Diosc. Gal. Raiffort sauvage. Ital. Raffano & Rauano.

Raphano Rusticano lacte aut Zyrho macerato ad stomachacem, Scorbutum nuncupatum, Frisij feliciter vtuntur.



DENTARIA *Rondeletij. Advers. pag. 136.*
Lepidium Aegineta Monsp. Molybdana Plin.

Carpis imposita ex sale, corpore purgato tertianam notham soluit, horroresque quartanae cum oleo Rutaceo & è piperibus, inuncta dorli spina.

Plinio, Molybdana commanucata, si oculus sabinde liniatur, plumbum, hoc est morbi genus, ex oculo tollitur.

LEPIDIVM amurensis.

Herbacea est quae à simili cum figura, tum ortu foliorum, Dentillariae Monspeltiacae Lepidij cauli incumbentium, herbarijs nostris Lepidij dicta. Caulis ite bicubitalis multiscidus: flores albi, & semen foliaceis Thlaspi inuolueris clausum, acre gusta: radix fibrosa. In Belgio hotten- se; hyeme vitens, folijs Lepidij maioribus.



panacei chrysomia
theophrasti
aquorati genus po
tius quam mete



HORYORVM COSTVS

Advers. pag. 137.

BALSAMITA maior Dod.

*Mentha corymbifera Cordi. Alisma Tragi. Lepidium
Diosc. quorundam. Ital. Herba di S. Maria &
Salvia Romana.*

Capitis dolores finire afferunt recentiores: hep-
par roborare nativumque calorem instaurare: ca-
lore, tantillo amarore & adstrictione moderatis,
fluxiones siue rheumatismata sistit: concoctioneta
iuvat, mulierculis expetita ad placentas. Se-
men vermes necare afferitur, stomacho & cordi
amica.

ALYSSON Dioscor. putativus.
Advers. pag. 255.



LUNARTA
Græca, BOL-
SANAC Bel-
garum. *Ad-
vers. 137.*
perpera n
Raphanus
syl. primus
& Amora-
cia Fuchsi.
Abstergit,
modice cal-
facit, vias
eis, vel Re-
punculus.

Lunaria Græ-
ca semper
virens radi-
ces habet fi-
brofas, mini-
mè bulbosas



Diosc. Eius decoctum singulis sine febribus
distat. idem efficit, si quis eam aut teneat, aut odore


ter. cum melle trita, vitis \dagger cutis in facie, & lentigines emendat. confusa in edulio, rabiei canis* mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur. & hominibus atque animalibus fascino amuletum. purpureo limbo circumscripta, pecorum morbos abigit.

Easdem facultates tribuit Gal. Alyssa quas Dioscor.

\dagger Gal. Alysson nuncupata, quod mirificè inuet demorfos à cane rabido. Sed & rabienti quoque data, sæpe in totum sanavit: atque hoc ex totius substantia similitudine efficit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola percipi experientia, & planè nulla constat methodo. Quod si quis ad multa experietur, cognoscet facultatem habere mediocriter siccificam & digerentem, cum hoc ut absterforium nonnihil etiam obineat. Hac ratione & vitiliginem & maculas faciei à sole prognatas expurgat.

VIOLA MATRONALIS, & Damascena,
Viola alba Tragi. Belg. Weiß; winter
violten. Advers. pag. 137.

VIOLA Mariana.
Raphanus syl. Diosc. Dod.
Advers. 137.



lege Viola Ma-
riana an sic
Diosc. Ma-
riana

Viola Rapun-
culostemalis.

Viola matronalis { Suavissimi odoris, totamque minorem & floribus albis alit in horto Ioannes Ma-
tronicus.
Tussi medetur, consiliis & difficulter spirantibus. Urinas & sudores propellit. Incidit, ad-
fert, & digerit.



EPIMEDIUM, *Aduers. pag. 138.*

Epimedium
Anguil.



TRACHELIVM, *sive Cervicaria. Pularia Tragi & Herbariorum. Campanula Fuchf. & Archangelica quorundam. Aduers. pag. 139.*



lege lin. 14.

TRACHE-
LIVM mi-
nus. *Aduers.*
139.

lege lin. 14.
alsi modo crescit.



EPIMEDIUM.

Belgij hortis hodie in quillina facta stirps, ubi sapillimè flores inter folia recondit, qui minus supra folia se exerunt, ut pictura docet; specie si, quaternis foliolis, intercurvantibus lineis albis variati, quorum ora & aversa pars tubent: interna flavescit; medij apiculi vident.

TRACHELII varietates.

Passim istud etiam alperis, saxosis Angliæ & Gallobelgij syluosis fructat: sed strigosius, hians minus & aucto aspectu: alioqui possit esse & congener.



TRACHELIVM *minus*.

Radice fibrosa purpurarubentibus floribus stipatur, alioqui ceteris haud ita abfimila.

TRACHELIVM *maius Belgarum*.

Priori facie assimilatur, & prorsus idem foret, nisi alterum caulium proceritate, foliorum longitudine & magnitudine duplo superaret. Flos cartuleus, Viola Marianæ super.


Anglicum Septentrionale maius TRACHELIVM *candidum*.

Semina venusta & rarissima plantæ hoc anno quam hæc meditarer, ad me misit D. Thomas Pennus Medicus Londinensis stirpium doctissimus, ex boreali Angliæ tractu delata, ubi copiosa & nusquam alibi, vel à quoquam observata. Tota facie Ceratocizæ maioris iam descriptæ non abfimilis: sed folia ferè digitalis; Flores item Trachelij vel Violæ Marianæ candidissimi & maiores & longiores. Caulis binum & ternum cubitorum surrectus. Radix fibrata, crassiuscula, lactescens, variè diuaticatur. Semen Trachelij, sed maius.

Lactescens CAMPANVLA *maior*.
*Pyramidalis Luceiana.*CAMPANVLA *persicifolia nostras*. *Advers. pag. 139.*
Phytoua Matth.

Quod plus aliis cunctis lactis fundat, Lactescens hæc merito dicta; cuius ima folia Solani hortensis & nigre Martiæ violæ media, leuia, atroirètia. E radice fibrosa Violæ Marianæ, turgida iaculo iucco, adeò viuaci, ut vel tantillo frustillo infosso, repullulet: caules emittit tennes ternum & quatuor cubitorum, à medio summo tenuis foliis angustioribus, longioribus, copiosis floribus amantis, careuleis, campanulæ nostratis maioribus, nolas item experimentibus, cinctos, in æptum Pyramidalis ritu fastigiatos, vnde Pyramidalis dicta. Belgio hortensis, nullius vsus hæctenus comperi.

CAMPAN-
ULA minor
rotundifo-
lia.



RAPUN-
TIVUM
ma.

Leg. silv.



RAPUN-
TIVUM
maius. Ad-
uerf. pa. 140.



Leuco-
purpurea
Scabum.



CAMPANULA minor rotundifolia. Aduers. pag. 139. Cantabrica Plin. Anguil.

RAPUNTIVM parvum. Aduers. pag. 139. Ital. Rapunzolo.

Lege accu-
sata.

Rapunculi floris colore varietas. { Albis floribus secus Brugellette Hannoniae oppidulum variat.
Lactis copiam augeri quaedam nutrices elixa radice, ex pipere sum-
pta, exploratum habent.

LEVCOIA Diosc. Aduers. pag. 141.

Viola matronales Fuchs.

DIOSCOR. Lutea praecipui in medicina usus. Huius aridi flores servasacti in defensionibus, valent contra vulus
inflammationes, & menstrua expellunt. Sanant oris ulcera cum melle; cum cerato rimas sedis. * Semen dtuum drach-
marum pondere ex vino potum, aut cum melle inditum, menses, secundas & partus extrahit. Radices cum aceto illita,
lucnem expriment, & podagricos iuvant.

† Idē Hipp.
Aegin. idem.

Agin. Viola alba frutex vniuersus extergit, & tenui essentia constat, plus tamen flores, atque in-
ter hos sicciores, ideoque menses praecipit, foetum perimunt & eiiciunt. Verum si quis eius vehemen-
tiam aquae admittione hebetauerit, ad inflammationes etiam conferet, praecipue vteri. Radices aqua-
lis facultatis sunt, nisi quatenus crassiore, & magis terrestri substantia. Cum aceto inflammationibus
schiirho induratis illitae succurrunt.

Idem Gal.

LEVCOIUM floribus luteis, KEIRI Arabum.

Belg. Sici violieren. Angl. Walle gpllofer, wal gelouer,
and fletch gelouers. Hisp. Alhelys.

LEVCOIUM marium minus, flore purpurante.

Aduers. pag. 141.

Hesperis Theopb. quorundam.

Inclusa bene
olet inposita.
quae?



KEIRI, sive LEVCOIUM marium flore luteo.

Luteum marium facie keiri vulgaris, sive mediterranei Leucoij lutei floris: folia haec viridia, sed
maiora, latiora & flauentia ex viridi.

Varietas.

Albi floris colore duntaxat variat, & folij exilitate haec leucoij maridimi species, utraque in Belgij
hortos translata.

Patauinum marinum LEVCOIUM,
Erucæ peregrinæ Clusij.



LEVCOIUM *marinum alterum latifolium.*



Hanc alebat Melchiorus Guilandinus stirptum summus explorator, in celeberrima & antiquissima Patauina Academia simplicium medicamentorum professor, & Senatorij ibidem Venerorum horti præfectus. Folia illi Leucoij marini maioris & minoris media, concoloria, infernè angusta, quæ radicis cervici innituntur. Cauliculi sesquicubitales, in quorum summo flosculi lateoli stellati: semen Leucoij simile & par, compressum in tereti folliculo Thlaspi maiore.

LEVCOIUM *marinum alterum latifolium.*

Alterum Leucoium marinum quod alunt horti quidam Belgij navis maritimæ natalitæ, non ita diversis est foliis, sed latioribus, rigidioribus, hirsutioribus; flores caruleo purpureos in palmatis & sesquipalmaribus coliculis. Semen in siliquis minoribus nullo Leucoij luteo.

LYCHN: 3

LYCHNIS
CORONATA.

LYCHNIS coronaria. Aduersf. pag. 142.

Hist. & Ital. Lychnide coronaria.

DIOSCOR. Semen cum vino potum, à scorpione
idè auxiliatur.Calidum secundo, & siccum quodammodo or-
dine Gal.

LYCHNIS syl. rubello flore: an Hesperis Theopod.?

Aduersf. pag. 142.

LYCHNIS
SYLVESTRIS
A. 13.DIOSCOR. Semen duarum drachmarum pondere
potum, bilioso per alium ducit. Et à scorpione idè efficiunt:
autem etiam scorpiones torpescere, & ad latendum in-
efficaces reddi, hac herba ipsos apposita.

LYCHNIS siluestris hirta.

Lychnis syl. quinta Cuspi.

Alia non est ab similibus, quam è foliis hispida hie-
sutam dixerunt. E hirsuta & implexa radice com-
plures rotundi, genijolari, hirti, villosove furcilli, &
folia Nigellastri in illa & incano. Eios iuxta alas
suaue rubens Lychnidis siluestris: Semen in capi-
tulis sine calycibus videtur. Ocy mastu. Areis, se-
getibusque Gallo: p'ouincis & Nordonenis agri
gaudet.

LYCHNIS

LYCHNIS *fyl. prima Clusij.*
& *Beben albena Salamantinum.*

LYCHNIS *fyl. altera incana cauliculis striatis.*
Papauer Spumecum quorundam.



Rariozem multò, Belgio difficiliùs oriundam, mihi minime animaduersam fateor, sed posteris scite etiam à Carolo Clusio literis proditam, cuius idcirco indicium & descriptionem sequemur, vt gratiam nobiscum habeant, acceptamque referant herbarum studiosi illi, cui debetur.

CLVS. Geniculatos habet cauliculos, plurèsq; alas facientes, pedales aut maiores: folia in singulis geniculis bina, ternàq; interdum plura, angustiora quàm reliquarum, in virore candicantia, & quasi caesia: flores in summis ramulis, ex quinis non pluribus foliis bifalcis congestos, iactiore parte candidos, exteriore purpurascens aliquantum, & antequàm omnino tabescant, sese contrahentes & circumuolutes: calyces duros admodum, breues & subrotundos: semes paruum, rotundum, Papaueris rhœadidis sed cinereum conuenientes: radicem satis crassam, candidam, multifidam, sed non perennem. Quibus facultatibus sit prædita, compertum non habeo, degustata verò subamaro sapore deprehenditur.


Lychn. fyl. 2.
Clusij inter
Caryophyl-
los.

LYCHNIS *fyl. altera incana cauliculis striatis.*

Dodrantalìs hæc herbula Lychnidi marinc facie proxima, nusquàm, nisi in Gallo-provincia & Italia campestribus & vineis à me reperta: quinis & senis sesquivalmatibus rathulis & foliorum gemino posito, effigie & ortu humile Nigellastrum, siue Pseudomelanthium apprimè refert; sed quàm striati: conferim stipati semen claudentes florum calyculi, Lychnidis marinc. vniuersa planta albescit, gustu præficcò nonnihil calido.


LYCHNIS

LYCHNIS *fl. hirta minima.*
Lychnis fl. 6^a. minima Clusij.



VARIETAS. Quae aridis, saxosis collibus Narbonae & Salamanticae vicinis flores fert aliquando minores; odore sanguineo purpureo nitentes: rec alia sui parte dissimili, nisi quia tota delicatior pal- mum vix aequans: plantula hirta.

LYCHNIS *fl. 3^a. Clusij, cauliculis striatis.*



LYCHNIS *Chalcedonica miniata.*



Non diversae naturae aut figurae est Lychnis illa affabre à Clusio posteritati exhibita, geniculato cauliculo, sed paucioribus ramis concavo; & binis foliis è geniculis singulis virentibus magis rigidioribusque: floribus item iuxta alas, dilute rubentibus & calyculis cinereis amplis, striatis, ferrugineo cinereum reliquis minus claudentibus.

LYCHNIS *Chalcedonica miniata.*

Licetf. pag. 143.

Flas Constantinopolitanae Bod.

LYCHNIS *Chalcedonica ianas expurgat Sa-
 ponaria rivi.*

DESMOND

OCIMOIDES, sive OCIMASTRUM. *Advers. pag. 143.*
Lychnis hylaeastrum Dod. Polygonatum Tragi.

SPURMEVM papaver vulgo. *Advers. pag. 143.*
Behen album Monspel.
Polemonium Dod.
an Melandryum Plin. lib. 26. cap. 7.

OCIMASTRUM Valerianum bon. *Advers. pag. 144.*
Valeriana rubra Dod.
Valeriana rubra & Behen rubrum Beigarum.
Saponaria altera & Struthion Vlysis Aldroandii.
an CONDURVUM Plin. lib. 26. cap. 5.



Iecinoci herba Melandryum medetur, nascens in segete ac pratis, flore albo, odorata. Eius cauliculus conteritur ex vino vetere. Item herba chalcetum è vineis contrita imponitur.

OCIMASTRUM Valerianum bon.

Plin. Solstitialis herba flore rubro, quae suspensa in collo comprimere dicitur strumas.

Lege in *Advers.* Radice odoratiore, Valerianae aemula; cuius vires nonnulli referre videntur, sed imbecilliores; humido quippe excrementicio obtunditur in Belgio potissimum.

OCIMOIDES

COEUM OF-
POLYSPERMUS
POLYSPERMUS
144



LYSIMACHIA LY-
TEA. Belg.
geri Weide-
rich. Ital. &
Hisp. Lyfi-
racha. lege
Gal. Cor-
neolic. Ad-
ueri. 144.

LYSIMA-
CHIA pur-
purascens
Florant.
Lysimachia
Astrucian.
144. Paris
144. Ad-
ueri. 144.




LYSIMA-
CHIA fil-
iquola. Ger.
Wattm &
Rot Weide-
rich Delphi-
um Diosc.
Dalec. flos
& semen
quadrant.
Aduerf. 145.




CHAMAE-
NEPTON
Galeri-
Delphi-
nium buci-
num Diosc.
Aduers. 145.

Lysimachia
fruticosa va-
rietas.



LYSIMACHIA caerulea bertensia.
Aduers. pag. 145.
Veronica recta quorundam.



legitimus
ho. 1709
145

GALERI-
CVLATA.

raccuas mitridatia
et scordium appellat
vide plinij




Diosc. Foliorum succis adstringentem sua vi, san-
guinis reiectionem supprimit: dysentericis potui datur, et
infunditur. Mensium abundantiam sistit, in jesso. Sanguis
nis proflatio subuenit, si naues ea herba obturentur. Vulne-
rum cruorem cohibet, acerrimum nidorem suffusa reddit;
qua de causa serpentes fugat, & muscas interficit.

Eodem C.
J. in A.
Aegle.

LYSIMACHIA Galericulata. coronicopurpurea.
Aduers. pag. 144.


Riuulorum & fluminis ripas & depressos agro-
rum margines Londinensis & Antwerpiani agri se-
quitur hec. plures emittit quadratos sesquipediales
& bicubitales genicularos pediculos; in quibus
folia Lysimachiae purpureae similia, scordii emula-
tione atrouiteta, ex geniculis gemina, & quibus in-
str galericuli flores caeruleo-purpurescentes. Radice va-
rie diuaticata repit: ut nullidū haecens descripta
aut depicta, sic vsu neglecta aut incognita.



CONYZA media. Hifp. yerua de las
pulgas olorosa. *Advers.* 143.

CONYZA minima, minimè omnium glutinosa;
perperam *Conyza minor* Macchioni. *Psyllanthus*
Cordi. *Advers.* pag. 145.

After *Atticus luteus* Fuchf. & perperam *Calamintha* tertia.



Diosc. *Conyza* duo genera, quæ parva vocatur, edore præstantior est. maior verò, frutice altior, & foliis la- Met. Cony-
rioribus, gravioris utriusque folia oliva sumida, hirsuta, pinguis. in maiore caulis binem cubitorum altitudine attol- re maiori nõ
litur, in minore pedem aequat. flos fragilis, lutei aut fulvi coloris: qui in pappum abit. radices superuacue. Si frus- folia oleæ,
substratâque frutex totus serpentes fugat. culices abigit: & pulices necat. Folia convenienter illuminantur serpentium pia- neque pin-
guis, vi M. G.
gu, & tubercula, ac vulneribus. flores & folia cum vino ad menses partusque eijciendos bibuntur. item contra vrina- speltaceæ &
st: leidia. æquaturn morbum, & tormina. comitiales pota ex aceto adiuvant. Decoctum in desceptionibus medetur. idem Gal.
vulva malis. Impositus succus abortum facit. ex oleo efficaciter horribus oblimitur. Capitis dolores tenuis illa sanat. & Paulus.

Conyza media.

Est Tertia Dioscoridis *Conyza* minimè pinguis, multò tamen grauioris edoris, & inuidio-
sis, sed inefficacior. foliis mediæ inter maiorem & minorè amplitudinis præuenit locis humentibus; Galidem &
Belgio, Gallie, Italie, & Germanie familiaris. Paul.

Gal. & Paulo Maior & minor sunt tertij ordinis in calfaciendo & siccando: proinde oleum in quo
dixæ fuerint, febrium rigores per circuitum remanentes sedant.


Maior digerit & liccat potenter decocto & fomento.



Asp. Atticus
et Scopulorum
ASTER AT-
TICVS.



Aster Atticus
Loren.



ASTER CO-
NYZOIDES
GENARI.



ASTER ATTICVS *superius* Clesij.



ast. Attic. & Bobas. ASTER ATTICVS. Aduers. pag. 147.

Gal. Estoillee & aspergoutte menue. Hisp. Bobas.

Germ. Magerkraut / buchkraut & sternkraut.

Et Babonum, id est, Inguinaria & Inguinalis, quod inguinibus medetur.

Oculus Christi, Monspel.

Diosc. Quaceniem ambiunt folia stella modo radiata, oblonga, hirsuta, feruenti stomacho, oculorum inflammationibus, prociua sedi, ac inguinibus, illius auxiliatur. Tradunt purpureum florem, si ex aqua bibatur, arginis, & parvis comitiali malum sentientibus, optulari. Inguinum inflammationi recentem illucere conuenit.

Argin. Mixtam facultatem, discutientem & refrigerantem sortitus est.

Argin. eadem.

lege per familiarum.
lege Aster luteus fruticosus, lin. 14.
& lin. 16.
Nemaufum, lin. 49.
lege montanus.

ASTER Italorum flore purpureo luteo. Aduers. 147.

Nonnusquam in Galloprovincia, Narbonensi Gallia & Longobardia occurrit hic Conyzae facie: floribus non modò luteis; sed mixto luteo purpurascens, foliola radiantiu stellatum amulatione exerentibus: nec secus in pappos dehiscensitu & ortu Asteris Lunariae folij Narbonensis; maioribus tamen, caeteroquin omnia cum luteo eadem. Belgii hortensis est.

pag. 148.
lege lin. 17.
similia.

GLASTVM satium. isáre nuspor. Gal. Guesde & pastelcultine. Angl. Wode & wade. Germ. Wepdr. Belg. Weedt. Hisp. Pastel. Ital. Guado domestico.

Aduers. pag. 148.

ASTER CONYZOIDES.

CONYZOÍDPS GESNERI.

In Anglia, Belgio & agro Louaniensi iuxta academiam pomeria frequens hic oritur: facie, folijs & surculis dodrantalibus, interdum & maioribus Conyzae minimae, flores asteris obsoleto luteo in pappos dehiscens.

ASTER ATTICVS supinus Clusij.

Virgultis exit crebris, hirtis; humi fusis, ab vna radice prodeuntibus: folia edit oblonga hirsuta Lychnidis aut Stellae atticæ, numerosa & viridiora, flos luteus buphthalmi aut Chrysanthemum sponte oritur quibusdã Castellæ locis Clusio auctore.

GLASTVM satium.

Diosc. Illa folia tumores omnes discutunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt, ignem sacrum, phagelanas, putrescentia vlcera, & qua serpunt, sanant.

Ex dem Gal. & Plin.

Subdit Gal. Satium tumores œdematodes mitificè discutit, si nul & reprimat, omnibusq; vlcerebus malignis mirabiliter resistit, etiã si putrescãt, etiã si erodãtur. Quod si quãdo laborantibus natura valdior appareat, folijs elustritis aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticeam, aut polentam, pro vincente in vnoquoque affectu, miscere oportebit.



ISATIS fl. *Vastaria dista*: *Thamnochemon Corii*,
Glossum primum Angul. Adverf. 143.


Isatis dypsis
 Isatis syl.
 Ger. Wild
 kraut. Belg.
 Wild wort.
 Angl. Wild
 Washe &
 woods. Gal.
 Pastelloua-
 ge. Hisp. pa-
 stel salvage.
 Ital. Guado
 salvatico.
 Aduerf. 148.



LYTREA
 Belg. mon-
 nez. Gallo-
 belgis V Van
 de Germ.
 Arbet spinn.
 men. Antie-
 rhinum
 Tragi. Ad-
 uerf. 149.



SEBANDI
 DES PANZI
 Clusij.



SYLVESTRE *Glastrum*.

D: ose. Eadem qua & supradicta praestat: potu & illi tu lienosis auxiliatur.

um. Filia.


Gal. Sylvestre potentissimè humidis putredinibus obfistit; ad cætera verò iam comprehensa deterior: immoderatus enim & cum mordacitate deficcatur; talia namque irritantur hoc pacto, & phlegmone granari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienosis quoque vilis est, quum altera prodelle nondum possit.

SESAMOIDES paruum Salamanticum Clusij.

His accersenda videtur ea herbula, (nonnulla ducti similitudine) quam icone & descriptione Sesamoidis minoris Salamantici nomine, posteritati patefecit in hunc modum C. Clusius. Ab vna perenni candida duriuscula & crassiuscula radice, plures cauliculos emittente, lini folijs densis, à medio summo tenus flosculis racematim, initio ex herbido purpurantes, deinde villis expallentes, è quorum medio veluti quatuor grana viridia conspiciuntur, quæ decedente flore in filiquas excrefcunt, semine exili nigricante plenas. In collibus Salamanticæ proximis provenit lapidoso solo, vbi Maio floret, & subinde semen profert.

EPHEMERON Matthioli, vel potius *Ephemerum spurium*. *Giglio matto. i. Iris fatua* Matth. Anamensisibus.

TITHYMALVS *Paralius*. Germ. *Zee wolf's milk*. Hisp. *Leche trezna*, *Lletrera marina*. Ital. *Tithymalo matino*. *Aduers. pag. 150.*



Characie & Myrtinri si-
nole ad vna
reconditur
Diof.

Herbariorum sedulitate Belgij hortis indigenam factum est; quod *Glasto* vel *Lysimachijs* annectendum videtur foliorum qua. lam & plantæ de facie affinitate: folia quippe *Lysimachiz*, *Glasti* aut *Luteolæ* media, in sesquicubitalibus cauliculis densis, multisque alis concavis, flosculi candidantes *Verbasci* nigri, quinario foliorum numero. Semen pusillum in rotundis lini pericarpis oclusum, radix multum fibrata. *Humidis.*

M. V. R.

ISATIS fl. Vaccaria dilla: Thamerneumon Cordi.
Glossium primum Angui. Aducrf. 148.


Isatis alypia
Isatis syl.
Ger. wild
kraut. Belg.
wild wecht.
Angl. wild
madde &
wode. Gal.
Isatis alypia
Hisp. pa-
sot saluage.
Ital. Guado
saluatico.
Aducrf. 148.



ITROEA
Belg. mon-
da. Gallo-
belgis V Van
de Germ.
Wicherspin.
mon Antic-
rhinum
Tragi. Ad-
ucri. 149.



525407-
2 es parasit
Clusj.



SYLVESTRIS *Glastrum*.

Diosc. Eadem qua & supra dicta praestat: potu & illi tu lienosis auxiliatur.

12m Plin.


Gal. Sylvestris potentissimè humidis putredinibus obfistit; ad cætera verò iam comprehensa deterior: immoderatus enim & cum mordacitate desiccatur; talia namque irritantur hoc pacto, & phlegmone grauari incipiunt. Cæterum ob facultatis robur lienosis quoque utilis est, quum altera prodelle nondum possit.

SESAMOIDES *paruum Salamanticum Clusij.*

His accersenda videtur ea herbula, (nonnulla ducti similitudine) quam icone & descriptione Sesamoidis minoris Salamantici nomine, posteritati patefecit in hunc modum C. Clusius. Ab vna perenni candida duriuscula & crassiuscula radice, plures cauliculos emittente, lini folijs densis, à medio summo tenuis flosculis racematim, initio ex herbido purpurantes, deinde villis expallentes, è quorum medio veluti quatuor grana viridita conspiciuntur, quæ decedente flore in siliquas excresecunt, semine exili nigricante plenas. In collibus Salamantica proximis prouenit lapidoso solo, vbi Maio floret, & subinde semen profert.

EPHEMERON *Matthioli, vel potius Ephemeron spurium. Giglio matto. s. Iris fatua Matth. Ananensibus.*

TITHYMALVS *Paralius. Germ. See wolfs milch. Hisp. Leche trezna, Electera marina. Ital. Tithymalo matino. Aduers. pag. 150.*




Characis & Myrtinifimile: ad vna reconditur Diosc.

Herbariorum sedulitate Belgij hortis indigenum factum est; quod Glastrum vel Lysimachijis annectendum videretur foliorum qua. lam & piante de facie affinitate: folia quippe Lysimachijis, Glastrum aut Lutetole media, in sesquicubitalibus cauliculis densis, multisque alis concavis; flosculi candidantes Verbasci nigri, quinario foliorum numero. Semen pusillum in rotundis lini pericarpis oclusum, radix multum fibrata Isidis.


MYR-

MYRSINI-
tes Myrtili-
folius, Myr-
sina Gazae,
Ital. Tity-
malo Mirtili-
nito.




leg. macro-
nata.

TITIM-
a v. s. s. s.
Cypria
in v. s. s.
Trag. in
S. s. s.
Wolff. in
A. d. c. s.



TITHY-
MALVA cy-
pricaria,
Diosc. Eadē
vis quae su-
perioribus.
Aduers. 151.



leg. Cypre-
sius.

Perperam
Etilaminore
Ital.

PITTYA,
sive Pitta,
Officinam
Etilaminore
Turpan
in v. s. s.
Trag. in
S. s. s.
Wolff. in
A. d. c. s.



Anal. sive
specimen
Hisp. sive
menor.

leg. H. s. s.

specimen
Hisp. sive
menor.



MYRSINITEIS, Myrsini folius. Aduers. 150.

Diosc. Similis suapte natura daphnoidi, mordaci gustu. Succus, radix, semen, folia, consimilem Characis fortiter facultatem, sed ad citandas vomitiones inutilior hac est.

TITHYMALVS annuus Pityusæ facie.

Pityusæ simillimus hic Tithymalus; sed varietas cernitur in radice lignosa, quæ non serpit, & floribus, qui in umbellis pluribus à medio, summo tenus, caule cubitali, exeunt. Hunc Mutoni nostri hortus & plures alij sponte nascentem habent.

ESVLA EXIGVA Tragi.

Omnium Tithymalorû minima est Esula exigua Hieronymo Trago memorata. In nostris segetibus Gallobelgij & Angliæ sæpe æstiuo tẽpore reperitur cauliculo palmum & fessupalmum longo, paucis folijs Tithymali cyparissiz breuioribus & minoribus multo: flosculis item luteolis & herbaceis, summis pediculis, & iuxta alas, & semen exile tricocon edentibus. æstiuã planta.

ESVLA DVLCIS in Erino. Aduers. 216.

Dulcis quia cæteris minus acris, vultu Pepli siue Rotundæ Esulæ: caulis sequepedalis flos: & semen vt peplus; sed folia paulo longiora.

MESVE. Maior viscera vicerat, ob id perniciofa. Parua est præstantior, præsertim cortice radicis tenui, leui, fragili, subrubro castiæ modo, ante sex menses collecto. Nam recens quo mense collecta mala est, vi & niger, & orta loco aliquo prope thernas. Colligenda est Veris initio. Lac autẽ quod calidius, acrius, ac valentius sine Veris. Calida sicca principio tertij gradus, substantia constat tenui, igne acri, incidente, tenuante, fundente, siccante, aperiẽte: & terrea styptica etiã siccante materias altius immerfas. purgat valẽter pituitã, aquas, atram bilem etiam à iuncturis: ob id harum doloribus confert, & hydropi insigniter, se diuocet cordi, stomacho, hepatis, viscera excoriat, venarum ora dirumpit, corpus immodicẽ siccat, semen absumit, febres inflammando excitat, lacte suo maximẽ. Ob id miscenda ei sunt cardiaca, stomachica, hepatica, adhuc glutinosa, cogentia, & adstringentia: glutinantia vt gummi, tragacanthum, bdellium, mucago psyllii, succus portulacæ. Postremò refrigerantia, & calorem illum extinguentia. Infundatur ergo in acetum, præsertim quo cydonia sunt macerata aut decocta, & succum intybi, vel sonchi, vel portulacæ, vel solani: additis autem myrobalanis, absinthio, aloẽ, præstantior euadit. Indæus infundendo in acetum, aut lac sæpe mutando, & siccando corrigebat. Si te autem immodicẽ purgat, sede in aqua frigida ex Rusi consilio. Frigus enim ambiens & medicamenti virtutem in vnum cogit, ipsamque roborat, & per accidens iuuat, propterea à se materiis ad meatus per quos sunt vacuanda, succurrendumque est, vt in canonibus diximus.



Pityusæ speciem alunt Belgæ stirpium peritiores spithameum & pedem alam, foliis Esulæ paruz. Flosculis rubris & semine Pepli, pyridata pelte rãne foliola unipinnitibus, Tithymalorum rãne.

PITYUSA.

Diosc. Detrahit per acetum radix drachmis duobus data in aqua mulsã; item feminis drachma: succi cum farina subacti cochlearium, in catapota hæret. Modus sororum drachma tres.



ESULA maior Germanica. Turbith nigrum & adulterinum. Gal. Turbith noir.
Hisp. Esula mayor. Ital. Esula maggiore. Aduers. 152.



Radix aceto maceratur, eadem ratione quam miscerant salem & acetum Elleboro antiqui, quò
Deme & As-celenus exigeretur Helleborus, vti suo loco nonuimus. Inflammationem enim aut caloris impressio-
 nem quæ fieri solet à medicamento cunctatione, auerit.

Radix *Esulae maioris* aceto & lacte preparatam in puluerem redactam à granis 12. ad grana
 16. enmate infundere solemus, & in medicamento cholagogo grana 6. vel 8. sine molestia: pituitosis
 verò ad tempus tantillum submolestum, quia ægrè pituita expellitur. Angliæ frequentissima in
 sylua D. Ioannis Coltes, prope Bathoniam.

DENDROIDES. Ital. Titymalo arborco.
Aduers. pag. 152.

CHARACIAS Monspeliensium, Clusij, &
Matth. Aduers. pag. 152.

*Esula Myrtili
 species: & pan-
 ta post lege
 frutice.*



Diosc. Eiusdem effectus cuius superiores, similiq; modo reconditur.

CHARACIAS Monspeliensium.

Quem nostra ætate scriptores & Monspelienses Characiam genuinum statuerunt, Platyphyllion
 (vt fieri solet, ignoratione & penuria meliorum) opinati & tutati sumus, quòd huic præ cæteris folia
 inessentialiora, vt Plinio etiam visum, ad violæ albæ & minimi syluestris verbasci acet dentia, simili-
 tudine, ortu & paritate, latifolium hunc dici oportere. Sed cùm aliū insuper nactus sit C. Clu-
 sius omnibus notis melius quadratè, de quo mox dicemus, ei libè assentimur. Malumus vera prode-
 re & sententiam mutare (non enim adeo nobis placemus) quàm, Senecæ exemplo, maximo detri-
 merito non modò tyronum, sed & doctorum quam platimorum, ad nostratam gloriã effigies cõcin-
 nare & detorque, aut apros syluis appingere. Est enim Characias hic vt plurimũ vnicauis, interdũ
 plures caules emittens cubitales, & bicubitales, cæterorũ tithymalorũ ritu inferiore parte glabros: folijs
 latioribus, longioribus, & rigidioribus prægrandis Pisyus sine *Esula maioris*, Flores Maio & Iunio,
 non luteoli, sed nigri, & semen trilaterum circinata foliola traieciunt. Radix digitũ crassitie æquat. In
 Narbonæ, Gallo provinciæ, alijsque quamplurimis Gallie locis saxosis, collibus & fluentum ripis,
 nihil frequentius, etiamque ad Lanii crepidines, & pontem Castri noui.

CHARACIAS.

*Diosc. Succus alius pergar. et abie pituitam bilemque, vniu obois in posca sumptis, & cū aqua melle, vici-
 ciones mouet. Appetente videriariarum tẽpore, succus congestis ramulis, non dissectis, & vase conclusis, excipitur. A-*

si qui adijciunt farinam crui, & in pastillos digerunt, qui crui magnitudinem implent. Alij in aridas ficos, ternas quaterasque guttas instillant, ut cum his marescant: quas ad vsu recondunt. Per se etiam rufas in pila, & in pastillos coactas reponitur. Porro cum extrahitur lac, neque quod ventus aspires, siare quonquam, neque manus oculis adiacere convenit, sed antequam colligas, corpus, praesertim faciem, collam, scrotumque genitalis, adipe, aut oleo cum vino perungere. Fauces autem consperat. quae propter catapotia cera aut decocto melle, oblini par est, & hoc modo davi. binas tamen ternasque ficos, purgationis gratia sumpsisse satis est. Recens lac ex oleo, perunctos in solo capillos evellit, renascentisque flavos & exiles efficit: denique omnes perimit. Dentium caueynis incisum, leuat dolores. sed cera dentes obtinendi, ne suo delapsu, fauces & linguam vitiet. tollit illius impetiginis, fornicantia verrucas, pensiles, & quae thymis florem representant. valet aduersus pterygia, & carbunculos, phagedenas ulcerum, gangrenas, fistulasque. Legitur semen autumnis, & siccatum sole leuiter tunditur, serueturque loco mudo reponitur. Foliantem siccantur. Semen & folia lactei succi effectum praebent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisso cum lacte lepido, & caseo contuso. Radix drachma pondera in hydromelice pota, per inferna trahit. decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

† Gal. quia valenter tum excalfaciunt, tum extergunt, si in tempore & moderatè vtare, iuuare aliquando poterunt. Verumenimvero & fistularum callos eximunt eadem facultate.

Gal. Tichymali omnes vincentem habent acrem calidamque facultatem: inest verò & amarus. Validissimus est itaque eorum liquor. secundum locum tenet semen, & folia: sed & radix dictarum facultatum pariceps est, sed non ex a quo. Sanè ipsa cum aceto decocta dolores dentium sanat, maxime qui illis erosio proueniunt. At liquores ut qui valentior vim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur: ceterum si aliam corporis partem contigerint, continuo adurunt, vlceraque: proinde foris illis cera circumlinitur: quippe cum ex quarto sint excalfacientium ordine, quem esse adurentium posuimus. Sic pilos quoque succus inunctus tollit. Porro cum vehementior sit, oleo miscetur: & si id saepe fiat, tandem prorsum pilorum radices adusta extirpantur, corpusque depile reddetur. Eadem facultate verrucas, qua acrochordonas nominant, & myrmecias, & pterygia siue oculorum vngues & thymos auferunt, detergentque: lichenas & psoras, quia scilicet & abstergendi facultas inest propter amaritudinem. Porro cum septè sint eorum genera, valentissimus est què Characià nominant: què vitic; etiam quidam mare cognominant, & femina nuncupata Myrsinites, & qui in petris nascitur, ad modum arboris, deinceps qui verbasco adsimilis est, & Cyparissias: deinde paralius siue marinus; denique helioscopius. Proportione verò eò; rebese illerum facultatis & cinis, & ex ipso lixiuum erit. Ceterum hæc omnia genere quidem similiter, in becillius tamen & folia & fructus prestare possunt.

M E S V R. Tichymali omnes cordi, iocinori & vetriculo maxime officiant, vasa dirupunt: intestina abradunt; vniuersum excalfaciunt corpus. adeo vitic de febres facillè coëcitetur. Tollitur prima Tichymali noxa ijs admistis quæ cor, hepar & ventriculum roborant. Secunda verò & tertia ijs, quæ agglutina-

toria facultate possent; cuiusmodi sunt Tragacanthæ lacryma, gummi, Bdelliū, Pnylij seminis spissamentum, & Portulacæ succus. Tollitur & quarta admistis frigidis & humidis. Proinde aut Sonchi succo aut Intybi, aut Portulacæ, aut horretis solani, aut aceto cum cydoniorum seminibus diutius rudicula agitato commiscant. Vulgaris vsus Tichymalis pituitam vehementer deiecit, & atrum què vocant succum pariterque; pituitas ad articulos decurrètes. Aquam inter eam validissimè extrahit: nihilo secius exsiccat vniuersum corpus, & genituram exstringit. vnde Rusticorum medicamenti nomen sibi merito asciuit.

Monspeli AMYGDALOIDES.

Characias primus Dod.

Monspelliensis agri ad Crepidines Lani eis potem Castri noui; item Lugduni ad pomaria peninsulae Gallicæ Aynex, (quæ fluminem inguina dixerit) Aurelia, Biturigibus & alibi Gallia plurima. folia Characis Anglicæ, sed longiore, molliore, & longe maiore, latiore, magisque sparsa feruntur peltata comaradix fibrosa. Semen in Belgium deferendum Monspelij tradidi.

A E V L. Ad verrucas tollendas. Tichymali lactem mixtum cum harrachij herbe succo si in verrucas impofueris, tertio die sanabit. Ad fistulas. Tichymali succum cum vino mixtum superexpromito, deinde caeteris fomentis obligato. Ad lepram. Tichymali florem cum resina decoque, & leprosum illine, non sinet crescere.




CHARACIAS VARICTAS.

Varietates.



MYRSINITES altera, & Turbith Alexandrinum
quorundam. Characias quarta Dod. &
Belgarum.

PLATYPHYLLUM Hispanicum.



Cognatiorem multò Characiz quam Myrsinici Tithymalo putarunt Belgæ, quamvis priusquam umbellas pandat, suprema folia proferat occlusa, quæ veluti nucem Amygdali adumbrare videantur: folijs tamen pallidè virentibus characiz æmulis, sed minoribus angustioribusque: fructus & flores luteos herbaceos cæterorum Tithymalorum ritu gestat: radice crassa altè depacta. E Narbonensi agro & Galloprovincia in hortis Belgicis alitur.

PLATYPHYLLUM Hispanicum.

Platyphyllum legitimum eruditissimi Clusij nostri sedulitate & opera innotuit; cui hoc in Valenino agro inter Biar & Huentimente via salebrosa inter medios frutices reperit. Folia quam Amygdaloidis aut Characiz latiora, rotundiora, lætius nouella: figura proxima viridia densaque. Caulis sesquidrantalis: Flosculi purpurantes ex luteo, itidem umbilicata folia traicientes: radice crassa & candida.

Diosc. Platyphyllus Verbasco similis. Radix, succus & folia per inferna trahunt aquas. Piscos necat, tu-
sus & aqua inspersus. Reliqua Tithymalorum genera quæ supra scribuntur, idem efficiunt.

Eadem Gal. celerrimè namque in veriginem acti, ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem
seruntur.



ⲛⲓⲧⲁⲓ PEPPLVS sine Rotunda ESULA. Gal.
 Refucille marin des vignes. i. sigillum matuti-
 num vinearum. Germ. Teuffels milch. Diabolicon
 lac. Hisp. Peplo. Aduers. pag. 153.



ⲛⲓⲧⲁⲓ PEPPLVS. Hisp. Peplide.
 Aduers. 153.



LATHYRIS sine CATAPUTIA minor.
 Aduers. Germ. Spingkraut & Spinkraut, Ce-
 riehoerter. Belg. Spingkraut est Dyurgie Ital.
 Catapufa minore. Hisp. Tactago. Gal. Elspurge.
 Aduers. pag. 153.



Diosc. Grana gustu dulcia. Nulli radices vsus.
 totus frutex lacteo succo turget, vsi Tithymali. Cran-
 sex aut septem in catapotio, aut cum suis, aut palmulis
 denorata, aluum purgant, sed aqua frigida postea ser- Idem Gal.
 benda trahunt autem bilem, pituitam, & aquas. Suc-
 cus, tithymali modo exceptus, eundem effectum pra-
 ebet. Cum gallinaceo aut oleibus solis decoquuntur
 ad eosdem effectus.

PEPLVS.

Diosc. Fructus insus & seruesactus recondi-
 tur. Bili ac pituita detrahitur, aceruulo eius in hy-
 dromelisi cyatho potu. obsonijs inspersis conturbat al-
 uum. muria conditur.

Tithymalis
 vis similis.
 Gal.

ⲛⲓⲧⲁⲓ PEPPLVS.

Diosc. Colligi, reponi, ac dari, vsi peplos, &
 sale condiri solet. Usidem habet vires.

Sale conditur ad accelerandam operatio-
 nem, Tithymalorum modo expurgat Aegin.


CHAMÆSYON Aduers. pag. 154.

Diosc. Rami ex vino triti valde dolores sedant, in peso appositi, tollunt tumores, ac verrucas omnium generum
Eadem Gal. illiri. Decoctorum cibo alius resoluitur. Succus simili effectu p. odest: illitu contra scorpionis ictum auxiliatur. Aduer-
sus caligines oculorum vitilis, & hebetudines; incipientes suffusiones, tuberculas, cicatrices, cum melle immixtus.

Gal. Abstergendi simul & acrem vim possidet. Hebetudinem visus à crassitie natam adiuuat:
eum melle & oculorum crassas cicatrices deterget.

APIOS. Aduers. pag. 204.
Tithymalus tuberosus Dod.

NERION. Hisp. Adelfa & Eloandro.
Ital. Oleandro. Aduers. 154.



Iege flosculos
ex luteo pal-
lidis.


B. LIXXV
Spain.

Diosc. Radicis superior pars vomitione bilem pituitasque extrahit: inferior per alutam. Tota vtrinque purga-
tiones mouet. Succum si libet eximere, rusa radix in fistula mergitur & agitata aqua, quod supernat at prima selectum,
exiccatur. Purgat utraque parte is succus, sesquibolo potus.

NERION.

Diosc. Flores & folia multa, canibus, asinis, & quadrupedum plurimi venena sunt: hominibus verò contra
serpentium morsus praesidia, è vino pota; eo magis ruta addita. Imbecilla etiam animalia ut pecus & capra, si aquam
bibant, in qua folia ea maduerint moriuntur.

Gal. & Aegia. fons illitum dissipari intra verò corpus sumi lethale est.



Nelron
Alpigena




Alpigena
CHAMADENDROS
odora.
Aduerf. 145

Balsamum I-
talicum vul-
gare, siue
Rhododa-
phne parua
rustica, Te-
rionarcha
Plinij puta-
tur Guilla-
dino.

lege minora,
breuiora.
155. lit. 1.

BALTIMYR
Alpinum



MESSEYIA
Germanica,
an Chamad-
daphne
Diof. 2
Chamela
Germanica
Dod & Tra-
gi: Peperam
Daphnoides
Fuch.
Germ. Teuf-
kraut & hel-
schale, zets-
delbalt, Reis-
land Belg.
Kerlhart &
Aduerf. 155

lege synony-
morum
lit. 1. pag.
156.

lege Augu-
sto. pag. 155.

Alpigena



Alpina CHAMÆRHODODENDRI odore varietas, BALSAMVM Alpinum Gesneri
& Rosa Alpina, vera Euonymos Theophr. Dalechamp. & Herbariorum.

Huius affinem & per similem speciem Balsamum Alpinum fecerat Gesnerus. Sirculi paulo
crassiores, folia simillima: cuius ora tantilla hirsutie pubent, auersa parte xerampelina. Flosculi
Rhododendro minores, & confertim stipati. Helvetijs & Ailobrogis montana est.

CHAMÆDAPHNE.

Mutuus.


An Sigillum Salomonis angustifolium sit Chamædaphne Diosc.?

Diosc. Illinuntur capitis doloribus trita folia. Stomachi ardores mulcent. Ad sedanda tormina in vino bibuntur. Posus cum vino succus menses & urinam ciet. Idem facit pesto appositus.

DAPHNOIDES sine Laureola cum flore.
Advers. 156.

LAVREOLA cum fructu. Germ. item Zeland.
Gal. Laureole. Ital. Oliuella.
perperam Thymelæa Tyagi.

Demein
margine
Laureola pin-
genda.



DAPHNOIDES.

Diosc. Folia Lauri, quorum gustatu, os & fauces incenduntur. Pituitas extrahunt recentia, vel arida in
potu. Menses ciet & urincus, caput in anis commouenturum. Stomachicis in aqua, Bacca quindecim parte siccata
rosolantur.



GRANUM GNIDIUM, Thymelaeae fructus. Aduers. pag. 156. 157.

DIOSCOR. Per inferna bilem, pituitam, aquasq; detrahit, si viginti granorum pars interna bibatur. Verum fauces adurit, itaq; cum farina aut polenta, aut in vasa acino dari debet, aut melle cocto obductum deuorari. qui egre deficiunt, trito semine cum nitro & aceto, inungitur. Folia, quae peculiariter cneorum appellantur, per messes colligi debent, & siccata in umbra recondi. Quibus dare libeat, antea tundere, & nervos exinere conuenit. illitum acetabuli modo cum diluta vini portione, aquam extrahit, mentoerius purgat, addita lente cocta, aut contritis oleis. Thymelaeae farina vna acerbata succo excipitur, & in pastillos diniditur. herba stomacho infesta, partus imposita necat. Nascitur in montibus & aphis. Hallucinantur, qui coccon gnidium fructum esse chamelae existimant, decepti quadam foliorum similitudine.

CHAMELAEA & Thymelaeae Diosc. est Cneorum Guilandino. Aduers. pag. 157.

DIOSCOR. Folia gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahunt pituitam bilemq; foliis praesertim in catapotia sumptis, namq; dua Absinthij partes, adiecta chamelae vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia cogentur. Ea autem in ventre non liquefunt: siquidem quotquot fuerint deuorata, regeruntur. Folia cum melle tritis, sordida ulcera & crustosa repurgantur.

Gal. Vincentem habet qualitatem amarum; quamobrem sordida ulcera, & quae maximas habent crustas, cum melle purgare potest.

CHAMELAEA incana Bononiensium.

Maritimis Bononiensis agri, facie & vultu Doryenij Monspelliaci incanam Chamelaeam cubitalibus virgulis reperit eruditissimus D. Hermes le Clerc, Medicus Neruiensis, qui plantam aridam mihi impertiuit.

ESVLA rara è Lio Venetorum in floribus purpurascens, an Pityusa Diosc. Aduers. 160.

ALYDUM montis Ceti. Aduers. pag. 158.
Est Ptarmica & Conyza 3^a quorundam.
Hippoglossum Valentinum C. Clusij.
An Calcifraga Diosc.?



Hic eadem
est quae
in Aduers.
Pag. 159. sed
nulla.

TURBITH, sive TURPETVM.
Aduers. pag. 159. 160.

Pituitam crassam, pulmonum farctus & articularum, remotiora abditissimaque excrementa pituitosa educit. Decocto quam infuso efficacius suas vires exerit & exuit; vt appositè annotauit D. Petrus Brugelius almae vniuersitatis Louanicae Regius professor celeberrimus, qui suis decoctis vnâ cù polypodio inseri iubet. Magni vsus & commodi ad omnia de Mesuei Turbitis prodia, de quo suo loco dicemus.

Legelin. 27.
Puff. com. quasque arripuit.

Turbith Me
suei prodia.

TARTONRAIRE Gallo-prouincia Massiliensium.
Sesamoides maius Scaligeri.



AIZOON, *Sempervivum maius*. *Aduef. pag. 161.*

Hisp. Siempre viva maior, yerua puntera.

Gal. etiam triquemadame.

DIOSCOR. *Eius vis refrigerare, & adstringere. Medentur igni sacro, nomis, vlcibus qua serpant, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris, per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfunditur. datur in potu contra phalariorum ictus, dysenteriam, aluiq; profusiva. teretes tinea potus in vino excutit. subactus in vellere, mulierum abundantiam sistit. succus oculorum lippitudinibus sanguinis vitio conceptis inungitur.*


Gal. Vtrumque, tum maius tum minus, deficcatur leuiter, quandoquidem & mediocriter adadstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expertus; quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea: cæterum non mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine & recessu refrigerantium. Hinc etiã ad erysipelata & herpes & phlegmonas à fluxione natas accommodatur.

Eadem A. gineti.


ALOE. *Aduef. pag. 161. Sempervivum maritimum.*

Sedum amarum Columella Dod.

Hisp. Azeuar & herba Bauefa.



ALOE folio mucronato. Aloe America Clus. *Aduef. pa. 161.* Valerianis filij aguil. i. i. filium & acris dicitur. Clusio auctore, quod saliorum extremæ pinnæ, acris, & fibræ interiores hinc vicem præstent.



DIOSCOR. *Ad glutinanda vulnera sanè quam viliis Arabica. Natura eius est fissare, exicare, sanum allicere, & corpora censare, aut resoluere. stomachi reprobos diuini cœdicaria macerata, in aqua frigida aut egula potus.*

poti. sanguinis reiectiones sistit. regiam morbum purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachma pondere in potu. demorata est resina, aut cum aqua vel melle colto sumpta, aluum soluit. purgationis perfecta causa, tribus drachmis sumitur. alius purgatoris modicaminibus admista, praestat ut minus stomachum infestent. sicca glutinandi & vulneribus inspargitur. ulcera ad cicatricem perducit, cohibetque, eadem peculiariter exulceratis genitalibus medetur. disrupta puerosum praeputia iungit: condylomata, ximaque, sedis ex passio sanat. haemorrhoidum abundantiam & sanguinis eruptiones sistit. pterygia ad cicatricem ducit. liuores & insignita, ex melle tollit. priuatis scabras lippitudines, pruriginosque, angulorum, perimulcer. dolorem capitis sedat, temporibus & fronti illita ex aceto & rosaceo. capillan fluentem continet, cum vino somphila, ginguis & omnibus oris ulceribus, cum melle & vino proficit. Oculorum medicamentis torretur, in munda & candenti testa, permasque, subinde versatur, ut possit aequaliter torreti. Lauatur, ut quod sit aridissimum, tanquam inutile subsidat, & leue ac pinguisimum assumatur.

Agin. Primi exalfacientium ordinis est, exiccatum vero tertij.

Gal. Est autem non simplicis naturae, sed ut indicio est gustus, adstringit simul & amara est. Adstringit quidem mediocriter, sed vehementer amara est. Subducit & ventrem, ut puta ex numero medicamentorum quae Graeci ab excernendo stercore vocant *ἰκτερωτικά*. verum & ipsius facultates mixturam attestantur particularia eius opera, nam & gratum stomacho est medicamen, ut si quid aliud, & finis * glutinat. * *Eadem Gal. qua & Diosc.*

Eadem Plin.

Gal. In summa repellere & discentere simul potest, cum hoc ut paulum extergeat quantum videlicet ulceribus puris non sit molestum.

MESVE. Aloë medicamentorum purgantium praestantissima, & ob suam quandam prerogatiuam excellentissima. Cum enim caetera purgantia partes nostras principes, & ex his, ceu fontibus profectas facultates nostrum corpus dispensantes, vel actionis vehementia laedant (vel nihil iuuent) Alc e sola eas partes imbecillas roborat, & ad functiones suas reducit, nulla omnino actione noxia: praeterquam quod venarum ora tantum aperit, ut per haec sanguis effluat. Ad has eius doteis accedit, quod caeteris purgantibus, & his praesertim quae vacuando corpora dissoluunt, aloë mista haec ipsa corrigit, & noxis eorum prohibitis meliora reddit. Nam sua crassiore substantia tenuem illorum, acremque naturam frangit, & noxam partium ab his promptam, celeremque proprietate quadam substantiae inhibet: sua denique purgandi tarditate horum celeritatem temperat, purgationemque auget. His igitur ipsis nunquam non miscenda aloë. Calfacit ordine secundo, siccit tertio, sed tamen sine morsu: ob id excrementa consumit, & a putredine vindicat, etiam cadauera, praesertim myrrhae mista: sanguini vero draconis, & myrrhae iuncta, sanat ulcera putrida & maligna, quia, ut dixi, sine morsu siccit: ora tamen venarum aperit, praesertim hepatis. Quapropter hepar ab ea laedi quidam putauerunt, utque ipsum potius iuaret, correctione effecerunt. Adhaec aloë lota, minus aluum subducit, stomachum magis roborat: non lota contra. Postremo melle excepta minus trahendo quidem purgat: magis autem partes quas permeat, tergendo. Bilem pituitamque purgat, ob id affectibus ventriculi, & cerebri, & reliquarum partium, inde natis, ut dolori, inflammationi, sic praecauet, ut eius crebet usus sensuum instrumenta & corpus reliquum nullo insanabili affectu tentari sinat; sed sensus acuat, cogitationem reddat meliorem. Hepati confert, icterum tollit, haemorrhoidibus & sedi nocet: ob id vitanda his, quibus istae partes dolent, & aere frigido, quia tunc sumpta excorticatis sanguinem educit. Vinum autem, vel aquae rosata, vel succus feniculi quo aloë fuit macerata, oculos lotionem terget, visionem acuit, delachrymationem sistit. Datur ab aureo vno ad drachmas duas. Infusa autem ab aureo vno ad drachmas tres. Veruntamen cum & tardius purget aloë, ob id diu ante cibum sumenda, & tam imbecilliter, ut eius facultas purgatrix hepar vix transeat, nisi largior sumatur: cum denique adeo venarum ora patefaciat, ut inde sanguis emanet, his eius incommodis hac ratione occurrimus. Imprimis tarditatem purgandi aloë ipsi celeramus, si cum aromatibus essentiae tenuioris & acris, ut mace, nuce moschata, cinnamomo, spica nardi, calamo aromatico, cubebis, schœnantho, asaro, mastiche, caryophyllis, portione pari: croco autem portione dimidia, in aquae sextuplo igni lento, ad aquae eius tertiam, coquantur: aloës vnciae sex, in libras aquae singulas: potest siccantur in umbra primum, deinde in sole. Idem alij similiter efficiunt per aromata sex, quibus cum aloë mistis Galenus hieram picram componit. Eius enim actionem talia citatorem reddunt, & praeterea hyssopus, cinnamomum, casia, & alia plurima. Sunt qui celeritatem purgandi aloë acquirant, macerantes aqua illa, cui incocta sunt aromata, deinde expressum potui dantes. A partibus autem remotis, trahendi potestatem aloë conciliamus, aliis purgantibus valenter (qualia sunt colocynthis, turbitis, & similia) mistis: vel in decocto illo aromatum, vel in fero lactis, vel in trochiscis, vel catapotis, vel in alia medicamenti forma. Postremo venas aperire desinit aloë, bdellio, aut tragacantho, aut mastiche, aut simili permista. Haec autem tria eius incommoda non modo maiora habet aloë, dictas bonitatis notas egressa: sed praeterea ventrem totum torminibus dolorificis conturbat, ventriculum, & hepar, & viscera alia laedit molesta adeo vacatione, ut sua virtute illis haerente, interdum sanguinem quoque vacuet. Haemorrhoidibus & sedi eadem maxime nocet. Lotione igitur

c 2 partes

partes luteas impure sepsentur, & quod purius est, aromatatum decoctio maceretur, & his misceantur quae ipsam promptè lubricando per intestina deurbent: qualia sunt aqua hordei, cum oleo nucum, aut uuarum passiarum decoctum, aut aqua tepida cum melle. Bdellium autè & Tragacanthum, praeter caetera, omnem aloëti castigant, & emendant.



Agin. Abstergendi, distrahendi, & aluam subducendi vires continet: elota imbecilliorum exteri vim possidet: atqui magis amica ventriculo est, & inflammatione leuat. Calfacit primo, siccat in tertio ordine. Dysenteriae infunditur Plinio. Et si difficilius concoquantur cibi, bibitur à cæna modico intervallo. Digitorum pterygia tollit, potenter exficcat.

STRATIOTES, siue MILITARIS *Aizoides. fol. 334.*

Sedum aquatile Dod. siue Stratiotes pot. amios.

Flos tribus foliis constat lacteis minima Nymphae alba, in pediculo emicans.

SEDUM minimum: tertium.



DIOSCOR. *Herba Semperuius simile ni miora haberet folia qua refrigerant, sanguinem qui desistit, aerebus pota sistit. Vulnere qua inflammationem viuuntur, intumescente non suunt: Ignibus factis & tumores ex aceto allinuntur.*


Gal. *Stratiotes aquaticus quidem humida & frigida facultate est.*

SEDUM minus, facie & foliis Sedum maioris.

Alterum Sedi facie, foliolis angustioribus multo magisque acutis & mucronatis, munere C. Clusij colitur in viroto generosi viri & stirpium parentis benemerita Ioannis Braconis Mechliniensis, apud quem nondum floruit.

SEDUM minimum tertium.


Omnium longè minimo ex Syria asportato, folia quam superioris, & petraei montani Sedi minoris cauliculi sesquiuunciam aequant, in quibus luteoli flores maiores pro plantae exilitate, Sanguinibus aut Sedi petraei montani, Radix implicata fibrata.




SEMPERVIVUM *partium*. *Advers.* pag. 162.




SEMPERVIVUM *minus astium*.



Vermicularis, sive ILLECEBRA *maior*.
Advers. pag. 162.
Angl. etiam *Mous teyle*.



SEMPERVIVUM *minimum*, sive ILLECEBRA.
Gramen 3^o. Plinianum Angul. *Advers.* pag. 162.
Germ. *Mautschet.* *Ital.* *granellosa, & grafella.*



DIOSCOR. *Vesicaria effectoria, acris, exulterans.*
Illis cum acungia fructus asperis.

SEDEM



SEMPERVIVUM paruum. Aduers. pag. 162.


DIOSCOR. *Folia eisdem cum maiore viribus pradita sunt.*

SEMPERVIVUM minus asium.

Palmaris fruticosa planta; folio exiguo Sedi minoris, rotundiore. Flos luteus, radix inutilis, gustandi frigida. Belgis hortensis est.

SEDVM arborescens maius, flosculis candidis.
Aduers. pag. 162.

SEDVM minimum arborescens vermiculatum.



Eisdem Syriæ natalitiis natura: munifico Iussu & luxu plantulam penes me habeo, fruticosam & densè geniculatam, confertisque foliis & ramulis. Flores luteoli vermicularis acris, vni tota facies. Vtramque in Italia oriri quoque opinor.



VERMICULATAE fruticis varietas maior.
An CHAMÆPITYS altera vermiculata Diosc.?

Legit AIVGA vel Chamæpitys mas Diosc. & tertius.
Iua arthritica offic. Chamæpitys 1°. Dod. & Math.
Peristerona Crataea Anguillara. Advers. pag. 164.
Gal. Iua arthritique. Angl. Steunde & pne. Belg.
Welt rypjes. vulgus Ger. perpiram pe langer pe
lieber. Hisp. penilho, & yua arthetica. Ital. Iua.



VERMICULATAE planta Sedi effigie varietates. Advers. pag. 163.

Utrique densi confertisque ramuli: sed quæ maior, foliis est albis densissimè conferta, denticularis vermicularis acris, maioribus.

Exilior totaque minor altera, minus crebris foliis teretibus oblongis; & Rosculis heribacis Cennodij, ex vireto generosi viri Brancionis oriunda.

CHAMÆPITYS altera.

DIOSCOR. Alterum est genus Ainga cubitalibus ramis in anthera speciem incurvatis, pratensibus, coma supra dicta; flore candido: semine nigro. Hac etiam pinum redolet.

AIVGA vel Chamæpitys mas.

DIOSCOR. Tertia mas nominatur, parvula, foliis exilibus, albis, scabris: caule aspero, candido: inter floribus: semine iuxta alas. Resipit & hac pinum. Ha duo vire superioris obtinent, sed non usque ad eod efficacem.

CHAMÆPITYS

CHAMÆPITYS prima Diosc. pium redolens.
Aduers. pag. 164.
Altera Matth. tertia Dod. luteo in floribus.




CHAMÆPITYS prima.

DIOSCOR. Folia septem diebus in vino pota, regio morbo medentur: & quadraginta diebus ex hydromelite, ischiadicis sanant. dantur peculi. uriter vrina difficitatibus, iccinoris, & renum vitii. torminosi profunt. Ea apud Heracleam Ponticam, perinde atque antidoto contra acenitum vruntur, bibentes decoctum. ad antedicta illinitur, cum potentia iure decocti subacta. trita in farinam, & cum fico in pilulis sumpta, aluum emollit. excepta melle, cum aris squamma & resina deicit. apposta ex melle vulnura vitia extrahit. mammarum duritias difcutit. vulnera glutinat. vlcera qua serpunt, cum melle illita, cohibet.

Gal. Gustu amarum saporem acri validiorem obtinet. Effectu vero expurgat, abstergitq; viscera plusquam calfacit. proinde regio morbo laborantibus, & omnino quibus iecur obstruitur, bonum est medicamentum. Quin & menses ducit tum pota, tum osita cum melle.


Aduersus scorpionum ictus profunt Plin°. Sanguinem densatum pota extrahunt. sudores facit perunctis ea. * Fiunt ex ea & † hydropicis pilulae, cum sicu aluum trahentes. Mortuos scetus ex aceto cocta, potaq; eicere protinus dicitur.

ANTHYLLIS Chamæpityides minor. Aduers. pag. 164.
IVA MOSCHATA Monspel. scitè effigiat a.




CHAMÆPITYS


CHAMADRYIS laciniatis folijs, vel potius CHAMADRYIS altera. Chamadryis tertia Dod. Chamacyparissus agrestis Tragi, & Chamadryis altera. A. uers. 209.



COTYLEDON. Belg. Gauselkrup. Hisp. Scudentes & orejas de monje. Aduers. 165. Lusit. Cocihelos. Salamanticensib. Vasillos. i. acetabula y asculane à cano folio.



Aquatica COTYLEDON ACRISS Septentrionalium, an CALITRICHÉ Plinij. Aduers. 165.



Vitæ ex Calitriche sternutamentum. folia sunt lenticulae similia, & uiles hinc tenuissimis: radice minima. Nasctur in opacis & humidis gustatu feruens.

CHAMÆPITYS *adulterina*.

A foliorum cognatione cum Chamæpytide Pseudochamæpitys recentioribus etiamque Dodoneæ & Clusio vocatur: Vulgaræ Iuzæ arthriticæ, folijs & furculis, sed habitioribus, & radice similis, nisi flouculis candidis cucullatis galericulis & rictu hiantibus, inodoris, vti tota planta, foret. Semina succedunt quaternis Milij Solis modo, conferim stipata. Hanc cum multis alijs acceptam refero generoso viro D. Brancioni, qui Hispano semine plantam nactus est.

COTYLEDON.

Idem Gal. DIOSC. Succus cum vino circumlitus, instillatus, concolta genitalia nudat. inflammationibus, sacris ignibus, strumis, perionibus, illitus auxiliatur. Stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt. vrinam cient. hydropicis cum melle dantur. Herba vintur ad amatoria.

Gal. Cotyledon facultatis est mixtæ, nempe humidæ, subfrigidæ, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amaræ: vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaque phlegmonas erysipelatodeis, & erysipelata phlegmonode curat.

ANDROSACES. *Aduers. 165. 166.*

Musci marini genus Guilandini qui frigidum & siccum arbitratur.

**Idem Gal.* DIOSC. Ea drachmis duabus in vino pota, copiosam hydropicis vrinam cient. Idem effectus est serini pota, & herba decocto, podagris vtiliter illinitur.

Desiccata, discutit; humida & acris herba Gal.


COTYLEDON minor Sedi folio *Aduers. 165.*

Aizoum ferratum Cordi. Onobletum Hippoc. Anguil.

DIOSC. Gustu adstringens: & eadem facit qua Semperuium.

PORTULACA *domestica. Germ. etiam Burtzellkraut, & Angl. Portelapn. Gal. Porcellaine. Hisp. Verdolagas. Lusit. Bardroegas. Ital. Porcellana & portulaca. Aduers. 166.*

PORTULACA *filuestris.*



PORTULACA.

Diosc. Portulaca vis refrigerat. capitis doloribus, inflammationibus oculorum, ceterisque, cum polenta imponitur. ardoribus stomachi, sacro igni, vesicae doloribus, auxilio est. commanducata, dentium stupores † sedat. stomachi & intestinorum † astuacionem, fluxionesque mulcet. renes & vesicam adiuvat, etiamsi erosionem sentiant. veneris impetus exoluit. succus epotus simili effectu prodest, in febribus valens. contra teretes ventris tineas, cruentam excretionem, * dysenteriam, haemorrhoidas, & profusiva sanguinis, percolta efficax est. item contra sepiis morsus, ocularibus medicamentis vtilissime commiscetur. interaneae fluxione laborantibus, atque vulvarum erosionibus, insudatur. contra dolores, quos astus excitant, caput ex rosaceo & oleo sonera. eruptiones papularum in capite, cum vino emendat. vulneribus quoad syderationem spectant, ex polenta illinitur.

Refrigerat.] ex tertia classe refrigerantium est: humectantium verò secunda, Aegin.

† Eadem Gal. tum ventris osculo imposita, tum totis hypochondrijs, potissimum in hecticis febribus.


* idem Gal. & Plin. Leniens & repellens, ut pote cum viscosam habeat humiditatem.

Gal. Frigida & aquae temperamento est, paucae cuiusdam austeritatis particeps.

Plin. subdit, cum ipsa non est, semen eius simili effectu prodest.

† * Plin. dentium dolores sedat, & ulcera oris, tumoremque gingivatum. Dentes stabilit commanducata: sissim arcet. Cervicis dolores cum Galla & Lini semine pari mensura sedat: mammarum vitia cum melle aut cimolia creta. Salutaris est suspiriosis, semine cum melle hausto. Vomitiones sistit. Dysenteriae & vomicis datur ex aceto, vel bibitur cum cymino. Tenasms autem cocta & comitialibus cibo vel potu prodest. Podagris calidis, cum sale illita. Nervorum duritias emollit. venerem inhibet, venerisque somnia. Oculos hebetare putatur Plinio.

APVL. Herba Portulaca purgat, & in aceto sumpta mirè inflammationem stomacho tollit. Herbam portulacam comedat, mirificè facit ad duritiam stomachi.



TELEPHIUM, Scrophularia Tragi.
Advers. pag. 167.

Diosc. Tempore verno folia senis horis illita, albam vitiliginem sanant, sed postea hordaeosa serimo illius debet. perustulam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguantur.




TELEPHIUM sine
Crassula
maior Hi-
spanica.




Telephium
maior
vinea



RHODIA
RADIX.



Muraria
sive
Scorzon-
nas. Tele-
phium de
guil. Ado-
pag. tab.



TELEPHIVM *sive Crassula maior Hispanica.*

Quadruplo tota maior quæ in Belgij vitetis ex Hispania delata collitur. cetera nõ dissimilia; & simili Varietates. dote prodest. flos albus, folio rotundiore interdum & longiore vitetur, & flore rubro.

TELEPHIVM *minus repens semper vivens.*

Folio est rotundiore, flore rubro, radice fibrosa, & cauliculis Cerpæ crassioribus.

TELEPHIVM *glaucum verius.*

Telephium alterum vulgato par & simile, sed folio glauco cæruleo, vt Theoph. annotat. hoc alit Muxonus noster.


RHODIA RADIX. *rodia piza. Germ. Rosen wurtz. Belg. Rosen wortelen.*

Hisp. Raiz Rodia. Aduers. 177.

Diosc. *Veilissima capitis doloribus, si madefacta fronti & temporibus cum rosacei momento imponatur.* Aegin. Calfacit ordine secundo, tenuium partium & dissipantis naturæ.

FOENICVLVM *marinum, sive EMPETRVM seu Cal-*
cifraga. Germ. Bacillen & merfenichen. Gal. Bacil-
les & fenouil marin. Hisp. perexil de la mar. Ital.
Finochio marino & herba di San Piero. Aduers. 168
Empetrum Rondelletij. Batis Plinij folio crasso in modum
Portulaca, flore albo, semine Libanotidis.

PORTULACA *marina, an CRITHMYM Diosc.*
Aduers. 168.



CRITHMYM.

Diosc. Semen, ceurorismarini, odoratum, molle, rotundum; quod factum rumpitur. haec intus tritici ovo-
do nucleum, radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & incendi. Radix, semen, & folia incolla vi-
no, poen vrima difficultati & regio morbo auxiliantur. menses cients. ester credens collimus in alere. seruatur vltimo
in maris.

Gal. Crithmū gustantibus falsum quodammodo est, cum paucis amaritudine, quam obrem vis eius est exicatoria, & absterforia: vtraque tamen imbecillior in eo est, quam in amaris.

FOENICVLVM *marinum, sine Empetrum.*

Diosc. *Nascitur in maritimis: falso gustu, sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam & aquam, si bibatur in iure aliquo aut hydromelite.*

Semen ceu rorisinarini,] propter semen Cachris, sunt quibus Empetrum pro Crithamo magis arri-
deat, quia facultates suffragantur.

Κυράια. CEPAEA. *Advers. 167.*

HALIMVS *Advers. 169.*



Teretibus pedalis & sesquipedalis numerosis reptilibus surculis Semperuici minoris, stellatis flosculis albis confertis. Foliola minima, Portulacae agrestis, angustiora & longiora, tenera, carnosae, succo praegnantia. Radix exilis. in Belgij viretis luxuriat, Parasio delata.

Diosc. *Folia in vino pota vrinam stibitidie & vesicae scabie laborantibus optulatur. maxime id praestat, si cum decocto radicis Asparagi eius, quem Myacanthum, hoc est, Cerruianum vocant, bibatur.*

Eodem Aegyp.

HALIMVS.

Belgij hortis semen racemosum Atriplicis, aut Portulacae marinae edit, sed habitus.

KALZ *magnum. Ital. Soda. Advers. 169.*
Eg videatur. Empetri modo acerarijs quibusdam apta, vrinam ciet.



Cichorium
CERTICANTHUM.
TRIMVM.
Cichorus
Chrysanthemus Dod.
Aster villosissimus.
Cichorium
tortuosum Mart.
Aduerf. 171.



Age 29. 168.
in Cichorii
specimine.

In 10. Age,
Cerinthe.



PERFOLIATUM
vulgatum flore lu-
tesco, folio
vmbilicato.
Germ. Dutz-
schwartz.
Ital. Perfo-
gliata. Ad-
uerf. 172.

Age qui folia.
In 40. 81a-
φύλλα.
In 49. elegā-
tioribus.

PERFOLIATUM
siliquosum.

Varietas.

Spilica cyp-
reus Clu-
dij, qui cichor-
ij per silua
ferat, flo-
ribus purpu-
reis & maio-
ribus differe
facit.

Hisp. Col-
celon, quasi
brassiculam
dicit. Ad-
uerf. 173.





CERINTHA
maior.
Aduerf. 172.



Cerinthus maioris { Luteo,
 è floribus colore tres } *Flore sese*
differentia; { Purpureo, fundo. } *panden-*
 { Purpureo, & folio fu- } *te.*
 sco glauco.

Que minor, folia longiora edit, florem oclusum,
luteum: sed omnia minora.

HYPERICUM. Angl. *etiam* *Johns grass.*
 lege *Hisp.* *Coraçoncillo.* *Aduers.* 172.



Hyperic.
cum Sura.
com. & A.
manducan.

HYPERICUM.

Diosc. *Vrinam cit. menstrua pellit* appositum: ter-*
tianis, quartanisq; cum vino potum liberat. Semen qua-
draginta diebus haustum, ischiadicis medetur. Folia cum
semine illita, † ambusta sanant.

† *Subdit Gal. & alia ad cicatricem ducit.*

* *Gal. sed ad hæc totus sumendus est fructus, non*
tantum semen.

Plin. eadē. Aluumq; sistit: natura semini spissādi.
Excalfacit, desiccāt, tenuisq; substantiæ est, aded
ut & menses & vrinas prouocet. Gal.

SYRIACUM, & Alexandrinum.

Folia quadruplo minora quàm nostri Europæi,
quæ summis cubitalibus virgultis confestim tan-
quam in verticillis exant. Flores lutei nostri
perfuniles.

ASCYRON.

Eadem Gal. Diosc. Vfus seminis ad ischiadicos, potum in hydro-
melis laxatio, bitiosa recurrentia amplè semè detrahitis. sed
asiduo dare oportet, donec sanitati restituantur. Miltur
& ambusta efficaciter.

ANDRO-



A. scyren
Ital. Alex.
Aduers. 172






ANDROSAMON.

Dioscor. Semen tritum drachmis duabus potum, biliosa alui excrementa pellit. Ischiadicis maximè medetur: Sed à purgatione aquam exorbere oportet. Herba ambustis illita medetur, & sanguinem cohibet.

Ægin. Alcyri & Androsami semen expurgandi vim continet, sed folia potentiùs deficcant.

HYPERICUM minimum sspinum Septentrionale. in CORIS Diosc.




Non ita dissimilis hæc herbula, ex ericetis, sabuletis & strigoso solo Brabantia, & Flandriae oriunda, ramulis & cauliculis palmaribus, & duas uncias altis. Folia pusilla Thymi nostratis parvo maiora: flo- sculi lateo pallentes; & setina pinguis Hyperici vulgaris longè minor. Vix non dilparis.

Hæc Hyperici sspini figura non est diversa ab altera tomentosa effigie mox subdenda. Sed quia pistoriosa folia hinc et inde reddidit, & nequaquam incanam tomentum expressit, appositè minime depicti Brabantici Hyperici sspini potest.


HYPERICUM

*HYPERICVM tomentosum. Aduers. pag. 172.
Hypericum supinum Clusij.*



*Κενταύριον μικρόν, CENTAVRIUM parvum.
Luteum autem est Mesuei. Aduers. pag. 173.
Febrifuga. Panax leptophyllum Plin. Dodonae.
Gal. petite Centoïre. Angl. Centoy. Belg. Santoye,
cleyne Santoye. Germ. thausentgüldenkraut,
sieberkraut. Hiff. Cintorio, & fel de tierra. Ital. biondella.*

Varietas. Floribus albis in monte Trinitatis Neapolitanorum conspicitur.



Dioscor. *Herba recens tusa, suo illitu vulnera conglutinat, vetera vlcera purgat, & cicatrice obducit. Lilem crassosq; humores per alium exigit, si decocta decoctetur, ius decocti ischiadicis conuenientissimè infunditur, trahit enim sanguinem, & dolorem leuat. succus oculorum medicamentis perquam vtilis: siquidem cum melle caliginis oculorum expurgat. in velleo appositus, menses & partus extrahit. epotus peculiariter nervorum vitis succurrit. Socii extrahendi ratio: Legitur herba: semine pregnans, & scibus quinque madesalta, decoquitur donec supereminat aqua. mox vbi refrigit, lintolo exprimitur, & cistia herba iterum decoquitur, vsque dum mellis crassitudinem habeat. Nonnulli eam recensem grassidamq; conuident, & arant succum: sicili non paruo exprimitur, & in sole, lignea velle assidue mouentes, inspissant. quod si quid conretum succibus vasis adhaerescat, eradunt, reliquosq; humori permiscunt. noctu diligenter operant, namque rosaspectum, si quores coalescere non sint. Qua autem sicci radices in herbis liquantur, exprimitur, decocta, vt in gentiana mentione recitatur, praeparantur. sed quae ex coctibus humidis, aut coctis herbis facta auter, in sole, vti ante dictum est, coguntur. sic è thapsia, sic è mandragora, reliquisq; similibus succis. sic ex acerbis velle melleo coguntur. hycim tamen & absinthium, hypocistis & conuident, decocta, eo quo diximus modo, coguntur.*

Eadem Gal. Idem Gal. cep biliosa cogit, ducens nam de rebus purgat: quanquam cum velle vehementer operabitur, vt cruenta euacuetur, tunc magis proderit. Eadem Gal. Gal. Idem.

Gal. Herba arefacta glutinatoris, & desiccatoris mixta ex facultatibus, his videlicet, quas siccus & siccitas sanare sunt natura, & veteres dicitur emollire, tum vicerum maligna sanare. Misceatur etiam his, qua rheumaticis affectionibus medentur, in quibus ea medicamenta optima sunt, quae vehementer desiccant cum quadam adstrictione nulla, non habent mordacitatem.

Succus eius cum admixtis sit facultatis, hoc est exicatoris & absterforis, & reliqua iam dicta pulchre efficere poterit.

Optimum est medicamentum ad obstructions iecoris solvendas. Bonum quoque lieni indurato foris impositum, & nihil lectes, si quis bibere tenuerit.

Cum exiguo salis & aceti succus bilem detrahitis Plinio.

Insigni calore abstergit, incidit, aperit, ideo febribus pituitosis non secus ac Gratiola, & regio morbo auxiliatur.

APVL. Ad viperæ morsum: herbae Centauriae minoris puluer in vino exhibitus, aut ipsa pistata in vino veteri & potui data, validissime proficit.


Ad auriginem: herbam Centauriam minorem decoque in aqua ad tertias, & ex ea dabis bibere quantum poterit, sanabitur.

Ad lumbricos & tineas: herbae Centauriae minoris succum dabis ut supra, miraberis bonum effectum.

Qui venenum sumpserit: herbam Centauriam minorem ex aceto titam da bibat, mox discutit venenum. Item Centauriae radices pondere denarij vini in tribus cyathis vini bibantur.

Radices si-
peritocum
dicit Dios-
corides.

CENTAVRIVM floribus luteis sive citreis
pallidis Mesuic. Aduers. pag. 137.
Efficacius purgationes molitur.




Eadem ferè quas Diosc. facultates Centaurea flore puniceo, illi tribuit Mesuicus his verbis. Ad omnia Centaureum minus est præstantius, idèque suis floribus pallidis, & citreis, ac semine. Calfacit, siccatur ordine secundo, vel cum Raso tertij initio: constans terrea substantia ob vitionem valde amara: & alia terrea non adusta, aquosa mixta, quæ modicè adstringit, & aërea parum dulci, & ignea subacti sine morfa. Ob hæc, vlcera & vulnera efficacissime curat & glutinat. Terget enim, siccatur, excrementa consumit, alium soluit aliquando tam violenter, ut aperiat ora venarum, quibus sanguis emanat. Quæ de re dubitavit Hermes, præsertim cum vulnera conglutinet & sanat, & Alkindi sententia, sanguinis sputo conferat, ipsum sistendo & apertam vasis partem glutinando. Sed ambiguitatem hanc soluit substantiarum in eo præcipuarum contrarietas, amaræ scilicet, & hæc largoris stypticæ, quæ prima cogendo agit, quod à dominante substantia hæc facultas sit ad agendum promptior. Post longam autem eius actionem calor mordax ex atri substantia excitatus, corpus agit, & notas prædictas affert, non semper tamen, sed quando immodicè purgat. Purgat autem Centaureum præsertim minus, pituitam crudam, & bilem flatuam, & materias alias etiam à nouis & immundis, & hæc tardè. Ob id hanc partem affectionis confert, ut etiam ischiadi, cystere iniectum, vel cataplasmate impositum. Musculis iterum attritis, sed cum panis mica, sale parco, & melle, vel obo.

Obstructionem hepatis & lienis sanat, colico dolori & ventris prodest, lumbricos necat, & vacuat, menses mouet, uteri dolorem sanat, scorum educit. Styptica verò substantia spiritum sanguinis sistit, vulnera glutinat, vlcera etiam dysenterica glutinat, præsertim glutinere per se vel in unguentum coacto, ac etiam pota decocti ipsius fistulas & vlcera cacæthæ sanat.

Ambrosiosè autem quidam ab eo carnibus diuisis incocto eas glutinari aiunt. Cum mulla, vel oxymelite, & salepauco, vel decocto ameos mellito & sale gemmæ habenti promptius purgat: & clementis. Mastiche autem addita, venas ab eo aperiri prohibet.

CORIS Monspeliensium. Aduers. pag. 174.

CORIS Matthioli. Aduers. pag. 174.



Dioscor. Potum semen mensis trahit & vrinæ contra phalangiorum morsus ischiadicis, & opisthotonicis, ex vino potum auxilio est. horribus ex pipere, sal opisthotonicis ex oleo, aptissime illinitur. Radix vino decocta potu, defectis opem ferre creditur. Sed laborantem inter potandum quamoptimè cooperiri licet: siquidem corpus totum desudabit, ex qua re pristinam agilitatem recuperabit.

Matthioli Cori flores stellati Ornithogali minores ex rubore emittentes, quorum apiculi flauent. E lignosa radice plures spithameos cauliculos & foliola kcali aut Spergulæ stellarum è geniculis profert. Gaudet pratis in afflatu maritimo.


CAMPHORATA Monspeliensium. Aduers. pag. 174.

Vis illi Stratiotis militaris, ad vulnera perefficax: cogit, glutinat & siccatur. Chamæpeuce Plinio li. 24. cap. 15. lumborum doloribus & spinæ propria est.



ANTHYLLIDIS altera Italorum.

ANTIRRHINUM, *Advers.* pag. 175.
Cynocephalis Apulei. *Hisp.* Velera yerna,
& Cabeza de ternera. *Ital.* Antirino.



Camphoratae congenerem stirpem tenuifoliam, humilem pinum experimentem, Dioscoridis alteram Anthyllidem Atygae foliis & ramulis rebantur Itali non indocti. sed cum minus esida sit, Monspelliensium Inam Moscatam retinere malimus. Surculis, foliis, ortu & facie Chamapeucen sive Monspelliensium Camphoratae adumbrat: sed exilior tota; & summis virgulis, tomentosis, muscosis flosculis luteopallentibus, gustanti praesecis.

ANTIRRHINUM.

DIOSCOR. *Appensum venescit aduersatur, gratiam conciliat, si quis eo perennans cum liliaceo aut cyprino sit.*

Gal. Semen inutile: herba ipsa adsimilis cum bubonio facultatis, sed multo minoris.

APUL. Ad epiphoras oculorum: Herbae canis cerebri radicem cum aqua decoquit; & de eadem aqua subinde oculos fouet, & celeriter lenit.

ANTIRRHINI
 NVM in ni-
 md. Aduerf.
 174. Phytos
 ma Dod. huc
 Antirrhinū
 fyl.


Legit Antirrhini-
 num esse dicitur
 cepitale.



Caput Mau-
 rocher. aut
 Simia quo-
 rundam.



LEONARIA
 purpurea o-
 dotata. Ad-
 uerf. pa. 176.



LEONARIA
 purpurea
 Aduerf.



ANTHRRHINI *minimi varietas.*

Minimum Anthrhini genus proferunt Trinitatis colles Nerulensis agri, vulgari nostro ortu & vultu nō ita abfimile: sed floribus differt, qui Lychnidis aut Leucoij sunt (quales Diosc. suo Anthrhino tribuit): neque semen clauditur involucre nares & hiatus oris vituli experimente.

OSYRIS, aut LINARIA. *Advers. pag. 175. Cbrysocome Gesneri Dalese.*

DIOSCOR. *Decoctum eius potum, inuat arquatos.*

Gal. *Amara inest qualitas, & obstructions referandi facultas.*

Varietates. { Floribus albis aliquando inuenitur in Belgij hortis.
Linaria pumila Clusij tota minor, sed non abfimilis, aridioribus locis apud Salamanticenses oritur.

LINARIÆ *purpureæ varietates.*

Quandam etiam videre meminimus surculosis gracilioribus multo ramulis, & foliis angustioribus; flosculis purpurouiolaceis, albis & cæruleis.



Tertia folio, viticulis, & floribus purpureæ Narbonicæ par, sed inodora.

Quarta, Narbonensis angustifolia, odorata, Monspelliacis vinetis gaudens.

SCOPARIA, *Beluider Italarum. Osyris Græcorum Dod. Osyris Anguillara. Advers. pag. 175.*

LINARIA *Valentina Clusij.*

LINOSYRIS *nuperorum, an Tripolij species: num Linaria tertium genus Tragi?*



Hæc folia Hyperici aut Cytisi in ramulis & cauliculis surculosis pedem altis, terna. Agro Valentinæ lecta manu seduli & peritissimi vestigatoris C. Clusij. Flores item secundum summos caules lutei Linariæ vulgaris, rictu lanuginoso, corniculis aut caudicellis purpurantibus donentur. Martio floret Valentiniis partibus.

LINOSYRIS *nuperorum.*


Hanc ob ipsam eū vulgatis Linariis & Scopariis similitudinē, Linosyridē dixit recentior ætas. Est quippe virgis rigidis & foliis Scopariæ aut Osyridis vulgaris: sed flores in summitatibus luteo fuluo languēt. Asteris mōtani angustifolij, vel Crithmi Chrysanthemij, situ & posita; paritate & effigie Conyza maioris aut minoris. Cauliculi pedem & cubitū æquant. Hanc in collibus Narbonensibus Galliarū nō proeniā mari erant memini, quā ad Balnea prope Frontignan situr. & acris gustati, glutinosi, amari, Sene amulo sapore, ad Thymelæam accedente.

LINARIA

LINARIA aurea Tragi.
Hyssopus umbellifera Diosc. Gaillardino.



PASSERINA *Linaria folio.*
Chrysocome altera Mutoni.




Profus genere eadem Lynofiridi videtur : facie siquidem, iisdem foliis & cubitalibus summis alis multifidis cauliculis neutiquam diversa: sed extrema florum bullata capitula copiosis aureis villis referta fulgent. radix enim lignosa, fibrosa, semen exiguum. Vires exploratas non habeo. In viroto clarissimi viri D. Petri Brughelij in schola Louaniensi professoris regij elapsa aestate latè florentem vidimus; nec non apud nostrum Petrum Coudenbergium & Iacobum Plateau.

PASSERINA *Linaria folio.*

Linariis & hæc ob effigiaturam reddenda : foliis quippe Linariæ similia. sed acernatim in capitalis coriandrinis seminibus paribus summis Chrysocomes similibus, pallidioribus, surculosis pediculis Lini. flosculi pallentes. ex agro Mospelliensi oriunda. hanc Turnaci etiam Mutonis alii in hortu suo.





DIOSC. *Linum* vulgo notum est. cuius semen easdem quas *sanum* *gratum* vires habet. discutit & emollit omnem intus forisque inflammationē, cū melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut *melle colcho exceptum. vitia cutis in facie variosaque crudum tollit. illitum cū nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiasque discutit. vlcera qua serpunt, sanosq; cum vino decoctum expurgat. vngues scabros eximit, cum pari modo nasturtij & mellis. vitia pectoris extrahit, si ex melle eclegmatis vice substituat. tussim lenit. venerem stimulat, si farina piperis & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Huius decoctum interaneorum vulnūque erosionibus immittitur. alii excrementa euocat. ad vulnū inflammationes in desensionibus perquam vile.

*Idem Gal.

†Idem Plin.

Plin.

Plin.


Plin.

Oleum seminis Lini emollit; nervos contractos laxat, & lenit. Recens potum, calculo auxiliatur: cœliacos & lateris dolores leniendo finit.

Aegin. Lini semen, caliditatis primum sortitum est ordinem, humiditatis & siccitatis medium. comestum flatu generat, etiam si frigatur in sarragine. aded sanè excrementaria humiditate plenum est. Visceribus tamen quæ circa hypochondria sunt, vt si quid aliud, gratum existit. Quidam hoc tosto instar obsonij, non secus ac factitio sale cum garro vtuntur. Inferunt nonnulli panibus quoque; stomacho & concoctioni repugnat. tenuiter corpus alit. Quod spectat ad deiectionem, nec laudandum, nec vituperandum: per exiguam tamen vim mouendæ vrinæ tenet, quæ in tosto efficacior est. Ideo quoque aluum magis sistit.

Idem Gal.

Plin. Semē anginas in aqua & oleo decoctum & cum aniso illitum iuuat. Cœliacis & dysentericis imponitur ex aceto. Ad iecoris dolores estur cū vua passa & ad phthisim vtilissimè. Semine fiūt & eclegmata. Cum radice verò cucumeris syluestris extrahit quæcumque corpori inhaerent, sic & fracta ossa.



LINUM fl. floribus albis. an Linum fl. certius
Clasij

LINUM fl. tenuifolium.



Via quâ Monspellio Frontignanam itur, Linguagortia agrorum strigosis marginibus & caulis nonnunquam obuium; teretibus, nitidis, summis dodrantalibus virgultis. flores albi Lini lutei maritimi maiores: foliola Scopariae longè angustiora, exilitate Asparagi aut Foeniculi caules ambientia.


LINUM tenuifolium densè fruticans;

Lini sylvest. varietates.

Non modò florum effigiarata, sed etiam foliorum, in Belgicis viretis multiplicem sortitur varietatem sylvestre Linum, cuius nostris Vienna Austriae hoc anno 1775. seminaria misit C. Clasius. Aliud tenuifolium densè fruticans; aliud verò latifolium, cuius quidem flores nondum videre contingit in Belgio.


Angustifolium satiuo ferè idem, nisi quia totum gracilius multò, flosculi quinque foliolis caruleis fugacibus & caducis, satiuo pares. copiosis pediculis & cubitalibus virgulis, exilitoribusque Lini aut Linariae purpureae foliolis, è longiuscula, perenni (ut puto) radice, cuiusmodi hic appicta damus.

Latifolium foliis ex hirsutis, Tithymali helioscopij paribus, nam eadem sit planta cum Latifolio Clasij syl. Lino Aegyri folio, equidem affirmare non ausim.




CRAMBIDIVM, *sive* *fl. Linum purpurifolium.*

GLAVX *exigua maritima.* in *Glax* *Diof. J. Germ. & Belg. Melch. crup. & Melch. crup. Aduers. 178.*




POLYGALA *repens nuperorum.*



Chamelinum sive fl. Linum.

Aliud sylvestre Linum vix palmū æquat: foli-
la, flosculi luteo pallentes; Lini cauliculi, cæteraq;
cūcta quadruplò minora. in glareosis Gallobelgij,
& ipsis Louaniensibus pomærijs oritur.



CAMPANULA *lutea linifolia Montii Lupi.*

Aduers. 177.

Videtur Viola Calathiana Plin. flore luteo.

GLAVX *exigua maritima.*

Diosc. Coquitur cum hordeacea farina sale & o-
leo in sorbitione ad reuocandam extincti lactis vbertatem.

Aegin. temperatura calida est atque humidæ,
proinde nutricibus lactis vbertatem generat.

POLYGALA, *Aduers. 178. 179.*

Diosc. Gustu adstricto; qua pota, lactis abundan-
tiam facit.

Aegin. modicè austera habet folia: potum fac
procreare videtur. Temperamentum itaque in eo
imperat calidum & humidum.


POLYGALA *repens.*

Quantis multæ consimiles piante quæ folijs
Polygalam adumbrent magis quam pressè deli-
quata plântula hæc multis & dēssimis, palmatibus, reptantibus fœculis & foliis Herniariæ ex inter-
uallis distinctis; è quibus foram veluti candicantes globuli verticillatim oriuntur. In scrobibus sabu-
losis, fossarum & agrorum marginibus Antuerpiæ, & Gandavo conterminis luxurians.

sient, antexplicant; inter eas tamen id nominis apud nonnullos herbarum peritos est etiam affe-
quata plântula hæc multis & dēssimis, palmatibus, reptantibus fœculis & foliis Herniariæ ex inter-
uallis distinctis; è quibus foram veluti candicantes globuli verticillatim oriuntur. In scrobibus sabu-
losis, fossarum & agrorum marginibus Antuerpiæ, & Gandavo conterminis luxurians.

ONOBRYCHIS altera Belgerum & Dod.
Belg. Brauwe Spigel.

Πολύγαλον.
POLYGALA
Recentiorum.



POLYGO-
MYM.



POLYGALA recentiorum è florum colore
varietates. *

Angl. *Witch lentil*. *Aduers*. 179.

* { Purpurei sanguineius diluti punicei.
Albi.
Violacei.
Albi rubore confusi. }

Recentiorum Polygala est Onobrychis vera
Diosc. folijs lentis, longioribus; caule dodrantali;
flore puniceo, radice parua. Nascitur in vliginosis
& incultis. Quae omnia bellè quadrant.

Diosc. Herba suapte vi, si tria illinatur, tubercu-
la dissipat & cum vino pota, strangurias sanat, illita ex oleo
sudores mouet.

Num facultates respondeant, nondum expie-
ratum habeo.

ONOBRYCHIS altera Belgerum.

Aequè nos habet anxios conquestio facultat-
um plantae consimili nomine vocata & donat-
ta: quarum si certiores essemus, hesitationi locus
nec

nec dum iam foret. Similis ortu est Delphinij aut minimi Rapunculi: ramulis spithameis, quos ambiunt foliola, leatis, sed leuiter serratis ad Ciceris accedentia: summis, & iuxta caulicuios multis alis diuisos, florum cęruleo purpurantium peramena fetura Rapunculi aut Lini, sese pandit & contrahit conuoluulorū ritu. Segetibus & pingui veruacō Belgij, Germaniæ, Angliæ, Galliæ & Italiæ gaudet.

POLYGONVM. Ital. Corregiola, & lingua passerina. Hisp. Corrihuela.
Lusit. Corciola. Aduers. 179.

DIOSC. Vis eposi succi est, spissare, ac refrigerare. prodest cruenta excretioni, cholera, alui fluxionibus, & vrina stillicidio. vrinam aperte ciet. cum vino potus, contra serpentium morsus auxiliatur. datur in febribus per horam ante significationes. feminarium profluvia impostu sistit. idem succum putulenti auribus * instillatur. facit eximie ad genitalium vlcera, cum vino, adiecto melle, decoctus. Stomachi feruori, † sanguinis reiectionibus, vlcibus qua serpunt, ignibus sacris, collectionibus, tumoribus, & recentibus vlcibus folia illinuntur.

*Idem Apuleius.
lege polygonum in animum, demum altum. in 30

Aegin. habet quiddam adstringens, sed vincit in eo aqua frigiditas in excessu secundo.

† eadem Gal. & Aegin. qui subdit. antecellit autem in omnibus feminam mas efficacia.

Onobrychis Diosc.

Gal. Potrò tale cum sit, & fluxiones reprimat, & hac ratione videtur exiccatoriū esse. Est & cruentorum vulnerum glutinatorium.


Plin. Succus eius infusus naribus supprimit sanguinem.

Plin. datur cholericis, dysentericis, & in solutione stomachi. Semen aluum largius sumptum soluit, vrinam ciet, rheumatismos cohibet.

APVL. Huius herbae Proserpinacæ succo cum oleo rosaceo saepiusperunges, dolorem lateris tollit.


Herba Proserpinaca tusa cum butyro subacta, & mamillis imposita quæ dolorem & tumorem habeat, dolorem & tumorem perfectissime tollit, ita tamen vt vsque in tertium diem medicamentum ponas. Ad quartanas: herbae Proserpinacæ succum cum piperis granis septem aut nouem sub accessione dabis bibere. Lege eam die Iouis, Luna decreſcente. Vermes necat.

POLYGONVM montanum nigrum minimum. Aduers. 179.
Paronychia Hispanica Clusij.



Hæc effigies eadem est cum minimo nigro Polygonato, sed planta sauz & enata celo & solo humidior, horis videlicet vbi ætatequam lucentes nigri candoris glomerulos edidit.




ANTHYLLIS *Valentina Clusij & Placc.*

Consimili facie eū Herniaria & Chamaefyce, in vinetis & oliuetis Monspellio finitimis Boutonet
versus & Castrum nouū fuscū humi spargitur cauliculis palmatibus & dodrantalibus. Flosculi purpu-
rascunt ex albo, quatuor foliolis constati. Hanc olim Chamaefycen alteram cum Lugdanensibus di-
ximus, sed non lactescit, falso gustu præfisco.

HERBA TYRCA, sive HERNIARIA. est Epipactis *...* Millegrana Cordi,
& Empetrum Tragi: Polygonum minus *Matth. Ital.* Centograna.

SERPILLVM. *Saxifraga* Dod. *quæ Thymi, non*
Epithymi simitem legit. Hisp. Serpol & Ser-
pillo. Aduers. 120. & 181.

Narbonense SERPILLVM *folijs & facie perpusillæ*
angustifolij Thymi nostratis.
Aduers. 181.



Fadem Gal.
& Plin.

Diosc. Menses trahit, urinam potus ciet, tormini-
bus, vasis, vulsis & iocineris inflammationibus, accilia-
rit. & aduersus serpentes potus illatus. capitis dolores mal-
cet coctum adiecto rosaceo, & madefactum in aceto. Ma-
nimè verò phreneticis & Theriargicis conuenit. Cyuentos
vomitus sedat succus arachidis quatuor ex aceto potus.
Aetius. Madefactum autè aceto ac decoctum
admixto rosaceo, lethargicis & diurnam phre-
nitim patientibus, summopere congruit.

* diachma vnius Galeno.


Plin. Folia obolis quatuor dantur ad liecem ex
aceto.

Narbonense Serpillum.

In ericetis Egidij pagi, vulgò S. Gilles, agri Monspeliensis, Thymi angustifolij facie rarior hæc Serpilli species, lignosis & durioribus surculis repit, cuius radix & flores similes nostrati. Huius ramulos nobiscum communicavit Fraciscus Penninus Antuerpianus pharmacopœus fide dignus, stirpium materiâque medicæ gnarus, vt si quis alius.

THYMUM. *Hisp.* Tomillo falso. *Luff.*
Oregon de matto. *Advers.* 181.

EPITHYMUM *Græcorum & Arabum.*
Advers. 181.



DIOSC. Virens habet hanc, vt cum sale & aceto potum, pituitam per aluum detrahât. ducoliti in. prodest † or-
thopnoicis, & anhelatoribus. tinea ventris exigit. menses, partus, & secundas pellit. vinas ciet, cum melle in ecleg-
mate faciles facit * excreationes. recentes tumores discutit, cum aceto illitum. concretum sanguinem dissoluit. verru-
ces thymi colorem rodentes, pensilesque tollit. ischiadicis cū vino & polenta inpositum subuenit. hebetibus oculis in ci-
bo prodest. perquam vtile pro condimento, duntaxat ad vsus eorum qui rectè valent. Idem Plin.

† Gal. quia incidit & calfacit, manifestè ob id vrinam & menses prouocat, fetum euellit. Eadem Plin.

Aegin. calfacit, exsiccat in tercio à temperatis excessu: tenaces & viscosos humores incidit.

Actius. Dato ieiunis articulari morbo laborantibus Thymiacidi minutissimi drachmas quatuor cum Oxymelitis cyatho: bilem enim reliquosque humores atque acre semen euacuat. Ventre inflatis, vbi intumescere cœperint, ʒ j. dato ieiuno, cum cochleari aqua mullar. dato ieiunis & ante eapnam aduersus lippitudinem & vehementem oculorum dolorem. Postremò ad tumefactos † testes iuranis trium drachmarum pondere exhibeatur. Idem Plin.

Plin. Oculorum claritati multum conferre existimatur & in cibo, & in medicamentis. Coxendicis imponitur cum vino. In fastidio tritum cum sale.

EPITHYMIUM *Græcorum & Arabum.*

Diosc. Epithymon, flos est è thymo duriore, Satureia simili. capitula habet tenuia, & leuia, & in eis caudiculas, quasi capillamenta. Potum cum melle detrahit, pituitam bilémque atram, per inferna. Præuatim prodest melancholicis, & inflatis, acetabuli mensura ad quatuor tertias cum melle, sale, & aceti exiguo.

Aegin. & Gal. Thymo efficacius ex tertio calfacientium & arefacientium ordine.

Potentius in extergendo aperiendoque Cassiis; ideò melancholico humori terreo, lieni, indidem ortis omnibus morbis, doloribus capitis diuturnis, lepræ, melancholiz morbo & hypochondriaco: item quartanarijs & consimilibus accommodatur, eo quòd splenetica hepaticis potiora.

SATUREIA *Aduers. 182.*

SATUREIA *hortensis. Hisp. Axedrea. Angl. etiam sauxp. Aduers. 182.*





Diosc. Eadem potest que thymum, si modo consimili semperitur. Apertis sensu vsus. Est estachum galicam sativa, hylaciri prorsus minor, que propter mitiorem acrimoniam, commodius in liberecepta est.

Aegin. eadem. calida & sicca excessu tertio.



**EPITHYMBRA, EPITHYMYM, &
CASSITHA** Pils. *Advers.* pag. 182.
Androsaces Tragi. Gal. Tigne de Lin. *Angl.* Dether.
Belg. bianghis, & scorfra. *i. tinea.* *Germ.* scbteim,
flir, araut, flafch leyden. *Hisp. & Ital.* Calcuta.

SAXIFRAGA magna Matthioli & *Italarum.*
Ital. Saffisfraga maggiore.



Cui innascitur plāta vires quadamtenus referi. Cassitha è lino prædicis & officinis præfertur, quod citra calorem minus adstrigit, magis emollit, lenit, extergit, & ad eductionem & disculsionem præparat. Iecinoris & lienis infarctus biliosos & pituitosos leniendo referat; urinam ciet, idèd morbo regio inceditur. Febres tertianas, quartanas & pituitosas curat, ut Mesueus auctor est; flauam que bilem persuam educit, sed efficacius addito Absinthio.

EPIVRTICA.


In vrtica nata maxima se mihi copia obtulit in agro Sommerseti Angliæ: que venis potentius eliciendis, & obstructionibus solvendis efficacior. In Rubo aut Genista hæcenus mihi non perspecta, que tamen nonnusquam occurrere potest.

SAXIFRAGA magna Matthioli & *Italarum.*

Spontè fruticat hæc in ipso calle & præruptis ad angustias saxorum montis Baldi Veronensis secus sanæ Virginis lacum, viregulis exilibus numerosis, durioribus & lignosioribus, sed ad unum digitum crassitudine æquantibus. Folia Thymbre similia, exorta inæquali prodeuntia. Floresculi candicant è calyculis Ceymoidis, quibus semen sic cedit rudrum, perpusillum, ut scite apponuit Matthioler. Radix saxorè interueniens & commissurata, è depæcta, ut vix diuelli possit. Maxime è primæ nobilitatis apud Italos ad excurrendos & propellendos calculos.

SAXIFRAGA. *Advers.* pag. 185.

Dioscor. Frutex est succulentus E. *Jalypno* similit. *Costus* in vino, max potus febricitantibus opituitatem. *Syracusano* prodest, singultum sedat, calicis vesicae frangit, & urinam ciet.
Anglica Saxifraga est salines minimum genus.



ROSMARINUM coronarium. *Advers.* pag. 83, 124.
Libanotis coronaria Galeni. Lusit. Alcecin.

Dioscor. *Exaltatiora vi praeditum est. Rogibus sanat morbum, si decoctum in aqua, ante exercitium bibatur. Et vbi laborans exercitatiōi se crediderit, in cauea descendat, & merum poterit, acopi, glauci, & vnguicento admisceri solet.*

* Gal. eadem. Omnes enim libanozides abitergentis & incidentis facultatis participes sunt.

Cephalicum, stomachicum; nervis & cordi peramicum, memoriam roborat; cerebrum emaciat; resolutionibus medetur. Coryzam a causa frigida iuvat Serapioni, exsiccando. Calido & sicco temperamento.

Cinis dentificiis miscetur ad dentes firmādos.

STOECHAS. *Advers.* pag. 134.


Ger. stichas kraut. Hisp. Cantuello, & canuello. Lusit. Rosmarinho. Ital. stichade.

Summi cauliculi ut plurimum foliis stipantur in Gallia Narbonensi: interdū nudi conspiciuntur.

STOECHAS nudis cauliculis summis.



STOECHAS.





Diosc. *Sub amara gustu, & aliquantulum sty-
 Cius de odore Hygiei modo ad eorum vicia & ad
 Antidoti nascitur. Vixit a curia & vicia & ad
 et a vicia extrema, et ab obliuisci vicia & ad
 Gal. Gustu amaro, vicia amara est. Sicut
 dioscorides in vicia. Sicut in vicia & ad
 posita, vicia vicia vicia vicia vicia vicia
 ad vicia vicia vicia vicia vicia vicia vicia
 a qua vicia vicia vicia vicia vicia vicia vicia*

conuenientiam & coitum, obstructione liberare, extenuare, extergere, roborareque tam viscera omnia, tum totius corporis habitum est nata.

M E S V R. Deicit tum pituitam, tum atram bilem, cerebrum, neruos ac sensuum omnium organa mundat, ac roborat. Prodest contra frigidos morbos qualescunque sint, ideoque comitialibus conueniens remedium habetur, addita Scilla aut eius aceto. Balnea, fomenta ac laconica, quæ ex ipsius tum decocto tum vapore fiunt, oclusos narium meatus aperiant: neruorum & compaginum cruciatus mitigant: ac interna viscera frigido humore affecta roborant. Abstinentium tamen ab ea biliolis est, præsertim si eorum ventriculus sit bile refertus: nam eos maximè turbat, nauseam commouet, sitim accendit, & calore quodam molestissimo vniuersum afficit corpus.

STOECHAS folio serrato & crispo Clusij, admodum rara. Lufit. Alichrin francez.

SPICA Recentiorum, sive Nardus Italica. Pseudonardus Fuchs. & Math. & Gallorum Aspic. Anglorum frensche spick narde, & Spigo Italarum; est STOECHAS Arabica Mes. spica siliginis Mutona. Aduers. pag. 184.



A superiori denticulatis vel serratis foliis virentibus, sed aversa parte cardidis dissidet, & capitulis squamosis purpurouiolaceis in cacumine Thymi, aut Stoechadis longioribus Erythrodani marini ritu rosali purpurei exeruntur. Semen, radix & caniculi incani, gustus amarus, aromaticus, superiori similia. Sponte nascentem, non nisi in summa Calpe, floribus orustam Februario inuenit Cladius: Scintre in regia arcis hortulo, quatuor supra Vlyssiponem leucis primùm animaduersam.

SPICA Recentiorum.

Inflationes & dolores ventriculi, vici, & lienis durities discauit. Iccoris obstructiones reserat. Stranguria & vrinae difficultati medetur. Simili qua Spica Celtica effecta prodasse nuperi asserunt, eiusque vsum commendant ad frigidos & humidos cerebri & neruorum affectus, apoplexias, paralytes, melancholiam naturalem, & eiusmodi. Calida & sicca ordine secundo.

Pulvis ad faciendam partum, eiusq; dolores arcuam è semine Lauendula

Rondeletij præstantissimum, minime fallax.

℞. Seminis Lauendulae ʒ. s. seminis Plantaginis & Endiuæ añ. ʒ. ij. piperis ʒ. j. fiat pul. capiat cum aquis sequentibus. ℞. Aquarum Caprifolij & Endiuæ añ. ʒ. iiij.

Alius efficacior pulvis.

Ouracum cum duobus vasis coniunctis abluatur vino albo, in fictili nouo vritur clibano: deinde aqua Endiuæ & vino abluatur, seruetur vsui. ℞. cineris Ouraci ʒ. ij. cinnamomi ʒ. s. piperis longi, & galangæ añ. ʒ. j. seminis Plantaginis & Endiuæ añ. ʒ. j. s. Seminis Lauendulae ʒ. iiij. fiat pul. cap. cum aquis prædictis & vino albo si febris desit.

Fortissimus ad secundinas & fetus mortuos.


℞. Confect. alkermes & pulueris præscripti añ. ʒ. ij. Borracis, Trochisc. è myrrha añ. ʒ. j. s. Castorei ʒ. j. cum aqua Buglossi, Arthemisiae, vino albo.

Spica LAVENDULA. Advers. pag. 184.

Stachys Anguillara. Pseudonardus femina Matth.

*Gal. Lauendel. Angl. Belg. & Germ. Lauen-
del. Ital. Spigo gentile.*

*LAVENDULA multifido folio Clusij.**



*Raritate, elegantia, & foliorum diuisura multifida in apposite dixit Clusius ceter. Malis. his quoque caulium furculis pedalis, quadrangulis & hirsutis, quos alce laciniata veitur è geniculis folia cinerea coriandrina aut Melanthij cingunt. In Belgio, Germania, Anglia, Gallia & Italia nusquam me vidisse meminit. Hispanie sola inquitina. Spica Lauendulae aliquantum siccata, & veluti in quatuor versis aut ordinibus vallari raris interdum ex alia nascens. floribus caruleis odoratis. Malace vicino colle quodam, Februario flo. entem, & circa Murciae Mardo. invenit Clusius, alibi nusquam. Reliqua minor censetur.

HYSSOPUS Arabum, Mesua & officinarum.
Aduers. pag. 185. Gal. hisope. Belg. & Angl.
Yloze, & Ysloze. Hisp. Ylopo.

HYSSOPUS Arabum floribunda.



HYSSOPI Arabum è floribus coloribus varietates.

Floris albam Hyssopum cultiora vireta Belgica interdum & rubram dant, sed floribus, ut plurimum, unico tantum ordine digestis.

MESUA. Hyssopum hortense pituitam facile deiecit, quamvis dixerint aliqui, quod & arara bilem educit addito fossili sale, aut Indo. At ipsum pituitam purgare manifesto experimento constat, praesertim quae in pectore ac pulmone continetur. Facit hyssopum ad pituitosum tumorem, tunc nervorum affectus: quod non modo mundat, sed quod etiam roborat. Quia & pectus, & pulmonem detergit, praesertim senibus, quorum pedes lenta crassaque pituita referuntur est: quo fit, ut alliciat, & rursus optuletur. Discutit hyssopi usus confirmatos inflammaticos, cibi appetentiam inuitat, menses & urinam ciet, & febrium horrores excussit, visum acur. Melle commixtum, interaneorum tinea necat, atri addito momento. Oleum, quod tum solus, tum floribus paratur, nec rosalgure affectos inunctum sanat, & roborat. Potest eadem & mentaniam, atque etiam haec omnia efficacius praestat.



GRATIOIA, & Gratia Dei. *Advers.* pag. 185.
Linneusium Cordi sine Centaurides.
Papaver Spumensum Diosc. Anguillara.
Ital. Stanca cauallo, Centaurida.

HELIANTHOS, sine flos Solis. *Advers.* pag. 185.
Cisti species Monspeliensis. an Helianthe Plin.?
Helianthemum Cordi & Tragi.
Helianthos Anguill. & Eubol.
Belg. & Germ. Bepden pley. Gal. Hyslope des
garigues, quia ericetis gaudet.
elatine distentibus



Centaurium minus, amarore, absterforia & vi deiectoria longè superat. Nec secus ac Pityusa aceto, & lacte maceratur, ut noxium virus & aliquam acrimoniam exuat. Bilem utranque, aquas & pituitam crassam detrahit sesquidrachmæ vel drachmarum duarum infusum.

Gratiola: an PAPAVER Spumensum Diosc.?

Eadem
Theophr.

DIOSCOR. Herba est alba & spuma tota, radice in summo capite. Legitur estate seruen cum integro adoleuit, decidit, exiccatur. Datur acetabuli mensura in aqua miset conuisione expurgat. Efficacium huiusmodi purgatio, comitialibus prodest.

Semen pituitam expurgat Gal.

HELIANTHOS, sine flos Solis.

*x. cap.

Plin. lib. 27. cap. 10. frutex est humi se spargens dodrantalibus ramulis: folia similia serpillo. Radix eius candida & dulcis.



PSYLIUM. *Advers. pag. 186.**Angl. Fleesele oriam dicitur.*

Dioscor. *Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conueniens. Articularum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, laxatis illitum auulsiatur. Impopitur in dolore capitis cum rosaceo, aqua, aut aceto. Euterocelis infantum, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur. Teritur acotabuli mensura; & in aqua sextario madefactum, ubi concreuerit aqua, illinitur: Siquidem vehementer refrigerat, & in feruentem aquam deiectum calorem reprimit. Contra ignes sacros efficax est. Fama est si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum, sordida vlcera & qua cacochie vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus ex melle prodest.*

Eadem Plin.

Gal. Semen ex secundo refrigerantium est ordine, in desiccando verò & humectando medium quodammodo & symmetrum.

PSYLIUM Plinianum forte, radice perenni supinum.


Advers. pag. 186.CORONOPUS. *Advers. pag. 186.**Anglicam Ereusato. Hispaniam estella.**Lusit. Guibella. Ital. Sicilia herba.*

Dioscor. *Herba decocta efficit stomachi acriorem. Radicem habet in cibo stringentem, pro oculis & cordis.*


CORONOPUS repens.

in Pet. virentes Coronopus Ruellos

CORONOPUS




CORONOPUS *terreus*, *Adverf.* pag. 187.



Legit etiam
folia.

SERPENTINA. *Adverf.* pag. 187.
Coronopus fol. seu *Serpentina Matthioli*.
Ital. Stella herba saluatica.

SERPENTINA *occidentalis minima*.




Mixtura nullatenus distat à superioribus, pro
terram exilitate, & difficultate enim vix vincitur. Sc
loquuntur autem maxime in cellis montium high Berge
Sautena in Gellia, & Bourbonnais copiose provenit.

CAYO

CAYDA MYRTIS. *Advers. pag. 187.*


CARYOPHYLLUS. *Advers. pag. 28.*
Angl. stiam Geipflours, & Seicours. Ital.
 Garofoli, & Garofoni.
Centabrica Turneri Angl.
Veronica altera Fuchs. Dod.



ARMERIA, *sive* CARYOPHYLLUS *minor* *fol.*



Lege lin. 3a
 242.



Ad cordis palpitationem, vertiginem, epilepsias,
 paralytes, & convulsiones commendatur.

ARMERIA, *sive minor* CARYOPHYLLUS *fol.*
foliis latioribus. Advers. pag. 188.
Armerius flos primus Dod. Germ. Diepunnegle.
Cuyderelles Gallobelgarum.

ARMERII *floris* *varietates.*


In viroto D. Matthæi Lobelij canonici Insulari,
 viri non minus probi quam peccati, stitutumque a-
 mantissimi, Veronicæ sylvestris specie primam me
 videre memini; deinde Mechlinia, & apud Ner-
 vios, flore simpliciore, sed speciosiore, candidante,
 media veluti peratruena striata corona concolori
 cincto: cubitalibus gracilioribus viticulis & foliis,
 Caryophylli sylvestris.

Vienna Austria floribus albis sylvestrem alte-
 ram Armeriam aspectu hilarem & peruenustam
 hoc anno in Belgium transtulit Carolus Clusius.


SYPERDA Fuchsii & Excursionem. *Advers. pag. 189.*
Dioscoridis Theophr. Agrostaria.
Ital. Fior d'Amore, & Balsamin.

CARYO-


CARYO-
PHYLLVS
marinus.
Aduers. 189.
Gramen mi-
tium Dod.



CARYOPHYLLVS *montanus* alter. Aduers. 189.
Perperam Cantabrica Plin.
num sit potius STATICE eiusdem



Myscipv-
LA, siue
Armoraria
altera.



Louanij, flore albo variat in horto stirpium di- Variosa-
tissimo D. Ioannis Limoges, alias Nonnij.

MVSCIPVLA, siue VISCARIA.

Aduers. pag. 189.

est Lychnis syl. quarta Clusij.

Silene Theophr. Aldroand.

MVSCIPVLA altera flore muscosa. Aduers. pag. 190.

Papaver frumens quorundam.

Sesamoides magnum Salamanticum Clusij.

MVSCIPVLA, siue ARMORARIA altera.

Armerius flor tertius Dod.

nam flor Constantinopoli atus alter minor Gesnerij
Lychnis syl. altera, & Bohem rub. Salamanticum Clusij.

Iisdem natalibus delata hortis Lusitanie, Angli-
cis, & Belgicis oritur: cauliculis, foliis & congeulis
rubris cauliculis floribus, & semine Polemonij
herbæ vulgi, vel Centaurij minoris. Viscidiora
glutine tenaci circumlita tota.

DRACE

DRACO.




DRACO, aut potius TARCHONACIS Sessili.
Aduers. pag. 190.
Gal. Targon. Angl. Dragon. Ital. Dragoncello,
& Dragone.

Acetariis Erucae vicem supplet. Ad pestis con-
tagia maximæ & primæ laudis eius stillacitæ apud
Anglos. Sudores citæ, & crassam pituitam con-
coquit.

Πρασινόν. PTARMICA folio Taronicæ, sed
crenato, flosculo umbellato, candido.
Aduers. pag. 190.

STERNUTAMENTORIA. Pyracanthum
Hluest. quercudam.
Tanacetum acutum album Tragi.

BUPLEV.
274.


DIOSCOR. Folia cum floribus illita, fugillationes
rapiant, flores sternutamentum efficacissime mouent.

Legge Bérard. super. BUPLEVRUM.

Aduers. pag. 192.

Buplevium Dod. & herbariorum.

Legit Plinio li-
900.



alterum BYPLEVRON latifolium.
Advers. pag. 192.

BYPLEVRUM Dod. & herbariorum.
Isophyllum Cordi. Germ. Wundkraut.

Herba vulneraria & Panax Chironium Tragi,
qui illi vires similes facit.

SCORPIOIDES repens Bupleuri folio.
Belg. Galen ooyen, & Scorpione crupt.



LITHO-
SPERMON minus. Hisp.
& Catalanis
Müllbarr.





LITHOSPERMON. Advers. pag. 192.

Dioscor. & Esin. Semen cum vino albo po-
tum, calculos conterit, & vimat pulle.

Plin. de stranguriam discutit.

Temperamento calido & sicco, ut Gal. docet. Sicut
j. simplic. medicamentorum, de cunctibus vitiis.

LITHOSPERM.

LITHOSPERMUM *tridens*,LITHOSPERMUM
MON ANCHU
IN FACIE.

parentibus
oculis
quas alter-
23
Lithosper-
mum
L. g. p. 111.

ALSINE. *Advers.* p. 193.
Ital. etiam Gallinella, & Centocchi.



MYOSOTIS
HIRSUTA REP-
ENS. *Advers.*
p. 193.
an Elatine
Diole qui-
busdā folie
Helicis a ē
noce hirsut.



LITHOSPERMON *arabica folia.*

Declivibus saxosis vallis Ostensis Pedemontium occurrit, fruticosis pedibus ramulis hirtis: foliis Lithospermi; & floribus Anchusæ aut Echij aut Buglossi facie purpurantibus: radix lignosa.

ALSINE.


DIOSCOR. *Vim refrigerandi & adstringendi, obtinet: oculorum inflammationibus cum potentia illinitur. Succus aurium doloribus insunditur, quin & emendat omnia qua Helicine.*

* Ideo Gal. Ad feruentes phlegmonas, & mediocria erysipelata competit.

Eadem ferè Plin. Epiphoris peculiariter imponitur.

Refrigerare omnes creduntur. Inflammationibus, stomachi ardoribus, ignibus sacris, vlceribus que serpunt, & erysipelatibus auxiliantur.

ALSINE *corniculata* Clusij.
an Nigellastrigenus?



ALSINE *minima*. Aduers. pag. 193.
Alsine minor Fuchs. Germ. *klein vogelkraut*, & *Heberkraut*, quia refrigerando febris aestus mitigat.



Folia Nigellastrigenæ nostrarum breviora, Alsinæ longiora, gemino situ, exili radice, Maio flosculis candidantibus, & pusillo atro semine membranis corniculis transparentibus clauso. Canaliculus palmaris hirsutus, alis diuisis, segetibus, vti Nigellastrum, agri Salamanticensis gaudet.

TRAGOVA *purpurea* Alpinus.

Hoc nomine plantam aridam sesquiuncialem spectandam mihi dedit ex suo herbario charascoo emilito eruditissimus medicus in hac medicinae parte exercitissimus Hermes Clericus; foliis superioribus Myosotidis angustis, inferioribus, brevioribus multo & latioribus: radice digitorum crassa, Rose Martole Meampyri lutei nostri Narbonensis.

MORSE

MORSVS Gallinae folio bederula. *Advers. pag. 194.*
Alfina media Fuchs. Elatine Dod.
Angl. Gunning, buckwheat.
 LAPPAGO *Plin. lib. 26. cap. 10. apud Anguillaram?*

ANAGALLIS Phœnicea *ms. Advers. pag. 194.*
Cercorus Plin. Anguil. & Malochia Serapionis
Valerand. Hisp. Mortiaom.



Plin. Est & Lappago similis Anagallidi, nisi esset ramosior ac pluribus foliis aspera, rugosa, aspericidii succi, granis odoris: quæ talis est, Moilugo vocatur, &c.

ANAGALLIDES.

DIOSCOR. Vtraque mitigandi vim habet; inflammationem arceat, adallos corpori aculeos^a extrahit, nomas cohibet. succus gargarizatu caput purgat, &^b naribus infusus: dolorem dentium lenit, si in adursum urem iniicitur. Argema cum melle Attico^c emendat. Retusa oculorum aciei auxiliatur. Contra viperarum morsus, iocinoris & renem vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ caruleum edit florem; prociadanti sedem reprimere; quæ verò phœniceum,^d illiæ euocare.

Gal. Anagallis vtraque calidam & siccam facultatem obtinet: exterguntque admodum.

Gal.^e Quendam calorem attractorium possident; coque succus earum ex naribus purgat. & vesummatum dicatur, exiccatoriam citra mordicationem facultatem habent, quamobrem vulnera glutinant. & putrida adiuuant.

^f Plin. eadem. & ex icu erorem, & argema rubens, magis cum Attico melle inunctus succus. Bibitur & contra angues succi drachma in vino. Mirum quòd feminam pecora vitant. Vrinam cient Anagallides: Iecineri mirè profunt, cohibent quas nomas vocant. Viles & recentibus plagis, præcipuè sanum corpori. Ad recentia quoque vulnera tanta traditur vis, vt sanguinem ollibus extrahant.

^g eadem Plin.

ANAGALLIS carulea *femina*. *Advers. pag. 194.*



ANAGALLIS aquatica.

ANAGALLIS lutea. *Advers. pag. 194.*



ANAGALLIS aquatica. *Advers. pag. 195.*

Sion, *sive Lauer* & *Anagallis aquatica* *Fuchs.*


Sion non odoratum *Tragi.*

Trag. Apud veterinarios magno est in usu, ut discutiendis tumoribus & sananda equorum scabie, alijsq; id genus affectibus. acetarii conmanducata, calculos rumpit, urinas cit; facit mortuos pellic & menses. Cum aceto & butyro tosta & imposta, ac subinde renouata, tumoribus quibusvis & ignibus sacris prodest.




ANAGALLIS aquatica altera, fortè Sion non
odoratum alterum Tragi folio Pulegij regalis, *

PARONYCHIA Albusfolia. Aduers. 196.



PARONYCHIA altera Rutaceo folio.
Aduers. 196.

* Vdorum, fō-
tiū, fluentorum.
que amantior
hec, sed rarior;
cui⁹ folia Vale-
rianæ minimæ
æmula & con-
coloria sūt: cau-
liculus spitha-
meus sūmo di-
uisus è pusilla fi-
lamētis compa-
cta radice. Flof-
culis albis & pe-
ricarpijs Anagal-
lidis, sed exilio-
ribus multò, per
maturitatem fer-
rugineis. Secus
ripas & margi-
nes riuulorum
Austrayel paguli
altero ab vrbe
Antuerpiana la-
pide occurrit.



leg. pag. 196.
quasi Calli-
trich.

PARONYCHIA.

Diosc. Illi a paronychijs atque duritijs remedio est.

E. LATINE Diosc. Aduers. 197.
Veronica fœmina Fuchs. & Matth.

Immeritò hic notatur Matthiælus, quòd huic
perquam affinis & per similes plàta in Galliebergij,
etiamque Angliæ agrorū marginibus folia sinuata,
aliquantùmue pinnata ostentaret. Cætera cuncta
similia, aut eadem.

Diosc. Elatine oculorum fluxionibus & inflam-
mationibus auxiliatur, folijs cum polenta tritis & impo-
sitis. Eadem colli a sorditionis vsu dysenteriam sistit.

E. LATINE RECTA.

Pedis altitudinē assequuntur colliculi surrecti,
folio & facie nostratis, sed flore maiore, concolore,
exili cætilium fibrata radice, & folijs cauliculis in-
rumbentibus.



VERO-

ANAGALLIS cerulea *femina*. *Advers.* pag. 194.



ANAGALLIS aquatica.

ANAGALLIS lutea. *Advers.* pag. 194.




ANAGALLIS aquatica. *Advers.* pag. 195.
Sion, *sive Laner* & *Anagallis aquatica* *Fuchs.*
Sion non odoratum *Tragi.*

Trag. Apud veterinos magno est in usu, ut discutiendis tumoribus & sananda equorum scabie, alijsq; id genus affectibus: acetiis commanducata, calculos rumpit, urinas cit; facis mortuos pelit & menses. Cum aceto & butyro tosta & imposita, ac subinde renouata, tumoribus quibusvis & ignibus facis prodest.




ANAGALLIS aquatica altera, forè Sion non
odoratum alterum Tragi folio Pulegij regalis. *

PARONYCHIA albifolia. Advers. : 96.



PARONYCHIA altera Rutaceo folio.
Advers. 196.

* Vdorum, fō-
tū, fluentorum.
que amantior
hec, sed rarior;
cui^o folia Vale-
rianæ minimæ
æmula & con-
coloria sūt: cau-
liculus spitha-
meus sumo di-
uisus è pusilla fi-
lamētis compa-
cta radice. Flos-
culis albis & pe-
ricatpijs Anagal-
lidis, sed exilio-
ribus multò, per
maturitatem fer-
rugineis. Secus
ripas & margi-
nes rivulorum
Austruyel paguli
altero ab vrbe
Antuerpiana la-
pide occurrit.



leg. 196.
quasi Callis-
trichs.

PARONYCHIA,
DIOSC. Illi paronychijs atque duritijs remedio est.

ELATINE Diosc. Advers. 197.
Veronica saxina Fuchs. & Math.

Immeritò hinc notatur Matthiæus, quòd huic
perquam affinis & persimilis plàta in Gallobeygijs
etiamque Angliæ agrorū marginibus folia sinuata,
aliquantùmue pinnata ostendat. Cætera eundem
similia, aut eadem.

DIOSC. Elatine oculorum fluxionibus & inflam-
mationibus auxiliator, folijs cum potentilla tritis & eupos-
tis. Eadem coct. sordidioribus vsu dyfenteriam ficit.

ELATINE RECTA.

Pedis altitudinè a sequimur coliculi surrecti,
folio & facie nostratis, sed flore maiore, concolore,
exili tantillum fibrata radice, & folijs cauliculis in-
cumbentibus.



VERO-

VERONICA maior Septentrionalium. Moes
Fuchs & Dod. Advers. pag. 157.

VERONICA recta. Moes Martialis.



VERONICA
recta mini-
ma.



Minor se-
pillsifolia vs.
RONICA.
ibidem (se-
mina Dod.
Eadem pol-
licetur, sed
inefficacia
Dod.



VERONICA maior Septentrionalium.

Vicera, vulnera, omnia ad cicatricem perducit. pota, & imposta ad hernias efficax. vncias duas succi herbæ epotæ, cum vini albi vncia, vrinæ potenter ducere afferunt quidam non indocti. decoctum autem obstructionibus iocinoris & lienis referendis, medèdisque, abstergendo pulmonum vlceribus, perutilem afferunt.

VERONICA recta. Mai. Matt.

In hortis Belgij, Coldenbergij & aliorum, hanc vidimus folijs & flore in surrectis pedibus cauliculis, alijs non dissimilibus, sed maioribus, amarioribusque.

Ad febres, contagiososque morbos pul. trium drachmarum pondere epotus commèdatur Matthiolo: etiamque ad vteri, renû & vesicæ illunem propellendam, obstructionesq; viscerum referendas, vulgatæ nostræ Veronicæ modo.

VERONICA Recta minima.

Longè minor hæc vnciam & sesquiunciam æquans: folijs Veronicæ nostratis aliquanto minoribus. Flosculi non dissimiles, sed dètiore, como-fioresque, spicati, corniculis crebris succeden-tibus.

VERONICA Recta Herbariorum.

Folia Teucrij similia profert, aut Lysimachicæ caruleæ, cui congener cum folio, tum flore.

SYMPHYTUM petraum.

NUMMULARIA. Ital.
Diacarion.
Aduerf. 198.



BRUNEL-
L., SYM-
PHYTUM
petraum.



SYMPHYTUM petraeum. Aduers. 198.

Diosc. Genua dulco saluam ciens. Decoctum in aqua mulso & porum pulmonis vitia purgat. sanguinem veientibus, & renum malis, ex aqua datur. * ad dysenteriam rubraeque faminarum profusa, in vino decoctum ad conuulsa vero & rupta, ex aceto mulso bibitur. quoniam & commanducatum situm fedat. faucibus asperis subuenit. talia nera recentia enterocelasque conglutinat, & illitu cohibet. carnes autem cum symphyto decocta coalescunt.

Gal. Potest Petraeum Symphytum, collectum in thorace pulmonumque pus expurgare. Habet etiam contrahendi vim, qua sanguinis eiectionibus auxiliatur. Enterocelis imponitur, & ad conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur.

BRVNELLA, SYMPHYTUM petraeum. Aduers. pag. 199. Consolida minor Matth.

Iisdem viribus, quibus Bugula & Cochlearia, pollet; sed efficacius siccatur, adstringit, cohibet & re-primat.

BUGULA, quibusdam BRVNELLA.
Consolida media Fuchs. & Matth. Herba sacra Cordi. Arthretica
Pandeitarj Angul. Aduers. 199.

BELLIS maior.
Aduers. 199.



Varietas.

In horto Mutoni BUGULA annua alicur, flore non distincti, & eouirantali erecto caule, sed vegetio-ribus: folijs rotundioribus, latioribus, hirsutioribus asperis & rigidis.


Vulnere glutinat, sanguinis grumos dissoluit: Regis morbo & Ictero nigro, vesica fellea, hepate & liene ab obstructionibus liberis, medetur. Depressione oris & quibusdam vicera commo-destab-lyuntur. Inscena vulnere & enterocelas ferruminat. Urinas citat.

BELLIDES sive *CONSOLIDAE* *minores & mediae*,
Primulae verae Tragi. Ital. *Margarite* & *fiori di pri-*
ma Verigentili. Germ. *Mastliebent* oder *Zeit-*
lofen.

BELLIS, *caerulea nostra*. *Aduers* pag. 200.
 est *Aphyllantes* & *fronsiflorae* *Angulera*. *Mon-*
speliensis. *Globularia*, & Ital. *Botonaria*.

BELLIS maior sive *Consolida media vulnerariorum*,
Aduers pag. 200.

BELLIS Hortensis multiplici flore.



Succus, decoctum, stillatiuae ad rupta & vulnera feliciter bibitur. Unguentis & ceratis quoquo modo exceptus, imponitur, vel optimis practicis, Rondetio, alijsque: unde liquidò constat, temperatè frigidae & siccae, potius quam humidae, vt quidam volùt, naturae esse, nonnulla adstrictione mixta. Caeterùm cum articulorum sauos dolores lenire imposita prodatur, addita interdum malua & butyro, humorum illuc incitum impetum reprimendo, & deriuando, inflammationibusque intestinalium & feбри ardenti censmate conferat: eisdem præbet effectus Plantago, calorem mulcendo, reprimendo, & nonnihil roboris parti relinquendo, ad expulsionem. Venærem lenire aut facilitare, suspectum, vt Matthiolus & neoterici volunt.

BELLIS maior.

Consolida media vulnerariorum.


Hernijs potus & cataplasmate medetur: & eadem præstare quas *Bellis minor*, fertur.



Holostium
quorundam
Lacuna.

PILOSELLA. Gallobelgæ Peluette & veluette.
Germ. Gagelkraut & menscheer. Gal. piloselle. &
oreille de rat ou souris. Bel. Gagelkrupp, mupfso-
zen & piloselle. Ital. Pelosina. *Advers.* pag. 200.

PILOSELLA maxima Syriaca.



Potentissimè siccatur & adstringit: gargarizatu vuula, fauciumq; relaxationes reprimat. potu dysen-
tericis, enterocelis & vteri profluuijs medetur. Vulnora glutinat, laxosque lienis tumores & eruentas Mart.
deiectiones cohibet. pota & imposta, vulnora & vlcera quæ serpunt, ferruminat. Gallobelgæ & Ner-
uij syrupum è succo parant ad tuilum, tabem, & pthifim.

PILOSELLA maxima Syriaca.

Et aliam habemus Syria missam, folijs maioribus, carnosis, dense ab imo stipatis: candore & ligu-
gine sericeæue vellere, holoserici attractatu, hilari & specioso aspectu, incanis. Caules ternos, qua-
ternosue, quadrangulos, geniculatos, pedales emittit. Flores videre non conigit: radix durior, li-
gnosa, fibris donata.


GNAPHALIVM. *Advers.* pag. 200.

Dios c. Foljs pro tenuis utuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino austero ad dysenteriam.



GNAPHALIUM vulgare, Centunculus.
 Germ. Auerkraut. Belg. Auerkrupp & roet
 melissacrupz. videtur Impia Plin.
 Angl. Cotton weeds. Aduers. 201.

LEONTOPODIUM sive pes Leonis.
 Aduers. pag. 202.



Herba cōtrusa, oleo macerata & cocta, occidua Angliæ plebs ad liuores, concussiones, cæsa & verbera vitur feliciter. menses supprimit.

Plin. lib. 24. cap. 19. Herba impia vocatur, incana, Rotismarini aspectu, thyrsi modo vestita atque capitata. Inde alij ramuli assurgunt sua capitella gerentes; ob id Impiam appellauere, quoniam liberi super patentem excellant. Alij potius ita appellatam, quod nullum animal eum attingat, existimauerunt. Hæc inter duos lapides trita feruet; præcipuo aduersus anginas succo, lacte & vino admixto. mirumq; traditur: nunquam ab eo morbo tentari qui gustauerint. Itaque & suis daci: quæque id medicamentum noluerint haurire, eo morbo interire.

lege eandem
 speciosaque
 in. 18. pag.
 201.

In Anglico
 Gnaphalio.
 pag. 202.
 h. y. pediculis
 & pediculis
 radiceque
 capillacea.
 Item in. 10.
 verticilla-
 rim.

GNAPHALIUM montanum. Aduers. pag. 202.

Lagopus & pileosella Tragi.

Germ. Auerkraut & Belsenphatlin.

HOSTEACOLON Bononiensium.

Tomentosa herba Gnaphalio congener: binis foliorum ordinibus, maioribus, tomento incanis. in furculis exilibus, flosculi lateri. Hanc aridem vidi in sportulis Hermetis Clerici D. Medici doctissimi Toronensis, cui acceptam refero.

lege singula-
 ris globatus.



Holostium
quorundam
Lacuna.

PILOSELLA. Gallobelgæ Peluete & veluete.
Germ. *Wageläut & mupfoc.* Gal. piloselle. &
oreille de rat ou souris. Bel. *Wagelärupt, mupfoc-*
zen & piloselle. Ital. *Pelosina.* *Advers.* pag. 200.

PILOSELLA maxima Syriaca.




Potentissimè siccatur & adstringit: gargarizatum vultu, fauciumq; relaxationes reprimat. potu dysen-
tericis, enterocelis & vteri profluuijs medetur. Vulnere glutinat, laxosque lienis tumores & cruentas
deiectiones cohibet. pota & imposta, vulnere & vlcera quæ serpunt, ferruminat. Gallobelgæ & Ner-
uij syrupam è succo parant ad tussim, tabem, & phthisim. Marr.

PILOSELLA maxima Syriaca.

Et aliam habemus Syria missam, folijs maioribus, carnosis, dense ab imo stipatis: candore & lanu-
gine sericeæque vellere, holoserici attractatu, bilari & specioso aspectu, incanis. Caules ternos, qua-
ternosque, quadrangulos, geniculatos, pedales cauita. Flores videre non contingit: radix durius, li-
gnosa, fibris donata.

GNAPHALIVM. *Advers.* pag. 200.

DIOSC. *Folys prozomismo vtuntur. Bibuntur efficaciter folia in vino anstero ad dysenteriam.*




GNAPHALIUM vulgare, Centunculus.

Germ. Aurkraut. Belg. Auckkraut & root
 melissen crupt. videtur Impia Plin.
 Angl. Cotton weeds. Aduersf. 201.

LEONTODIUM sine per Leonurus.

Aduersf. pag. 202.



Herba cōtusa, oleo macerata & cocta, occidit Angliæ plebs ad linores, concussiones, cæsa & ver-
 bera vitur feliciter. mensis supprimit.

Plin. lib. 24. cap. 19. Herba impia vocatur, incana, Rotismarini aspectu, thyrsi modo vestita atque
 capitata. Inde alij ramuli assurgunt sua capitella gerentes; ob id Impiam appellauere, quoniam libe-
 ri super parentem excellant. Alij potius ita appellatam, quod nullum animal eum attingat, existima-
 uere. Hæc inter duos lapides trita feruet; præcipuo aduersus anginas succo, lacte & vino admixto.
 mirumq; traditur: nunquam ab eo morbo tentari qui gustauerint. Itaque & saibus dari: quæque
 id medicamentum noluerint haurire, eo morbo interire.

lege eandem
 specioque
 in. 28. pag.
 201.

In Anglico
 Gnaphalio.
 pag. 202.
 lege pediculis
 & pedis post
 radiceque
 capillata.
 in. 10.
 verticilla-
 tim.

GNAPHALIUM montanum. Aduersf. pag. 202.

Logopus & pilosella Tragi.

Germ. Auckkraut & Balenphatlis.

HOSTIACOLON Bononiensium.

Tomentosa herba Gnaphalio congener: binis foliorum ordinibus, maioribus, rotundo incanis.
 in furculis exilibus, flosculi lutei. Hanc aridam vidi in sportulis Hermetis Clerici D. Medici doctissimi
 Tornacensis, cui acceptam refero.



lege singula
 tis globulis.

Leon.



LEONTOPODIUM PATENS.

CHRYSOCOME aurea com. *Amaranthus luteus*
 Eufh. & Tragi. & perperam *Heliobryses*.
Linaria aurea. *Tinearca*. Germ. Reindlumen,
 quod in regionibus Rheno conterminis potissimum
 striatur. Ital. Amarantho giallo.



leg. in 18.
 NEMAV.
 811.

Altera Dioscoridi & neotericis præterita huic effigie habituque toto convenit, singulari dorsali cauliculo, & folio Gnaphalij montani densa lanugine incanis: flosculis summo caule luteo pallentibus Gnaphalij montani, exili ligneaque radice.

CHRYSOCOME.

Diosc. Radix asfacis & adstringis: hepaticis & peripneumonicis usis. Sumitur cum hydromelice decocta ad veteri purgationes.

Fl. res vino incocti aut infusi lumbicos nuperorum experimento; ex lixivio autem pediculos, expellunt, enecat. Facetas pulmonum, hepatis & viscerum referre asseruntur.

CHRYSOCOME Germanica. *Pseudoleontopodium* Mattb.
 & *Heliobryses* syl. Tragi.


Varietas.

Tomentoso Gnaphalij vulgaris annulo folio, flosculis pallidis & semine iuxta alas, in Germanis & Brabantino agro, ipsique Antuerpianis pomeriis cis aedes Domini de Berchem, sabuloso solo variat.


POISSON

POLIVM montanum. *Adanf.* 206. & 207.

*POLIVM luteum capitulis quàm Polij montani aut
marini longioribus ex herba viridantibus*. *Adanf.* 207.



POLIVM montanum purpureum.
Polium repens supinum Clusij.



Reptat Polij marini aut Serpilli modo numerosis furculis è radice lignosa: folijs caulescos vestien-
tibus, tenuifolis ambita exantibus denticellis, visa vix discernendis, tomento crasso aded incanis,
Polio maximo minoribus. Capitula item non diversa, sed minora, flosculis purpureis ornantur. Oritur
sponte arenoso solo Marsicani regni inter Lorra & Velez vna cum socio congeneris & similimo Polio,
maximo subdendo, sed maxiore.

Polium quinnum Clusij, superiori purpureo congener. Martio flosculis albis stipat cineritia aut candida lanugo densissima utraque: & odoris suavitate reliqua genera superant, ut auctor fidus est C. Clusius, cui hæc: duo Polij genera debeantur.

POLIUM, Ital. & Hisp. Polio. Angl. etiam Delp.
Aduers. pag. 207.

DIOSC. Potum feruesciti ius auxiliatur serpentium ictibus, hydropicis, morbo regio, & lienosis ex aceto. Stomachum malè habet. caput doloribus afficit. Aluum & menses ciet. substratum suffutimur serpentes abigit. Illitum * vulnera † conglutinat. Siccum cacoethe siue prava vulnera sanat.

* viride fol.
Cret
† tetrobis
ut malè
nata.

POLIUM MONTANUM supinum minimum.*


POLIUM LAVENDULÆ folio, samina recentiorum. Aduers. pag. 207.



* Montano vulgato Polio per omnia simile, sed quadruplo minus. Allobrogum collibus & Delphicis Gallie provenit.



AGERATVM AGERATVM *Septentrionalium*
floribus candidis.
Aduers. pag. 208. Costus minor hortensis
Gesneri & Dod. Mentha corymbifera minor Cordi.



AGERATVM *floribus candidis.*

Aduers. pag. 208.

.DIOSC. *Vis decocti feruens: Huius vis a nidor urinae*
est, & valua durities emollit.

TEVCRIVM *pratense officinarum. Hierobotane mat.*
Dod. & quorundam. perperam Chamaedrys Tuchs.
Germanorum & Officinarum. Aduers. 209.

TEVCRIVM, *Aduers. pag. 208.*

DIOSC. *Recessu cum posca, aut arida feruescit a ius,*
poen lienem potenter abstergit: lienosis cum aceto & sicco*
illinitur. item serpentium morsibus ex aceto solo, sine sicco.

* Gal. *quia incidendi & tenuium partium facultatis*
est: ponatq; ipsam quispiam in tertio exsiccationum,
secundo vero calfacientium ordine.

TEVCRIVM *pratense alterum: Sacra herba, sive*
Verbenaca supina faminta Dod.

Aliud à supradicto non est, nisi quia foliorum
 magnitudine vincitur. Hoc tamen pluribus foliis
 & cauliculis donatur, umbrosis: itidem marginibus
 sylvosis; gaudens.

AGERATVM
 florum
 candidis.

TEVCRIVM
 pratense
 officinarum.




TEUCRIUM *parvum supinum.*

E Teuerij familia esse docent flores cerulei spicatum prodeuntes, & foliola; sed angustiora, longiora minusq; serrata; Folio montano paria, atrouirentia, in cauliculis dodrantalibus humi fuisa, oriatur in Frisia iuxta Deuentriam & Ouerissel.

CHAMAEDRYS *Hisp. Chamedreos.*
Aduers. pag. 209.

CHAMAEDRYS *montana durior. Aduers. 209.*
Ceruitaria Gesneri quorundam. Ital. Chioma di
loue. Sic dicta à floris similitudine; qui è foliis sericeo vellere in latam casariem tortilibus crinibus expli-
eatur.



Chamædrys varietates. { *vulgatior minor.* [Folio obtusiore & mucronato.
Maior [Hirsutior & minus hirta.

Diosc. *Recent viridis in aqua decocta & pota, conuulsis, tuilentibus, lien indurato, vrima difficilis acie, hydropticis inter iuuia auxiliatur. Cui menses & partusq; extrahit. Licent ex aceto paria minui. Aduersus venenata, cum vino pota & illita efficax est. Trita ad gradibus in pilulas conformata: cum melle vetera vlcera purgat. Cum oleo trita inuncta & illita, oculorum caliginem discutit.*

† ob id hydropticis incipientibus efficax manualibus scopis eius decoctis in aqua vsque ad tertias, in tribus heminis aquæ.

Gal. Extertio ordine calcificantium & siccantium, vincentem amaram qualitatem habet, & est quodammodo acris: quocirca merito lienem colliquat, vrinam & menses mouet, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions expurgat.

Pli. subdit. Item stomacho, tussi vetusta, pituita in gula concretæ, ruptis, cõuulsis, lateris doloribus. Fit & vinum ex ea pectoris vitijs.

Azvl. Ad ruptos: herba Chamædrys contusa de ligno in liguum, adiecto vino & potui data, cum mira celeritate sanat. Ad ischiã: herba Trizago seruefacta, ac tunc potui data, ischiã vlcera tuncificè sanat. Ad podagram: herba Chamædrys in puluerem molissimum redacta est, cum squæ calida potui data, mirificè paregoriam præstat.

EUPHRASIA. Aduers. 210.

EUPHRASIA 2^o Dod. sive Cratogeomum alterum quorundam descriptum superius Observationum pag. 22.SCORDEVM. Hisp. Camedreos de arroyos
Aduers. pag. 210.

SCORDION.


Diosc. Herba vim excelsioriam habet. vrinam cit. cocta recens arida cum vino, aduersus venenos serpentium morsus bibitur. ad stomachi quoque rofiones, dysenteriam, & vrina difficultatem, bis drachmis cum hyaromelite. crassamen purulentum pellere expellit, facit arida farina ad vterum tufim, rupta, cum melle, si cum nasturtio, melle, & resina misceatur in aceto. inflammata modice praecordia, cerato excepta, pectat cum aceto acri aut aqua, podagris conuenienter eliminatur. menses impofita mouet. vulnera conglutinat. vetera vlcera purgat, & ex melle ad cicatricem perducit. sicca excrefcencias in carne cohibet. Sucus ad eadem vicia bibitur. Inter prima efficax Ponticum natione, Creticis quoque.

Aegin. & Gal. Scordium varium existit, ut quod amarum, acerbum & acre sit, purgat igitur simul & caesfacit viscera. T vrinam & menstrua cit. refrigerata omnia res caesfacit; aridum illud cicatricem inducit.

SCOR-

SCORDION alterum Plantj.
Aduers. pag. 210.
Scorodiana Cordi. Sphacelus Theoph. Dodonæo.

ORIGANVM Heracleoticum.
Aduers. pag. 211.



Scordio viribus proximum; fetus mortuos, menses & secundas pellit. facultates & dotes rubiæ ^{leg. atrol.} habet ad sanguinis grumos dissipandum, per urinas materiam deriuando. Collectionibus, tumoribus, ^{tente. 111.} percussis, liuoribus, ruptis & internis vulneribus fauciat ferrumini est. Sani qui Bieris inserant, Hormini modo.

ORIGANVM Heracleoticum.


DIOSC. Excalfacit. vnde decolorum cum vino potum, demorsis à serpente conuenit. si cicuram aut moconiam bantserunt, ex passio si gypsum aut ephemeron, ex aceto mulso propinatur. ruptis, conuulsis, hydroicis, cum fico esui datur. aridum acciabuli mensura potum in aqua mulsa, aros humores per aluum extrahit. menses dicit, & suffi cum melle linctum medetur. ad pruriginem, psoras, regiumq; morbum, decybi in balneis prodest. Succus vnicuius conuulsas, vnam, & oris vlcera sanat. & per nares, ex oleo vino infusum, trahit. aurium doloris cum lacte mulcer. conficitur ex eo, & cepis, & rhois frutice quo ad obsonia vtuntur, vomiturum medicamentum, his omnibus in cupras vase per dies bis vicinas insolat, donec canicula sydra flagrat. herba autem substrata serpensos fugatur.

Gal. & Aegin. calfaciunt & exsiccant ordine tertio.



AGRIGORIGANVM, sive ONITIS maior.
Aduers. pag. 211.

TRAGORIGANVM alterum. Martini Cortesi
& Matth. Aduers. pag. 211.



Diosc. Qua Onitis appellatur, candidiore est folio, & hyssopo similior. Semen veluti coniunctos corymbos habet. Vni ei Origani Heraclei, sed multo inefficacior.

Syluestre ORIGANVM. Hyssopum Dioscor. Cilium Anguil. Ital. Oregano bianco.
Aduers. pag. 211.

Diosc. Syluestre Origanum, aliqui Panaces Heracleon, alij Cunilam vocant, ex quibus cũ Nicander Colophonius. folijs est origani, raris tenuibus, dodrantem altis, in quibus umbella anethi insunt. flores candidi, radix n. et iustice
viriisque
valentius
Gaean. nua, supernacua. Peculiariter percussu à serpente, folia & flores ex vino poti admittantur.

TRAGORIGANVM.

Diosc. Optimum est Cilium, & Cretense, & Smyrnaum, & in Chio Cooq, proveniens. Omnia excalfaciunt, urinam cient, aluo accommodantur. decocto potu bilem deiciunt. uentosis ex aceto bibere prodest. contra pota iuxta venena in vino bibuntur. mensi trahunt. peripneumonics, tussitibus, ex melle in elegante dantur. gratia ac mitis eorum potio est, quare cibum fastidientibus, & stomacho acidaruantis, imbecilloq, traditur. item si in marissima inclinatione nausea, & astus praecordiorum excitetur. tumores verò cum potentia illa discutunt.

TRAG

TRAGORIGANVM flore albo Clusij.

Genuina Græcorum HYSSOPVS foliis Origani virelato flore. Aduers. 212.



Non diuersa huius figura, sed duntaxat tota minor, folijs longioribus tenuioribus, & odore minus iucundis. per verticillos flores galeiculati, sed albi. solo Valentino agro Clusio obseruata.

Genuina Græcorum HYSSOPVS.

Diosc. Vim habet extenuandi & calfaciendi. decoctum cum ficis, aqua, melle, & ruta. potumq; peripneumonici, diuturni tussi, suspensio, destillationibus, & orthonoicis auxiliatur. tinea enecat. idem facit, si cum malic delingatur. crassum humorem per aluum extrahit, decoctum ex aceto mulso epotum. ad subduendam aluum cum ficis viridibus decitis manditur. vehementius, addita iri, cardamomo, aut irione, deijcit. colorem in corpore fouet. lenti, & aqua inter cutem, cum siccis nitroque: inflammationibus quoque ex vino illinitur. cum feruente aqua impositum, fugilata discutit. cū decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. decoctum cum aceto, densum dolorem in colicis sedat. inflationes auricularum vaporis suffren discutit.

Gal. desiccet & exalfacit ordine tertio, sed & tenuium est partium.

* Hyssopo Arabum ad eadem hodie vtuntur medici.



SAMPSONIUS, sine Majorana.
Aduers. pag. 213.

Sampsonius
reputat pri-
mum lerofo-
rum delata
a quodam
assiduo.



AMARACTE
TENUIOR.
Majorana
tenuifolia,
delicior,
Aduers. p.

MARVM.
Aduers. p. 3.
An Helicium
Secundum
Alexand.
Thopis.



MARVM SY-
RIACVM,
gracilioribus
famentis,
minoribus
capitulis &
folijs Adu-
ers. pag.
213.



SAMPŒUCHVS. *Aduers. pag. 213.*

Diosc. *Vt eius excaifaciens: succus decocti potus conuenit incipientibus hydropticis, & ijs quos vrina difficul-
tas, aut tormina excruciant. illita ex melle arida folia, fugillata tollunt. menses subditi in pefso trahunt. contra scor-
pionis icturn ex aceto & sale illuntur. Luxatis tumoribusque, cerato excepta imponantur. aduersus oculorum inflama-
tiones, tumoresque cum polline potentia illini prodest. acopis malagmaticisque, calfaciendi gratia, commiscetur.*

MAIORANA capiti, cerebro, cordi, ventriculo peramica. Succus errhinis additus, caput à fri-
gidis humoribus purgati: menses vt Sampfuchus euocat.

MARVM.

Diosc. *Vm habet Sefymbrio confimilem. substringit enim & modicè calfacit: qua de causa illien serpenti vi-
cera ficit, & in calidas illitiones additur.*

Varietates. [Hispania folio longè minore luteo virente nobis largitur.

MARVM *supinum.*

Aliud non abfimile in hortis nostris alitur, sed cauliculis repit.

PYLEGIUM *Regium vulgatum.*

Aduers. pag. 214.



Diosc. *Ex-enuat, calfacit, & concoquit. Potum
menses, secundas & partus trahit cum melle, & albe po-
tum: ea qua circa pulmonem sunt, educit, & consilij Eald. 72.
auxiliatur. Nauseas stomachiq, morsu cum postea potum
lenit. Atram bilem per aluum educit. Cum vino potum ve-
nenatorū morsibus succurrit. Defectos animo, cum aceto
naribus obiectum recreat. Siccatum in puluorem tritum
crematumq, gingiuas firmat. Illitum cum potentia infla-
mationes omnes sedat. Podagris per se subuenit, impo-
situm vsque dum rubescat locus. cum cerato varros extin-
git. lienosis cum sale vtiliter illuntur. Decoctum eius ab-
lutas pruriginis mitigat. Conuersas vituas corrigit. Con-
tra inflationes duritijsque vulua in des. stiones conuenien-
ter adhibetur. Vocant aliqui Blechona, quoniam dum flores,
gustatum à pecoribus, balatum concitat.*

Gal. eadem: Pulegium calfacere abundè ma-
gnam est testimonium, quòd illitum rubrificat,
& quòd si quis diutius tolleret, exulceret. Exe-
nuare verò satis indicat, quum humida crassa &
lenta è thorace & pulmone excreatu facillia faciat,
menselq, moueat.


Plin. Magna societas cum Mientha ad recrean-
dos defectos animo. Quia de causa dignior è Pu-
legio corona vertigini quam è rosis, cubitalis no-
stris pronuntiata est, nam & capitis dolores impo-
sita dicitur lenare. Quia & olfactu capiti ceteri cõ-
tra frigidum aestusque iniuriar, &c.



Δικταμόν, **DICTAMNVM**. *Germ.* Diptam. *Ital.* Dittamo. *Hisp.* Diptamo.
Advers. pag. 214.

PSEUDODICTAMNVM *floribus verticillatis.*
Advers. pag. 215.

Angli *French* diptammer, id est Gallicum aut Francum, non secus ac Germani *Welscher* exoticas & rare inuentionis plantas vocitant.



In Vireto D. Francionis & D. Ioannis Boisor hoc anno floruit.

Diosc. Praestat omnia qua *saruū* Pulegium, sed efficacius multo, non potum modò sed appositum quoque aut suffitum, defunctos partus eijcit. Prodiunt in Creta capras sagittis percussas, huius herbae passu, eas excutere. purgandi vim habet succus illius, ut cum polenta tritus. herba impactos pedibus reliquòque corpori aculeos, illius reficit. ad lieui dolorem efficac habetur, siquidem ipsum inminuit. Metunt astate & autumno. Radix eius gustu calfacit. partus accelerat. succus cum vino potus, contra serpentium morsus praesidio est. tanta herba facultas est, ut disacta abigit bestias, qua venenato ictu seuiunt, appensaq, contactu exanimat. vulneribus ferro illatis, & venenatis moribus, infusus succus praesentaneo est remedio, si etiam ab intillatione statim in potu assumatur.

Gal. tenuiore essentia constat quam Pulegium: cætera illi simile.

PSEUDODICTAMNVM.

Diosc. Quod Pseudodictamnvm vocant, multis in terris nascitur, antè dicto simile, sed minus quam illud acre. Eosdem effectus prabet. * sed inefficacius multo.

DICTAMNVM alterum Creticum Dioscoridis.

Desertur à Creta alterum Dictamni genus, folijs silymbrij, ramis maioribus, in quibus flores sylvestris Origani, nigri, molles. odor solorum inter silymbrium & saluam incensissimus. Efficax ad eadem, sed minus nares ferre. misceatur emplastris & medicaminibus qua aduersus serpentium iniurias confinguntur, tberiacam vocant.



O C I M U M *medium vulgatum.*
Advers. pag. 215.

O C I M U M *maximum Caryophyllatum ac Citratum.*
Advers. pag. 215.




Diosc. Copiosiore cibo oculorum aciem debetat. alium mollit. spiritum movet. urinam ² pellit. Lac evocat. a lacrima
 agrè tamen conficitur. illatum cum polline polente, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est. draco-
 nis marini & scorpionis ictibus per se prodest: & cum vino Chio, oculorum doloribus. Succus visus caliginem ^b abster- b item
 git. destillationes exiccac. Semen potum convenit atram bilem gignentibus, difficili urina, inflatisq; naribus haustum
 subinde movet ^c sternutamenta. quod idem herba efficit. sed oculos premi necessum est, cum sternutamentum urget. e Exlem
 Sunt qui in cibo abdicandum censeant: quandoquidem manducatum, & in sole positum, verniculos ^d creat. Apert
 autem adijciunt, si feriantur à scorpione, qui ocimum ederint, nullo conficit ari dolore. d inficiat


Gal. Ocimum excrementitiam humiditatem habet, proinde nec commodum est quod in corpus
 sumatur. Cæterum foris illitum, ad digerendum & concoquendum vrile est. Plerique hoc etiam ut
 obsonio vtuntur, ex oleo & garto offerentes: vinosioris autem succi est, stomacho inimicam, & con-
 coctu pertinax olus.

Plin. Ocimum Chrysippus graviter increpuit, inutile esse dicens stomacho, urinæ, oculorum quo-
 que claritati: præterea insaniam facere, & lethargos, & iecinoris vitia, ideoque capras id aspernari:
 hominibus quoque fugiendum censeat. Afrj verò si eo die feriatur quispiam à scorpione, quo ede-
 rit ocimum, sanari non posse, &c. Secuta ætas acriter descendit, nam id esse capras. nec minus quàm
 Menthã & Rutam scorpionum terrestrium ictibus, marinorumque venenis mederi cum vino, ad-
 dito aceto exiguo. Vsu quoque compertum deficientibus ex aceto odoratum, salutare esse.

Semen potum. J cardiacis affectibus succentrit Simeoni Sethi, animiq; rætrorem ex atra bile ortam, in
 hilaritatem mutat.



Ocimum minimum Ambraci figura Caryophyllatum. Aduers. pag. 215.



Acinos Aduers. pag. 215. 216.
Betonica Pauli quorundam. an *Climoponium* Lacina?
 Germ. Wild basilic. Belg. Wilde basilicon. Gal.
 Basilic sauvage. Angl. Wild basil. Hisp. Alba-
 haca saluage.*



lege quemad-
 modum 216

Coscoros
 Plinij. Mo-
 indus Sera-
 ptusis quo-
 rundam.



*Diosc. *Ocimo* similis, odorata, sed hirsutior. Men-
 ses & aluum pota sistit. Illit apertos ignemque sacrum sa-
 nat.

ERINVS. Hisp. Albahaca de arroyos. *ocimum*
aquaticum. Aduers. pag. 216.

Diosc. Semen drachmis duabus in quatuor mellis
 cyathis, oblitum, oculorum fluxiones cohibet. Succus ^{lege quemad-}
 cum sulphure & nitro instillatus auertit dolores sedat. _{modum}

Coscoros Plinij.


Folij est *Ocimi* in sesquipalmariis & dodran-
 talibus cauliculis. Fliculi iuxta pedicelos lateri.
 Semen in longis corticulis *Asclepiadis* gracilio-
 ribus. Hispano semine in per sibus *Adonis*isque
 hortis alebat illustri vir Ioannes Brancionus, &
Coscorum Plinianum faciebat.

CASA

lege

AN CALAMINTHA aquatica Boigartum sive POLY-
CNEMVM, quæsi multistibia aut multivaria.
Pulegium agreste Officinatum. Nepeta agrestis Tragi.
Germ. Kechernept. Advers. 217.

CLINOPODIUM vulgare odore Pulegio lucidior.
Germ. Wilderthut 3. Prop. Advers. 217.
Ocimum sive Acinus Dod. perpetua Calamintia men-
tana Tragi.




Diosc. Folys origani: caule ut pulegij geniculis multis intersepto, sine umbella, tenui, tamen in cacumine co-
rymbo, boni odoris & acris. Vulneritas agglutinandi recens, aut aridum cum aqua, efficaciter idmitur, sed quanto
die solus debet: ad vrine stillicidium, rupta, cum vino bibitur.

CLINOPODIUM.

Diosc. Bibitur herba & succi eius decoctum ad conuulsa, rupta, strangurias, serpentium ictus. Menfes &
partus pellit, & pensiles verrucas, quas acrochordonas vocant, efficit aliquot diebus potum. Alium sicut decoctum
ad tertia, potum, si febrim sensimus, ex aqua: alioquin ex vino.



MENTHA
 vulgaris
 officinarum
 folio
 Terebinthaceae
 Mentha
 Dod. Germ.
 Mentha
 Dod. Germ.
 Mentha
 Dod. Germ.



MENTHA
 rotundifolia
 altera, flore
 spicatus sine
 CRUCIATA
 MENTHA
 Mentha
 secunda
 Dod. Germ.
 Spearmint
 Dod. Germ.
 Spearmint
 Dod. Germ.

MENTHA
 Romana
 officinarum
 folio
 Mentha
 Dod. Germ.
 Mentha
 Dod. Germ.
 Mentha
 Dod. Germ.



MENTHA
 Romana
 angustifolia
 sine
 MENTHA
 quarta
 Dod. Germ.
 Mentha
 Dod. Germ.



Mentha spicata varietates quinque.

Romana longifolia angustifoliâne descripta *Advers.* 218,
 Altera perfoliata folio nigriore, & rigidiora.
 Tertia latiore folio.
 Quarta rotundo crispo folio.
 Quinta folio minus acuto.

SISYMBRIA MENTHA *agrestis sativa* Cruciatâ *Mentha congener aut eadem.* Ital. etiam Balsanita, seu *Mentha Crespa.* *Sisymbrium sativum* Matth.

σισυμβριον. AQUATICA sive SISYMBRIA *Mentha rubrofolia, & flore nigra* *Mentha Balsamica* *Officinarum.* Ger. Wasser muntz, Gal. *Mente aquatica.* Belg. Stoot water muntz. It. d. Balsanita. *Advers.* 219



Diosc. Calfaciendi, adstringendi, atq; exsiccandi vim habet. proinde sanguinem sistit succus eius cum aceto potus. Lumbricos rotundos enecat. Venerem concitat. Singultus, vomitiones, cholera, sedane duo aut terni fereali cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cum polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet. Mammis si tendantur, aut lacte turgent, compescit. Cum sale cauum versibus illinatur. aurium doloribus cum aqua mulsâ subuenit. vulua ante coitum admota, conceptioni resistit. Lingua scabritiem consyida laugat. Coire lac, densariq; in caseum non patitur, si folia potionibus lactis im mergantur. In summa stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet.

Menthastrum minus ad sanorum usus expetitur.

Gal. Mentha sativa ad venerem mediocriter excitat. Et quod omnibus commune est quæ humiditate semicocta & statiosa participant. Ob talem ipsius herbae temperaturam in abscessibus aliqui eam cum polenta mista vruntur. Habet etiam quiddam amarum in se & acerbum; illo quidem humore coq; interficit; acerbitate verò, si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimit. Si testantia est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

Actius addit, potum eius decoctum tribus seriâim diebus, cholicos omnino sanare.

Plin. Menthae hortensis odor animum excitat, & sapor aciditatem in cibis: sed in marmarum mixtura familiares ipsae accessere, ut coire densarique lac non patiantur. quare lactis portionibus additur, ne huius coagulati potu strangulentur. Data in aqua & mulso, eadem vi resistere & generationi creditur, cohibendo genitalia densari.

MENTASTRUM. *Aduers. pag. 219.*

Gal. Mente sauage. Angl. etiam wilde st. pntz.

Germ. wild Muntz. Hisp. Mastrosantos. Lusit.

Mestrosantos. Ital. Menta saluatica.

MENTASTRI varietates.

Per simile Mentastro descripto pag. 218 sed folia nigriora, longiora, minusque incana & hispida, flos item spicatus. In agro tisho secus Campé & Zvvolen oritur.

MENTASTRUM niveum Anglicum.

Aduers. pag. 219.



MENTASTRUM minus spicatum.

Odore mitius minusque graue; folio Heliotropij tricocci.

Mentastri folia aquatica hirsuta CALAMINTHA
tertia Diosc. Aduers. pag. 219.

Tertia Diosc. Calamintha Mentastro cognata, cum primum eximpt, folio exit Cassia Menthae longiore & rubere Mentastri sic & posius eade Mentastro maiore prociore, multis alis diu foliis quibus fiores spicati exulet. Cassia modo digesti.


Kalkb. 170. CALAMINTHA montana praestantior.

Advers. pag. 219.

Gal. Calamen t. Hipp. & Ital. Calamento.

CALAMINTHA montana vulgaris.*

Floribus quavis Calamintha maioribus, aspectuque hilarioribus.



* Media odoris suavitate & magnitudine inter suaviorem Calamintham & Nepetam hæc. Quadrato quippe cubitali & ampliore alarum multis ramulis concavo caule fructicat, foliis rotundioribus, nigrioribus Nepetæ similibus, sed maioribus, hirtis, nitidioribus, & iucundioris odoris fragrantia. flosculis non disparibus. Chusis ite Angliæ, Germaniæ, Galliæ, & Italiæ sponte oritur, vnde in viretis nostris hæc ut plurimum alitur ad vsus medicos.

CALAMINTHA montana.

DIOSCOR. Omnium folia admodum seruentia & acris. Radix inutilis. Potæ aut illa domonstis à serpente capitulatur. Decoctum eius potum yrimas & menses expellit. Ruptis, convulsis, ortu hoc neca tarminibus, obolera, rigentibus auxiliatur. Prasumpta in vino venenis resistit. timeas ceteraq; interaneorum antiodia, cum sale & melle pota, enecat. nec secus cocta crudane, si ceratur. elephanticos estata adiuuat, si postea serum lactis ebibatur. Folia detrita si in velle subiciantur, menses extrahunt, & partus enecant. accensa aut substrata serpentes fugant, nigris est acricibus candorem reddunt, in vino cocta & illita, sugillata rollunt. Calamintha à schiadicis imponitur, ut ex alio humores euocat, suum in cutem exurens. vermes necat succus auribus instillatus.

Gal. Calfacit & sudorem ciet, omneque corpus tum digerit, tum exsiccet: ea ratione ducti quidam ipsam contra rigores per circuitum repetentes adhibuerunt.

Discutit frigora in aqua decocta Plin. eadem Gal. eadem Gal.

eadem Gal. subditque: Potum etiam elephanticorum remedium, non eo tantum quod strenue tenues humores digerat, verum etiam quia extenuet & incidat valenter crassos quales sunt qui hunc morbum procreant. sic & cicatricibus atris candorem reddit, & sugillata digerit. Sed ad talia recentem magis quam arentem adhibere potest. quippe arefacta vehementior redditur & ad vrendam promptior.

Potro talis cum sit, ad venenarum bestiarum morsus assumitur, velut etiam caustica, & quaecunque medicamenta calida sunt, & acris, tenuiumque partium, quaeque facile ex aëre ad se se circumiacentem omnem humiditatem possunt attrahere.


Vermes necat.] Gal. Ceterum quae illi inest amaritudo plane exigua est, verum ad quaedam ita efficaciter agit, ut quae valentissima est, nimirum cum coniuncta sit vehementi calori cum tenui essentia: quare & ascaridas & lumbricos succus eius infusus aut potus enecat: Eadem ratione aurium vermes, aut si alicubi in parte corporis sinuosa aut implicata quae putredine tenentur, talis prouenit affectus. Sic & conceptum seu pota, seu admota interimit & eiicit. Igitur incidendi quidem ei vis adest propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem: abstergendi vero propter unicam amaritudinem. Itaque asthmaticis ad omnia antedicta prodest. Ictericis vero potissimum ob amaritudinem, sicut alia ferè omnia amara, utpote abstergentia & expurgantia in iecinore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

Ictericis
prodest omnia
amara.

Plin. Tusa ægilopis imponitur & capitis doloribus recès cum tertia parte panis temperata aceto illinitur. Succus eius instillatus naribus supinis profuuium sanguinis sistit. Item radix cum myrthi seminae in passo tepido gargarizata, anginis medetur.

*CALAMINTHA altera odore graui Pulegij,
foliis maculosis. Aduers. pag. 219. Nepeta Diosc.
Angl. Calamint. Ital. Nepotella montana.*

*CALAMINTHA secunda incana.**



* Huius altera speciem ex Italica collibus attali, gustu Pulegij, foliis Maioranae duplo minoribus, canaliculatis, uti tota planta, in cubitalibus & pedalis surculis, exiliores hinc seculi Calaminthae suae Dioscoridis Nepetae odoris grauis Pulegij, Cautibus Linguagotticis calidaremque regionum oriunda.

Varietas.

Varietas. Floribus albis ex collibus Picardiae & Gallobelgij transiit ad nos Calamintham secundam D. Carolus de Houchin literatissimus, & harum si quis alius strenuus & peritissimus indagator.

Agrostis

Calamintha

mentha

mentha

mentha



MENTHA
Cataria.



MENTHA
angustifolia.



MENTHA CATARIA. *Nepeta* Tragi.
Advers. pag. 220.
Hisp. yerua Gatera.

*Mentha CATARIA duplex peregrina, latifolia
& angustifolia.*



Huius duas species primùm videndi copia fuit in horto antenissimo scirpiumq; ditissimo Ioannis Montoni Neruensis myrogoz in hac palestra bene versati. Folia angustiora Cretici Marrubij proxima, incana. Flores candidi, copiosi, Catariaz vulgaris verticillatim prodeunt; caulem itidem quadratum ambiètes, multis concavum alis, eiusque summum decorantes. Magisq; intensus odor, grauior vires etiam acriores quàm Cataria.

Alteratuntaxat angustioribus, minoribusque foliis variat; ceteroquin reapse vna. vtraque Hispano semine facta.

A. P. L. A. S.

APIASTRUM sive **MELISSOPHYLLON**
Gal. etiam ponceyrade. Germ. Bontgölnem. Hisp.
Torongil. Lusit. yerua Cidreira. Ital. Melissa.
Cedronella, & Aranciata. Allegracuore.

MELISSOPHYLLON Fuchs. Cordi, & Tragi.
Herba sacra Agrippa, & Lamium
Plin. quibusdam.



Varietas. Latiore folio & hirsuto, odore suaviori, in Belgio variat.

Dioscor. Folia cum vino pota aut illita, contra scorpionum, phalangiorum, canumq; morsus profunt. Deco-
rum eorundē, si eo perfundatur, idem potest. In infestationibus ad ducendos menses vtile est. Dentis eodē in dolore colluun-
tur. Dysentericis iniectum prodest. Fungorum stragulationibus, folia cum nitro pota succurrunt. Torninibus auxiliant-
ur. Dantur in eclogmate orbisnoicis. Illita cum sale strumas discutit. Ulcera purgant. Articularum dolores mirigant.
'Plin. eadem. 'Plin. Vulvarum habet. 'Idem Plin. 'Idem Plin. 'Plin. eadem.

Gal. Marrubio facultate simile est, sed plurimum ab eo vincitur: quamobrem nec vitur illo quif-
pam. Superuacaneam siquidem foret presente Marrubio (cuius tantus est vbique terrarum prouen-
tus) velle vt Melissa phyllo. Plin. Caligines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur.

Sethus. Ad stomachi motus ex frigiditate, & à nigra bile tristitias & tumores qui sine ratione ex illa
sunt, confert. Hilaritatem efficit, & ad melancholicum ac pituitosum humorem prodest, fertur quod
industriam afferat, & quod ante somnum sumptum, bona somnia faciat, contraria ratione cum bra-
fica, quæ mala insomnia affert. Bubones lædit.

Suffocationi matricis auxiliatur Dodonæo. Recentia vulnera imposita glutinare potis est.

Extractum Mellis Chymicum.


Melissa minutim inciditur, inditurque ampullæ vitæ; & vino stillatio, quod duos digitos super-
mineat, perfunditur: deinde illa cæco operculo oclusa, maceratur in balneo, vel in sole, vel iuxta for-
nacem diebus aliquot; postea eximitur & sub prælo validè exprimitur, sacibusque reiectis, recens
herba in idem vinum ponitur, maceratur, exprimiturque vt prius: idque labor ter quaterq; repetitur,
prout extractum efficax desiderauerimus. Tandem vinum illud in balneo ex ampulla extillatur, dum
extracti spissitudo in fundo mellis instar appareat, vel vini spiritui enocato aquosum effluat.

MELISSOPHYLLON Fuchsij, &c.

Folio Melissa phylli longiore, aut Menthe atrouirente, in cauliculo quadrato pedali: flos rubellus dilu-
te purpurascens oblongior, amœnus Laniij lutei. In vallibus Germaniæ & Narbonens Gallia oriunda.

CARDIACA

CARDIACA
MELIUS



MARRU-
BIUM albu.

MARRU-
BIUM
didum ab-
reus Hys-
panicum.



CARDIACA. *Aduers.* pag. 211. *Gal.* *etiam* Creneuse à crenatis foliis.

Decoctis cordi amicis sæpe miscet doctissimus & experientissimus D. Zigerus Cobeigiens Antuerpianus medicus imposita vulnera ferruminat.

Leg. pa sat.
dider.

CARDIACA *Melica.* *Aduers.* pag. 221. *Molucca minus aspera.* *Mafelic* Turcarum est *Molucca aspera.*

MARRUBIUM album. *Hisp.* Marruio blanco. *Ital.* Marrubio bianco.

MARRUBII candidi varietates.

Foliis longioribus magisque carnosis, hirtis, albis & suavius redolentibus in Belgij hortis variat Hispano semine.

MARRUBIUM *Aduers.* pag. 222.

DIOSCOR. *Huius* folia sicca, cum semine decocta in aqua, aut viridum succus datur cum melle suspiriosis, insipientibus, & ad tabitudinem redactis, crassam è pectore pituitam, cum sicca tri eicit, mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat. item in difficili partu, & his qui venena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt, vesicam renescit, ledit. Folia cum melle illinuntur sordidis viceribus purgandis, pterygia nomasq; sistunt. laterum dolores mitigant. Succus foliis confusus expressus, & sole coactus ad eadem pollet. cum vino & melle illitus, oculorum claritatem adiuvat. maribus trogium morbum expurgat, aurium doloribus conuenienter instillatur, per se aut cū rosaceo.

* eadē Gal.
† idem Gal.

Gal. Prassium vt gustu amarum est, ita si quis vtatur, conuenientem huic saporis actionem habet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemq; expurgans, ac menses promouens. Sed & illicum detergit ac digerit. Eadem ferè *Plin.*

BALLOTE, sive MARRUBIUM nigrum. *Aduers.* pag. 222.

Germ. Rhatz andorn. *Gal.* Marrubin noir.

Hisp. Marruio bastardo. *Lusit.* Marruio negro. *Ital.* Marrubio bastardo.

MARRUBIUM Hispanicum odore Stachadis:

Fortè *Ocymastrum* *Valentinum* *Clusij.**



DIOSCOR. *Balloses* vis efficax aduersus canis morsus, foliis ex sale illatis. *Exurenti* cinere succescunt folia, ut condylomata resprimant, purgant & sordida vlcera cum melle.

* *Emulo* sed oblongiore Marrubij nigri folio, pseudodictamnno propiore & concolori: floritem secundam ramulos, pulegij ritu, purpurascens. Hispano semine natum studiosè alit à Ioanne Matone Neraiensi Myropola doctissimo in fictilibus. Videntur sanè idem aut congener cum *Ocymastro* *Valentino* *Clusij*, icone & his verbis expresso. *Pedali* est altitudine, ramis quadrangulis hirtutis; foliis per singula genicula ex aduerso sitis, ocymii magnitudine & forma, gustu adstringentibus: circa summos ramos flores proueniunt orbiculatim compositi Marrubij modo, candidi, octini floribus omnes in vastulis pungentibus; semine Marrubij nigri: radix *Vrticæ* aut *Lamij* æmula. *Prouenit* copiosè circa ramos ex flumine ductos ad urbem *Valenciam* in *Hispantiis*: vbi *Aprilis* initio flores & semine prægnat.

GAL. OPUS.

GALIOPSIS, siue *Vrtica non mordax*.
Aduers. pag. 222. *Lamium Anguil.*
Purpurea Galeopsis Heraclea Plin. Tragi.
Germ. Waldmeisel.

LAMIUM, siue *Archangelica flore albo*.
Aduers. pag. 223.
Perperam Galeopsis herbariorum Matth. Lacina.
Hisp. hortiga muerte. Ital. ortica morte.



DIOSCOR. Folia, caules, semen, succusq., durities & carcinomata dissipant. strumas, penos & parotidas discutunt. oportet bis die tepidum ex aceto cataplasma imponere, & eius decocto fouere. ad putrescentia, gangranas, & nomas, cum sale efficaciter illinuntur.


LAMIUM.

Abcessus & duros tumores digerendo absumit.

VRTICA.

DIOSCOR. Duo vrtica genera, syluestris, asperior, latioribus, nigrioribusq., foliis; semine lina, sed minore. altera non aequè aspera, minuto semine. Folia vtriusque illa, canis moribus, addito sale, medentur gangranas, carcinomata, sordida vlcera, & que cacœthe vocantur, item luxata, penos, tubercula, parotidas, suppurationesq., sanant. diuosis cum cerato imponuntur. faciunt ad prostrum narium, cum succo tyria, & naribus indita. menses eunt, eadem de vna cum myrrha, & imposta, procidentes vuluas, recentia contactu resillere cogunt. semen porum ex passo, venereu stimulat. vltima ora patefacit. cum melle delinunt; arthropna, lateris & pulmonum inflammationibus, prodest. aciem expurgat, erodentibus medicamentis admiscetur. Cocta cum conchyliis, aluum euollunt. vrinas mouent. inflatres discutunt. decocta cum prifana, vltia peccoris contrahunt anallis. ut menses eunt. cum myrrha modice porum. In inflammatione surgentem vnam, gargarizatus succus repræsentat.

eadem Gal.
& Plin.



URTICA fylvestris asperior. Ital. Ortica
volgare. Hisp. Hortiga.
Adversf. pag. 223.

URTICA Romana. Germ. Rottschneffel. Belg.
steensche uetelen. Gal. Urtia Romanaq.
Adversf. pag. 223.



Gal: Herba semen & folia, nam hæc potissimum in usum adhibentur, digerentis sunt facultatis, adeo ut tubercula & parotidas sanent. Sed & quiddam flatuosum obtinent, quo & venerem * extirpant. Porro quod non vehementer calefaciat, sed admodum tenuium sit partium, testatur Eadem Gal. & Plin. crassorum viscosorumque humorum ex thorace & pulmone eductio, tum quod partes quas contigerit, pruriant. Cæterum flatuosura eius, cuius pariceps esse dicta est, dum concoquitur, nascitur, non enim actu flatuosa est, sed potentia. Ventrem autem mediocriter subducit ipsa duntaxat absterfione, ac veluti titillatione, non purgatione.

GAL. *Gangrana.*] Gangranosa & cancrofa, & in totum que exsecari citra mordacitatem possunt, ea convenienter sanat.

Plin. Articularibus * morbis & podagricis plurimi cum oleo vetere aut folia cum urfino adipe cruda imponunt. Et ad eadem radix tusa cum aceto non minus utilis. Eadem psilothrum exicat.


* Et ischiaticis hodie expetitur.



URTICA minor acrior. Germ. Brennnessel & habernessel. Belg. Heeten netelen.

TETRAHIT Advers. pag. 224.
Heraclea Syderitis Dioscoridis Corde, Clusio, & alijs. *

lege quidam.



TETRAHIT herbariorum varietates.

*Segetibus nostris aestivum est floribus ex luteo purpurantibus, caule pedali & maiore.
Aliud longè minus in segetibus item nascitur floribus albis aut rubentibus.

Diosc. illi a foliis, saepe vi, vulnera sine inflammationis periculo iungunt.


Gal. Sideritis habet quippiam etiam abstergendi quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est & mediocriter frigida; paucula verò inest adstricção; quare phlegmonem sedat & gluvinat.

TETRAHIT quorundam.

Flos Nartice Pliniana dictæ, vel Ononidis; foliola oleæ, Phyllithelgion in palmaribus & scilicet quipalmaribus cauliculis. In Italiae sylvosis Bononiensis agri lecta sedula manu & industria D. Davidis van Meuden.



ALYSSON Galeni Clusii & Herbarijs.

MARRUBIUM aquaticum vulgi. Syderitiis secundis
Martii. Advers. pag. 224.

ALYSSON.

Propter vulgum, ortum, flores & pungentes verticillos haud ita dispares Syderitidi siue Terrabit
subdendum fuit Alysson Galeni dictum. Folia tamen latiora, in pedibus quadratis cauliculis ro-
undiora, divisis & effigie Buguiae, carnosa, hirta & tomentosa, uti tota planta. Radix lignosa, fi-
brosa, flos è verticillis Marrubij caeruleo purpureis. Hanc stirpem mihi communicavit præclarus D.
Ioannes Dilsius & Ioannes Muttonus, stirpium & naturæ miraculorum summi admiratores, qui hi-
spano semine plantam nacti sunt.

Gal. Alysson lib. 11, de antidot. Marrubio per similes herbula, sed asperior & magis spinosa circa
orbiculos flore ad caeruleum vergente.

SYDERITIS Montpelliana Scordoides floribus luteis. Advers. 225.
Tragonitum praeoides Francisci Pennisi.

Plura super-
ius in Alyss.
fo. Dioscori-
deo.



CANNABIS. *Advers.* 226. *Ger.* Kernerhanf.
Belg. Hemp. *Ital.* Canape. *Hisp.* Caña no do-
 mesticó. *Gal.* Chambré. *Ang.* Hemp
 & Hemp.

CANNABIS *erratica pedunculata* *Hil.* *Ital.* Canape
Luaticó. *Hisp.* Cañamo salvaje.
Advers. pag. 227.



leg. Biffon
 etc.

Diosc. Cannabis sativa largiore cibo genituram exinguit. Succus ex ea recens contusienter aurium* dolori- *Idem Plin.
 ribus † instillatur. † ab obstructione, ut videtur Galeno.

Syl. CANNABIS *Dioscoridis*, est *Alcea maior Martio flore Lychnidis*
subnigro, semine & radice Albea.

Diosc. Decocta radix illius inflammationes mulcet, tumores discutit, topicos articuloꝝ dissipat.

Gai. Semen flatus extinguit, adeoq; desiccatur, ut si platculum edatur, genituram exiccet. Semen
 etiam difficulter concoquitur. Stomacho & capiti aduersatur, priusque humores creat. Admodum
 exalfacit, ideoq; caput estuoso, ac medicamentoso halitu sursum misso tentat.

Idem somnum conciliat ut Iris, quo sæpe abutuntur medicasti & clinici.

Plin. Radix contractos articulos emollit in aqua coctam, podagras & similes irapetus. Ambustis
 cruda illinitur, sed sæpius mutatur priusquam atrescat.

Simeoni Setho Semen largius sumptum idem nocumentum quod Coriandrum adfert, deli-
 riumque facit; desiccatur semen genitale, ut Caphura.

Cannabis aquatica planta EUPATORIUM dicta. Advers. pag. 227. *Officinis Gallie*

Eupatorium Cannabisinum Antenna. Pseudopatrium in s. Dod. officinis vernacula.

Offic. Belgij perperam Eup. torium Græcolim. Germ. Stoffentale,

Wasserdoff, hungaricant. Belg. Woolven cruydenauckant.

Boëxt. STACHYS *Dioscoridis*, *Scordatis Plin.* lib. 15. cap. 8. *Marrubium agreste Tragi.*

Pseudostachys Martii. Germ. Steil Rüberr. Advers. 226.

Diosc. Vim habet succifluciam & acromfelicum doctam gora pellis menstrua & secunda.

St. 4.



Crista-
alli L.
barbarum.
Adversary.
Germ. *Stel-*
Stels.
Belg. *Stats-*
len & gals
Statis &
han-ran-
nicks. i.
Cristan gal-
li à foru si-
muscudinc;
vulvū; nou
dijpat, vt
Plinius ha-
bet.

CRISTA
alli

STACHYS.
Aquil. 116.
Rosa Maria
Aquil.
G. S. *Stach-*
is
frons &
Siphocur.
Cala allu-
nia & her-
b. sua sil-
lex on sil.
L. S. *Stach-*
is
L. S. *Stach-*
is
L. S. *Stach-*
is




Stachys
Stachys
Dioscoridis,
Scordus
Plinij.



STACHYS
teuria Flan-
dronum. Ad-
vers. 229.
Sphaecus
Gualandino.

Dire succo
aqua.



BETONICA. Ital. & Hisp. Betonica.
Advers. pag. 229.

Herba venti
Rondel. an
OTHONNA?
Advers. 229.
Parietaria
Cordi Mon-
spel. Syaczi-
tis genus
Dalech. Ital.
Verbasci syl.
species

†
n. Non actum
dicitur. ~
Inj. raris
hinc est ~



STACHYS *Lasiatica quorundam.*

Repricem Gnaphalij folijs & cauliculis sesquipalmaribus herbulam, candida lanugine stipatis & tomentosis verticillis concoloribus perexiguis sub foliolis cinctis visum effugientibus, suavè spirantibus, vti planta vniuersa, Stachyn dixere Herbatorum quidam non imperiti, nonnulla de facie & viribus similitudine ducti.

OTHONNA.

Diosc. *Extractus succus oculorum medicamentis adijcitur, vbi expurgare est opus; mordet enim & absterge* *ansiem caliginem qua oculis offunditur.*

BETONICA.

Diosc. *Betonica radices ex hydromelite in potu, pituitosam vomitionem euocant. Folia dari debent ruptis, con-* *sulsis, mulieribus vulua malo opportuni, & ad laxandos veteri strangulatus, denarij pondere cum hydromelite: tres* *in vini sextario drachma, contra serpentium morsus ebibuntur. Herba magna utilitate illata à serpente vulneribus* *illinitur: aduersus etiam venena drachma ex vino pota conuenit. præsumpt: ea, si venenum * hauriatur, nihil necesse* *est: urinam ciet: aluum subducit: in edetur comitialibus & insanis, pota ex aqua: & iocinoris lientisque vitijs, drach-* *ma pondere in aceto mulso, concoctionem adiuvat, si quis eam saba magnitudine secundum eanam cum melle cocto* *dehorarit: modo consimili acida ructantibus propinatur. Stomachicis eam manducare & succum deuorare proderit,* *si postea dilutum vinum sorbeatur. Datur sanguinem excreantibus, tribus obolis, cum diluti vini egelidi cyatho: Pthi-* *dicis, renum & vesica doloribus, ex aqua: aqua inter cutem bis drachmis ex hydromelite, si febricitant: sui aliter,* *ex mulso: regio morbo laborantes recreat, menses * pellit, drachma pondere cum vino pota: aluum purgant drachma* *quattuor pota, in hydromelitis decem cyathis. facit cum melle ad tabem & purulentam excretionem. Folia sicca tri-* *plura subdit Antonius Musa.*

* Eadè Gal.

† Eadè Pliu.

* Eadem Gal. & Pliu.

Animas hominum & corpora custodit, & nocturnas ambulationes à maleficijs & periculis, & loca sancta & busta etiam à visibus metuendis tuetur & defendit, & omni rei sancta est. Ad capitis fracturam: herba Vetonica contusa, & super capitis ictum imposita, vulnus mira celeritate conglutinat & sanat. Eo quoq; efficacius, si tertio die refectam, hoc est, recentiore frequenter impolueris donec sanescat. Eius potestas tantam fertur habere utilitatem, vt ossa quoq; fracta vi sua extrahat. Ad dolores oculorum: Vetonicæ herbæ radices ex aqua ad tertias coquito, & ex ea aqua oculos foueto: ipsa autem folia eius trita supra frontem & oculos imposito. Ad dolores aurium: herbæ Vetonicæ recentis folia vel per se aut in aqua madefacta perterito, succumq; eorū excipito, deinde adiecta rosa liquida tepescito, & in aures stillato, lanaq; spissata, mirè proficere creditur. Ad caligines oculorum: Vetonicæ drachmā vnam, aquæ calidæ cyathos quatuor ieiunus bibat, deducit ad inferiorem partem cum sanguinem qui caliginem oculorum facit. Ad lachrymosos oculos: Vetonica manducata aciem oculorum clariorem facit. Ad sanguinem de naribus profluentem: herbæ Vetonicæ contrite paululum salis adijcto digitis duobus & pollice medio quantum tolli poteris, & subactū formato rotundalam: quam si naribus inserueris, sanguinem sistet. herba Vetonica ex vino veteri aut aceto ad tertias decocta & gargarizata, dolorem dentium discutit. Ad vomicos & suspiriosos & thoracis dōrem: herbæ Vetonicæ drachmā vnam, & sumptis ex aqua tepida cyathis duobus, bibendum si dederis, iuuat. Idem suspiriosis prodesse creditur. Ad pthificos & eos qui putulentum reijciunt: Vetonicæ drachmas tres in puluerē redactas dato cum melle, & gluiar ieiunus cotidie, auxiliatur. Ad stomachi dolorem: Vetonicæ drachmas quatuor dato manducare per triduum, vel in aqua frigida cyathis quatuor dabis bibere, miraberis bonum effectum. Ad lateris dolorem: Vetonicæ drachmas tres ex vino veteri cyathis tribus, & piperis grana viginiseptē cōtrita & calefacta ieiunus bibat, curabitur. Ad lumborū dolorē: Vetonicæ drachmas tres ex vino Amineo cyathis tribus, piperis grana decem & septē contrita & calefacta ieiunus bibat. Ad ventris dolorem: herbæ Vetonicæ drachmam vnam in aqua calida cyathis duobus bibendum da. His autē duntaxat hæc apta erit cōpositio, quorū non ex cruditate intestina torquetur. Ad colum: Vetonica cū vino austero æque proficit. Ad iustum: herbæ Vetonicæ vacias duas ex melle accipiat per dies nouē. Ad quotidianas: herbæ Vetonicæ drachmas duas, anegiosæ drachmā vnam, ex aqua calida cyathis quatuor dato, bibat sub accessione. Ad tertianas: Vetonicæ & Pulegij drachmas singulas, aquæ calidæ cyathos tres sub ipsa accessione dato bibere, sanabitur. Ad quartanas: herbæ Vetonicæ drachmas tres, mellis Attici vnciam vnam, aquæ calidæ cyathos tres in vnum miscēbis, & ante accessionem da bibat, mirè sanabitur. Ad vesicæ dolorem: herbæ Vetonicæ drachmas quatuor, apij radices scrupulos tres. Decoque apij radices in sextario aquæ ad medias, quum decoctæ fuerint, tum demum Vetonicam permiscēbis, & dabis bibere, dolorem in perpetuum sanabit. Ad calculum: Vetonicæ drachmas tres ex aceto scyllitico, & mellis vnciam vnam & aquæ calidæ cyathos nouem bibat, confert. Vetonicæ drachmas duas ex aquæ calidæ cyathis duobus, & vini austeri cyathis duobus suo accessione dato bibere. Ne sias ebrius: Vetonicā prius sumas, Ad cathunculū: Vetonicæ drachmā vnam, aquæ calidæ cyathos duos bibat. Qui perfrictionibus laborat: Vetonicæ vnciā ex vino cyathis quatuor bibat triduo. Lassus ex itinere: Vetonicæ drachmā vnam ex oxymelitos cyathis tribus potui dato. Ad eos qui cibū nō possunt continere: Vetonicæ drachmas tres, mellis vnciam vnam cōcoquito, donec indurefeat, & pastillos ex his facito quatuor, & ex ipsis cum aquæ calidæ cyathis duobus vnum per singulos dies deglutiat & bibat. His qui venenum sumplerunt: Vetonicæ drachmas tres ex vini cyathis tribus sistim dato bibat, & reijciet. Ad fistulas: Vetonica contusa & trita ex hac rotundala facito,

* & par-

& parvalem salis insetito, & fistulã obligato, expurgat & sanat. Ad podagram: Veronicæ radices cum folijs decoctas ad tertias in aqua potui datas, ipsamq; per se tritam & impositam, mirè dolorem lenire experti adfirmant.

Gal. Vim habet incidendi, ve gustus indicat. amariuscula enim est & subarris ipsa herba, id quod & particulatim edita ostendit actio: nam consistentes in renibus lapides rumpit, & pulmonem & cho- racem & iecur expurgat abstergitque.

Plin. Faciles præstat vomitiones radix eius Elebori modo quatuor drachmis eiusdem in passo aut mulso. Hyssopum tritum cum melle vilius præsumpto Nasturtio aut Irione. Molemonium densatij pondere. Est & Pphyllibus lacteus succus, qui densatus in Gummi sumitur cum melle supradicto pon- dere; præcipueque bilem trahit. Rursus sistunt vomitionem Cuminum sylvestre, Betonicæ farina ex aqua mulla; plantago decocta caulium modo.

De floribus colore } In Mutoni apud Neruios paradiso ditissimo, floribus candidis Betonicam legisse
differentia. } memini; & in sylvis sæpius legit Carolus de Houchin D. de Longastre.

BETONICA aquatica Septentrionalium an CLYME-
NYM Diosc. ? Galisopsis sine Scrophularia altera Dod.
vernacula æditionis. Clymenon Turneri. Sesamoides
viniis forte Solimano. Terpetaria D. I. Dilij à Te-
rebintina dote simili. Ocimastrium alterum Tragi.
Belg. Beechicum erupit & S. Antuentis erupit.
Aduers. 230.

SERRATVLA. Aduers. 231.




Varietas. [Maius quadruplo maiorem speciem alebant Londini eruditissimus D. Thomas Bennet, & Mutonus Belgæ Turnaci.

Tragus. Semen tuum, melle mixtum, ac emplastri modo impositum fronti, fustiones capiti- rum cohibet. Succus herbe cum sulphure ac nitro temperatus, artibusque inditus, dolorem uis- sum lenit.

DIOSC. E frutice toto cum radice succo exprimitur: qui ad sanguinis reiectiones, in popo efficacis est: ca- Eadem sententia Plin.
 lacos rubrae, feminarum profusiva refrigerando infrenat: sanguinem naribus crumpentem suppressit. Trina folia
 aut filiqua recentibus vulneribus inposita, ea ad cicatricem perducunt.

SCROPHYLARIA maior. Aduers. 220.
 Galioffis Fusch. Cordi & Dod. Germ. esiam sauwurtz
 & gro; feigwartzenkraut. lege Belg. Dpern-
 crupt & helmcrupt, à galericulatu flosculis. Ital.
 Scrofolaria.

Περωνισός, ή ισπα βοράν, **VERBENA** Dioscor. Germ.
 Eisenkraut, Eisenhart. Belg. Werbene, Herctupt,
 & Herherz. Gal. Verucine. Angl. Verucinus.
 Ital. Verminacola, Berbena & Berbenaca.
 Hisp. Verbena. Aduers. 231.

**VERBENA.**

DIOSC. Folia cum radice in vino pota, illitane, aduersus serpentes polent. eadem drachme pondere cum thuris
 abolis tribus, in vini veteris hemina, quadragenis diebus, ieiuno ore, contra regium morbum bibuntur. veteres tunc-
 res & inflammationes mitigant. sordida vlcera purgant. Tota in vino decocta, tonsillarum crustas dirumpit. oris no-
 mas gargarizatu colibet. Aiuunt, si aqua spargatur irichinium, qua maduerit, latiores contictus fieri. Datur po-
 tandum in tertianis febribus, tertium à terra geniculum, cum folijs circundantibus: quartanis, quartum. Sacram vo-
 tant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendatur. * Eadem Plin.

Gal. Vim habet adeò desiccantem, vt vulnera glutinet.

Acrius. Verbenaca recta ad capitis dolores summo praesidio esse testatur Archigenes, si ea coro-
 neur patiens, aut si teratur cum aceto & rosaceo, & illinatur, aut oleo decoquatur & foveatur caput.
 Nec tantum capitis dolores sedat, sed capillos quoque suetes compescit. Radicis decoctum calidum
 ore retentum dentium dolores mitigat, ac mobiles firmat, orisque vlcibus medetur. Ad colicos
 radices semicontusas in aqua ad dimidiam decoquito, & diebus quinque decoctum potandum dato.
 efficacissimum id esse experientia compertum est. facit & ad calculos atque ad inchoantem elephan-
 tia, si eum melle propinetur. vtere itidē ad epilepticos, & ad quotidiana, quarantate febre laborantes.
 Ad podagricos verò & coxendicū morbo affectos, vino decocta exhibent.


Plin. lib. 16. cap. 7. Verbenaca verò omnibus visceribus medetur, iateribus, pulmonibus, ioci-
 moribus, thoraci, peculiariter autem pulmonibus, & quos ab his phthisis tenet.

Eadem Si
 meda Sc
 thus.

Sacra

SACRA VERBENA *Hispanica minor.*
an Diosc. Perisleron?
Verbenaca supina Clusij.

SCABIOSA *minor, Advers. 232.*



SACRA VERBENA *minor.*

Complures fundit cauliculos, graciles, procumbentes, dodrantales & pedales in Belgij hortis, Ioannis Muloni, vbi à me primum visa, deinde Antuerpiæ P. Coldenbergij peritissimorum & pharmacopæorum, stirpiumque exploratorum, vulgata Verbenacæ facie haud ita dispari, sed altioribus lacinijis incisurisque, flosculis item similibus, cætera tota minor: multoque minora folia & flores. Hispano semine ex agro Salamanicensi Belgij inquilina facta C. Clusij opera, vbi quotannis rediit semine iterum repullulat sponte in prædictis hortis.

APVL. Ad stramas: Verbenacæ radix in collo ligata, summè proficit, vlcera & parotidas Verbenaca rufa & imposita, mirificè sanat. Ad eos qui induratas venas habent, & cibos non recipiunt: herba Verbenacæ succum mixtum cum vino, melle & aqua, & postea coctum, des bibere, & statim sanat. Ad hepatis dolorem: herba Verbenaca solstitio lecta, & in puluerem redacta, & potui sumpta, mirè proficere creditur: robur autem cochlearia quinque ex vino quàm optimo cyathis tribus, & cæteris pro cuiusque viribus sic dabis. Ad calculos: radix contrita ex mulso optimo tepido data, incredibiliter calculosis succurrit: nec solum ipsis calculosis, sed & quicquid est quod urinam impedit, celeriter educit. Herba verbenacæ corona facta & capiti imposita, dolorem capitis tollit. Ad morsum tabidi canis & hydrophobon: herbam Verbenacam in vinum apponito, tritici quoque grana integra indito vulnere donec humore remollita expleant: sanantur, proijcito illa gallinæ; si non appetit, simili modo alia grana proijcito; si sic esse coeperit, periculi sublatis signum erit. Ad vasa recentia: herba contrita cum butyro vulnere imponatur. Ad morsum serpentis: herba Verbenacæ ramuli ex vino decocti & contriti, si exca erit plaga cum tumore, impositi adaperiunt primum, exulcerant deinde, postea crudi cum melle contriti & vlceri inserti donec ad sanitatem, quod celeriter fit, perducant, imponuntur. Ad ictericos: herba Verbenacæ drachma vna & cardii oboli tres, lacte rosarum illa foliorum expressis succus & paululum myrtæ conuine ex aqua cyathis tribus potui data, expellere morbum creditur.

SCABIOSA *minor, Advers. 232.*

Tinctam abluunt: lixio in quo maduerit aut decocta fuerit Scabiosa. Succo vitæ Tragus.

Montana SCABIOSA calidarum regionum.
Aduers. pag. 233.



SCABIOSA
media.



SCABIOSA maior fatorum. Hisp. Scabiosa.
Aduers. pag. 232.

Ad eadem quæ superior efficacissima; cordi,
hepatis & visceribus peramica; ut cuius succi epo-
zi ternum & quaternum unciarum pondere cum
Mechtidijs, aut Theriacis ℞ij. sudorem mouē-
do febres exitiales & pestiferae etiam abiguntur.
Omnes cutis fæditates, illita, abstergit.


SCABIOSA media flore globularia.
Aphyllantis genus quercindans.
Albis floribus variat agro Leuantensi.

lege tenuior.

lege flores al-
bos non pur-
pureos Sce-
biola.

Scab

SCABROSA
maior Hispanica.



SCABROSA
PERUVIANA.



JACCA ni-
gravalga-
tia.



JACCA ni-
gra.



SCABIOSA maior Hispanica floribus albis. Aduers. 123.

Passim huius semen reperitur & aduehitur ex Hispania in Belgium vna cum vna passa Damascena. ibidem loci istius est. apud Salamanticenses vinetis, & marginibus agrorum familiaris.

SCABIOSA PEREGRINA.

Neutiquam posthabenda & hæc raræ & peregrinæ elegantie Scabiosa, nullidum hætenus literis prodita: infrequens enim est, nec nisi horti longè amantissimi ratifq; stirpibus ditissimi claris. & doctiss. viri D. Ioannis Boissot inquilinam factam vidimus, cuius beneuolentiam florentem cum furculis legimus, quos iam enatos habemus in horto Guil. Driesch peritissimi & fidissimi pharmacopœi Antuerpiani; facie & virgulis Valerianæ Rubræ vocatæ; sed floribus & semine Scabiosæ Hispanicæ.

SCABIOSA æstiuæ minor.

Folio laciniato Scabiosæ aut Erucæ; flore caruleo vulgaris Scabiosæ, spinillis longiusculis virentibus sesquiuncialibus, rosarum gratia stelle modo radiato. Semē membranæ inuolucris argutis implicatur Scabiosæ maioris Hispanicæ ritu. Vnde hæc apud nos oritur rediuiuo singulis annis semine. Mutonus noster primus hanc mecum communicauit.

IACEA nigra vulgaris. Hyosiris Plin. Anguillara. Aduers. 234.

Medium Diosc. Mutono folio Scridis syluestris, flore purpureo rotundo, semine cuius minuto; radice dodrantali, crassitudine baculi, gustu acerbo.

Gargarizata oris, faucium, laryngum ulcera, & quævis vitia emendat: apostematibus & vulnere fauciat medetur.

IACEAE maioris folio multum laciniatos varietas. Aduers. 234.

Num Cynaoides flos Dod. eadem? an non potius congener?

Nonnunquam Mechliniæ in hortis floribus albis & capitulis spinosis visitur.

IACEA MONTANA Narbonensis.

STORBE Salamantica maior Brancionis. Stobe Salamantica prior Clusij, vulgò Cabecuela. i. capitulum.



IACEA MONTANA *Nardensis.*

Hanc novam subdere visum fuit, propter nonnullam inter se similitudinem. Caetibus & colibus Caltre novi conterminis Monspellienfis agri nonnusquam a me reperta. Cauliculo riget dodrantali & pedem alto, rotundo, folia laeae luteae & Chamaleonis laeae Theoph. media edente, altera parte incana, glauca, tantillum hirta. flores laeae aut Cirsij, sed minores. radix sesquipalmaris, gracilis, minusque fibrata, gustu cyaneo amaricat.

STOEBE *Salamantica maior.*

Ima folia Scabiosae Hispanicae & Sequanorum Cirsij media habet. Radix oblonga nonnihil fibrosa, cubitalibus & duorum pedum caulibus in longioribus petiolis & squammoso capitulo flos Cyani purpureus. Semen Cnici sed minus. vniuersa planta gustanti peramara, praesicca, adstringens.

STOEBE *argentea SALAMANTICA minor.*
Stoebe Salamantica altera Clusij.

Pusilla incana IACEA altera folio Olea.
STARMICAE species.



Folio minutius diuiso Cyani minimi sparteis viticulis Monspelliaci descripti amula, Hispano semine in D. Brancionis viroto inquilina facta; vbi tamen strigosa tota. Flos purpureus & semen Cyaneo cubitalis, multis alis diuisus. Salamanticensis agri marginibus gaudens.

Huius generis secunda Stoebe Clusij est Cyanus nosster minimus, viticulis sparteis, perpusillis capitulis; qui humeni solo Belgico longè maior conspicitur.

STOEBE ARGENTEA *incana Alderandi.*

Varietas.

Et aliam vidimus Stoben opera D. Hermetis le Clerc medici Neueniis doctissimi, otleri ossijs & caule argenteae Stobes, sed delicatioribus virgulis, & folijs tomento crasso incanis.

STOEBE *Advers. pag. 41.*

Diosc. Stoebe vulgaris noritia, vniuersum semen & folia in strigosa; propter decoctum dysentericis insuatur, auribus quoque parientis inditur. Illius folia oculis ab ista cruenta profunt, & arispanis sanguinis impetu cohibent. Aegin. Stobes semen & folia ad stridoria facultate donata desiccata in terreo excessu. Quae carione vulnere peringentia conglutinant, eorumque decoctum in stridoria terminibus, sanguinis vitio, & in stridoria & auribus parientis analiter, oculos ex loco sanguinis suffusos illare lauant.

1^o sine zeri-
monia Gal.
Zadem serij
Col.



Puffillincana IACCA altera folio Oleæ.

Huic per omnia similis capitulis & floribus exotica Syriaca plantula: sed cauliculus minus diuisus palmatis & sesquipalmatis: folia maiora, oleæ, magisq; incana, minimè ferrata. capitula item, habitio-
ra, nitidis argenteis squamis, gustu insipido, minimè amaro.

Incana facies
altera Aduers.
235. est
Ptar mica
vulgaris
Herbariorū.

PTARMICA AVSTRIACA.
Ptar mica Matth.



MORSVS Diaboli.
Aduers. 235.



Ptar micæ vulgaris cognata est illa peregrinæ venustatis Austriacæ Ptar mica Herbarijs nostris vocata, qui eam in hortis alunt propter elegantis effigiatæ floris gratiam, similinæ & concoloris Sesamoidi parvæ, sed aspectu hilarioris, è capitulis squamulis lucidis argenteis compactis, sibi imbricatis inter-
venientibus. Folia Oleæ incana; colicali sesquipedales. radix, & cætera non ab similia. Huius semè in Bel-
gium Vienna Austriæ hoc anno ad amicos misit Clusius noster, vade miræ venustatis planta feliciter
adoleuit.

MORSVS Diaboli.

Omnes easdem dotes quas Scabiosis referunt. Sanguinem icturn concretum dissolvit Dod.

CYANVS vulgaris *Aduers.* 236.

Baptifecula Tragi.


Vulgo *Batiffere* pro *Blatiffere*, id est *Segetum Seris*: num sit *Condrilla* species aut *Cyanus*? *Blatum ovium* sine
Blatum barbaris idem est cum *Gallorum* bleci, id est, *tritico*.

Condrilla & *Scabiosis* congenerem, affinesq; facultates & temperiem *Cyano* inesse crediderunt
aravi nostri; eoque non tanta infelicitate Syrupus è *Cichori* Guilielmi Piacentini ad æstus villosi-
tatem & lecoris immiscere soliti: qua vi refrigerandi, non nihilq; repellendi inflammationibus oculiq;
tam prodest. Astringendo, succandoq; plantaginis ritu refrigerans. Contagiosis febribus, ruptis, vai-
lliquæ auxiliatur.

CYANTUS
vulgaris. Ad-
verti 296.



CYANTUS
maior. Ad-
verti 296.
Verbastrum
Tragi.



CYANTUS
peramarus
superius capi-
tulis squaro-
sis Sesamoi-
dis parvi.
pag. 296.



CYANTUS
repens etc.

Superius
non altius
lis sed est
ribus non
foliis &
eandem
hu captus
argentei o
reca.




SESAMOIDES parva Diosc. *Advers.* 227. *Condrilla species Dodonae, cuius nomen solum in capitulis Sesamo & Pba aridi propius est, ut vult Diosc.*

DIOSC. Semen Sesame, solum, amarum. Detrahit bilem pituitasq; ex aqua mulsâ posum dimidio acetabulo. Illudum ex aqua, tumores ac tubercula discutit.

TRAGOPOGON. Germ. *Boxbart.* Belg. *Boxbaert*
& *Josephs bloemen.* Hisp. *Barba cabruna* & *Barba de cabron.* Gal. *Barbe de bouc.* Angl. *Witches beard.*

TRAGOPOGON *lucum.*



Quod flores in pappos barbularas imitantes abeant, Barba hirci vocata; quo etiam nomine hodie officinis notissima. Cyanis, Condrillis aut sesamoidi minori reddenda, quibus figura & facultatibus haud ita ab similibus. Folia phalangij, Sesamoidis parvae longiora habet ab vna radice Dentis Leonis. Aestatis initio flores lutei, alias obsoletè purpurascens Dentis Leonis aut Sesamoidis parvae summo cubitali & sesquicubitali caule in papposam caesariem dehiscens. Calidarum & frigidarum regionum pratis gaudet. In hortos translata speciosa floris foetura variat. Lacteo succo turget, quem dum vulneratur fundit.

DIOSC. Edendo est & cruda & cocta.] renella à nostris hoitoribus acetarijs miscetur.

Facultatibus Condrillis ad stipulatur. lancinationibus astuantibus, iecori, stomacho, renibus & rheumati auxilio est.

TRAGOPOGON paruum flore *Condrilla purpureo-oculata.*

Spithamea pusilla planta nulla sui parte à Tragopogis dissidet. Flos Condrillae ex tubo caulis purpurascit. folia graminea palmum longa. In Hetruria & agro Romano obuia.

Scor.

SCORZONERA, *Viperaria.*

Hisp. Scorfonero.

Tragopogis congenere plantas Itali & Hispani Scorzoneram vocant, quarum alteram mihi primus ostendit præceptor Assiatus Monspeliensis cis lacum è regione montis Ceti Frontignanæ inter maritimas syl. Irides, folijs Tragopogi latioribus, rigidis, carnosis. Caulis pedem & sesquipedem altus. semine & flore luteolo: cuiusmodi Tragopogi: crassiore radice. Gallis, Belgis & Anglis Hispano semine propagatur.

Varietas. Bohemicam ab hac variam facit Matthiolus.


Scorzoneræ humilis nuperrimè semen misit Vienna Clusius; cuius flos rubet aut purpurascit ni labat memoria.

Alia angustioribus folijs alitur in hortis nostris.

Pota fertur viperarum moribus mederi, venenis & pesti præstantissimū antipharmacum. Cardialgias, epilepsias, vertiginem, & melancholiã, radix assumpta iuvat. Succus lacteus Glaucij, vel Dentis leonis modo, oculorum medicamentis commodè miscetur.

CHRYSANTHEMVM. CALTHA *Poetarum.*

fortè *Grôphelia* Plin. Gallis Souly, Gallobelgis Gonde, detorto vocabulo Flandria Goudt. Latrum & aliorum à colore. *Advers.* 157.



CHRYSANTHEMVM
legatum.



legatum
na.

CHRYSANTHEMUM *segetum folio multifido.* Germ. Gantebium. Belg. Geel gans
bloemen & bokelact. *Aduers. pag. 237.*
perperam quorundam Bellis lutea.

Varietas.] In segetibus Gallobelgij folijs minus laciniatis conspicitur.

CALTHA *Poëtarum sive Chrysanthemum Dioscoridis.*

Diosc. *Caules olevis modo eduntur, flores cum cerato triti, Stomatata discutere dicuntur. Ipsa herba pota in balneis post exitum de folio, regio morbo correptis, breui bonam colorem inducit.*

Stillatitius liquor, non secus ac Cardui benedicti & Scabiosæ ad pestiferos morbos bibitur. Cordi
amica.

lege Supphal
mum. 245.
& 345.

lege multifido,
& Belli-
dis.

SALVIA *maior.* *Aduers. pag. 239.*

SALVIA *minor pinnata.* *Aduers. 240.*



varietas. } Luteolis folijs in Belgarum hortis variat.

ter. } Nonnūquā & Spicæ lauedulæ folijs visitur cōcoloribus, sed latioribus, & grauioris odoris.

Diosc. *Foliorum ramorumque decoctum potum urinam cit, menses fatisque extrahit. Pasticata marina scilicet
bus auxiliatur. capillos tenigrat. vulneribus & herba utilis est, sanguinemque compescit. Farina testæq; vicera purgat.
Pudendorum pruritus foliorum & ramorum decoctum, cum vino, si eo abluantur, scilicet. Calcis, adstringit succos.*

*Eadem fore Pinn. & vulnera glutinat succando. * Eadem Gal.*






HORMINVM. Aduersf. pag. 140.


Diosc. Ad venerem stimulantem, cum vino bibi volunt. purgat cum melle argemas albuginæsq. illitum ex aqua tumores discutit. eo etiam extrahuntur aculei ex corpore, idem effectus est illita herba. Sylvestre magis viribus pollet, quare vnguentis, præsertim giencino, permiscetur.

SCARLEA; an Alecterolophos Plin.?
Herba S. Ioannis vulgi.
Aduersf. 140.

Sylvestre
HORMI-
NVM.
Aduersf. 140.



Leaves to-
wards Or-
bita terra
Doli. Hor-
pura syl-
-agae quo-
fundam &
ringui folio,
ederao
A. 17.



VERBASCUM
Sylvestre,
solijs Solinis
renuifolia.



Phaeos,
Lychais.



[Hinc effi-
gat inscri-
pso ta-
cie preced.
mal. a loci
Phioni ly-
canis irre-
pfit. & econ-
ter quas re-
ponis.]

VERBASCUM *Symeitre folijs Salvia tenuifolia cum flore, an PИЛОМОС. Diofcoridus?*
Hisp. Candilera.



Flores Aduers. pag. 241. quia emarcuerant pictor minus animaduertit & omisit.
Non modo Norbonensis planta, sed Hispania, Syria, & Illyria indigena.

PILOMOS *Lychnitis altera Syriaca.*

Etiam hanc nouam plantam nec minus speciosam hisce interferere visum fuit. à superiore diffidet
florum ortu & modis: ant enim Lychnidis syl. vel Chalcedonicae, coloris flani. Folijs item angustis
& virgulis quadratis tomento crasso incanis, & radice lignea.

VERBASCUM syl. *Salisfolium exoticum.**

VERBASCUM *Salisfolium fruticosum luteo flore.*
Verbascum 4^m. Matth. Aduers. 241.



*Hæc folijs rotundioribus, candidioribus, densioribusq; minus tamen lanugine canis, sed Salviae
æmula concretionem; alioquin lignosa fibrataq; radice, caule & facie non ita dissimilissimam gaudet
Syriae natalitijs, quibus superior. flores videre non contigit, quia marcidi.

VERBASCUM *Salisfolium fruticosum.*

Varietas. Quod Syria mittit, folio est carnosiore, rigidiore, latiore & hispidiore.

VERBASCUM *nigrum Salisfolium. Salvia syl. Terge dulcorata. Aduers. 241.*

VERBASCUM *nigrum Salisfolium purpureo flore. 3^m. Scutellari.*
Aduers. pag. 241.

VERBASCUM syl. *Salisfolium laciniatum. Verbascum dicitur Matth. Aduers. 241.*

Aduers. pag. 241. lin. 1^a. inscribitur

VERBASCUM purpureum Erucifolium; & deinde Syneſtre Saisifolium fruticosum, lignosum.

VERBASCUM Mas & Candela regia.


Hisp. Gordolobo. Angliam *Wallier* &

mullen. Aduers. 242.

Ital. Tasso barballo.

VERBASCUM Femina.

Aduers. 242.



Diosc. Radix priorum duarum adstringit, quare quod magnitudine ludicrum talum aequet, in alni profusio, lege *ap. Diosc.* conuenienter ex vino datur. decoctum ruptis, conuulsis, fractis, antiqua tussi, auxiliatur. Dentium dolorem* collu-
tione mitigat. Verbascum cui flos aureus, capillos tingit. Et quocumque abijciatur, blast. *as. x. in secent. abt.* Colla in
aqua folia, aduersus tumores, inflammationes oculorum, hyderata vlcera, ex vino & melle illinuntur. cum aceto quo-
que vulneribus incedunt. contra \dagger scorpionum iclus, sunt auxilio. Stylvestri folia ambactis igni, sunt cataplasmata.
Sunt in folijs eius, quam feminam dicimus, aridos sicus omnino non putrescere.

* Gal. eadem, folia tamen digerendi vim habent. Sic etiam aliorum folia, potissimum autem eius
que aureos flores obtinet.

\dagger Idem Plin. cum Rura radix bibitur.

BLATTARIA. { VERBASCUM femina floribus albis, & caule summo alis multissimo, n^o sit Blattaria *Maronius.*
ria Pliniana? Hoc enim mirè capiuntur & in eo vicinans Blattaria.

Varietas. Floribus luteis duntaxat ab hoc diuersum videtur.

Radix eius perennat in Brabantia, vti Blattaria vulgaris.

Oleum è florum Verbasci multiplica infusione efficacissimum est ad sedandos arthriticis hæmor-
rheidarumque sepius cruciatus.

Adstringit.

Adstringit.] Gal. radix acerba est, & fluxionis affectibus prodest.
Dentium dolorem.] Plin. tonsillis ex aqua potum medetur.
Antiqua tuſſi.] Plin. contra pectoris vitia & purulenta excreantibus tanta huic vis est, ut iumentis edicere non tuſſientibus modò, sed ilia trahentibus auxilietur potus. Panos sanat cum ſua radice tuſum, vino aſperſum, & ita cinere calfactum, ut imponatur calidum. Semen in vino decoctum & contritum luxatis medetur, dolorem & tumorem tollens. Radicis medulla collyrij tenuitate in fiſtulam additur. Contuſis, euertis, & ſi febris ſit, potatur in aqua verbaſcum, cuius floſ auro ſimilis eſt. Folia ex aceto imponantur in ſtruma. Semine ac folijs decoctis in vino ac tritis omnia corpori infixi extrahuntur.
Infixa.] eoque equorum ungulis ex clauo inter calceandum profundius ac par erat adacto vulneratis, recenti oribus & Matthiolo commendatur.

ÆTHIOPIS. *Aduerſ. pag. 242.*

BLATTARIA. *Aduerſ. pag. 243. Verbaſcum leptophyllum Cordi. Germ. Solcknopflin. vulgaris Blattaria annua planta eſt, folio quercus inſtar laciniata. Carulea perennat, folio nigriore minusque ſerrato, quemadmodum & Phœnicea.*





ÆTHIOPIS.

Diosc. Auxiliatur purulentis excretionibus, ischiadicis, pleuriticis, arteria ſcaberris, doctis a radice & potu. cum & cum melle, eclegmaticis vicem prabet.

Varietas. Latiore folio in hortis Belgij conſpicua differentia cernitur.



PRIMULA
 pratensis.
 Aduers. pag. 243.
 copiosis umbellatis
 floribus odora-
 tis.
 Angl. Primrose.
 Ita.



PRIMULA
 hortensis An-
 glica omnium
 maxima, &
 ferocia flo-
 ribus plenis.
 Aduers. 244.

Bot. Angl.
 Tab. 177.

PRIMULA
 pratensis tu-
 ropalida
 italica. Adu-
 vers. 244.
 245.





Sylvarum
 PRIMULA.
 Aduers. 244.
 Ang. Colse-
 Clippe.



Sylvarum PRIMULA floribus obscurè
virescentibus fimbriatis.
Advers. 244.

Paralytica Alpina SANICULA sive AVRICULA
VRSI lutea. Advers. 244.
Lunaris Arthritico Gesneri Britannica Anguillara.



PRIMULÆ TERRE: VERBASCULA Fuchsis.

Radicis decocto vesicae renumque obstructions solvantur Fuchsis. Ius herbas propinatur & illinuntur adversus rupta, luxata & liuentia. Quod verò hæc eadem possint, temperamentum eorundem palam docet: parum enim adstringunt, si gustaveris; amara & modicè acrisunt; ut hoc nomine desiccandi, & detergendi facultatem habere, nemo dubitare debeat. Et mulieres formæ studentes, succo è floribus illorum expresso faciem illinunt, quòd maculas, rugasque & alia eiusdem vitia misericè detergeant.

Paralytica Alpina.

Ad enterocelas, thoracisq; vulneta commendatur Martiolo.




Alpina SANICVLA
lutea sine Primula va-
rietas.

Quemadmodum Primulae veris occasione loci & soli in Anglia folia & flores
coloratiores, maiores & minores, sic in montibus arduis calidarum regionum
cauliculus & folia emittit maiora Auricula vrsina dicta: & interdum longè
minora; specie tamen aut natura minimè diuersa.

Varie-
tas. { Luteo pallentis itidem Saniculae eadem est ratio, puta maioris & minoris.
Hæc omnes aluntur in horto generosi viri D. Ioannis Dilfij materiae Medicæ peritissimi & a-
mantissimi.

Paralytica Alpina SANICVLA angustifolia
maior floribus rubore & candore confusis.
Primula veris florib. rubris.*

SANICVLA Alpina minor, sine media.



* Qui maiorē Paralyticā Saniculam tantillum sibiricis folijs Aduers. pag. 144. memoratā viderit,
has mox subdendas non potest non nosse. Hæc quæ maior, folia Gnaphalij montani longiora pro-
mit. flores multiplici fatu umbellæ instar in pedibus & dodrantalibus mollicibus pediculis porpu-
tantes aut ex roseo & albo confusis micantes, visumq; oblectâtes. Vienna Austria à Clusio nostro D.
Brancioni transmissa.

Sanicula Alpina minor.

Media folio est minore tantillum crenato: floribus non disparibus in cauliculo palmari & dodran-
tali. Radix multum fibrata.



SANICULA *alpina minima.*


Omnium minima vix unciam & sesquiunciam aequat; folijs item car-
nolis, sedifolij Coryledonis minoribus, summis oris embriatis & denticula-
tis. Flos purpureascit.

DIGITALIS *purpurea.*
Aduers. pag. 245.*BACCHARIS *Monspeliensis.* Aduers. 245.
perperam Conyza maior Matth. & Dod. Conyza Helenitis Cor. li.

*Sommerfeti Angliae rustica turba huius decocto febricitantibus purgationes & interdum super-
purgationes & vomitiones humidioribus aluo, molitur. Amaro abstergit puitosa, biliosa purgat,
obstructiones reserando.

Varietates. { Nihil prorsum dissimilera caule, folijs & semine, duntaxat candido flore diuersam, aiunt
amicorum horti in Belgio.
Sed quae giluo flore, alias ferrugineo, angustiore calathio spectatur, folia promit Genzianae
cruciatae maiora, iisdem viretis atroulencia.

Varia haec conspicitur Louanij floribus suauiter rubentibus pallore & rubore confusis in viridario ante-
nissimo D. Ioannis de Limoges, alias Nonnij.




BACCHARIS Montpollensis.

Diosc. Radix in aqua decocta stupris, visis, et alio precipitatis, spirandi difficultati, salutaris; item diuturna tussis & vena difficili. menses pellit; contra serpentinum morsus verisimiliter dicitur in vino. recens radice apposta, parva extrahit. puerperis eius decoctum in defecationibus prodest. in diaphragmate vtiliter inseritur, incunat odoris gratia. folia, vt pote quae assiringant, capitis doloribus illis profert. oculorum inflammationibus, manibus tumantibus à parva, egilops incipientibus, ignibusq; sacris auxiliatur. odor somnum gignit.

HELENIVM. Hisp. Raiz del alla. Advers. 146.
Panax Chironium Anguillare.

BYGLOSSVM latifolium sine BORRAGO.
Advers. 246. Perperam Lycopsis Anguillare.



Diosc. Radix Helenij decoctum potum, vinum & menses ducit. Ipsa deniq; in eclogem cum melle sumpta, cisti, orthopnea, rupturis, conuulsionibus, inflationibus, venenatorum moribus prodest, calefaciende vi quam in y-ni-rsem habet. folia enim in vino cocta, ischiadicis vtiliter illinuntur. Radix etiam Helenij in passo condita, stomacho vtilis est. Siquidem salgamarij paululum siccata eam, mox decoctum, frigida aqua demergunt, postremo in defrutum coniectam ad usum recondunt. Eritia & pota sanguinem excreantibus auxiliatur.

Gal. Rubrificat radice ea partes frigidis & diuturnis veracis affectibus, cuiusmodi sunt nonnullae coxarum passionis, ischiadas vocant, & exiguae assiduae que quorundam articulorum pra humiditate luxationes.

Herba trita ex vino pota mirificè morsus viperæ sanat Apuleio, & venenum discutit.



Plin. subdit. Radicis succus decoctae tinea pellit & lumbricos.
Radix recens & succo adhuc medida feratui pulmonum vtilissima, & efficacissima. eadem qua in
Eryfino diximus, ratione, abstergit enim, concoquit, & incidit.

BYGLOSSVM latifolium sine BORRAGO.

Diosc. In vinum delectum animi voluptates auget.

BYGLOSSVM angustifolium. Aduers. 246.
Cirsium italicum Fuchs. Germ. Welckh Ochsenzung.

Echysacie BYGLOSSVM minimum flore rubente.



BYGLOSSI vulgaris varietas.

{ Altera folio habiore, flore caruleo, rarius albo.
Altera strigosior, folio angusto, flore purpureo rubello. } hortenses.

BYGLOSSVM minimum.


Belgis hortense est; radice & folijs angustifolij Buglossi, sed exilioribus Echij paribus. Flos ex
rubello violaceo nitet. Semen Buglossi haud absumile. Saporis, odoris & vltus non disparis.



SYMPHYTUM pumilum repens Borraginiis facio.

BORRAGO minima herbariorum.

Speciosam hanc plantã alit illustriss. Princeps de Chymay D. Carolus de Croy, ceteriq; peritiores stirpium exploratores Belgij; folijs Borraginiis aut Pulmonariæ minoribus: notentur item caculopurpureis borraginiis; sed radix pulsa Vimaræ aut Caryophyllatæ fibris implexa. Floret hyeme in pensilibus hortis: Vere etiamq; Augusto in hortis. Gustanti cum mucositate nonnullam acrimoniam exhibet, quod Borragini aut Buglossò negatum est. Quamvis sit hæc antiquis, adhuc ignoramus.



BUGLOSSI peregrini radice multifida varietas.

Advers. 247.

Eandem aut per similem videndi copiam fecit Ioannes Muttonus perbonus & industrius Nervienfis pharmacopœus, in suo stirpium ditissimo & amantissimo paradiso, eius tamen folia conspersa nonnisi Pulmonariæ ritu erant: flores necdum videre licuit.

ANCHUSA. Hisp. Ancusa.

Advers. pag. 247. 248.

Diosc. Radix manus inficit sanguineo colore. loto solo nascitur. Radix adstringit. ad ambusta & vetera vlcera, ex oleo & cera efficax est. igni sacro cum polenta medetur. lepro & vitiligibus illinitur ex aceto. parte extrahit, vulva incita. eius decollum renum vitij, lieni, & bile suffusa datur: & si febris sit, ex aqua mulsæ. Si sunt alium solia in vino pota. Radice pigment. arj utuntur ad unguentorum spissamenta.

ALCIBIADION.

Diosc. Est & altera, quam aliqui Alcibiadion, aut Onocbles appellarunt. hæc à priore distat, quod minoræ habeat folia, sed simili modo aspera: ramulos exiles: florem purpureum in panicum vergentem: radices rubras, oblongas. que mœstibus sanguineum succum fundunt. in sebulosis nascitur. vis ei folijsque inest, qua contra virus cum reliquorum serpentium, tum maxime viperarum, auxiliatur, sine cibo, sine potu, sine aligatu. nam si quisquam mandens, in serpentis os inspuit, eum necabit.

Est & alia huius hæud dissimilis, semine puriceo, minore. Cuius semen manducatum, si in serpentis fauces inspuitur, eam interficiet. radix acetabuli mensura cū hyssopo † & nasturtio pota, latus ventris tuncas exurit. † Eadem Gal.

Gal. Anchusæ quadruplex species est. Quam Onoclea quidem radicem habet admodum refrigerantem & desiccantem, tū adstringentem, & subamarā, tū quæ sufficiat extenuandis & extergendis humoribus biliosis, corporibusq; condensandis. Cæterum folia habet imbecilliora quidem radice; adstringunt tamen & ipsa & desiccant.

Porro *LYCOPPOS* cognominata refrigerat & desiccant, magisq; quā *ONOCLEA* adstringit. At *ONOCLEOS* calidior est, & magis medicata. Nam plusculum habet & gustu ipso protinus acrimonie. Hæc verò etiam calidior est parva, quæ est amarior, & magis etiam medicata est.

Anchusæ nō omnes easdē vires obtinēt: Nam *Onoclea* quā vocat, radicem simul habet adstringentem & subamarā, corporibus condensandis & modicè extenuandis idoneā, tū abstergēdis quoq; & abluēdis biliosis & salis succis. Dictū enim supra est quo qualitas acerba mista amaritudini ea præstare queat. Sic sanè aurugini & lienosis utilis est. Sed & refrigerare idonea est. Et sanè cum polenta illita inuat cryspelata: & abstergit non modò epota, sed & foris imposita. Proinde vitiligines & lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidē hæc opera sunt & operum facultates quas diximus. At folia ipsius herbar, radice quidem sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt à resiccatione & adstrictione. Itaq; etiam profusum sanāt pota cum vino. Et quæ *LYCOPPOS* nominatur, eodē modo cryspelatis congruit, & radicem habet quā *Onoclea* magis adstringentem. At *ONOCLEA* & *ALCIBIADII* cognominata vis magis est medicata: Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniam, & eos qui à viperis mori sunt, admodum inuat, tum illita, tum suspensa, tum esca. Reliqua verò, nempe quarta, quæ parva est, & ferè nomine caret, ex illis sola *Alcibiadio* quidē per similes est, verū & amarior & magis medicamentosa; ac proinde ad lutos lambdicos idonea oxybaphi mensura cū *Hyssopo* & *Nasturtio* epota.

- Varietas.* Anchusam latifoliam Daglossio angustifolio parem, radice cruento inficiente & flore albo habuit
Matonus noster.

ANCHUSA lutea minima.

Et hanc Monspeliensis ager spontè dat, sed raritas multo. Floribus luteis in pusillis pediculis in se
conuolutis Echij ritu caudam Scorpionis aliquantum æmulantibus; cuiusmodi scitè meminit fides
testis doctus & industrius pharmacopœus Franciscus Penninus Antuerpianus.


LYCORIS altera Anglica.

Aduers. pag. 249.

Perperam Cynoglossum Matthiolo.

ECHIVM floribus purpureantibus rubellis.

Aduers. pag. 249.



*Diosc Radice rubra & astringente. Cum oleo illis vulneribus medetur; & cum factis bordacis igni-
bus sacris, sudores peruncta mouet, adhecto oleo.*

ECHIVM.

*Diosc. Radix non modo à serpentibus percussis ex vino prædesti, sed et ante ante bibenda, ferri non patitur.
Folia & semen idem præstant virtutibus. Lumborum dolores sedat, in vino aut serbentibus sumpta, Lac extractat.*


ONOSMA. Aduers. pag. 249.

Diosc. Folia in vino pota parum extrahunt: pragnans se cum intergressibus, adtertium sacro dicitur.



CYNOGLOSSVM *Vulgare sine flore.*
Lycopsis Lacune. Adversf. 230.

CYNOGLOSSVM *vulgare cum flore. Angl. ciliam*
Wegges tonge. Ital. Cinoglossa. Adversf. 230.



lege axungia.
lib. 33.

CYNOGLOSSVM *maximum.*

Varietas. [Folijs, floribus, semine, omnique sui parte duplo maius occurrit in hortis Belgicis.

Diosc. Folia cum suillo adipe veteri, medetur morfibz canum, alopecijs, & ambustis. Emollit alium decoctum herba ex vino potum. Subditi a pessa hemorrhoidas sanare fertur.

CIRSII *varietates.*

In Belgarum amicorum hortis Cirsij plures è folijs & capitulis conspiciuntur differentie, præter genera dudum memorata. vni caules quaternum & quinum cubitorum, foliaq; incana Buglesso hortensi angustifolio altero tanto maiora & longiora, oris & ambitu lacinosi & spinosa. Flos purpureus, alterius Cirsij, singulæ cymæ singulus, papposus in duplo maiore squamulis loricato capitulo, minus spinulis horrido.

Quarto caules cubitam & sesquicubitam æquant, spinulis delicatioribus serrate folia, & echinata capitula duplo minora.

Minus adhuc alteram compactis item squamulis echinatis rotundis capitulis, staminibus purpureorum florum refertis: laciniata spinulisq; horrida foliola. Inftar telipinnati aut alati sinuati & spinulis ornati cauliculi.


CIRSIVM



CIRSIVM
Diofcor.
Aduerf. 251.




CIRSII
differentia
Canaceis
affines &
congeneres.
Aduerf. 252.



CIRSIVM
siccum
Aduerf.

CIRSIVM
maius fir-
gularibus
capitulis.



CIRSIVM
Anglica




CIRSIVM *Anglicum.*

Videtur hoc Spinam albam adumbrare, scithameo caule, & folijs Cirsij, cui refertur commodè potest flos singularis Cardui bulbosi. Radix Bellidis aut Hellebori nigri modo fibrosa. Prouenit in pratis C. viri D. Nicolai Pointz equitis præfectura Glostrensis in villa vernaculè Kctan nomine: Gafu adstringente, præsecco, moderatè calido.

Diosc. Radicem huius loco laboranti adalligatam, dolores varicum sedare Andreas scripsit.

SYMPHYTVM *Alam, seu Alus. Offic. Consolida maior.*

Germ. Wailwurtz, sehwarzwurtz, Schantwurtz, Schmerwurtz. Belg. Wailwortei. Aduers. 251.

SYMPHYTVM *tuberosum.*

Diosc. Radices trita & pota cruentis excretionibus, ruptisq; proficiunt. Recentia vulnera illis a conglutinant. Carnes quoq; si coquantur, macerant. Inflammationibus sedis potissimum, cum Senecionis folijs vtiliter illinuntur.

Gal. Symphytum magnum similem Petraeo facultatem habet, non tamen gustantibus dulce, neque odorantibus odoratum apparet, sed ijs sanè ab illo diuersum. Cæterum quatenus viscositatem quandam & mordacitatem obtinet, Scillæ simile est. Vtitur eo ad omnia quæ Petraeo.

Subdit Plin. Ossibus quoque fractis medetur.

See Petappon-
sitè & l. 40.
Symphytū.



SYMPHYTUM *tuberosum*.

A superioribus non ita diuersum ortu & facie, sed speciosius quod ex Italia delatum in D. Ioannis Brancionis amicorum que viretis in Belgio visitur sola tuberosa radice diffidens; floribus ex luteo palentibus, caule item & folijs non disparibus, vulgare Symphytum æmulantibus.

Indorum sana SANCTA, *sive* NICOTIANA Gallorum, Petum Clusij & Recentiorum.

Hyoscyamus Peruvianus Dod. *Aduers.* 252.

Gustu mordet & feruet in ore: calida & sicca ordine secundo intenso, minimè frigida, stupesciēs, vt vult Dod. tenuium partium, quemadmodum aliqua calida sunt & crassarum partium, vel frigida tenuium partium, frigida lenta, vel crassa. Quæ verò λεπτομερής sunt, citissimè exerūtur: vel calfaciēdo vel refrigerādo, soluēdo aut adstringendo: quia sine negotio altius vis eius permeat. Ideoq; calidiora quàm sunt, vulgè creduntur. Hoc in alumine satis cōspicuum, quod stipticum à facultate adstrictoria dicitur, quæ in terrea substantia consistere videtur. Illud tamen scissile, vulgo [De pluma] vocatū: efficias ob partium tenuitatem habetur. Secundum locum sibi vendicat ερωδύλλο sive rotundum, vel Saccharinam. Hæc tria adstringunt. Porro quibus naturā aptior adstrictio est, potentius adstringunt. Quæ tamen tenuitate partium, substantia minus conueniente, minori que adstrictione, quia citius id efficiunt, vel etiam quia abditissimas quasuis corporis partes permeant; tanquam validiora habentes & preferuntur. Ideo à quibusdam, qui gustu calorem metuntur, & explorant, calidissima, aut frigidissima dicuntur. Nicotiana calida & sicca in secundo intenso ordine. Sed quia ob partium tenuitatem mordet linguam, calidior quibusdam credita.

Ad gangrenas, vlcera sordida, strumas, & quoslibet morbos doloresue abigendos, Panacis olim d. cantatissimæ more, succus hodie melle excipitur. Dentibus attrita folia copiosam pituitam alliciunt, cerebrum expurgant. in ventriculum illipsa & deglutita etiam famem & sitim sedare creditur. Dentium dolores mulcet, à frigido ortos. Syrupus è succo, vel Stillatiq; aqua cochlearis mensura asthmaticis orthopnœisue medetur.

HERBA *sancta*, *sive* TABACVM *minus*.

Sana Sancta *sive* TABACVM *minimum*.



HERBA *sancta*.

Quae minor habetur, folia promix Hyoscyami lutei, mucronata, angustiora, pediculo inherencia. Flores minores aliquantò, non abfimiles, saturiores, purpurantésue.

Sana Sancta sive TABACVM *minimum*.

Alia minima doctantalis herba facie non diuersa, eodem item feruido vrentique gustu. Flosculi Hyoscyami lutei multo minores ex flauo herbacei. Folia Doronici aut Plantaginis angustifoliae minora, & angustiora Pulmonariae. Radix pusilla fibrata; qualem hoc autumno Mechliniae in hortulo Ioannis de Vroede rizotomi nouissimi vidimus.

Maculosa PULMONARIA. *Aduersf. 252.253.*

In horto Mutoni variat floribus albis.



PULMONARIA Gallorum, flore Hieracij.

Articula muris maior Tragi.



PULMONARIA *alba exotica*.

Huc meritò & hæc inferenda figure cognatione, quam alebat Petrus Coldenbergius pharmaceuticus & simplicium peritissimus, Foliis Britannicæ aut Adimatis humi prostratis. Floribus Solano proximis exilibus, muscosis.



num. Aduerf. 253.
in Galeni.

PERSONATA. Aduerf. p. 17. 253.



Montanum ARCTION.

Anglie tribus à Bathonia miliaribus, secus ædes generosi viri D. Ioānis Cokes, in agro Sommerseti Angliæ minoris genus reperi folijs & caule gracilioribus subans incanis, capitulis minoribus, sed mollicellis & multò delicatioribus, vt Cumini sylvestris. Flos purpureus & bicubitales, graciliores & molliores quàm Bardanz. Radix longa, edendo

de femine radix in vino, dentium dolorem miscet, si contineatur ora discolorum, ambusta bibitur ad coxendicum dolores & stranguriam, ð vino.

modum tenuium partium, & ob id exsiccantis, [extertgentisq;] tamen modicè. Men eius cocta cum vino quadamtenus dolores dentium mitigant. Porro horum modo decoctum persulam, sed & caules teneriores sanare possunt.

PER-

ARCTION Mont.
LAPPA m.



in agro Sommerseti Angliæ in montosis & syluosis Lap-
quadamtenus Lappa mai-
parens, caules cubitales
aperta, intus alba, vt Lappa

Diosc. Decocta tenuis
perniosa, fouentur eadem.

Gal. Facultatis est ad
Quamobrem radix ac se
ambusta & chimerla non




PERSONATA.

Diosc. Radix drachma pondere cum parvis nucibus pota, sanguinem & purulentam excreantibus auxiliatur. Articulorum quoque dolores, qui ex membrorum fractionibus collisionibusque sunt, trita & illa sedat. Quinetiam folia vetustis ulceribus vtiliter illinantur.

Gal. Discutit simul & desiccatur, sed & astringit mediocriter, quare folia eius veteribus ulceribus mederi possunt.

Radix & semina urinas & calculos eiciunt practicanum experimento.

APUL. Succus herbæ cum vino veteri in potionem datus omnes serpentium morsus mirificè sanat. vulnus etiam si cancer erit, cum aqua decoctionis foliorum eius foueto: deinde ipsam cum nitro & axungia, cum aceto tere, & in panno inducito & imposito. Ad canum rabidorum morsus, radix cum modico sale trita imponitur morsui, & statim ager liberabitur. Succus foliorum eius cum melle potui datus, urinam prouocat, & vesicæ dolorem tollit. Puluis feminis eius cum vino optimo per quadraginta dies datus, ischiadicis mirabiliter sanat. Folia trita cum albumine oui & imposita, amabusta mirificè curant.

XANTHIUM. *Adanf. pag. 254.*


Diosc. Fructus ante collectus quam perficere succescat, tunditur, & in ali vase reconditur. Pleas autem sunt capillos, si acetabali iustor tepida aqua madefiat, mox cepit, nitro autem per stellam iunctur, alij in vino tundunt & ita afferunt. Semen aptissime tumaribus imponitur.

Gal. Fructus discutendi vim obtinet.



TYSSILAGINIS flores. Angl. *erim* Garth hene.
Ital. *Vnghia cauallina.* Hisp. *Farfara & vngle*
caualluca. *Advers.* 254.

TYSSILAGINIS folia.
Advers. 254.



TYSSILAGO.

An Chamæleuce Plinij, Farfanum & Farfrugum secus fluuios nascens folio Populi, sed ampliore: cuius radix imponitur carbonibus Cupressi: atque is nidor per infundibulum inqeliter in ruffi veteri.


Diosc. *Folia ex melle trita igni sacro & omnibus inflammationibus hiltu medentur. erida fumus per infundibulum hiantioro raptus, hos sanat qui sicca tuffe * atque orthopneza infestantur. peltorū vomicas rumpit. Eundem effectum prabet suffra radix. decocta in hydromelite, & pota, emortuos partus eijcit.*

† Gal. propter aqueæ humiditatis admiffionem, qua omnia viscētia tenera, alia plus, alia minus participant: nam sicca folia acriora sunt, quā ut inflammatione laborantibus paribus conueniant.

* Eadem Plin. & Gal. est autem modicè æcis, ut sine molestia noxiæ omnes thoracis abscessus credita sit rumpere.



TUSILAGO montana minima.



Se ipsa prodit radicem & foliorum indice, à quibus figura nihil, sed magnitudine tantum discerni videtur. Siquidem tusilagini nostrati facie proxima foliola in pediculis bitum & tenuim digitorum Soldonellæ alpinae paria, similibusq; lateribus, pariterque auersa incana, tomentosa, & carnosâ. Hanc cum rarissimis plantis Vienna Clusius misit in Belgium præclaro D. Brâcioni, penes quem flores videre necdum licuit.

PETASITES. Ital. Cappellazi. Hisp. Sombretera.
Tusilago maior Math.

PETASITES sine flore. Aduers. pag. 254.
An Persolusa & Personata Plinij?



Casa.



Diosc. *Contra phagedaenas, & ulcera quae cacocholis vocant, efficaciter illinitur.*
Idem Gal. & Aegin.

CACALIA. *Advers. pag. 255.*

Diosc. *Radix † in vino madefacta, ut tragacantha, delinctu aut manducata per se tussibus, scabritie & arthria medetur. Grana quae post excussum florem innascuntur, trita & cum cerato illita faciem erugant, & cutem extendunt.*

† Gal. quia radix facultatem habet mordacitatis expectem, & modicè exsiccantem, essentiam crassam & emplasticam.



* similiter ut Glycyrrhiza Gal.

SOLIS FLOS *Peruvianus, sive SOL Indicus.*

Chrysanthemum Peruvianum Dod.

Lusitanicè Gigante à proceritate stirpis.

SOLIS FLOS *minor.*





Solis peramænus flor, quos vnquam vidi, maximus, Chrysanthemi vel Chamaeleonis albi auro micans fulgore, orbiculatus, discum pedalis & nonnunquam sesquipedalis latitudinis superat, speciosis quæ radiantibus luteis folijs ambitu circummeinctis. Caulem edit rectum quindecim, 18. & 20. pedes procerum Maius arboreæ. Folia perampia Cacalia, Bardana, Syda Theoph. maiora, carnosa, atro-utentia. Radix aliquantum tuberosa. Semen compressum ferulaceum. Multis hodie Belgij hortis in delitijs est, vbi tamen ratò maturitatem adipiscitur: quia ferotina planta hyemis seruitia emoritur. Martii. vsus hæcenus nullus.

Solis Flos minor.

Alter minor caule alis brachiato, folijs simplicibus, & horum minorem folijs in stellorem morem circummeinctis.

CHELIDONIUM minus.
Aduers. 256.

CALTHA Palustris Gaspari & recentiorum. Caltha Virgilij
Tragi. Tuffilago altera Matth. Chelidonium minus palustre
Cordi, & Dilij. Chamaleuce Plin. Anguil. Gerin. Blau-
tenblumen. Geel wits blumen. Aduers. 256.



Diosc. Vis ei acris. & anemones modo, summam cutem exulcerat. psoras & scabros vngues eximit. succus † †Eadē Gal. radicibus expressus ad purgandum caput naribus infunditur. decoctum eius cum melle gargarizatum, magnifice id praestat. & omnia pectoris vitia extrahit.

Gal. cum acrius sit maiore, illitam confestim cutem exulcerat vnguesq; scabros eiecit.

Idem hemorrhoidibus, strumis, exterditque ficibus illinitur, sub cineribus cocta in folio ficulneo aut Betæ.


NYMPHAEA alba.

Diosc. Radix secca cum vino pota colicis, dysentericisq; auxiliatur: lientem absorbit. Radix stomachi ac vesicae doloribus illinitur. vitiligines ex aqua emendat. imposta cum pice, alopecias medetur. eadem contra Venereis infectionibus bibitur. siquidem ea profluxu admittit, pota astitit aliquot diebus, genitale infertur. Item semen potum efficit. Nymphaea nomen sibi vendicasse videtur, quoniam aquosa ariet.


† Eadem Gal. Ceterum Nymphaea quae candidam radicem habet, potentioris est facultatis, ut & muliebri profusio medeatur. Verum & haec, & ea quoq; quae atram habet radicem, ex vino nigro austero bibitur. Porro nonnullam etiam abstergendi vim obtinet, ita ut apthos & alopecias sanent. Ad apthos vero macerantur aqua, ad alopecias pice liquida. Sed ad haec aptior est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

NYMPHAEA lutea.

Diosc. Huius semen & radix contra feminarum profusio efficaciter ex vino nigro bibuntur. Subdit Plin. Tenesmo radix ex vino bibitur. Dolores vesicae sedat ex vino. Manantia sanat vicera. Maculas omnes emendat. Tota piagis imponitur. Ulceribus piusculis que calcemere facta sunt, prodest arida infusa.




NYMPHAEA alba. Aduerf. pag. 257.



*NYMPHAEA
alba. Aduerf.
pag. 257.*

*RANAS
Mortis.
Aduerf. 258.*



*RANUNCULUS
acris. Aduerf.
pag. 258.*



TRIBULUS aquaticus.

Diosc. Uterque refrigerantis & inspissantis est natura. idem inflammationes omnes cataplasmate adtinet, vicera in ore erumpentia, pustulas, gingivas, tonsillasq; persanat. Succus ex his colligitur, ad oculorum medicinas. Semen dum recens bibitur, calculosis iuuamentum affert. Drachma terrestris tribulis posa, illis a vipera recreat. contra venena cum vino apertissime bibitur. decoctum eius sparsum pulices necat. Thraces qui ad Strymona amne habitant, viventi tribulo equos seginant, & è dulci semine & esculento panem, quo vescuntur, faciunt.

Gal. Tribulus ex humida essentia modicè frigida & sicca, non mediocriter & ipsa frigida componitur. In terrestri tamen superat terreum, frigidum, quod & adstringens ostendimus: in aquatico vero aqueum. Propter utrumque itaque, & contra phlegmonarum generationes, & omnino contra omnes influxus congruunt.

COLOCASSIA, sive Faba Aegyptia species.

ARVM Aegyptium Dod. & Recentiorum.

Hisp. Manta de nuestra Señora.


Aduers pag. 259.

ARVM, ἄρον, **Officin.** Varus & Pes vituli. **Belg.** Calfs-

voet. **Gallis** Pied de veau. **Germ.** Phaffen püt.

Ital. Gigaro. **Hisp.** yaro. **Ang.** Cothowpnt.

Aduers pag. 260.



Diosc. Caulem habet cubitalem, digiti crassitudine: flore ¶ roseum, dupla papaveris amplitudinet & ubi flore exiit, fert folliculos vesp. vium sane similes, in quibus faba supra operculum, bulbaris ampulla modo, prominet. Ciberium aut Ciborium, i. arculam ideo nominant, quoniam feratur ipsa bumenti globa mandata. Et ita in aqua demissa. Radice firmatur arundine crassiore qua cruda colūve estur. Colocassa sive faba adstringendi facultatem obtinet, & stomacho vtilis: dysentericis, celiacisq; prodest, in parso polenta vice, lomento. Datur quoq; in pulve. Cortices in vino mulso decocti si terni inde cyathi bibantur, magis proficiunt. Facit ad curiam dolorem, quod in carnis medio viride spectatur; gustu amarum, sive ritum, & cum rosaceo colūve infillitur.

¶ Bellonius etiam negat illi florem aut fructum.

Gal. Sicuti nostratrem fabam magnitudine longè præcellit, ita & naturam humidiores, magisque excrementosam sortita est.

ARVM

ARVM.

Diosc. Radix decocta estur, ut potest cum minus acris sit, folia ad usum reconduntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen & folia Dracunculi vires habent. Præcipue radix ex primo bubulo podagris illinitur, & dracunculi more reponitur. In totum ob mitem acrimoniam, in cibum expeditur.

Gal. Terrena & ipsam essentia constat, sed calida: proinde extergendi vim possidet: verum non valenter sicut Dracontium. Est itaque in exsiccano & calfaciendo primi ordinis. Radices eius maxime sunt utiles: siquidem comestæ crassitiam humorum mediocriter incidunt, aded ut & excretionibus ex pectore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontium.

ARVM maius Veronense; perperam Arisarum. Aduers. 260.
videtur idem cum Dracunculo altero seu Helicophyllo Cordi.

Tanti discriminis relationi quorundam acquiescere, quantæ fraudis, imaginibus arguissimè picturis credere. Quibus radicibus olim nos donavit Franciscus Calceolarius Veronensis sedulus & harum peritissimus pharmacarius; temporis progressu eam assequutæ sunt magnitudinem, ut merito & affabre Aron maius, vel Dracunculum minorem quidam statuerint. Aron siquidem per omnia similis: sed folia maiora intercurtantibus venis & notulis albis variata, in hyemem perfiat. Racemus item & radix Ari, quæ pluribus bulbillis adnatis propagatur.


ARISARVM Hispanicum congener cum Arisaro latifolio Clusij.
2^m. Arisarum Clusij.

D. Bracionis Adonidis pensilibusq; hortis nuper inquilinum Hispania delatæ radice tuberosa anemones, folio hederæ aut violæ nigræ oblongiore: neque semen neque florem cernere hactenus datæ.

Diosc. Radix olivæ magnitudine maioris quàm Aron acrimonia. Unde illius nomas sistit, sunt collyria ex ea, ad fistulas efficacia. Illius radice, genitale animalis cuiuscumque in perniciem agitur.

ARISARVM latifolium Clusij, nunc idem cum Narbonensi; Hisp. Iaro & fratillos. i. fraterculi, Clusio interprete. Aduers. pag. 260.

ARISARVM angustifolium cum fructu racemoso albo, & corniculo purpureo. Aduers. pag. 261.



In Arisarum
Narbonensi
lege Aron.

lege Clusio
galieno

ARISARVM *Latifolium*.

Ternis aut quaternis folijs Smilacis, satis carnosiss, mollibus, viridibus, & scribis, oblongo pediculo ex Clusio.
fultis, lunata falcataque basi. flos Aristolochie longae extrema parte nigricans in sesquivinciali pediculo, notulis rubris vario. radix rotunda Aro minor. Sponte oritur ad margines agrorum Lusitanie in colibus & dumetis.

ARISARVM *angustifolium*.

Varietas. [Mechlinie in horto Georgij Ryensis rei herbarie perquam studiosi folio aliquanto latiore & corniculo virenti à superiori diuersum visitur.

ANGVINA DRACONTIA. *Hisp T gonst Ital. Serpentina. Gall. Serpentine grande. Serpentaria Colubina. Germ. Draken wurtz, Slangenkraut.*
Belg. Drakenwojtels & Spretwojtels. Aduers. 161.



Diosc. *Seminis succus cum oleo instillatus, arisan: dolorem mitigat. Naribus etiam ex lana impositus poly-
pium absunt. Carcinomata illis sistit. triginta eius gra-
na, si in posca bibantur, abortus inferunt. Odore auius
postquam flaccidi flores emaruerint, conceptus adhuc te-
neros enecare. Radix excelsat, orthopnois, ruptis, vultis,
tusi, destillationibus, auxiliatur. humores pectoris excre-
tu faciles reddit, siue colla tollatque cum melle, aut per
se edatur, siue farina eius ex melle delingatur. vrinam
pellit. venere excitat, cum vino pota. phagedanas ricevū,
& qua catocethe vocantur, vicia cum melle & bryonia al-
ba, expurgat, & ad cicatricem perducit. collyria ex ipsa
ad fistulas & eijciendos partus fieri solent. qui radice suas
manus perfricauerint, à viperis ferri negantur. illa ex a-
ceto, virilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus, sin-
amentorum vice, conuenienter imponuntur. decocta in vino
pernionibus apposuisse prodest. casus folijs involutus, à
putredine defenditur. Succus radice ad nubeculas, albugi-
nes, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda colla-
ne, ad sanerum vsus, pro oleo recipitur. in Gynnesijs insu-
lis, qua Balzares vocantur, collam radicem cum melle
multo, in conuinijs placenturum loco offerunt. Radix mes-
sibus effoditur, lotaq; frustra conciditur, & lino traiecta
siccat in vmbra, & ita reconditur.*

De altero Dracunculo inter notha Dioscor.

DRACONTIVM, sine DRACUNCVLVS Gal.

Quiddam Aro persimile obtinet, tam folijs tum
radice: ceterum illo tum acris est, tum amarius,
ac proinde calfactorium magis, & remioribus
partibus. Habet etiam leuicillam quandam ad-
strictionem, que quandoquidem cum compre-
hensis duabus qualitatibus acris scilicet & amara &

iancta est, medicamentum factum est, vt que maximè efficax. Nam radix viscera omnia expurgat,
crassos potissimum & lentos succos extenuans: optimūq; remedium est contra maciam vlc. rotū, que
arabibus nuncupant. Expurgat quoque extergere; strenuè tum alie que extersionem desiderant, men vi-
tiginem cum aceto: tum folia item vapore similem facultatem habentia. Viceribus, vulneribus que
trecens inflatis accommoda sunt. Et quanto minus fuerint sicca, tanto magis conglutinant. Nam que
lectora sunt, viribus sunt acrioribus; quā vt vulneribus conueniant. Creditum est quoq; casum hu-
midum si illis foris reclusis reponatur, ob temperaturā illorum siccitatem à putredine conseruari. fru-
ctus valentior est non folijs tantum, sed & radice: Itaq; & caneros & polypodas eliquare creditus est.
Succus quoque eius vitia oculorum expurgat.

APVL. Ad omnium serpentium morsus & aspidum: radix ex vino trita tepesca sita potui data, vena-
num omne discutit. Radix cum axungia facta quasi malagma & imposita, mox ossa fracta de cor-
pore educit, & lapides extrahit.


Foliorum stillatio liquore vinctur Angli ad Pestis contagia, vna cum Draconis seu Turacois
sqm. Dosis singulorum ʒ. j. & s. Theriacis ʒ. j. sudorem copiosum eliciunt.

Aquatica ANGVINA, sive DRACUNCULVS.

Dracunculus arundinacea radice Plinij.

Germ. Wasser Schlangen Kraut. Belg. Water Slangen
crupt. Gall. Serpentine d'eau. Aduersf. 261.

ASARVM. Angl. Felleste & Wjara haccora.
Aduersf. pag. 262.



Plin. Lib 24. cap. 16. Eam ex aqua vel vino contra serpentes dabant.

ASARVM.

Diosc. Radices habet odoratas, excalfacientes, & qua linguam vehementer mordent. Excalfacioriam vim habet. vrinam cit. hydropicis & vetustio coxœdium dolori prodest. Radices senis drachmis ex aqua malsa pota, menses trahunt, & veratri albi modo purgant. In vnguenta additur.

Gal. Radices facultate similes radicibus Acori, intensiores tamen. Itaque ex ijs, quæ de illis prodita sunt, hic facienda coniectura.

Plin. Nardi viro habet Asarum, quod & ipsum syluestre Nardum aliqui appellant. Secundo ordine excalfaciunt & siccant tertio Asari radices. Mesueo attenuant, referant, resoluunt, & prouocant; adstrictione tamen non vacant. Bibitum Asarum non modò vomitione cit, sed & per aliu ducit.



Mesue. Tota planta est aromatica, & gustum mordens. Radice præcipua, præsertim magna, odore tenui, sapore acri, & parum styptico. Calida sicca ordine tertio, vel potius cum Dioscoride calida secundo, sicca tertio. Tenuat, resoluit, obstructa aperit, hepatis, lienis, & horum duritiem soluit, & affectus alios inde natos, febres putridas & diuturnas, icterum, hydropem, præsertim vino infusum. Purgat vomitu & deiectione, & vrinis bilem, sed puritatem manifestius, etiam ex ilibus, ischio, & aliis articulis: ob id harum partium dolores mitigat, præsertim infusum, vel aliter exhibitum.

Oleum asari cum ladano spinæ illitum sudores mouet, & rigorem febrilem inhibet. Vrinam mouet, semen auget. Valentius agit cum sero lactis, spica & hydromelate. Mustum his radicibus conditum post tertiam mensem hydropes & splenem sanat. Mediocriter coqui & teri possit: & quò tenuius est tritum, eò magis vrinam mouet: minus autem aliu ducit. Nasur infuso ad aureis duobus ed drach, quatuor: puluere autem à drach. vna ad aureos duos.

Isobladus & quædamque vomitione, vtilis.

ASARINA *sterilis* *Socina* *Narbonensis* *agri*,
Aduers pag. 262.
Asarina *diuisa* à *Matthiolo* qui *florem* *Anthemidis*
esse *seruit*.

SOLDANELLA. *Brassica* *marina*.
Delg. Hermbold: Hisp Soldanela,
& verca marina. Aduers 263.



Folia & *flores* dilute purpurantes *Hederæ* *terrestri* *conueniunt*; *sed* *maiores*, *longiores*. *Rupibus*
 & *caulis* *Vegano* *concernitis* *Sciencæ* *oriunda*.

SOLDANELLA. *Brassica* *marina*.

Dioc. *Folio* *pingui* *concreto*, *satis* *guisu*, & *aliquantulum* *amaro*. *totâ* *herbâ* *stomacho* *incommoda* *est*, *acris*.
Quam *maximè* *solent* *in* *cibus* *cocta*. *Coquitur* *propt.* *et* *acrimoniam* *cum* *pingui* *carne*.

Ferri *ordinis* *excessu*, *calida* & *sicca* *conferuntur*.



Tormina & *flatus* *gignit*, *flauas* *hydropicorum* *aques* & *pituitas* *edificat*.

Gal. *Suprà* *quàm* *quodè* *ventrem* *deijciat*, *ut* *potè* *subtilis* & *subarsa* *gusti*, *feris* *sanè* *eiam*
ad *exteros* *corporis* *vltus* & *ad* *omnia* *ea* *ad* *que* *tales* *qualitates* *accommodantur*, *si* *conca*.



GRAMEN PARNASI. Recentiorum Hederacearum.
Hepatica alba Cordi. Germ. Heber. Sinuatum,
Adusif. 263.

GRAMEN PARNASI duplicatis floribus.



Diosc. Densus fruticat. Succus in vino cum melle pari, & Myrrha dimidio decoquitur. Adhucianturque pipereis & thuris tertia portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Id in area pyxide reconditur. Decoctum radicum, idem quod herba praestat. Semen vehementius urinam impellit; alium, vomitionesque facit.


Gal. Semen eius urinam ciet; & fluxus ventris & stomachi testificat. vis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacriba.

GRAMEN PARNASI duplicatis floribus.

Varietas. { Prosum idem, vdis Brabintini agrici etiam quò loci aliud vna sponte oritur, legit sedula manus D. Lucæ Eersfel medici Louanensis harum perquam studiosi & permissimi; sed sola florum speciosa duplicatione vacium.



CYCLAMEN folio Hederae. Rapum terra. Arthritica.
Belg. Scaughen bjeest. Adnerf. 164.



DIOSC. Radix cum hydromelite pota, pituitans
aquamq; detrahit, menses potu appositivie ciet. Tradunt,
si pragnans radicem transgrediatur, abortum fieri. partum
appensa accelerat, contra venena, praesertim leporis mari-
ni, ex vino bibitur, illita contra serpentium ictus remedio
est. immista vino inebriat, regium morbum discutit, tri-
bus drachmis pota, cum passo aut diluco misco. Sed oportet
eum qui ebibit, multis vestibus contextum, loco calido,
& a perfrictionibus tuto, recumbere, quod facilius exudet,
ejecti autem sudores fellei coloris inveniuntur. Succus eius
ad purgandum caput, naribus infunditur. ad deicienda
quoque alia excrementa, in vellere sedi subijcitur. illito
umbilico & imo ventre coxarum tenuis, album emollit, &
abortum efficit. suffusionibus, & retusa oculorum aciei,
oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum
infernibus admiscetur. succus cum aceto illitus, prociduum
sedem restituit. Exprimatur tusa radice succus, & ad mel-
lis crassitudinem decoquitur. Radix cutem purgat, eruptio-
nes papularum reprimat, vubteribus ex aceto per se aut cu
melle medetur. * lientem absorbit. vitia cutis in facie, &
alopecias emendat. eius decocto laxata, podagrae, & capi-
tu vlcuscula, perniciosesque saueri congruum est. ipsaque
in oleo vetere servata, illito oleo, vlcera ad cicatricem
perducit. Cavata radix oleo expletur, & cinere ferventi
imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cera momento,
ut frigmenti crassitudinem rugulentum contrahat, cum
primis vitile perniciosis. Radix, scilla modo, concisa repo-
nunt. Narrant, ad amatoria assumi confusam, & in pa-
stillos utisam. Nasitur in umbrosis, maxime sub arbo-
ribus.

Eadem Plin.

* eadē Gal.

† eadē Gal.

* Gal. eadē.

† Gal. eadem. & menses sine pota, sine imposta euocat. non modò viscus purgans, sed etiam quae
in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorem excernens, proinde à potione omnibus modis adiuvandae
sudoris prouocatio est.



MESVE. Calidus siccus initio tertii ordinis, incidit, tenuat, resoluit, terget, expurgat, obstru-
ctiones aperit, sudorem copiosum mouet, cutem scditate eius ablata omnium maxime expurgat.
Pituitam lentam & crassam sumptus, & suppositus, atque adeò femori, ilibus, & vicinis partibus il-
litus purgat. Obstructiones viscerum, praecipue splenis aperit, maximeque ex oxymelite, & sum-
ptus, & emplastri modo ad motus colicum dolorem à pituita, aut stercore suppresso sanat, caput &
oculos insigniter expurgat, praesertim ethino ex ipso in nares recepto, praesertim post purgationem
per Hieram, aut Theodoricon, aut catapotia fetida, aut similia. Quapropter visui imbecillo, & a-
quis in ipsum ruentibus, hemicraniae, cephalalgiae, torturae, paralyti, & ceteris cerebri affectibus frigida
confert, ethino, vt dixi, attractus. Ictericum sanat experientia certà, praesertim succo cum oxy-
melite, vel anomelite sumpto, & operto deinde diligenter corpore. Nam sic sudore largo materia
etiam in vaporem versa bilioso excremento exonerabitur. Duro licet confert quouis vici modo, &
tumoribus aliis, vt etiam strumas iuuet. Menses mouet, sumptus & suppositus haemorrhoidas po-
tentissimè aperit. Corrigitur vt dracunculus, & bryonia, succi huius drach. quatuor cum saccharo
solutas, & ad tertiam coctas, mane sumptas, icterum sanare certissimè, & expertissimè affirmat si-
lius Serapionis.

Gal.



GRAMEN PARNASI *Recentiorum Hederacearum.*
Hepatica alba Cordi. Germ. Aebet. unguent.
Adurf. 263.

GRAMEN PARNASI *duplicatis floribus.*



Diosc. *Densius fruticat. Succus in vino cum melle pari, & Myrrha dimidio decoquitur. Adhicianturque pip-
 ris & thuris tertia portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum. Ad in area pyxide reconditur. Decollant
 radice, idem quod herba praestat. Semen vehementius urinam impellit; etiam, vomitioneque silit.*


Gai. Semen eius urinam ciet, & fluxus ventris & stomachi reficcat. vis enim eius est exiccatoria,
 tenuium patium, & subacris.

GRAMEN PARNASI *duplicatis floribus.*

Varietas. { Prorsum idem, vdis Brab utini agri etiam quò loci aliud vna sponte oritur, legit sedula
 manus D. Lucae Hessel medici Louanienfis harum perquam studiosi & peritissimi; sed
 sola florum speciosa duplicatione varium.



CYCLAMEN folio Hedera. Rapum terra. Aristavida.
Belg. Druggen v. aet. Adnrsf. 264.



DIOSC. Radix cum hydromelite pota, pituitam
aquamq; detrahit, menses potu appositive ciet. Tradunt,
si pregnantis radicem transgrediatur, abortum fieri. partum
appensa accelerat, contra venena, praesertim leporis mari-
ni, ex vino bibitur, illita contra serpentium ictus remedio
est. inuisita vino inebriat, regium morbum discutit, tri-
bus drachmâ pota, cum passo aut diluto misco. Sed oportet
eum qui edibit, multis vestibis contactum, loco calido,
& à perfrictionibus tuto, recumbere, quò facilius exudet.
eiectionem sudores felei colore inveniuntur. Succus eius
ad purgandum caput, naribus infunditur, ad deicienda
quoque alia excrementa, in vellere sedi sibiq; citatur. illito
umbilico & imo ventre coxarum tenuis, aluum emollit, &
abortum efficit. suffusionibus, & retusa oculorum aciei,
oblitus cum melle succus prodest. medicamentis abortum
inseminationis admiscetur. succus cum aceto illitus, proiduum
sedem restituit. Exprimatur tusa radice succus, & ad mel-
lis crassitudinem decoquitur. Radix autem purgat, eruptio-
nes papularum reprimat, vulneribus ex aceto per se aut cū
melle medetur. * lionem absorbit. vitia cutis in facie, &
alopecias emendat. eius decocto laxata, podagras, & capi-
tū vlcuscula, permionisque foueri congruum est. ipsa quo-
que in oleo vetere seruata, illito oculo, vicera ad cicatricem
perducit. Cautela radix oleo expletur, & cinere seruenti
imponitur, adiecto interdum Tyrrhenica cera momento,
ut frigiditatis crassitudinem vnguentum contrahat, cum
primis vitale permionibus. Radix, sic illo modo, concisa, repo-
nunt. Narrant, ad amatoria assumi confusam, & in pa-
pillosa diuisam. Nasitur in vmbrosis, maxime sub arbori-
bus.

Eadem Plin.

* eadē Gal.

† eadē Gal.

* Gal. eadē.

† Gal. eadem. & menses siue pota, siue imposita euocat. non modò viscus purgans, sed etiam qua
in toto corpore bilis fitit, eam per sudorem excernens, proinde à potione omnibus modis adiuuan-
di sudoris prouocatio est.

M E S V E. Calidus sicus initio tertii ordinis, incidit, tenuat, resoluit, terget, expurgat, obstru-
ctiones aperit, sudorem copiosum mouet, cutem sciditate eius ablata omnium maximè expurgat.
Pituitam lentam & crassam sumptus, & suppositus, atque adeò femori, ilibus, & vicinis partibus il-
litus purgat. Obstructiones viscerum, praecipuè splenis aperit, maximeque ex oxymelite, & sum-
ptus, & emplastri modo ad motus colicum dolorem à pituita, aut stercore suppresso sanat, caput &
oculos insigniter expurgat, praesertim erithino ex ipso in nares recepto, praesertim post purgationem
per Hieram, aut Theodoricon, aut cataportia foetida, aut similia. Quapropter visus imbecillo, & a-
quis in ipsum ruentibus, hemigraniae, cephalalgiae, torturae, paralyti, & ceteris cerebri affectibus frigi-
dis confert, erithino, vt dixi, attractus. Ictericum sanat experientia certâ, praesertim succo cum oxy-
melite, vel œnomelite sumpto, & operto deinde diligenter corpore. Nam sic sudore lato materia
etiam in vaporem versa bilioso excremento exonerabitur. Duro lieni confert quouis vterque modo, &
tumorebus aliis, vt etiam strumas iuuet. Menses mouet, sumptus & suppositus haemorrhoidas po-
tentissimè aperit. Corrigitur vt dracunculus, & bryonia. succi huius drach. quatuor cum saccharo
solutas, & ad tertiam coctas, mane sumptas, icterum sanare certissimum & experitissimum affirmat A-
lius Serapionis.

Gal.





Gal. Cyclaminus varias vires obtinet, non & extergit, & incidit, & ora venarum aperit, & attrahit. Clarum verò id est ex particularibus operibus: nam succus eius hemorrhoidas referat, violenterque ad secessum prouocat in floccis appositus. Sic etiam medicamentis tubercula, strumas, aliaque durities discutientibus commiscetur, ac suffusus cum melle illitus competit. Ad hæc quoque per nates expurgat.

Varietates. Cyclamen vernum flore rubro Ferraria misit D. Alfonsus Pancius, cui folia Martio erumpunt: Aprili & Maio flores. Semenque matureat initio Iunij.
Belgij virena folio hederaceo rotundiore tantillum crenato fusque deq; maculis variato colunt.
Breuiori flore est illud quod fundit Romanus montanus ager.

ARISTOLOCHIA. Gallis *Aristoiole* & vulgo *Sarafina*.
Ital. *Aristologia*. Hisp. *Aristoloquia*. Germ. *Stertlucy*,
& *perperam* Holwurtz. *Aduers.* 264. 265.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA.

ARISTOLOCHIA *Clematitis* nostras, *perperam* longam Martioli & Fuchsi. *Aduers.* 265.



Diosc. Rotunda ceteris venenis resistit. Longa verò aduersus angustis arcebutina pondero est. Vinò labitur & trinitur. Posita cum pipere & Myrrha, menses, partus, & omnia vuluarum onera spei. eadem efficit in pesto subtilitate. Rotunda ad eadem polles insuper singultientibus, siccis, horribus, licet, conuulsis, La. m. g. delictibus, & in aqua singulariter an. illatur. Aculeos & spicula extrahit. Osium squammas illis aduenit. p. i. h. v. i. c. a. g. i. l. l. i. c. a. t. & for. h. l. e. o. r. p. u. r. g. a. t. c. u. i. c. u. m. i. r. i. d. o. & m. a. l. l. e. c. o. p. l. e. s. E. x. t. e. r. g. i. t. g. i. n. g. i. v. a. & d. e. n. t. e. s. C. r. e. d. i. t. u. r. & C. l. e. m. a. t. i. s. p. r. o. l. e. s. s. e. p. u. i. b. u. s. t. o. m. a. n. i. n. f. e. r. i. e. s. q. s. s.

Gal. Radix zniara & subactis, sed ex illis tenuissima est rotunda, & in omnibus efficacior. Alia-
rum verò duarum Clematidis vocata magis odorata est: itaque ea ad vnguenta vruntur vnguentarij;
sed ad sanationes infirmior. Longa verò minus quidem tenuis est, quam rotunda; sed nec ipsa in-
efficax: Verùm abstergerendi & calfaciendi facultatem possidet; minus tamen quam rotunda abster-
git, atque digerit: sed non minus calfacit, imò fortassis etiam plus. Itaque in quibus vsus est modicæ
absterisionis, commodior est longa; puta in carnis exulcerationibus, & vteri fomentationibus. In qui-
bus autem crassum humorem validius extenuare oportet, illic vsus est rotundæ. Proinde dolori ab ob-
structione, aut crassitie crudorum flatuum natos, magis curat rotunda, & spicula extrahit, & putredi-
nes sanat, & sordida vlcera repurgat, dentes, gingiuasq; candidas efficit. Auxilio est asthmaticis,
singulientibus, comitialibus, podagricis cum aqua frigida pota. Ruptis etiam conuulsisque, vt si
quod aliud medicamentum, idonea est.


APVL. Herba Aristolochia sicca suffumigabis febricitantem, & hilariorem eum facies. Fugat &
dæmonia. Frigore exultis, herba Aristolochia ex oleo vsque ad calefactionem vim habet cum ax-
ungia porcina. Si infans contristatus fuerit: herba Aristolochia suffumigabis infantem, hilarem
facit, & conualescit infans, fugato dæmonio. Canceromata quæ in naribus nascuntur, herba
Aristolochia cum Cypero & Draconteæ semine trita & cum melle imposta, emendat.

PISTOLOCHIA & Polyrrhizon Plin.

Aduers pag. 265.

Conuulsis, conuulsis, ex alto precipitatis, radice pota ex aqua, vtilissima esse traditur: semine pleu-
riticos & neruos confirmare, exalfacere. purida vicera exciit, vermesq; extrahit, & cætera cuncta
potest quæ superiores. lego promi-
scuè, in, 32.

Aristolochia CLEMATIDIS altera Hispanica.




Candote, sedulitate & industria D. C. Clouij nobis Clematidis alteram genis innotuit, qui ex Hi-
spania Barce, & Hispania ibus radicibus in Olyssiponensi in spiculis detectam D. Brancioni
ex amicis videnti copiam fecit. densioris & diuerti gaudet, flexuosis, anfra duobus, vinculosis, re-



mosis, gracilibusque cauliculis arripit & amplectitur vicina crenia. Radice reptice, praelonga, anfractuosa, geniculata, Smilacis asperæ, & no tratis Clematidis colore. Flores incurui nigricant ex purpura: lagenulæ, & foliis Aristolochiæ Clematidis minora, rigida, leuia & tantillum acuminata. Facultatibus cæteris haud abfimilis creditur.

VIOLA MARTIA purpurea, flore multiplici.
Hisp. Violeta. Ital. Viola mammola & viola
porporea. *Aduersf. pag. 266.*

VIOLA MARTIA surrectis cauliculis.
Aduersf. pag. 266.



Diosc. Refrigerandi naturam habet. Folia per se & ex potestate illius aptissime stomacho astuant, & viscerum inflammationibus, sedique procedenti. inflammationem, tensionem & dolorem leniendo. Semen calculos vesicæ comminuit, urinas ciet: exiccate, vel plantaginis, creditur.

Marsb. Violæ refrigerant & humectant ordine primo, cum tamen sicca minus refrigerent, & Bala minus humectent. Humiditas que superflua recentibus locis, alium emolliendo ciet: verum acris, & electoricæ sunt facultatis, non quod emolliant, sed quod dissoluant. Violæ in summa torrefactæ sunt, refrigerant.

refrigerant, capitis dolores mulcent, inflammationes extinguunt, leniunt & solvunt. bilem educunt, eiusque feruorem mitigant. Conferunt capitis doloribus, quos caliditas excitauerit. Pectoris & asperæ arteriæ scabritiem leniunt. Medetur anginis & columellæ vitij. Præcipuo autem sunt auxilio pectoris, & lateris inflammationibus, sitimque arcent. At quæ sicca sunt, iecoris obstructions referant, inflammationes discutiant, & morbo regio laborantibus opitulatur.

Cauliculis ramosis Viola martia è floribus { Hanc luteis floribus transmissit stirpium summus explorator
colore differentia. } Clusius noster D. Iohanni Brancioni.

*VIOLA flammea coloris. Herba Trinitatis Fuchsf. à
triplici floribus colore. Lacea sine flos Trinitatis Matth.
Viola tricolor Dod. Aduersf. 266.*

*SAXIFRAGIA alba chelidonides, eiusque varietas.
Aduersf. pag. 267.*



Non secus ac Viola martia, gustu subacris, tenuis substantiæ & incidentis facultatis, non sine humido abstergente, cuius beneficio crassa pituita, citra exiccationem & calorem, inciditur, abstergitur, & facilius educitur. Ideò nuperis ad asthma, peripneumonias, febres, convulsos, epilepsias, materiam propellendo. Pruritus, psoram & cutis vitia emendat. Ulcera quodam lymphitii lentore conglutinat.

SAXIFRAGIA alba.

Et sola magnitudine omni sui parte auius conspicua differentia in Belgio.

lega

lege *SAXIFRAGIA cures Lichenis facio & natalini. Ery-*
fimi species Alarandi. Advers. pag. 267.

HUMILIS HEDERA flos CHAMÆCIS sive,
Coronaria. Yonellris hancina. Germ. Gandel
frid. Belg. Onberpaur. Gall. Liane corollice.
*Advers. pag. 268. **

Chamæcema Cordi, quasi dica: humilis Citema-
 tis repens. Citemen autem teutonice, est repero
 scanderæe.



Corymbosa
 HEDERA.




lege foliolata
 cur. in. 14.

* *Diosc. Gustu supra modum amara. Bibens con-*
venientissime ischiadici folia, tribus obolte in aqua catho-
tribus, tricens quadragesime diebus, eodem pota modo,
fortis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Gal. Chamæcissi flos cum sit admodum ama-
rus, iecur obstructione liberanda utique ex cox-
dica laborantibus.

CHAMÆCIS. Advers. pag. 268.
Calchis paliferis Gesneri.
Diosc. Lumbri cum solariis propolis est.



Corymbosa HEDERA. *Hisp. yedra. Ital. Hedera. Advers. pag. 269.*

Diosc. Hedera omnis acris est, & adstringens; nervos tentat, flos^a irinum digitorum carpta, facit ad dysentericos, in vino bis die potas. anibositis cum cerato tritus illinitur. recentia folia^b ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. foliorum & corymborum succus, cum irino unguento, melle aut nitro,^c naribus infunditur. & contra veteres capitis dolores, caput eo citim aceto & rosaceo perfundat utile est. purulentis auribus, aut dolentibus, cum oleo medetur. nigra hederæ succus, aut epoti corymbi, corpus infirmant, mitemq;^d turbant largius sumpti. acini quinque triti, calfactique in pumici mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aere, dolorem dentium mitigant. denigrant capillum illiti corymbi. folia in vino decocta illinuntur omnium vlcerum generi, etiam si cacoërbe sint. vitia cutis in facie & ambusta sanant, vel antea diximus, decocta. mouent menses triti & subditi corymbi. hederæ peti, post purgationes seminarum, drachma pondere, concipiendi sperm adiuuant. pediculus foliorum melle irrigatus, ac vulua inditus, menstrua & partus extrahit. instillatus succus putrida tadia narium, graneolentiámque emendat, & sanitati restituit. lachryma hederæ psilothrum est: illatu pediculos enecat. succus radicum, cum aceto potus, phalangiorum moribus succurrit.

^a [Flos] Gal. flores aut quodammodo validiores sunt, vt ad læuorem redacta cum cerato ambustis conueniant.

^b eadem Gal. ^c eadem Gal. ^d Gal. capiti purgando idoneum existit. ^e eadem Plin.

^f eadem Gal.

Hederæ omnes refrigerant Plinio. eodem tamen auctore decoquuntur contra horrores febrium, eruptionesque pituitæ; aut in vino teruntur. Eadem quæ Diosc. Plin. qui subdit:

Hederæ, quam Chrylocarpon appellauimus, baccis aurei coloris viginti, in vini sextario tritis, ita vt terni cyathi potentur, aquam quæ cutem subierit, per vrinam educit Erasistratus. Hedera nigra corymbos decoctis suis hydragogis præscribat Rondellius. addidimus & nos ad vnciam vnam.

Plin. Radicis succus, in aceto potus, contra phalangia prodest. Huius quoq; ligni vase spleneticos bibentes sanari inuenio. Et acinos terunt; moxq; comburunt, & ita illinunt ambusta, prius perfusa aqua calida. Sunt qui & incidant succi gratia, eoq; vtantur ad dentes erosos, frangi que tradunt, proximis cera munitis ne lædantur.

Gummi etiam in hedera quæruni, quod ex aceto vtilissimum dentibus promittunt.

Folia vino infusa calculos & vrinas pellunt. Fontanellis vulgo dictis imponuntur commodè. Huiusmodi mores alliciunt, inflammationes & putredines arcent.

Gummi
Hederæ.

HELIX sive Prouoluta, sterilis Hedera, *Advers. 269.*

CYMBALARIA Italica hederaceo folio, *Advers. 269.*






HEBERACEVM THLASPI.

In Portlandiæ peninsula, Cornubiæ vicine portu Plimmouve, alijsq; maritimis Angliæ caulis, repens herbula dodrantalibus & spithameis gracilibus cauliculis, striatis, puncticulis, folijs finnofis hederaceis, carnofis. Floſculi candidi & ſemen exite in folliculis guſtu & habitu Thlaſpi exprimunt.


De NASTURTIO Indico ex Dod. *

DOD. Speciem exhibet Cœvoluuli. folia eius lata anguloſa, & pulchrè depinguntur virentia. floſ luteus retro propendens habet corniculatum inſtar floſis regij, quem Delphinium appellant.

NASTURTII Indici genuina effigies.



NASTURTIVM Indicum.



Hanc eandem Nasturtij plantam Neruij ſemine ſua in peſtilibus hortis anno elapſo aiebat induſtrius & materre medicæ gnarus Iacobus Plateau; que tunc aſſeſſorẽ picturam Dodonęo miſſam delictatã, oſtendebat. Folia quippe peſitata, ambitu circinato, & leuiter ſinnata, e quorum medio centro pediculi Coryledonũ ſua. caulis tenuiſſimũ & quatuor cubitorum modis concavus aliſ. ſemina Betae quãdam tenas, quaſi mabi oſcãdit prædicũs Plateau.

Cucurbit

Cusulo Indiano ferè patia afferebat D. de Brancion in siliqua admodum eleganti, qualem habeo à nasoleis reducibus ex Peruianis Indijs, tereti, rotunda, vnicili & duos digitos longa, coriacea, strijs & rugis exarata, luteola, summo & imo ventriosa, tantulum falcata. Apud nos florum rudimenta duntaxat videre licuit. gustus illi Nasturtio proximus, unde nomen a sciuit.

Æ CYCLAMINOS altera, hederaceis folijs planta.

SMILAX ASPERA. Advers. pag. 370.



CYCLAMINOS altera.

Si quid coniecturæ captari potest, cuiusmodi stirps fuerit Cyclaminos altera; cognata Hederae & Cyclamini planta accipienda videtur. Hanc multæ adumbrare videntur, nulla autem explere, aut asseri potest. Cordo Dulcamara, alijs Bryonia nigra, & Pericymenon alterum, nonnullis stirpium venatoribus aliæ magis placent. In Italiae collibus, quo loci & qua radice iam non occurrit, repertæ plantæ, in quæ sporulas coniectæ sedulis vestigatoribus iconem & descriptionem exhibeo. Herba est Hederae folijs sinuatis paribus in mollibus flexilibus cubito prolixioribus, nil labar memoria, cauliculis, flores oblongi, galericulati, ex purpura pallentes.

Diosc. Est & altera Cyclaminos folijs Hederae, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassissq., circa vicinas arbores, capreolorum modo, se volentibus; flore candido, odorato: acinis Hederae mollibus, lenti gustus aliquantulum acris. Radix superuacua. Nascitur in asperis. Huius acini drachma vnius pondere poti, cum vini albi cyathis duobus, quadragesima diebus, lienem per vrinam & aluum absumunt. Ad orthopneam bibitur. Reliquas à parva purgat.

SMILACIS ASPERAE è spinis varietas.

Folio non spinoso & sarmentosis viciulis multò minus spinis refertum munere D. Brancionis alit amoenissimum & stirpium ditissimum paradisi Ioannis Mutoni, ceteroquin cetera cuncta similitudine aut eadem, fructu nigro.

Diosc. Folia & acini, & ante & post epotè, venenorum antidota sunt. Trudunt si infansibus nuper in lucem editis, quid ex his tritum propinetur, nulla postmodum venena nocitura. Inciditur etiam ad alexipharmaca, in as, ad ea medicamenta, quibus venena arcantur.

lege SALSAPARELLA. Advers. 370.

Radicum decoctum exsiccat: sudores & vrinæ cit: cutem euacuat, & tunc cutem subierunt educit. Folio Smilacis asperæ spinoso & sarmentosis implexis viciulis, spinis eduncis, horridis, & radice crebris implexa lotis, qualem superius dedimus, alit Ioannes Mutonus.




quædam. *Smilax lanis maior*. Germ. Winden-
kraut. Belg. Winda & wrange. Ital. Vituchio
maggiore. Hisp. Yedra Campana. Gal. Liferon.
Angl. Windweedt & winde. *Malacocissus Dama-
cratis Anguilara*. Aduers. 271.

Diosc. *Semine cum Dorycnio potio, ternis singu-
lorum obolis, varia & tumultuosa in somnis obuersari
traduntur.*

Gal. Hanc *Smilacis asperæ* quodammodo fi-
mitem esse vult.
Nullius vñs, Plinio.

SCAMMONIUM.

Aduers. 272.



CONVOL-
VULVAMI-
NOR PERPU-
TENS. Ital.
Vituchio
minore
Aduers. 272



SCAMMONIUM.

Diosc. Legitur ad hunc modum succus. Capite exempto, radix in eodem speciem caltro excuatur: quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alii scrobes in terra concamerato sinu fodunt, in quos subiectis iuglandium folijs, profundunt succum, siccatumq; extrahunt. Laudatur autem Scammonium leue, nitidum, rarum, & colore quam simillimum taurinoglutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Æthiæ regione Asia deperatur. Nec attendere solū par est, si lingua tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admixto fit thymali lacte) sed longè magis antea narratis. item si non vehementer linguam exurat, id quod mixti thymali argumentum est. natione aut Syriacum, & Iudaicum deterrima habentur, graua, densa, erui farina & thymalo vitata. Succus drachma vnius aut quaternum obolorum pondere haustus, ex aqua pura rei mulsæ, per inferna bilem & pituitam extrahit. ad resoluendam aluum binos obolos cum sesama, alioue semine, sumpsisse satis est. dantur efficacioris purgationis causa, succi tres oboli, cum duobus veratri nigri & aloës drachma vna. Fient purgatorij sales, drachmis viginti succi scammonia, in senos satis cyathos adiectis. Horum modus proportione virium: integer quidem, tria cochlearia: medius, duo: minimus, vnum. Radicis drachma vna aut altera purgat, cum ijs quæ retulimus. Nonnulli decoctum radicis ebibunt. Coquitur in aceto, & cum hordeaceæ farina teritur, cataplasmate ischiadicis vitis. Partus enecat succus, vulua in lana subditus. tubercula discutit cum melle aut oleo illitus. decocto in aceto peruncta lepra abiguntur. diuturni capitis dolores ex aceto & rosaceo perfunduntur.

SCAMMONII Mospeliaci Varietas.


Apocynos sive Periploca prior Dod. & Belgarum quorundam.



Cognate figura & nature est cū Scammonio Mospeliensi, flore, succo, viticulis, & longo radicis repugnans subter terrā hinc inde porrectæ, quæ adeo viua est, vt semel in hortos ascita, vix runcari deieritue queat, etiamque, frustillo tantillo relicto, repullulet; sed folijs longioribus, siquis verò & semine Vicetonicæ, cuiusmodi è littoreis Adriæ sinus, & mediterranei maris in hortis nostris alicat.

CON-

CONVOLVULVS minimus spica folius, sed ceteris affligit
 minus felix expressa Aduers. pag. 274.
 Scammanium tenax Plin. querendum.



ASVREYS sine Caruleis Conuoluulus. Campanule Laxa
 herbariorum. Aduers. 274.
 Nollu flores: Pictonaria di the.

1723

1



CONVOLVULVS peregrinus Clusij. 1723

In Collibus iuxta Tagū lato solo, Bætica, pluri-
 misq; Hispaniæ locis nascens peregrinæ elegā-
 tiz C. Clusius Cōuoluulum folijs Althææ minori-
 bus vberi admodum prouentu inuenit, indidemq;
 in Belgium D. Brācioni misit apud quem excreuit;
 sed tandem emortua hyemis iniuria flexilibus ca-
 ducisq; viticulis cubitalibus, nonnihil hirtis, vicina
 quæuis arripit, folijs Althææ minoribus, cristatis,
 sūmbriatis, & nōnihil laciniatis oris: flores Martio
 purpurantes aut candidantes Conuoluuli æmuli,
 quinque itidē plicis complicati longiusculis pedi-
 culis infidētes. Radix longa, tenuis, pulla, summo
 cespite serpens, & hinc renascens.

Diosc. Follorum succus petra scilicet alatum.



CONVOLVULVS perogyinus Claf. Convolvulus Scarpionij Jacq,
 an Helxine Cysampelos Diofc. i. Hifp. Campanilla.
 Lafit. Verdezilla. Aduerf. pag. 274.



Helxine CISSAMPELOS altera, Atriplicis
 effigie. Aduerf. pag. 275.
 Convolvulus niger, & Helxine Cissampelos Dod.

VITIS ALBA. BRYONIA Diofc. Aduerf. 285.
 Ital. Zuccha faluatica. Hifp. Nueza blanca
 & Norca blanca.



VITIS ALBA, Bryonia.

Diosc. ^a Aspragi decocti in cibo, aluum & urinam cient. Folia, fructus, radix, acrem vim continent. Itaq; vlcera phagedanis, gangranis, chironijs, putrentium tibiarum tacto, efficaciter ex sale illinuntur. Radix corpus abstergit, & cutem erugat. vitia cutis in facie, varisq; lentigines, & cicatrices nigras emendas, cum eruo, creta Cbia, & fano graco. eodem effectu prodest decocta in oleo, vsque dum liquefeat. sugillata tollit. reducias committit. inflammationes discutit illita ex vino. suppuraciones rumpit. medicamen to aptè immisctetur, quod carnem exest. in fracta ossa extrahit, trita & imposita. datur comitialibus in potu drachma pondere, quotidie, anno toto. prodest attonitis, & vertigine laborantibus, consimiliter assumpta. contra viperarum ictus pota drachmis duobus, auxiliatur. partu necat. mentem interdum subvertit. foeminarum locis apposita, partus secundasq; morantes trahit. cit urinam pota. eclegma ex ea fit cum melle, difficile spirantibus, strangulatu oppressis, tussentibus, vulvis, ruptis, & laterum doloribus. lienem ternis obolis pota ex aceto, triginta diebus, consumit. illinitur ad eadem cum fico. ad muliebres infusus decoquitur: siquidem vulvas purgat, sed abortum facit. Succus è radice vere exprimitur, qui trahit pituitam, cum aqua misca potus. ^b Ad psoras & lepras, semen efficaciter illinuntur. Lactis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decoctus sorbeatur.

^a eadem Plin. & Gal. eo quod astringat, stomacho gratum edulium: habent enim amarum & modicè acrem & adstrictionem, quare urinam moderatè mouent. Radix autem abstergentem nonnullam, desiccantem & tenuium partium, ac moderatè calidam vim obtinet, quamobrem & lienes induratos liquefacit, tum epota, tum foris cum ficibus imposita.

* Contradicit Dodo-neus.

† Plin. Splenem ternis obolis pota 30. diebus consumit.

^b Plin. folia & caules exulcerant corpus: vtique vlcera phagedanis, & gangranis, tibiarumq; tacto cum sale illinuntur. ^c eadem Plin. ^d Eadem Plin. subditque: & ipsa autem largior aliquanto, purgat sensus. ^e serpentium. Plin. eadem. ^f eadem Gal. & Plin.

Plin. illinuntur eadem cum fico & pterygijs digitorum. Succus radice colligi debet ante seminis maturitatem, qui illitus per se & cum eruo, lactiore quodam colore, & cutis teneritate mangonizat corpora, serpentes fugat. Tunditur ipsa radix cum pingui fico, erugatq; corpus, si statim bina stadia ambulentur; aliàs vrit, nisi frigida abluatur.

Bryonia bilem, pituitam & serosa purgat. ventriculum subuertit, & naturæ vim infert. Hydropticis, coxendicis & diurnis capitis frigidisque morbis vtilis.

BRYONIA, sive VITIS nigra.

lege VITIS sive BRYONIA siluestris. Sigillum Mariae.

Aduers. pag. 275.


Tamus, & Bryonia syl. Dod. Tamaro Italiae.

Hic annexenda Bryonia nigra, quam ea benivolentia & quo solitus candore eruditissimus Dodoneus, necnon alij Mechlinienses herbarum cultores peritissimi significarunt, Radice, viticulis, capreolis, folio, floribus & semine Bryoniae albæ paribus, similibusque. Sed acini nigri dum maturi, non rubentes: & radix foris nigra, intus buxea, conspicitur. Prouenit in Vestralia, Hestia, Saxoniam; etiamque in Pomerania & Misnia Cordo & Dodoneo testibus, qui merito Vulgarè Sigillū Salomonis sive Bryoniam nigram, syluestrem Bryoniā, Tamumic statuit.

Diosc. Viticulae qua primo germinam partem erumpunt, in olera recipiuntur. Menses pellunt. urinas cient. lienem absumunt. vertiginosis, comitialibus, neruorum resolutione tentatis, pro sunt. Radix eadem, qua vitis alba praestat, sed inefficacius. Folia cum vino exsiccat in iumentorum conuicijs commodissime illinuntur. lumbis eisdem imponuntur.

Supradicta ad omnia similis Gal.





Perinde falluntur qui putant Bryoniam esse hanc, ac-
 que illi qui Laurum Cinamomum, & Smilacem Aspe-
 ram Sallam parillam, aliâsq; complures exoticas eadem
 specie cum nostratibus faciunt. Hanc mittit Insula om-
 nium quæ nostræ avari in Occiduis Indijs innotuerunt,
 auro, pecore, stirpibus ditissima, *Mechoacam* vocata, cui
 radicē cognominē fecerūt Indi, vsumq; docuerūt Hispa-
 nos primum, ferè 20. abhinc annis, à quibus has accep-
 ptas pingēdas curauim⁹, & quarū tesquidrachmē & dra-
 chmarum duarum puluisculo solo, sed ex vino propi-
 nato, cōnodissimè qualibet die, hora, & etate, nulla mo-
 lestia aut incōmodo quinquies, sexties, aut septies flauas
 Hydropicorum aquas eductas, pituitasque quasuis cō-
 perimus. Reliquæ plātæ descriptionem & historiam de-
 bebim⁹ libro Hispanicè scripto, cuius copiam nobis fecit
 D. Hector Nonius magni nominis & peritiæ in Anglia
 Medicus Lusitanus, qui etiam huius radicis multam co-
 piam habuit. Hanc non visam qui cupit nosse, intueatur

Bryoniæ radicem: sunt enim concolores cortice, rugis, & ferè magnitudine: sed huius taleolæ, frustâ-
 ye rotunda transversim secta, siccandi causa, intus multis circularis à centro ad ambitum parallelis, dis-
 tinguuntur: mandendo sapore farinaceo, nec acri, odorisq; neutiquam ingrati est: cætero albida &
 friabilis, vt Bryonia, cui similem faciunt sarmentis pedamenta scandentibus, & racemis. Folia Smi-
 lacis asperæ, cuiusmodi tenellâ adhuc & pullulante plantulâ creuisse in stirpium exoticarum ditissi-
 mo vireto Petri Coldenbergij meminisse iunabit.

Varietas. [Duplex tamē differētī in viretis nostris aliquādo cōspicitur, vbi oritur Hispano semine
 Cāpanillæ Lafutez simili vel Scammonij, folio Bryoniæ syluestris. Hyemis impatientissima emoritur.

VIORNA vulgi. *Vitis nigra* Fuchs. *Clematis altera*
Macrh. & Cordi. *Germ. Waldreben & oder spnen.*
Vitis alba Italorum. *Aduers. pag. 278.*

CLEMATIS peregrina carulea & purpurea: ut
Pothos Theoph.?
Clematis altera Diosc. Dodonæo.



CLEMATIS altera vniuersi FLAMMULA
Aduers. 176.

DIOSC. Folium gustu admodum acre, ac exulcerans. raris. reperit per arbores, vt Smilax. Semen tritum, pituitam bilēque detrahīt, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita, lepras & purgant. Cum Lepidio conatur ad cibos.

* Gal. acrem & adurentem facultatem obtinet, adeo vt & lepras excoriet. Fuerit itaque in quarti ordinis excalfacientium initio.

FLAMMULA altera surrocta.



CLEMATIS
altera minor
longifolia.
Clymenum
quorundam.



Folio vegetiore hac, & grandiore, Iasmini lutei, ad Viornam accedente. Caules surrecti, quatuordecim cubitorum, & nonnunquam hominis proceritatis pulis admiculis egeri, & fibrosa, depacta radice, & papposo iuxta semen tomento, Viornae aut vulgare Flammulae ritu. Hanc etiam elapso anno, Italo semine satā, in paradisis aemansissimis & raris stirpibus ditissimis D. Alardi Ruerti, medici Insulani celeberrimi, & eruditissimi, et illius Iohannis Mauoni Neruēsis materis medicę gauri florentē & inquilinam factam viciniam.

CLEMATIS longifolia.

Quadam insuper Clematide nos docuit Iacobus Flereau Neruēsis simplicium peritissimus, cui folia insunt Flammulae siue Clematidis albae multo longiora, ex aduerso bina cubitalia, & bicubitalis cauli culces etiam humi spargit. Semen, radix, & cetera, facies non diuersa à Clematide vulgaris. Hanc quidam Clymenon ascribebantur.


Clematis *Batka* Clusij.Lupulus *salictarius*, sive LUPULUS. Ital. Lupulo.
Hisp. Hombrezillos. *Adversf.* 217.

Fig. 18.
Bouillon
vocata.

Affine nomine, & facie Clematidis alterum genus industria Clusij assequuta est posteritas. Folia quippe Clematidis altera, quibus capreoli subsunt, Viornæ rim dētata. In summis virgultis pulcherrimum lanitum tollit, tortilibus crinibus crispatum, carminatum bombacis pensum oblongum, glomeratum, quasi per torulos conflatum, Musci terrestris ritu, spicatumque comam referens.

Lupulus *salictarius*.

Poperinga urbecula Flandriæ maximo proventu luxuriat, vbi pampinis & asparagis vitis ritu spoliatur, ne tota vis & spes florum abeat in folia & caules.

MASS VER. Flavam bilem detrahit, sanguinem ab ea expurgat, & eius inflammationes exinguit. Sero caprino maceratus, valentior redditur. Succus cum saccharo decoctus syzerpi modo, morbo regio laborantibus medetur. Sed profecto mirum est, quod eo nostra ætatis medici, tam paræ curæ, vctus, cum tamen præstantissimum sit medicamentum. Quamobrem tum herba ipsa per se, tum etiam succus potentæ admixtus, capitis dolorem à caliditate contractum tollit, tectinoris & ventriculi sinus mitigat. Sympus ex saccharo & eius succo paratus vtilissimè exhibetur in febribus à bile, & sanguinis excitatis.

Vrinam cist; obstructions & viscerum fartas reserat. flores caput opplent, matore copia Bleris incocti



VITIS VINIFERA. Aduers. pag. 277. Germ. Weinstock.
Belg. Wijngaert & wijnsloek. Ital. Vite.
Hisp. Vid. Angl. Weintre.



Diosc. Folia vitium & triti capreoli, capiti dolores illi mitigant, & inflammationem stomachi ardoremque, cum polenta: folia etiam per se, vi qua refrigerent & adstringant, imponi solent. Potus eorum succus dysentericis, sanguinem excreantibus, stomachicis, & gravidarum malacia medetur. Eadem efficiunt madesacti in aqua capreoli & poti. Lacryma vitium, que veluti gummi in caudicibus concrevit, ex vino pota calculos pellit: illita lichenas & psoras leprasque nuro prius perfrictas sanat: eadem cum oleo sapius pilis illitis, psilotri effectum habet: maximeque sanies, quam accesa sarmenta vitium vinidia exudarunt: qua & peruncta verrucarum informicationes extrahuntur. Cinis sarmentorum & vinaceorum, detractis in sede condylomatibus, & thymis, illitus ex aceto medetur: prodest luxuris & viperarum moribus: contra lenis inflammationem illinitur cum rosaceo & ruta & aceto. Labrusca duorum generum est: alterius vva non maturefcit, sed flore tenui cenanthen nominatam perducit. Altera ad frugem peruenit, paruis acinis, nigra, & adstringens. Folia, caules, & clavicula quibus repunt, vim habent culta viti summi. VVA.

Diosc. Vva recentes aluum turbant, & stomachum inflant: innoceniores, qua descripta diu pependere, (ideo quod in eis copia humoris exiccatur) vtilis que sunt stomacho, agrisque, atque cibi aviditatem excitant. In vinaceis & ollis seruata, ori & stomacho grata sunt: aluum sistunt, (sed vesicam & caput tentant) & sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque qua in musto suere. Sapa aut passo condita, stomachum magis infestant. At qua solem prius passa in aqua caelesti conduntur, minus vinosae sunt, sticulis, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditi vinacei inflammationis

inammis, videntibus ac praeauris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, coliacos, & faminas fluxione vultu laborantes inuat infusa: ad desestiones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorum astringendi vim obtinent. Stomacho vtilis sunt: inspergitur farina tostorum, polenta modo, dysentericis, & coliacis, & solutis stomacho. Vva passa alba adstringentior est: prodest esicata caro earum tussi, facibus, renibus, ac vesica. Estur in dysenteria per se cum nucleis: & decocta in patinis cum melle, admista milij ac hordei farina, & ovo, valet ad purgandum caput. eiusdem gratia cum pipere commanducatur. Testium inflammationes sedat, illita cum lomento sobarum, aut cumini farina. Favos, epiphyridas, carbunculos, enatas in articulis putredines, & gangranas, sine nucleis trita, & cum ruta imposita sanant: podagra conuenienter cum panacis succo illinuntur: mobiles vngues illita, celerius extrahit.

Oenanthe Diosc.

Oenanthe vocatur Vitis hlynestris fructus, cum si ver. Recondi debet sicili non picato, collectaque sic strato luteo, in umbra siccat. Laudatissima in Syria & Cilicia & Phoenice. Vis et adstrictoria: quare pota stomacho accendit vna vtilis: aluum sistit, ac sanguinis excreantibus: contra fistulas, & acores stomachi, sicca & illita efficax est: capiti dotoribus tam vtilis, quam sicca, ex aceto & rosaceo perfricta: sanguinolenta vultu cataplasmat, & incipientes agilopas, oris vicera, & genu alium notiss, trita cum pelle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat: posita misceatur, ad sistendum sanguinem: contra oculosque delacrymationem, & stomachi ardorem, cum polline polenta & vino illinuntur. Cinis cremata in testa, ad oculos prunis facti ad oculos medicinalia: eoductus & pserygia, abscedente gingivis, cruentisque, cum melle sanat.



Omphacium Diosc.

Omphacion, succus est acerba vine, nondum maturefcentis, è Thasia vite aut Aminae. Oportet autem ante Canis-
minum, expressam melligenam in rubro are, lincoo cooperto, insolare, vsque dum cogatur, semperq; quod ceruici vase
concretum hæsere, reliquis humori permiscere: noctu à subdialibus locis in lectum referri: quandoquidem nocturni ro-
res ipsum concretum non sinunt. Eligendum est flauum, friabile, vehementer adstringens, & linguam mordens. Sicut
qui coquendo melligenam cogunt. Prodest contra tonsillas, vnam, vlcera oris, humida gingivarum vitia, purulentæ an-
treis, cum melle aut passo: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasq; ex aceto. Dysentericis, & mulieribus fluxione val-
uz laborantibus clystere infunditur: oculorum claritati, & scabritia, & erosionibus angulorum conuenit. Bibitur ad
recentem sanguinis excretionem, etiam si rupta parte aliqua cõingat: sed pauco, & aquatiore est vtendum: valde
siquidem exurit.

Vini natura Diosc.

Vino vetere nerua leduntur & reliqui sensus, quod tamen gustu suauius est: quare cauendum his qui intestina alicui-
us partu imbecillitatem sentiunt. Attamen in secunda valetudine paucum, aqua dilatum, innoxie sumitur. Nonnum-
quam inflat, egre coquitur, insomnia parit gratia, & vrinam ciet. Aetate medium, vtraq; vitia fugit: quare ad vitium sano-
rum agrorumq; vsurpatur. Album, tenue, stomacho vtile est, ac facile in membra distribuitur. Nigrum vero crassum
est, & concoctum difficile, carnem auit, & ebrietatem creat. Giluum, repote quod medium est, medias inter vtrunq;
vires habet: in secunda tamen & sinistra valetudine, cū primis laudatur album. Quin & vina sapore distant: siquidem
dulce crassis partibus constat, & difficilius à corpore exprat: stomachum inflat: aluum & interanea, vt musum, tur-
bat: sed minus inebriat. renibus, & vesica aptissimum. Austerum, per vrinam celerius transit: sed capita dolore ten-
tat, & temulentiam gignit. Acerbum, ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum, & ceteras
fluxiones cohibet, minusq; vrinam expellit, nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factum, stomacho ad-
uersatur: suum stimulat, nervos infestat, aluo aptum, à valetudine se recolligentibus inutile. Passum, quod vno sole sic-
catis in areis, aut in samitro torrefactis exprimitur, Creticum cognomine, aut prammion, aut protropion: & sapa qua sit
nigro igni decocto, Graeci siron aut hepsema appellat: nigra quide & qua dicuntur melampsitia, crassa sunt, & cor, ora
multū alunt: candidū, tenuius: & heluola inter hac media, mediae sortiuntur vires. Omnia tamē adstringunt, & puissu
reuocant: faciunt aduersus venena, qua exulterado necēt, ex oleo pota, & vomitionibus reddita: contra cicutas, n. ei o-
nū, pharicon, toxica & concretū in grumos lac: item contrarenū, ac vesica pruritus, rosiones, exacerationesq;. Inflan-
tam tamen, & stomacho aduersatur. Primitim prodest melampsitidū, si venter rheumatismū sentiat. Albū, magis ceteris
emollit aluum. Gypso conditum neruis officit, caput aggrauat, & incendit, ac vesica aduersatur: contra venena ceteris
aptius. Picata, aut resinata, excaesaciunt, concoquunt: sanguinem excreantibus inimica. Qua verò apara byta vocāt,
vt qua admittam saram recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, agrum in halitum expirant, stomachum
malè habent. Inter italica vina Falernum principem locum obtinet, quod inueteratum perquam facile coquitur, pul-
sus exsuscitat, aluum astringit, stomacho vtile: sed vesica nocet, atque his qui visas hebetudinem sentiunt, & ad potus
crebros minime idoneum. Albana crassioribus constat partibus, dulcia: stomachum inflant, ventrem emolliunt (sed
concoctionem non aquè adiuuant,) & nervosa minus infestant: vetustate, eadem austerum saporem concipiunt. Ca-
cubum, cum sit dulce, est & Albano crassius: corpus & colorem auit: egre tamen coquitur. Surrentinum, valde auste-
rum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet: & cum tenue sit, caput minus tentat: inueteratum suauis
redditur, & stomacho vtile. Adrianum & Mameatinum in Sicilia aque crassis partibus gignuntur: modicè adstringunt,
& ocysimè inueteratur, minusq; ob suam tenuitatem, nervos tentant. Paratypianum, quod ex Adriatico sinu deser-
tur, odoratum ac tenuius est: quare liberaliter epotem salis, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istricum Pa-
ratypiano simile est, sed vrinam vehementius pellit. Chiura tamen antedictis mollius, & aptum potui est: bene auit,
& minus inebriat, fluxiones cohibet, oculorum medicamentis vtile. Lesbianum facile membra subit, Chio leuius, & alio
lionoum. Ephesium eandem vim habet, quod Phygelites nominatur: verum Asianum è Tmolo monte, Mesogites ap-
pellatum, capitis dolores ciet, & nervos ledit. Cum verò & Clazomenium, quoniam multam sibi maris aquam ve-
dicant, facile corrumpuntur: statim nocens, aluum turbant, neruis officiant. Vinum omne (vt reliqua in communi di-
cantur) mortuum ac syncerum, & sua natura austerum, excaesacit. facile in membra distribuitur, stomachum adiu-
uat, appetentiam ciborum inuitat, vires auit, ac robur auget: somnum conciliat, & commendat colorem. Potum
liberalius auxiliis est contra assumptam cicutam, coriandrum, pharicum, icciam, meconium, argenti ssi mam, taxum,
aconita, fungorve, contra serpentium morsus, & omnium illius qua refrigerando nocent, aut stomachū in vomitio-
nei effundunt. Facit ad longas inflationes, rosionesq; praeioriorum, ac distentiones, stomachi resouitionem, & si ven-
ter aut interanea rheumatismum sentiant. Conueniant sudatoribus, & quibus corpus in modico sudore digeritur, ma-
ximè alba, vetera, & odorata. Qua tamen vetustate cauescunt, renibus ac vesica, accommodatiora redduntur: vni-
uerbis, inflammationibusq; in succida lana imponuntur: contra vlcera, & phagadenica, & fluxionibus obnoctis, con-
tra de perfunduntur. Qua marina non receperunt, austeriora & alba, ad sanorum vitium vsurpantur. In his praestant
italica, Falernum, Surrentinum, Cacubum, Signinum, & perusula Campanica, & Paratypianum ex Adriatico si-
nu, &

vin, & Siculans quod Memorinum appellatur. Ex Graecis Chium, Lesbium, & Phygellios ex Ephefo. Crassa verò & nigra, stomacho negotium exhibent: inflationem pariant: corpus auget. Tenuia tamen & austera stomacho prodest, & minus carnes alunt. Vetera valde tenuia, & candida vehementius vinam ciunt, & dolores capitis mouent, veru-
 q; largius pota tentant. In media etate, vt à septimo anno, potui saluberrima sunt. Modus autem pro etate, & tem-
 pore anni, & consuetudine, & qualitate vini definitur. Non siure, & modice cibos proci, optimum est praeceptum. Nocet ebrietas omnis, & maxime assidua: siquidem obfessos nervos quotidie remittit: largiorq; potus, acutorum mor-
 borum adfert initia. Mædiocris tamen vinolentia, aliquot diebus, maxime post aqua potus, vitium nanq; modo quodam
 ex alto euocat, sensibileq; expurgat excretis, & per caeca corporis ducit spiracula. Sed aquam post vinolentiam bibere o-
 portet: siquidem valetudinis alicuius gratia facta temulentia remedium affert frigida.

Omphacites nomine, peculiariter fit in Lesbo, siccata sole acri vna, paulo ante maturitatem decrypta, triduo sine
 quadratis, donec racemi in rugas contrahantur, expressumq; vinum cadu insolatur. Vinum adstringendi habet: prodest
 dissolutis stomacho, & illi dolore laborantibus: item pregnantium malacia, & crudis in pestilentia quoque sorptum au-
 xiliari dicitur. Huiusmodi vina non nisi post multos annos bibi possunt.

Lora, quam deuteriam, alij potinson appellat, fieri solet adiectis metretis tribus aqua, in vinacea, quibus triginta
 vini metretes extractae fuerint: calcatis vinaceis, expressoq; decocto ad tertias partes, & additis in singulos congios mo-
 di eius qui remansit, binis salis sextarij: post hyemem transfunditur in vasa. Lora intra annum vtendum: etenim ce-
 leriter exolescit. Conuenit agris quibus timemus noxam vini, coacti saepe desiderijs eorum obtemperare: item à longa
 valetudine se recolligentibus. Fit & vinum quod adynamon vocant, lora vires habens, hoc modo: Pares aqua, &
 musti mensura coquantur molli igne, donec absumatur aqua. quod, vbi refrixerit, elutriatum, picato vase recon-
 ditur. Alij marina & caelestis aqua, mellis & musti pares miscent portiones, decapulant, & quadraginta diebus
 insolant: quo ad annum vtuntur ad omnia eadem. Vinum è syluestri vna nigrum adstringit: prodest alui & stomachi
 fluxionibus, & ceteris quibus constrictione, & contractione opus est.

Vinum Gal. ex secundo est ordine excafacientium: sed quod admodum vetus est ex tertio, sicut
 mustum quod vocant, ex primo. Caliditati eius proportione respondet siccitas.

Vinum melitites. Diosc.

Melitites datur in longis febribus, qua stomachum infirmant: nanq; alium leuiter emollit, vinam ciat, stoma-
 chum expurgat. Prodest articulario morbo, renum vitijs, imbecillo capiti, & mulieribus abstinentis: odoratum siquidem
 est, & corpus alit. Diffat à mulso quod fit è vino vetere, austero & melle exiguo. Melitites autem adiecto ad quinque
 congios austeri musti, mellis congio, & salis cyatho, cortinis magnis, quò magis ad effervesendum locus pateat, fieri
 oportet, sensim asperso sale: cumq; effervere desierit, in alia vasa transfunditur.

Mulsum. Diosc.


Mulsum è vetere vino, austeroq; & bono melle factum, praefertur: minus enim inflat, ac celeriter id genus in usum
 venit. Vetus, corpus alit: media etate, aluo prodest, vinam pellit: à summo cibo sumptum, nocet: & inter initia po-
 tum, implet: dein appetendi auaritatem reuocat. Fit mulsum duabus vini metretis, admista vna mellis. Aliqui, quo ce-
 lerius praeberi possit, mel cum vino coquant, & ita transfundunt. Alij vtilitatis gratia, ad sextarios sex musti seruentis,
 vnum mellis adijciunt: & vbi serbuerit, vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa. Diosc.

Aqua mulsa easdem quas mulsum vires possidet. Cruda vtuntur, cum moliri deiectionem, aut vomitionem incitare
 volumus: vt ijs qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elanguescentis pulsus, quos illi
 dixere microsphyctos, tuilentibus, peripneumonicijs, & ijs qui immodico sudore digeruntur. Nam paratum conditum
 que, quod aliqui hydromeli proprie vocant, media etate adynamo vino, aut lora in recreandis viribus respondet, & si-
 milis vim adipiscitur: quare inflammationibus alicuius membri plus quam lora prodest. Inueterati tamen vsus dan-
 natur, inflammatis, aut constrictis: sed laboranti stomacho, aut cibum fastidienti, sudatoribusve conuenit. Fit, dua-
 bus pluvia aqua veteris ad vnam mellis partem additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adijciunt, & ad tertias partes
 decoquant, & ita recondunt. Nec desunt qui hydromeli appellent, quod à melle elutis aqua sauis confici ac seruari so-
 leat: sed meracius confecti conuenit: aliqui id coquant. Aegrotantibus noxium est, quocum plurimum teraginis sibi
 vendicat.

Acetum. Diosc.

Acetum refrigerat, & adstringit: stomacho vtile, appetentiam excitat: erumpentem vnaeque sanguinem,
 potu infessive stillit: prodest alui fluxionibus coctum cum cibis: cruentis vulueribus inditur, inflammationes arceat, in
 succidis lanis aut spongiae impostum: reprimat procedenti sedu, vuluati, itepi abscedentes gingiuas, & sanguine ma-
 nantes. Ad nomas, & ignem sacrum, vlcera qua sorpunt, lepra, & impetiginos, pterygia, cum aliquo conuenienti effi-
 cax est: phagedaenas vlcerum, nomasq; sora continuis cobidet. podagricis calido sora, cum sulfure auillatur: succilla-
 tiones rapit cum melle illitum. Contra capitis ardores cum rosacea in succidis velleribus, aut spongiae impostum.
 Ad aquam inter entem, granitatem aurium, & sonitus, sibi osq; feruentis vapor proficit: instillarum quoque aqua
 vermes necat. Pinos coëcet tepidus sora, aut si imbuta acro spongia admoveatur, pruritus perimitur. Contra me-
 moratos serpentium ictus, qui refrigerando nocent, calidum conuolue foditur: & frigidum, ijs qua exiens virus pro-
 culantur. Calidum potum, atq; vomitionibus reditum, aduersus omnia venena efficax est, praesertim contra mela-
 nim, & haustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ichon, laxum, cicutam



Sale. Huiusmodi voratas hirudines, si sorbeat, eicit: rufum veterem mitigat, & recentem lacefas. In orthopnea ca-
lidum commodè sorbetur. gutturis fluxiones gargarizatum inhibet. Anginis & vna procedenti conuenit: contra den-
tium dolorem, calidum collucit.

Acetum mulsum. Diosc.

Acetum mulsum, quod oxymel vocant, hoc modo temperatur: Aceti benignas quinque, salis marini pondus, mellis
minas decem, aqua sextarios quinque pariter coquito, decies effervescente certina: atq; vbi refluxerit, diffundito. Sum-
ptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articularum morbo consistitatis prodesse creditur. Co-
tra morsum eius viperæ quam sepa vocant, haustum meconium, ixiânre, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizatur.

Scillinum acetum. Diosc.

Scillinum acetum hoc modo fit: Scilla, quæ candida fuerit, expurgata conciditur, tripartitâq; lino segmenta modis
cis interuallis, ne se contingant, siccantur in umbra quadraginta diebus: mina eorum in aceti boni sextarios duodecim
immergitur, & vase diligenter operto septenis diebus in sole madescit: post cum numerum dierum scilla eximitur, &
expressa abicitur: defecatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scilla minam, quinque aceti sexta-
tariis miscent. Alij citra exiccationem repurgantes, parum mensuram adiciunt, & senis mensibus macerari patian-
tur. Id multo magis humorum lentitias digerit: gingiuas humore pragnantes collatione stringi firmatq;, & motos ac-
tes stabilât: putredines oris, & graues halitus tollit: durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem expedit, & lim-
pidam canoramq; reddit. Datur stomacibus, agrè cibum concoquentibus, melancholicis, comitialibus, vertiginosis,
mente capitis: item vuluarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodum re-
creat: corpus sanum reddit, & bonum colorem præstat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoq; aurium infusione
purgat. In summa, ad omnia efficax. Cauendum tamen intestinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorum
vitijs. Datur quotidie ieiunij sorbendum, iater mita exiguum, paulatim adaugendo, ad cyathum vsq;. Nonnulli binos
dant cyathos, aut largius.

Scillinum vinum. Diosc.

Scillinum vinum fit hoc modo: Dissectam, vti dictum est, scillam, & sole siccata concundito: minam eius tenui
cribro incernio, & linteo raro illigatam, in vicenos sextarios nulli vocentis ac boni demergito: vbi trimestri spatio
maduerit, elutriatum vinum, obstructo diligenter vase, recondito. Licet quoq; sic humida scilla vti: In orbiculos, rapè
modo, dissectam duplicato pondere, quatuordecim diebus insolari oportet, & valde inacterafcere. Alia parandi ratio:
Scilla dissecta & repurgata tres minas, in Italicam metretam nulli demittito; & senos menses in vase obstructo ma-
cerari sinito: post id tempus defecatum & excolatum vinum recondit. Vtile est contra cruditates, & ciborum corru-
ptiones: item ijs qui reuolunt cibum, nisi pietia in ventre, aut stomacho coierit. Prodest lientosis, malè habitis corpo-
ribus, aqua inter cutem, regio morbo, difficili vrina, torminosis, inflationibus, resolutioni neruorum, horribilis lon-
gus, vertiginosis, & vultis. Menses pellit, minime neruos infestat. Hoc vinum vetustate fit melius. Cauendus in se-
nere vsus, aut si interanea vlcus sentiant.

Vina marina. Diosc.

Marina variè siccitantur: Aliqui enim statim quum decerpta sunt vna, aquam maris admiscunt. Alij in area v-
na sole siccant: quibus calcatis, marinum adiciunt. Alij passas prius vna in dolis marina aqua macerant, mox cal-
catas exprimunt: id magis passu generibus adscribitur. Quæ tamen austriore gustu temperantur, contra febrim ad-
uentantium indicia valent, si modo meliora non adsint: alium subducunt: prosunt purulenta extuscentibus, aut si du-
ra aliens exerceat. Quæ ex Animalis vinis sunt, caput tentant, stomacho aduersantur, flatu creant. Verùm quo plenior
habeatur historia, his qui huius studio tenentur, non inutile existimamus varias vinorum compositiones adferre, nõ quòd
frequens eorum aut necessarius existat vsus, sed ne quid omisisse videremur, quòd ad eorū rationē atineret. Sunt autem
quædam ex iis facticia, minoris cura ac impendij, quæ cadunt in vsus: vti quæ ex cotoneis, malis, pyris, siliquis, item
myrti-baccis componuntur.

Vinum Cydonites. Diosc.

Cydonites nomine alio melites appellatur, & ita fieri consuevit: Mala cotonea exemptis seminibus, frustatim rapi-
mo seculantur, & duodecim minarum pondus, in musti metretam, triginta diebus macerantur, postea defecatum
vinum reponitur. Alia faciendi ratio: Oportet ad singulos mellis sextarios, denos succi cotoneorum caserū pressorumq;
adhibere, & ita recondere. Vinum hoc adstringit: prodest stomacho, dysenteria, hepaticis, renum vitijs, & vrina diffi-
cultati. Melomeli, quòd & cydonomeli nominant, sic fit: Cotonea mala seminibus suis castrata, in quam plurimum
mellis, quo penitus demersa contegantur, coniunguntur: id post annum murescit, misco non dissimile. Præstat eadem quæ
superior compositio.

Hydromelum. Diosc.

Fit hydromelon duabus mensuris aqua cocta, & sub Canicula hydus insolata, additis ad vnam melomelitis scelli ex
cotoneis. Vis huius eadem est.

Omphacomelites. Diosc.

Omphacomelitis faciendi ratio hæc est: Acerba vna adhuc immatura, & tribus diebus insolata exprimitur, &
ad ternas succi partes, mellis optimi de spumati singula partes adiciuntur: & insolat in vase transfusum. Vinum repri-
mendi ac refrigerandi habet: stomachicis calidissimè conuenit. vsus post annum est.

Spitas.



A pytes Diof.

Fit & de pyris, perinde atque cotoneis, vinum, apytes nomine, sed ita ut pyra non magnopere maturefcant. Et aliquis etiam, mephilis, sorbis, simili modo temperatur. Omnia haec genera acerbata sunt, & adstringunt: stomacho vtilia sunt, et intestinas fluxiones cohibent.

Oenanthinum Diof.

Fit de feraci vite sylvestri, quod vocatur Oenanthinum: Sicci flores minus duabus musti cado macerati, post tridua dies mutantur, mox colatum vinum reconditur. Facit aduersus stomachi imbecillitatem, cibi fastidia, colicos, & dysentericos.

Rhoites Diof.

Fit de punicis malis maturis quod rhoiten nominant, succo expresso ab acinis eorum, quibus lignosus nucleus absq; apyrena vocant, ac decocto ad tertias, & ita reposito. Efficax est contra fluxiones internas, & febrim cum alui profluvio exortam: stomacho vtile: adstringit aluum, & urinam mouet.

Rhodites Diof.

Rhodites sic fit: Rosarum siccarum tusarumq; minam linteolo deligatam in sextarios octo musti demergito: & post tres menses, defacatum vinum transfundens, recondito. Vtile his qui febrim carent, & ad stomachi coctiones, & dolores à cibo potum, & contra humiditas aluos, & dysenterias. Est quoq; ex succo rosarum, addito melle, quod rhodomeli vocant, quod arteria scabritijs conuenit.

Myrrites Diof.

Myrrites fit, baccis nigis, quae maturitatem excesserint, tuis, & organo expresso. Aliqui ad tertias coquunt. Alii baccas prius sole torrent, & quatuor sextarijs confusarum, ternas aqua benignas adiciunt, & vini veteris parum modum. postea expriment, & ferunt. Magnopere adstringit: stomacho vtile fluxionibus ventris ac stomachi prodest: & contra intestinas ulcerationes, & profuua: denigrat capillos.

Myrsinites Diof.

Myrsinites sic temperatur: Rami nigri myrti cum suis baccis & folijs tuis, decem minarum pondus, in tribus musti congijs feruescant, donec duo supersint, aut certe dimidium: id vinum colatum ad vsu reconditur. Contra furfures, vlcera in capite manantia, eruptiones papularum, gingiuas, tonsillas, & purulentas aureis efficax est, sudores sistit.

Lentiscinum & terebinthinum Diof.

Lentiscinum similiter vt myrsinites temperatur, nec secus terebinthinum. Namque bacciferi eorum rami sumi debent. Similes insunt vires: adstringunt, stomacho accommodantur, & de fluxionibus intestinorum, vesicae, & stomachi, & sanguinis profusio: vlcera omnia fluxionibus obnoxia: facta ad cicatricem perducunt: fluxiones vniuersas ac sedis, in se ipse cohibent.

Palmenum vinum Diof.

Palmulas maturas, quas vocant chydias, in uicolum uno pertusum, & obstruendum picata arundine, demittito: uno foramen sit obturatum, & quadragesimo sextarijs ternos congrios transfundito. quod si ipsum ita dulce essent libeat, quiaque congijs infudisse satis est, post decem dies detractio ab arundine. hinc, assumit vinum crassum & dulce, & reponit. uincit quidem, sed capiti noxiu, contra fluxiones, propter adstringentiam vini, efficax: stomachicis, colicis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idem ad ista aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, feruere, sicut, quod tandem acore vitiatu.

Catochites, et caryci vinum Diof.

Catochites, aliquibus scythes vocatur, in Cypro fit, ita ut palmenum: sed hoc interest, quoniam pro aqua eandem dem humoris adhaerent, in quo recenter pressa vinacea inuenerunt. Caricae quae chelidoniae aut pharicae appellantur, praesertim nigra macerantur, vt diximus, & post decem dies humor excipitur. atque tertio aut tertio, idem modum aqua qua vna acci inuenerunt, infunditur: sicuti etiam inuocatur a parte, quarto aut quinto assentur. De macerata sarani liquor non secus acorem contrahit, & aceti usum prabet. Id tamen est: si quis gignit: stomacho adhaerent, & si dicitur parit, alio tamen prodest, urinam elicit, menses trahit, lactu vberitatem facit, vitiosum sanguinem tollit. & eliphanti feruissert, vt potio quae in cythron appellatur. Aliqui feruissert, decem sillis sextarijs albi iunt. Alii puria amphorata: quae non facile vitatur, & alio idonem fore censent. Alii thymum & zosterium inuocant, & caryciae superponunt: & ita vniuersum, donec vas expleverint. Fit & de thymori eadem modo vinum: sed in eadem parte degetiora, quoniam non ita praesertim vna eorum, vt si uis liquoris delectationem retinetis possit.

Resinatium vinum Diosc.

Resinatium vinum populatim factitari solet: copiosum in Galatia: quoniam vinum illud coarctat, vna non maren-
rescendo, ob calis algorem, nisi picea resina temperetur. Resina autem cum cortice candidatur, & amphora dividitur a bo-
mina permiscetur. Aliqui, vbi effervuit, excolant, separantes resinam: alij relinquunt. Hac vna vetustate dulcescunt.
Omnia capitis dolorem, & vertigines faciunt: concoctionem tamen adiuvant, & urinam cient: tussibus, ac destil-
latione venarum conveniunt: item colicis, dysentericis, & hydropicis, & feminis fluxione vulvae laborantibus: alio
exulcerationibus insuntur. In hoc autem genere nigricant imagines albo consistunt.

Strobilites Diosc.

Strobilites fit maceratis in musto nucibus pineis, recentibus, fractisq; prabetq; resinati effectus. Si quis madescentis
nucis pini musto decoquat, potum affatus convenit ijs qui habitudine consueverunt.

Cedrinum vinum Diosc.

Cedrinum, iuniperinum, cupressinum, laurinum, pineum, aut abiegnum, simili ratione fiunt. Divisos recen-
ter ramos, cum fructum eant, aut soli, aut balneo, aut igni, admovere oportet, vti consident, congioq; vini mi-
nam vnam permiscere, & post duos menses transfundere, & ante quam recondantur, insolare. Factiorum vinorum
vasa impleri debent: namque non plenis vasis, vna in acorem corrumpuntur. Medicata autem vina, recte valentibus
injalubria. Omnia excalfaciunt, urinam cient, & substringunt. Laurinum tamen vehementius excalfacit. Fit quoq;
e fructu cedri maioris vinum, congio musti, adiecta insarum baccarum sebra: diebus quadraginta insolari debet, &
defecatum in vasa transferri. Fit etiam vinum e baccis iuniperi, non aliter quam cedrites, & ad eadem valens. Ce-
drines hoc modo fit: Cedriam dulci aqua lauant, & singulas amphoras singulis cyathis diluant, & ita musto replent.
Hoc genus vini excalfacit: extenuat, tussi antiqua vtile sine febre, pectoris laterumq; doloribus, torminibus, ventris &
interaneorum ulceribus, purulentis excretionibus, mulieribus vulvae causarijs, hydropicisq; facit adversus ventris ti-
neas & horrores: contra venenatos icthi auxiliatur: serpentes necat: aurium doloribus instillatum medetur.

Picatum vinum Diosc.

Picatum ex liquida pice & musto temperatur. Picem autem primum marina aut truvia tantisper eluere oportet,
dum inalbuerit, & sincera maris aqua desinat, mox aqua dulci proluenda: congio adto musti, vncia pice vna aut et-
tera adijcitur: vbi effervuerit & consisterit, in vasa diffunditur. Hoc genus vini excalfacit, concoquit, purgat, aliter-
git: vtile doloribus pectoris, alui, ictheris, lienis & vulvae, si sine febre sint, veteri rheumatismo, exulcerationibus in al-
tium recedentibus, tussi, suspirijs, concoctionibus tardis, inflationibus, & luxatis, praesertim in succida lana impositu.

Absinthites Diosc.

Absinthites faciendi ratio euariat. Aliqui enim duodecimque sextaes italicarum amphorarum, adijcunt
absinthij Pontici librari decoquunt ad tertias: & vbi insuderint sex aceri sextarios, & absinthij selibrari, ac diligē-
ter permiscuerint, diffundunt in vas: dumq; conquieverit, defecant. Alij absinthij minam in amphoram demittunt,
tusamq; & raro luteo deigatam, in cada musti macerant, binis mensibus. Alij absinthij quadrantem, alij trientem,
& nardi Syriaca, cinnamomi, castia, floris iuuci odorati, calami, elata, palmarum singulos sextantes inijciunt in
metretum musti, & tundentes prius pila, obstructo vasis spiraculo, binis tertiove mensibus dimittunt: postea defeca-
tum vinum transfundunt ad vsus. Alij addunt in musti cadam, Celtica nardi drachmas quatuordecim, & absinthij
drachmas quadraginta, luteo involuac: & post quadragesimum diem elutriat. Alij in senos sextarios musti, absinthij
libram, & sicca pini resina sextantem immittunt, & post decem dies excolant, & recondunt. Vtile est stomacho: vri-
nam cient: tardam concoctionem accelerat. hepaticis, regio morbo, & renum vitijs auxiliatur: fastidia dissiuit: ijs pro-
cedit quibus stomachus negotium exhibet: valet contra longam praecordiorum distensionem, & inflationes, teretesq;
ventris tinea, & remotos menses: contra hausta icthi venena quam plurimum potum, & vomitionibus reddi-
tum, auxiliatur.

Hyssopites Diosc.

Hyssopites e Cilicio hyssopo maxime laudatur. fitq; similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram musti cu-
lecta, luteolo raro cum quibusdam lapillis, solta involuatur, vt degravatur pondusculo fasciculus sidar: vinum post qua-
dragesima dies defecatum elutriatur. Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria procedit:
vriam cient: torminibus, & doctioribus febrium circuitibus auxiliatur: menses mouet.

Ex diuersis plantis facta. Diosc.

Simili modo chamaedrytes fieri solet. Excalfacit, desiccates conuulsis, regio morbo, vulvae inflationibus, tarda co-
coctione, incipienti aqua inter carum, subuenit. Inueterascens mollior reddatur. Si peboralites non secus conparatur.
Congit



Congit sex stachidū minima addere oportet. Crasphem, inflationem, laterum, nervorumque, cruciatu, & perfrictio-
nes discent: comitialibus commode Latur cum pyretho & sagapeno. Fit et eadem acetum e stachida herba, vespanti
ante diximus, aceto macerata, quod coalescit in plerumque. Fit vinum e betonica, quam colitron & jehotrophon ap-
pellant. Herbam sextimo mense pregnantem, cum suis ramis minima pondo, congij duobus vitiis macerant, & post se-
ptimum mensem transfundunt. Ad multa intractorum vitiis, ut frui: ut ipis, pollet. Si vitiis universis dicatur, le-
ctura vitiis, sibi miserrantem vires adfiscant: quare non difficile fuerit, ut quillorum naturas, nprini, vinarum vitiis
co-lectura quadam consequi: verum ante vinarum vitiis febricitantibus adhibendum. Fit etiam vinum e betonica acetum,
ad eadem vitiis. Tragoriganites fit quaterenis tragorigani drachmis linteolo colligatis, in quaterenis musti sextan-
rios coniectis, & post tertium mensem transfundit. Prodest tormibus, vulvis, ruptis, laterum doloribus, spirituum
distorsionibus, agris concoctionibus. E napi fit vitiis, nomine burires, drachmis duabus tustis napi sextarios duos musti
adactis, & ceteris eodem modo fectis. Prodest stomachicis, & dimitatione, aut longo equitatu fatigatis. Diuina
drachmas quatuor macerato quaterenis musti sextariis. Facit aduersus stomachi fastidia: menses, & pergametum
peru subducit. Marrubij adulti folia tumido, & sextarios octo in musti metretam demittito, & reliqua consimiliter
facit. Conuenit hoc vinum pectoris vitiis, & omnibus quibus marrubium. Thymi tust & cribati uncias centum linteo
colligatas, in amphoram musti adycto. Valet contra agras colitiones, fastidia, dynteriam, nervorum & praeor-
diorum dolores, hybernos algores, & venenata animalia, quorum morsum frigus insequitur, aut putrescit locus. Simi-
li modo e saturata vinum fit, quod eadem qua thymites praestat. Sic quoque origanites ex heracleotico origano consi-
citur similiter tum supradicto. Facit eadem qua thymites. E caluniana, pulegio, & abrotano vitiis sunt eodem quo
thymites modo, prorsus stomachicis, cibum fastidientibus; & regio morbo: quod vitiis moueant. Fit item e conyza
vinum, contra venenata ante alia efficit.

Aromatices Diosc.

Aromatices ita fit: Palma, assalati, calami, nardi gallic, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam con-
trineris, passo subigito, coactu ingentibus offis & in sextarios duodecim austeri musti deiectis, operculato vase, qua-
draginta diebus quietere finito: deinde vbi sece expurgatum fuerit, recondito. Alia eius ratio: Calami uncia, plu-
drachma septem, costi drachma duo, nardi syriaci drachmae sex, castia uncia, croci drachma quatuor, amomi dra-
chma quinque, asari drachma quatuor: omnia simul tuta & linteo colligata in eadem musti demerguntur, & post-
quam vinum defuerit, transfunditur. Facit ad pectoris, & laterum, & pum. omis dolores: difficili vitiis, horribilis,
retardatis mensibus, atque iis qui per frigora iter faciunt, potum conuenit: pituita crassam extenuat: colorem alit,
somnum conciliat, dolorem finit, renum & vesicae vitiis auxiliatur.

Ex diuersis odoramentis facta Diosc.

Fit & vinum ad destillationes, cruditates, tustum, inflationes, & si humor in stomacho coe: Myrrhae dua dra-
chma, piperis candidi drachma vna, iridis drachma sex, anisi drachma tres: omnia plerumque tusa & linteolo inuoluta
in sex vini sextarios conijciantur: vinum post triduum colatur, & in Laguna reconditur. Datur post deambulationem,
mercurium, cyathi vniis mensura. Fit quoque nectarites ex helonis herba: Radice sicca pondo quinquaginta drachmarum
linteolo colligata, & in congios sex musti adacta, & post tres menses effusa. Facit ad stomachi & pectoris vitiis: viti-
nam pellit. E Syriaca nardo, & Celtica, malabarbro, vinum factuatur, hac ratione: Singulorum selibram in binos
musti congios mittito: post menses duos colato. Datur cyathus vniis cum tribus aqua. Hoc vinum efficax est contra
vitiis renum, hepaticos, regium morbum, & vitiis difficultatem: prodest stomachicis, atque iis quos pallor decolorat.
Alij viciam, aut sextantem acori, & Celtica nardi quadrantem, in musti amphoram adyctis. Asari quadrantem
in senos musti sextarios itidem demittito. Id vini genus vitiis ciet: hydropicis, & regio morbo laborantibus, hepaticis,
ischiadicis, conuenit. Radici huiusmodi nardi recentis & trita cribatam, bessem, in congium musti conijcto, duos m-
ses quietere finito. Vitiis est hepaticis, difficili vitiis, inflationibus, stomachicis.

Ex diuersis herbis facta Diosc.

Radici dauci contusa drachmas sex in musti amphoram imposita, & simpliciter transfundit. Facit ad dolores he-
patis, praecordiorum, & vulvis menses pellit, rullus ciet, & vitiis: prodest tustis, vitiis, vitiis, Salvia vitiis in mu-
sti amphoram, quod idem cum ceramio est, mittito. Valet contra renum, vesicae, & laterum dolores, ratiociones sin-
guinis, tustum, rupta, vitiis, & suppressos menses. Panacis vitiis in musti congium mittito, & transfundit. Pro-
dest ruptis, vitiis, contusis, cathopitua: lenis crassitiam extenuat: contra tormes, coxendicem dolores, efficit. Est
tardis concoctiones noceleras: menses & paruis extrahit: aano inter castam, & serpentini vitiis auxiliatur. Vitiis
acoro & dulci radice egestiviti modo fit. Oportet enim singulorum vitiis octo in senos congios mittere, & in vitiis
bus macerare, mox in vac transfere. Facit ad pectoris, & laterum, & vitiis menses. Semina apij vitiis, vitiis
& cribati vitiis ponem in linteo colligata in musti amphoram demittuntur. Appetitum extitit: vitiis vitiis, & vitiis
vitiis auxiliatur: facit spiritus facit. E vitiis, anetho, & per vitiis, vitiis eodem modo fit. & ad vitiis vitiis
cacia. Fit et e vitiis vitiis, nullo ad purgandum efficitur, quod vitiis. Aqua vitiis vitiis.

resistant, roris, & stomachum infestat: quare neque in secunda, neque adtersa valentissimè prodest. Fit etiam vinum quod phiborion vocant, quoniam partus necat, & abortus facit, veratro aut scammonia, aut sphaesivi cucumero, iuxta radices vitium sato: siquidem vites sibi illorum vires adsciscunt. Id vinum partus enecat: datur icionis mulieribus, qua ante vomuerunt, cyathorum octo mensura, dictum. Ramorum thymelae cum suis folijs & fructu viginti drachmas mittit in congios tres musti, & leni igne coquito, donec congi duo supersint, defacatumq; recondito aquosa purgat excrementa, & bilem absumit. Chamelae dum floret, cum folijs trita & cribrata decem drachmarum pendere, in musti congium additur. Post duos menses vinum in vase transfertur. Aqua inter cetera, hepaticis, & lassitudine contractis, efficax est: icioni mulieribus qua à partu agraè pregnantur. Chamapitijinum simili modo fit, ad eadem conversionem: vinum quoq; ciet. Librum radicis mandragora concubito, segmenta lino trahito, quod selibra aquat, in musti calami demittito, ubiq; esse sinito ad menses tres, ut inde transfundito. Media parte, herina dimidium libitur passo in duplum addito. Aitunt hemirana vini congius infusam, potu soporem adferre: cyathus unus cum sextorio vini potus enecat: mediocri vsus eius, doloris sensum auferit: faciones incrassat: olfactu, potuq; & cum inditur idem praestat. In congium musti aqua marina diluti, drachmas duodecim nigri veratri triti in luteo mundo, mittito: dumq; effervescit, in marina aqua congios quatuordecim aut quindecim, ubi pleniussculè fegeris, injecito: post aliquot dies colato, & vitior. Dato cyathum unum ex aqua balnei in potu, ad alvum solven. tam, is qui enomuerunt à cœna. Alia ratio: Veratri drachmas viginti, tunci odorati uncias duodecim, spica Syriaca uncias tredecim, cribrata, & linteo colligata: in septem vini Coti sextarios, diebus quadraginta macerandas induro postmodum colato, dabo in potu sesquidemnam. Alia: Decocta marina aqua ex alto petita sextarios duodecim, veratri candidi libras sex, in musti amphora quadragesimo die, quam madefeceris, colato, & vitior. Alia ratio: Veratri drachmas duodecim, & abroniti quaternas, in sevis musti sextarijs diebus quinisidensis macerato, mox colato: & sumisti exalbe, vitior. id vini genus abortus facit, & partus necat. Ant vitas in sole siccatas imponere in musti metretâ (implet autem metreta congios duodecim) & gypsum in vinum mittit o podo drachmarum viginti, & biduo residere sinito, conjecito veratri nigri drachmas triginta, tunci odorati, calami, singulorum drachmas triginta, baccarum uniperi sextarios duos & tricenem, myrthe & croci singulorum drachmas, involvens linteolo diebus quadraginta appendito, postea colato. Dabis hemiras tres aut duas dilutas. Purgat à partu, & abortu feminas: factus extrahit, contra strangulatus vulva effere. Scammonites sic fit. Radicis scammonia per messes effosa, trita, & linteo colligata drachmas quinq; in musti congium mittito, ad dies triginta. Alvum purgat, bilem & pituitam extrahit.

Vini spiritus Chimistarum.

Quidam vini fortissimi non adulterati libras duodecim ampullae induit, & per vas refrigerato. G. Metratium, vulgari modo destillant, usque dum vini cistria imminuerit: tunc amoto vase quod excipit vinum distillatum vitro amplo recondunt diligentiùs, ne quid expiret, & in aquam calidam ponunt, sinantq; ebullire per dies octo: postea in vapore balnei spiritum vini subtilissimum extillant. In hoc autem opere tria notari debent: primò ne vas in quo vinum digeritur, aëris aquae calidae imponatur quam vinum appareat: secundò, ut commistura luto optimè circumlinantur: tertio ut spiritus inter destillandum rectè separentur à viño, caloreq; moderato evocentur.

Porro idem vinum alcalizatum, ut vocant, parant, dum aquosam materiam ex distillatione vini ^{Vinum Ab-}relictam, exhalare sicut ad succum faculentum usq; hunc deinde probè exsiccant, conteruntq; & calizatum, igne vehementi in calcem albam redigunt, quam sal vini appellant: Postea spiritus vini 3. duas salis eius semunciam miscent, induuntq; ampullae: hanc diligenter oclusam per dies 24. in cineribus sinit. ^{Sal vini.} Mox ex hisdem primò dum lento, deinde fortissimo igne educunt: postea salem relictum iterum exurunt, conteruntque, & spiritu vini imbuunt, digerunt, evocantque ut prius, atque hunc laborem toties reiterant, donec sal per operculum extillarit: sic nobilissimū vini spiritum alcalizatū provenire aiunt, ad rem coloris extrahendos magisterium.

Vel, Vini rubri valentissimi, ut Hispanici, aut Alsatici, aut alterius similis libra octo pellitano, aut ampullae vitreae satis amplae infunduntur, & vase diligenter obturato, macerantur in vino equino, vel aqua moderatè calida diebus triginta: tunc oleosus liquor oleum in aqua videbitur: qui igne lento in ampulla frigidiusculè tandem separatur, donec oleosum illud, tanquam purum, vel spiritus vini vegetabilis à fummitate operculi emanata desierit. Hic postea vitus in aqua calida digeritur per dies viginti quatuor: atque sic è libra vini emergit essentia terribilis, verò ad vitam producendam profudum. Ex hoc vini liquore subtilissimo essentia sine tinctorio per se, & aqua vitæ parantur, dum stirpium plantæ & odoramenta, nec non metalla, aliisque rebus fossilia preparata in illo macerantur, liquantur, extrahuntur, destillanturque.

Liquor Tartari.

Pulveris Tartari vini sibi exsiccati lib. quatuor ampullae incurvatae, vel erodantur obducat induitur. hanc in fornacem locatur, & vase quod excipit amplo apposito sinita luteo ocludentur. Facit enim exspirare solet. Postea igne paulatim augetore vegetatur, donec in hemolius spiritus appareat. Tunc refrigeratis vas liquor extrahitur: infunditurque ampullae vitreae, & in balneo colicæ corrigitur, separaturque aqua ab oleo.

Asclepias. Belg. *Waalvut* hercule.
 Germ. *Schwalbenwurz*, id est *hirundinaria*.
 Ital. *Vincetossico*. *Advers.* 278.

Asclepias altera flore nigro.



ASCLEPIAS altera flore nigro.

Est & aliud *Vicetoxicum* in agri *Montspelliensis* collibus *Frontignanæ* vicinis & *Belgij* viridarijs, quod à floris colore pullo, nonnihil purpurante, minimè albo uti alterius, nigrum vocatur. Cauliculis flexuosis ternis & quaternis cubitorum, proxima quævis fulcra *Periplocæ* æmulatione, quam etiam quia refert, *Periplocam* minorem fecerunt, scâdendo ambit. cætera priori similia, succo pallido turges.

Diosc. Radices ex vino pota torminibus auxiliantur, & contra serpentes illis. Folia adversus vulnè maris, & uterique vitæ, qua *tacôthe* vocant, illuntur.

Nullam eius periculum fecisse se testatur *Gal.*

Fuchsio & recentioribus *Asclepias* menses ducit, hydropicis auxiliatur, canis rabidi moribus venisq; resistit. Illita sordida purgat vlcera, & ad cicatricem potâ dicit. miscetur antidotis.

APOCYNVM PERIPLOCÆ GRÆCÆ.

Apocynum *Guillanini*, *Match.* & *Italorum*. *Cynocambe* *Gal.* & *Cinomoris*, quæ canes calerrimè incrimis, sicut *Lycellion* lupos. *Advers.* 279.

Diosc. Folia cum adipe in panes coctæ, canes, lupos, vulpes, & pueros, necant in cibo datis, & horum vitæ corundem resoluunt.

Gal. Hominibus venenum est, herbamultum grauius olens: proinde omnino cauda est non in fœnâ; non tamen proportione delicet, ubique illis admodum digetentis est facultatis.

1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



PERIPLOCA
serpens, an-
gustifolia fo-
lio. Aduerf.
pag. 279.



PERICLY-
MENON
perfoliatum
californicum
regionum.
Hort. Madra-
gita.
Aduerf. 280.

1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900



PERICLYMENON.

Diosc. Huius semen postquam maturis, collectum & in umbra siccatum drachma pondere datur in vino. quae dragenis diebus, lienem absuinit, laetitudinem discit: sed urinam citet, statim † à sexto die cruentam. orthopnea, & singultus prodest. partum accelerat. Folia sunt eiusdem viribus praedita. quae tricenis septenis diebus epota, fertilitatem facere produuntur. perunctis ex oleo, febrium algores abigunt.

† Gal. tum fructus, tum folia aded vehementer incidentis & excalfacientis facultatis, ut si plussculum bibantur, urinam sanguinolentam efficiant. Competens portio mensura est drachmae vales pondus cum vino.

Rondeletius ad partus facilitandos & accelerandos Periclymeni usum reuocauit: exhibuitq; aqua stillatitiae ex pulueris seminis Lauendulae descripti à sesquiuincia ad duas ̄ & tres.

Belgii hortense est ob floris suauitatem, qui totam aetatem perdurat.

PERICLYMENON non persoliatum.

Aduers. pag. 280.

Allobrogum PERICLYMENON. Xylosteon Dod.

Aduers. pag. 280.




Seseli Aethiopicum. Aduers. pag. 281.

Diosc. Semine amaro, Massiliensi odoratiore, & acriori, fructum suauem. Hinc colligere est esse ad omnia praestantius quibus Seseli. Perse plura in Seseli Massiliensi.



CAPPARIS folio acuto. Belg. Capparis.
Advers. pag. 282.

CAPPARIS rufis folio variat.
Advers. pag. 282.



DIOSC. Causis & fructus cibi gratia conduntur. Aluum turbat, stomacho adversatur, sicut gignit. Coctus in en-
stomacho, quam quida, vitior est. Fructus drachmis duabus in vino potus, quadragesima diebus, humores absorbet, & vi-
tium cruentumq, excrementum emittit. Bibitur vitisfunde in coxarum doloribus, & verumtum resolutione, item in typho
& comulsi. Menses citi, caput purgat. Dentium dolorem sedat. Semen ex aceto decoctum, colluto vnde vro. Ari-
dus radice cortex ad eadem proficit. Viscera omnia vetera & sordida, & que occaluerunt, expurgat. Lienosis cum
farina hordei stillitur. Dente demorsa, dolori eius auxiliatur. Cum aceto trita, vitisgines alba ut plerget. Radix fo-
lia, intrita, strumas ac duritias discutit. Aurium vermiculos infusus succus evocat. Apfrica & proscium Mar-
marica capparit, vehementer instat. Apula vomitus facit, & que a Talyco, & que rubro mari deservit, miram in vo-
dum acris est: siquidam in ore pustulas excitat, gingivasq, esse tenuis exest; quare in cibis non absque damatur.

Idem Gal. eadem Gal. & ex capite detrahit, quod *ἀπομαρτυριζου* vocant. Gal. predicantur
qualitatum ratione. Illa extergit, nec segnitur desiccat. Gal. eadem Gal. amaritudinis sua Gal.

Gal. Capparis radice cortex vincentem habet qualitatem amarant, proximat acrem, deinde acer-
bam; ex quo liquet quid dixerit, purgantibusq, constet facultatibus; quippe abstergere, purgare, in-
cidere potest amaritudinae: exacerbare, incidere, digerere, acrimonia: potest contrahere, densare, co-
nstringere, acerbiter; ut propter lieres induratos, si quid aliud, hoc medicamentum in mare valer,
tum foris idoneis illinendis remedijs admittam, tum intus in corrupta assumptam, sub ducoctum ma-
celo, aut oxymelite, & id genus, siue aridum contusum, illisque permixtum: quippe citra aperit, et
le, lentosque humores hoc pacto sumptum evacuet, nec eo tantum per vias, sed & per ventrem
sepe etiam sanguinolentos defert; vnde & lienes adisti sunt, & coxarum dolores

CLEMATIS DAPHNOIDES: Centunculus Plinij
 Angl. Perwinche, Gal. Peruenche, Gallobelgic Van-
 che & puceliage. Flandru Wincojde. Brab. Massch-
 denpaim & ingrom. Germ. Yngrun & Xun-
 grun. Hisp. Peruinqua. Ital. Peruinca.

CLEMATIS, sive PERVINCA Indes.
 Advers. pag. 282.

Tab. 27.
 Cap. 11. 12. 13.



DIOSC. Caudes ac folia in vino pota, alui profusiva & dysenterias finiant. Vteri & dolores cum Lacte & rosaceo
 aut Cyprino, in posse subdita sanant. Convulsiva atque dentium & dolorem mitigant. * Venenarum moribus imposita
 profunt. Fertur etiam contra aspidum moyses cum aceto pota auxiliari.

Gal. Daphnoides Clematis, nequaquam exulceratorium est, aut acre, sicut quod ante dictum est,
 imo profusivus ac dysenterijs cum vino potum prodest. tantum abest ut perinde vras aut vicet, ut
 illud superius.


Aegin. Siccardi virtute pollet, qua alui fluores, quam diarrhoeam dicunt, intestinorum tormina,
 & dentium dolores finit.

Menstruis albis sistendis utebatur Rondellietius.

Plin. lib. 24. cap. 15. Centunculi est egregius effectus ad sistendam aluum in vino austero, licet
 sanguineo sicut tritus cum cymelite; aut aqua calida cyathis quinque denarij unius pondere. sic
 & ad secundas mulierum efficac. vulnera glutinat, vrinam ciet.


Daphnoides POLYFLORA CLEMATIS daphnoides.

Potissima florū duplicatione & incremento, coloris purpureo subvatis, in Belgij horti videntur.



Viscum. Hipp. Ligay Liria. Lufis. Vifgo.

logi POLYGONATVM. Angl. Mistletoe.
Aduerf. pag. 283.



Diosc. Viscum optimum est recens. intus porraceum, extrâ solum, quod asperi nihil, aut fursiferosi conceperit. Fir acinis in robore nascentibus, buxco fructu is folio, consunt acinum lauant, & postea in aqua decoquant, sunt quo commanducando ipsum efficiant: quoniam quoque, in malo, pyro, & plerisque, alijs arboribus, quinetiam inuenitur in quorundam fructuum radicibus. Emollet, discutit, extrahit, parotidas, tubercula, ceterasque collectiones, ad naturam perducit. cum resina autem & cera pari, opuncidas in splenio sanat. vetera vlcera abscessusque quos ec-coëthes vocant, ex thure mollit. lienem cum calce, gagate, aut Asio lapide coctum & impositum absanit. cum sanda-racha, aut atripigmento illitum, vngues extrahit in sum cum calce & vini sacc, suam vim intendit.

Gal. Viscum ex plurima aëria & aquea, paucissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam effectus substantiæ respondent. Siquidem ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, colque diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere que non protinus admota excoëscant, sed que tempus requirant, velut Thapsia: Sed de ista hoc comonimus inesse calidis facultate medicamentis, vbi largum consistit humorem excrementivum.

Aegin. Calefacit cum acrimonia, humores ex alto validè elicit, & Thapsie modo discutit, hac tamen multò est ignavus.

POLYGONATVM.

Diosc. Radix vulneribus efficaciter illinitur; quis etiam maculas in facie deleret.
Stillatua eius aqua hodie quoque mulieres Italæ faciem faciunt, absterguntque.



POLYGONATO affinis planta forte LAURVS ALEXANDRINA.

Nullus est paulo exercitator qui illico percepto Polygonato maiori aut Hippoglosso, non opinetur hanc esse è censu Polygonati aut Lauri Alexandrinæ: folijs Myrti maioris æmulis ortu & politu, in cauliculo sesquipalmari, Polygonati, Belgij opera Clusij inquilina, vbi nondum floruit.

Ruscus. *Ἐυωπρία*. Centromirini Theopb. Anguil.
Angl. etiam Buchull, & huculms, Petigres.
Aduers. pag. 283.

HIPPOGLOSSON Bonifacia. Angl. etiam
Boyle touge. Aduers. pag. 284. & 284.



Diosc. Radice graminis simili, acerbæ, & subamara. Folia & bacce in vino pota vrinam ciens. menses pelunt, vesica calculos frangunt. stillicidio vrina medentur. dolores capitis sanant, & regium morbum. In asperis & precipitibus locis nascitur. Decoctum ralicis in vino potum, eisdem prabet effectus. Cauliculi recentes, asparagorum vice, in cibo sumuntur, amari autem sunt, sed vrinam mouent.

HIPPOGLOSSON.

Diosc. Capitis dolorem corona ex comis imposita mitat. malagmaticis radice, succosq; admisceat.

LAURVS ALEXANDRINA.

Aduers. pag. 283.

Diosc. Difficiles partus acciderat, radice pota seu drachmarum pondere in vino dulci, & stillicidio vrina an-
silicium. sed sanguinem curabit.



CUCUMIS *esulentus*. Hisp. Cogombro.
Ital. Cocomero, *Aduers.* 285.

CUCUMIS *esulentus*.


DIOSC. Satius cucumis alio & stomacho per quã
utilis habetur. Refrigerat * qui corruptionem non sentit.
Vesica prodest. Olfactu reuocat, quos animus liquerit. Se-
men † modicè urinam mouet cum lacte aut passo. Vesica
excitacionibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus
sanum sanant: & epiphyctidias cum melle.

* & humectat secundo ordine Aegin.


† Aegin. & Gal. Semen abstergerendi inci-
dendique virtute præditum, urinas mouet & cor-
pus nitidum efficit. Aridus siccatur primo ordine,
vehementiusque abstergit, & semen & radix,



CUCUMIS *Anguinus flexuosus*.
Aduers. pag. 285.



MELO vulgi, sive MELOPEPO Dioscor. Ital. Mellone & Popone.
Hisp. Melon. Aduers. pag. 286.



PEPO.

Diosc. Peponis caro in cibis vrinam cit. Inflammationes oculorum illita sedat. Ramenta eius contra adhesionem infantium quam syriasm vocant, sincipiti imponuntur. Fronti admoda oculorum fluxiones auertunt. Succus cum semine adiecta farina, siccatus in sole cogitur in sinegruata, qua faciem repurgant, & nitorem afferunt. Radix sicca & ex hydromelite pota, drachma pondere, vomitionem mouet: si quisquam moderatè secundam cannam vomere cupiat, geminis obolis sit contentus. Sanat quoque illita cum melle vlcera concreta in modum salsi, qua cecilia vocant.

CITRULLVS Officinarum. Germ. Citrullen. Aduers. 286.
Cucumer Citrullus Eufyf. Anguria Matth. & Ital.






PEPO maximus Indicus compressus. Advers. 286.




magnitudine à superioribus differt, fructus autem interdum 50. libras pendit: & si sic coctus.

PEPO rotundus compressus Melonis effigie. Advers. pag. 286.



CUCURBITA, *сибирская* omnium maxima
argyrea. Angl. Gourde. Aduers. 287.

CUCURBITA *legumaria*.
Aduers. pag. 287.



Diosc. Cucurbita esu apta: Cruda trita illi tumores & abscessus mitigat. Ramenta eius infantibus contra capitis ardorem, quam syriacim vocant, in sincipite illinuntur. Oculorum inflammationes, podagraeque refrigerant. Succus è ramentis tuis, per se aut cum rosaceo[†] infusus, aurium doloribus auxiliatur. Adustiones cutis in ardenti febre illi inuat. Totius seruesacta & expressa succus, cum melle exiguo & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excavatam infusum, si mistum sub dio teneatur, potu aluum leuigabit.

† Gal. aurium doloribus cum phlegmone. Comesta humida est, & sitim ardet: Cruda cibo insuavis est, stomacho pernitiola, & cocta planè inexpugnabilis, adeò vt si quis alterius cibi inopia ingerere eam compellatur, ceu quidam iam ausus est, pondus cum algore ventriculo ineuambere sit sensurus, stomachumque euertet, & ad vomitionem concitabit, quæ vna eum ab urgentibus symptomatis liberare potest. Hanc igitur, aliaque ex fugacibus complura, aut mox quam elixata est, aut frictam in cartagine, aut assam omnes homines esse consueuerunt. Ipsa quantum in se est, humidum frigidumque corpori alimentam præbet, ac id ipsum ea de causa * exiguum, sed leniter per aluum subit, cum ob suæ substantiæ lubricitatem, tum ob communium omnium humidorum ciborum rationem, qui scilicet citra adstrictiones tales sunt. Nec sanè infeliciter concoquitur, modò non auertat eadè aegri corruptio.

Plin. Valerianus subdit.

Fuchs.

Cinis aridæ corticis efficaciter potest combusta sanare. Eundem cinerem didicimus ab expertis vulnera in veretro, iam in patredinem versa purgare, & ad cicatricem vsque perducere. Semini sicco illa vis traditur, vt in puluerem tusum & inspersum impleat vulnera quæ cavata sunt. Quidam illud in vino bibendum dederunt, vt solutiones alui fluentis inhiberet. Viticulæ quoque Cucurbitæ iam senescentes cum passo & aceto dysentericis datur, miro modo sanctia intestina componunt.

Aegin. Colocyntha Cucurbita frigidi, humidique in secundo abscissu temperamenti est.

SERTIVS addit.] Pituitosos lædit, colicosque affectus; si malos humores allequitur, ab his corrumpitur & malum succum generat. Semen genitale minuit, & Venereis appetentiam extinguunt. Sanguis ex ea procreatus, consistentia tenuis est. Thoraci, pulmoxi & vesicæ prodest.

Cere

COLOCYNTHIS. Gal. Coloquinte & Cource
sauuage. Hisp. & Ital. Coloquintida.
Aduers. pag. 287.

COLOCYNTHIS pyriformis.
Aduers. 287.




lege dulco-
rauit in 6.
pag. 288.

DIOSC. Emittere fructum in speciem mediocriis pile conglomeratum, vehementer amarum, quem legere oportet, cum coeperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsâ, melle cocto, myrrha, & nitro excipiantur, & cogantur in catapotium. Aresactæ pile teruntur, & infusa clysteribus prosunt neruorum resolutioni, coxendicum doloribus, & colicis virijs, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum etiam cruorem eliciunt. Satus a limo aenocant. dentium dolorem tollit, si vna repurgetur & lacte oblata cum aceto & nitro infusetur, hocque iure decocti dentes colluantur. si aqua mulsâ aut passum in eadem decoquantur, & sub dicto refrigescat, potu crassum humorem & strigmenta alui detrahent. stomacho supra modum aduersatur. sub dicto ex sa balano, alui excrementa eijciuntur. Virentis succo virilium ischiadici perfruantur.

Gal. gustu amara est. Sed quæ illi amaritudinis dum potatur adsunt opera, ea euidenter efficere nequit ob purgandam facultatem, quam validam in se continet: nimirum cum ijs quæ expurgant, antè & ipsa per alui externi præuertens.

* Plin. intestinorum omnibus virijs clysteribus infusa, & renuæ & lumborum, & paralyti eie- Eodem Gal.
cto semine medetur. Carnes eius cum absinthio & sale dentium dolorem tollunt. Sucus verò cum & Aquis.
aceto calefactus mobiles listis.



CUCUMER Elaterij *Pl. vivax* & *Hisp. Cogombriños amargos.*
Ital. Cocomero saluatico. Advers. 288.
Cucumis Astriatus Officinarum.




Diosc. Infiltratus foliorum succus, aurium dolori
 conuenit. Illita ex polenta radix, veterem omnem tumorem
 dissecat. imposita cum resina terebinthina, tubercula rum-
 pit. ischiadici infunditur, podagras dissecat, decocta ex a-
 ceto, & illita, eius decocto dentes in dolore colluuntur. ari-
 da farina impetiginem, lepras, & vitiligines absterget,
 nigri cicatricibus colorem reddet. & in facie maculas ex-
 purgat. Radicis succus sesquiboli pondere, & item cortex,
 acetabuli quarta parte, bilem pituitamque deiciunt, pre-
 fertim in hydropicis. deiectiones autem citra stomachi in-
 iuriam mouet. radicis seibra, in vini presertim Libyci he-
 mina conteritur, danturque ex eo terni cyathi triano, dum
 tumor abunde deprimit cernatur.

Gal. Radicis succus, vt & foliorum, licet elate-
 rio vim similem habeat, imbecilliotem tamen.
 Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet.
 Abstergit namque, digerit, atque emollit. Porro
 cortex ea potentius desiccat.


ELATERIVM. Advers. pag. 288.

Diosc. A bimatu ad decennium deiectionibus vrile est. Integer modus, obolus est: minimus, semiobolus: pue-
 ris, chalcis duo. si quidem copiosius periculum adfert. Bilem ac pituitam vtriusque parte excrebit. optima suffragio est
 purgatio. quod si in animo sit deiectionem moliri, adiecto salis duplo, & sibi, quod colorate sufficit, ex aqua, cuius
 magnitudine catapotia dato, postea cyathus vnus aqua tepida sorbeat. ad citandam tamen vomitiones aqua diluens
 elaterium, subiectas lingue partes penitus pinnis obtinuit. quod si quisquam difficilis exomat, oleo aut vnguento
 vni resoluito, somnum inhibeto. porro his qui eximie vacuantur, continuis vniem & oleum dari conuenit. vniem vo-
 mendo restituntur. quod si vomitiones non siniantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & aqua stomachum den-
 sando corroborant, offerenda sunt. Ceterum elaterium menses, partus & enecas, in pello subditum, morbo regis * mede-
 tur, cum lacte nariis infusum, diuturnis capitis doloribus liberat. efficacissime anginis illinitur, cum veteri oleo, mel-
 le, aut solle & urino.


† partus enecas. Gal. ceu alia omnia amara & subtilia partium, maxime si quam habeant caliditatem,
 veluenissimum Elaterium, summe siquidem amarum est, seueriter calidum, vt ex secundo su ordine ex-
 calfacientium: Porro tale protinus quoque digerendi vim possidet. Sicutigitur ea angina laborantes
 inungunt quidam cum melle aut oleo veteri.



BATATA Hispanorum, sine Cucumete aut Amote. *Adversf. pag. 317.*



Foliis scabris & reptantibus multis Cucumeris asinini æmulis cauliculis. Radices in taleolæ dissectæ multis Baticæ maritimis locis hodie panguntur, ut fidus testis est C. Clusius,



BALSAMINA cucumerina pumica.
MONORDICA. *Adversf. pag. 289.*

Ger. Balsam kraut. *Gal.* Pommes de merueilles.
Ital. Caranzi, Viricella, & Balsamina.


Colico dolori leniēdo, pota efficacissimè mederi fertur. Mordaces vellicationes & partus dolores finit. Dente demorsa, eius dolores tollit. Thoracis sanat vlcera: Ruptis, cæsis utiliter illinitur. Hemorrhoidibus imposita subuenit: convulsionibus & neruorum malis auxiliatur.



Doronicum
minus offici-
narum. Ad-
ueri pa 199.
& 180.



Doronicum
brachy-
dite can-
fistulae
ca. 179. 180.
181.



Doronici ter-
tij varietas.



Goffysia
sic Xlvi



DORONICI tertij varietas. *Aduersf. pag. 290. Aconitum Pardalisanthes Dod.*

Huius tamen saepius radices Ioannes de Vroede rizotomus sine noxa vllibet percepto incommodo impune deuorauit, quamuis canibus perniciosum prodatur.

GOSYPIVM, sive Xylon. *Aduersf. 291. Hisp. Algodon. ἄλδοπος ἰσσοπέρι Guilandino.*

MALVA vulgaris procerior. *Hisp. & Ital. Malua. Aduersf. pag. 292.*

MALVA syluestris repens pumila. *Aduersf. pag. 292.*



Dioscor. Esu aptior hortensis multò quàm syluestris stomacho noxia. Alium bonam efficit, praesertim catulles, intestinis * & vesica vtilis. Folia cruda illita, & cum medico sale addito melle commanducata, agylops sanant. Verum in inducenda cicatrice, ea sine sale vtendum est. Contra^b apam vesparumq, iclus illa prodest. Et si cruda tri-
tag, cum oleo antea se intulerit aliquis, nõ feritur. Achras sursuresq, cũ vrinis illita sanat. Sacris^c ignibus & ambustis
decocta scilicet tritaq, vtiliter cum oleo imponuntur. Eius decoctum^d vultus infestatione mollit. Prodest erosionibus intesti-
norum, vulua scilicet, clystere infusum. Ius decocta cum radice sua omnibus lethalibus venenis auxiliatur, si continuo a-
bibentibus renouatur. Contra phalangiorum morsus remedio est. Lac prorit at. Semen eius admissis loti syluestris seme-
ne potum cum vino, vesica dolores lenit.

Gal. Malua, agrestis quidem, digerentis paululum & emollientis leuiter est facultatis a hortensis
verò, quanto plus habet aqueae humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Fructus eius tanto vtilior
est, quanto & sicior.

Modicè refrigerat, & quasi tepidum quendam calorem obtinet: facile hoc olus deorsum labitur,
non tantum quia humidum est, sed etiam quia glutinosum.

Plin. Dant & succum bibendum parturientibus ieiunis, in vino decocta hemina. Tenasmo & dys-
entericis vtilissimè infunditur: item sedis vitiis, vel si foueatur. Melancholicis quoque succus datur
cystitis ternis tepidus, & infantibus quaternis. Decocta conitibus heminae succi. Hic & calculi,
testis, & inflatione, & torminibus, aut opisthotonico laborantibus tepidus illinitur. Succus decoctus
portum mentis suaves facit.

Verbas: Vesicam, thoracem, pulmonesq, ue isuat, & rancam vocem lenit syl. Malua. Decoctum
porum lapides conerit, frantum conciliat, facit inque partum praestat, si mulier ea crebris vtiatur. Ea
que indurata sunt, emollit.

b Ead. Plin.

c Ead. Plin.

Gal. simplic.
medic. lib 7.

Gal. de ali-
mentorum
facult.

MALVA cristatis oris, vulgè Malva cristæ.

Viranque Maluam æmulatur; sed foliorum oræ
 fimbriis & plicis valdequam elegâtes: caulis assur-
 git ad quaternos, quinos, senos, & interdum denos
 cubitos, multis ramulis divinis, copiosis flosculis
 pallidis & semine onustis.

*MALVA Rosea frutescens.*

Advers. pag. 293.

Flore simpliciore.

*MALVA Rosea multiplex.*

Advers. pag. 293.



ALTHEA. Aduerf. pag. 293.

Hispanica Cannanera, & Marraica, & Maluanisco.
Ital. Maluanischio.

ALTHEA arborescens C. Clusij.



DIOSCOR. Decocta in vino aut aqua mulsâ & per se cum imponitur rufa, efficacis est contra vulnera: item ad strumas, parotidas, abscessus, mammarum inflammationes, fracta sedis, inflammationes, nervorum rigores. siquidem discutit, & excoquit, rumpit, & ad cicatricem perducit. cocta, ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, cerobimbinâ, ut malagmatis lentor fiat, facit ad vulnera inflammationes, praeclosuresq; in pestis subdita. decoctum eodem fungitur munere. onera vulnera, reliquiasq; à partu extrahit. decocta succus ex vino potus, succurrit vrina difficultati, calculosorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis, dentium n. ulcere dolorem, cum aceto decalbe collato inde ore viride semen siccum, tritum, vitiligines in sole perunctas emendat. eodem cum oleo & aceto peruncti, à venenatis non feriuntur. valet contra dysenteriam & sanguinis reiectiones, aluiq; profusum. in posca aut vino decoctum bibitur, contra omnes vesparum, apum, similibusq; aculeatos ictus. Folia cum oleo momento, moribus, & igni ambrâ ilinantur. Constat aquam, trita radice addita, sub die adlensari.

Eade n ferè Gal. & Aegin. Eius vis discutit, laxat, inflammationem abigit, lenit, & phymata concoquit. Radix verò & semen reliqua sanè intensa habet, verum exterie vitiligines abstergitque, precipue autem semen calculos quoque confringit. Exterioria vi Gal. Gal. radice decoctum dysenteria, alui profusio & sanguinis reiectioni vtile est, nempe cum astringentem quâdam facultatem possidat.

ANADENDROMALACHE Gal. Porro huius generis est & ea que Anadendromalache nuncupatur, sed efficacissima comprehensarum in digerendo appellatur etiam Althæa.

Varietas. Frutescit Bisinalua, hominisque proceritatem assequitur. In D. Brancioni's vireto amantissimo & ditissimo Hispano semine sata. Tota facie ceteroquin cum nostrato eadem.

ALTHEA frutex Clusij.

Hanc sanè eandem existimo cum althæa arborescente descripta in Aduerariis nostris, qua à me facta Londini in horto Morgani pharmacopœi peritissimi & optimi, in arboris æmulationem assurrexerit.

Aa 3

Al. C. P.

Althæa
Clusij.

Luteis florib.
ALTHAEA.



ALTHAEA palustris Citiniflora. Aduersf. pag. 294.
Althaea hortensis Dod. Sida Theophr. tamen proprie
hac palustris plura.
Sida enim Theophrasto capita papaueris ferri &
lacustris est planta.

Luteis floribus ALTHAEA, an Theophr. IBI SCVS,
& Aviceenna ABUTILONI
Aduersf. pag. 294. & 295.

Vulgaris ALCEA. Aduersf. pag. 295.

Alcea folio-
sua.



DIOSCOR. Alcearadices in vino aut aqua pote, tunc est
dysentericis, ruptisq; medentur.


Fruticosa ALCEA. Aduersf. pag. 295.
Cannabis sji. Diosc. Mateno.

ALCEA peregrina filisqua. Aduersf. pag. 298.
Alcea Veneta Tragi, & Vesicaria Dod.
Perperian Hypocorum Mattb.

SABOARUM


SABDARIFFA.

Huc spectat perelegans & nona planta, quam quidam Sabdariffam vocat. In cultissimis & sterpium ditissimo vireto D. Ioannis Brancionis, flores Sidæ, Alceæ peregrinæ ferè concolores & similes, ex luteo cinereo obsoletos, sed maiores, cauli singulari, alis donato, quinos & senos cubitos alto, insidentes, aro sanguineo medium cingente, protulit. Eius item folia Maluam adultam propius æmulantur, sapore prorsus Oxalidis. Caulis hominis proceritatem adipiscitur.



GERANIUM Robertianum. Aduerj. pag. 296.
Herba Roberti. Ger. Subrecht; kraut / Scharten kraut. Belgicè, Robertz crupt. Anglicè, Herb Robert.

Legionellen.



Tertia Robertiani Geraniij varietas est Syderitis Achillea Diosc. Panax Heracleum Anguil. Belg. Bloet wortel. & Geranium Hamatodes. Angl. Bitch nedle, & neide. Gal. bec de Crue. Lusit. & Hist. Pico de Gru.

DIOSCOR. Syderitis aliam esse tradunt, quam Cratenas Heracleam vocat, in maceris & vireo nascentem, foliis Coriani, à radice numerosis: ciliolatis, ciliis, lanidus, teneris, in rubore ciliolatis, flore pæo purpureo, paruo, gustati amaro & lento. Similis ut videtur, ut quatuor vocanti vulveri imposta, sanguinem suppriuat.



MYRRHIDA Plin. Aduers. pag. 296.
Rostrum Ciconie seu acus Moschata.

PES COLUMBINVS, seu Diosc. alterum
GERANIUM. Aduers. pag. 296.
Belg. Dupuentboet. Germ. Taubentusz.
Gal. Pied de pigeon.



Geranium
Batrachioi-
des.



Nephriticis, & vulnere fauciatu medetur. vrinas
mouet potum & impositum.

GERANIUM BATRACHIOIDES, seu Gratia
Dei. Aduers. pag. 296. 297. Germ. & Belg. Godes
genede, & blau Botterdiontmer. j. Batrachium
caeruleum.

GERANIUM BATRACHIOIDES alterum
longius radicans.

Alterum verò Geranium Batrachioidei, cognatum
proxiore serpit, flexibus variis in oblonga &
cespite summo sparsa radice, rufescente, sub his
bractea geniculata & odorata, digitum parvum
sitae aequante. Folia Santiculae rotundiora aut Ger-
ranij Batrachioidei, albida, nonnihil incana. pediculi,
& florum virentioloacei alterius minus. Angliae &
Belgij horti inquilina.

GERANIUM

GERANIUM fuscum flore livido purpurante,
& medio candicante.

GERANIUM VULBOSUM Diosc. primævis.
Aduers. pag. 297.



lege folio
multipartito.

lege in. 20.
oborum.
hortis Bel-
gicis inquil-
tum.

Saniculam item & Geranium longius radicanum voluit amulatur, sed folia maiora maculis fuscis pullisve nonnullis nigricantia. Ineunte æstate valdequam eleganti flore phæo lividoque purpurante, medio candicante, reflexo. Cauliculis pedalis aliquammodis exilibus alis decatis fruticat, & propagines fundit è radice oblonga. Hoc primū vidimus & habuimus Mechliniæ benevolentia Georgij Rije, ac deinde Liææ & alijs locis in vrceis pensilibusq, hortis nobis repertum.

GERANIUM Creticum animum.

Folio rubete Geranij & flore cæruleo luculentæ magnitudinis, semine reperto inter Dictamni Cretici fasciculos Ioanni Murono perbono & docto pharmacopæo ortum.

Radice reptice GERANIUM alterum.

Folia altius laciniata, circinata rotunditatis: radix repens reliqua multos annos perstans: flos singularis in singulis quadrantalibus petiolis. Florens est apud Belgas.

GERANIUM VULBOSUM.

Diosc. Ra. sic drachma pondere in vino pota vulua inflexiones discit.

Ægin. cadens. & Plin.

Pituita, bibitur contra pituitam drachma in vini cyathis tribus, bis die. Succus radicis auribus medetur. Opisthonicis semen drachmis quatuor cum pipere & Myrrha potum.

3b


GERA-



GERANIUM
paraxosides
Aduerl. 277.




SANICULA
TO. DIA.
PARSIA.



ALCHEMILLA.
Drolium
Cordi.



Alpina E.
LIBORNE
Sanicula
Elebor nig.
gr. fuce.
Aduerl. 254.



SANTICVLA, & DIAPENSA. *Advers.* 297.

Internis & externis vulneribus, sanguinis eruptionibus, viceribus, dysenterijs, ruptis & vulvis auxiliatur, decocta pota & imposita.

AICRIMILLA, *Drosum Cordi. Advers.* 298.

Chirurgi hanc vsurpant ad enterocelas, vulnera interna & externa ferruminanda. Admodum sicca & adstringens: ideo commendatur ad menstrua alba, & matricis pituitosos fluores, vterum aded irrigantes, vt à concubitu semen fetus spes elabatur, conceptus præpediatur & præcludatur.

À iammas imposita contrahendo duriores & solidiores reddit Martha. & Dod.

RANUNCVLVS pratensis, etiãq; hortensis reptans
cauliculo. Germ. Smaliblum. Belg. Hanenboet &
Worterbblumen. Hist. Yerva belida. Ital. Pic
coruino. *Herba Sclerata Apuleij. Advers.* 298.

Surrectis cauliculis pratensis RANUNCVLVS.
hortensis secundus Dodonæo.
Advers. pag. 298.



Varietas.

DIOSC. Folia, flores & cauliculi vocantes, illis exulcerant, & crustas non sine dolore gignunt: quare vngues scabros extricant, scabiem eximant. Pigmata dolent, formicantes verrucas, & pensiles, alopeciasque paulisper illita, tollunt. repente decocto perionnes fouentur. sicca radix, tria aqua, sternutamento. cist. uerbis adnota. acutius dolorem appensa leuat, ipsos tamen frangit.

Eadem Plin. & Gal. omnes vehementer acrem facultatem possident.

paulisper illita.] Gal. Nam si diutius inhiereant, non excoriatur solum cutis, sed & in crustam vititur.

Gal. vehementer exiccando frangit.



Prænsis RANUNCULI varietas.
Advers pag. 298.
Tertius sji. Dod. echinatus. Hortensis simplex Fuchs.

Ranunculus. POLYANTHEMOS, multiflorus sine
holeracens hortensis primus Fuchs. Germ. Gefuites
hancenfus, Belg. Lupertts clautwen. i. pes fias rō-
gnis Leopardi. Sylvestris 2°. Dod. Advers. 299.




BULBOSUS RANUNCULUS. Advers pag. 299.
deme hirsuto, muricato semine. Germ. Elepuz ha-
uentsus. Ranunculus tuberosus Dod.
Batrachium Apuleij.

Multiplici floris fetura hic parvus Ranunculus
in hortis variat.

ARVI. Ad lunaticos, qui cursum Lunæ patiuntur.
Herba Batrachion si lunatico in cervice ligetur
lino rubro luna decrefcere, cum erit signam can-
ri vel Scorpionis parte prima, mox sanabitur.

Ad nigras cicatrices: herbam Batrachion Tu-
fam cum fua radice mixto aceto impones his qui
habent cicatrices nigras: exedit eas, & fimile cor-
pori reliquo reddit colorem.



*RANUNCULVS niger polyanthos.**RANUNCULVS albus flore simplici.*

Varietas.

Fulcherrima exoticæ elegantiæ planta, quæ flores lartos multiplici factu & prouentu Liær Belgarum Maio mense dat in hortorum delitijs summi admiratoris & humanitatis summæ clarissimi viri D. Iohannis vander Dill. folia & ortus Ranunculi albi aconiti facie.

RANUNCULVS albus aliter.

Ibidem loci albi peramæni, sed simplicis floris, Ranunculi albi aconiti facie duplo maioris, & folijs minus altè diuisis, ex semine Burgundo.

Varietas.
Iue Aconiti
barbarorum.*RANUNCULVS minoribus albus.*

Folijis & quàm Tormentille minoribus; floris albus, sed rarior, qui facione in luteum mutatus est D. Dill.





Flammula
RANUNCULUS
aqua-
ticus angu-
stifolius.
Flammula
vulgo.
Fey. Egel-
koolm. 1.
carbo. Ad-
vert. 199.*



RANUNCULUS PALUSTRIS rotundiore foliis.
Ranunculus aquaticus Fuchf. sine Apium visus. Germ.
Wasser ranenfus; Adverf. pag. 299.
Apium aquaticum & Ranunculus aquaticus Tragi.
Ranunculus Sylvestris primus Dod.

APVL. Si quis homo eam gustauerit, ridendo
exanimatur. est enim caustica. Ad vlcera chi-
ronia: herbam Sceleratam tusam cum axungia si-
ne sale impones vulnere, excomedet putredinem,
& si qua fuerit sordes, expurgat: sed non diutius
patiaris quam necesse est, ne & corpus sanum ex-
eat. Si argumentum rei experiri volueris, tande
eam, & super manum sanam impone & alligato,
statim rodit corpus. Ad strumas & furunculos
& apostemata, vt sine ferro aperiantur: Herbam
Sceleratam tusam & subactam cum fimo porcino
imponere strumis, furunculis & apostemaibus, in-
tra paucas horas discutit, & pus eijcit.


RANUNCULUS aquaticus angustifolius serratis.



*Fuchf. 1. Vistur hic nonnusquam sicuti na-
talis. Serratis, folijs serratis.



Parsilus RANUNCULVS folijs gramineis.
lego, Narbonensis Gallia pratensis, quatuor à Monspelo lencis,
ne quis cum D. Dodonao urbem Narbonam putet.

RANUNCULVS *lyricus.*RANUNCULVS *Sanguineus multiplex.*
Constantinopolitanus D. van Eckenbeken
apud Clusium.

Præter iam recensita Ranunculi genera, exotici duo Belgij nuper inquilini facti sunt; quorum alter ex lilyria delatus, ex vno apice quasi nodulo Corrudæ amulatione, quamplurimas aceruatim congestas, tanquam cirros, tuberantes Chelidoniij minoris ferè pares, sed oblongiores habet radices; è quibus rotundi do- drantales pedales & sesquipedales cauliculi, & folia oblongiora altè minutim fissa, nõ- nullo tomento incana, creunt. Flores luteo pallentes, Ranunculi pratensis & semen racemosum, exile,

RANUNCULVS *Sanguineus multiplex.*

Meritò hanc Ranunculum dixere; tantopere namque cum Ranunculis quadat, ut illis propior sit, quam Anemones speciebus; cuius sanè elegantia captus illustris vir Carolus Rym, D. van Eckenbeken eius effigiem affèbrè expressam Constantinopoli rediès secum desulit, quam amicis & Carolo Clusio communicavit, qui eam pro solito candore omnibus rei herbariæ studiosis iconè, & his ferè verbis exhibuit. Caulis pedalis in duos aut plures ramulos diuisus, quorum extremitatibus insidèt flores peramani, pulcherrimo cocco colore nitentes, multiplicibus foliolis aspectu iucundissimis: folia circa radicem quina aut sena dilatè viridantia, paucis & echinati Ranuncolorum media: quæ verò per caulem sunt, minora, nec adèd incisa, nec admodum frequentia: Multæ illi radices simul congestæ, Lusitanici Ranunculi radicibus pessimiles, flavescentes.

RANTN-




RANUNCULUS PALUSTRIS *resundiore folio.*
Ranunculus aquaticus Eufh. sine *Apium* visus. *Grum.*
Wasser ranenfuß. *Advers.* pag. 299.
Apium aquaticum & *Ranunculus aquaticus* Tragi.
Ranunculus Sylvestris primus Dod.

APVL. Si quis homo eam gustauerit, ridendo exanimatur. est enim caustica. Ad vicera chironia: herbam Sceleratam tusam cum axungia sine sale impones vulnere, excomedet putredinem, & si qua fuerit sordes, expurgat: sed non diutius patiaris quam necesse est, ne & corpus sanum exedat. Si argumentum rei experiri volueris, tunde eam, & super manum sanam impone & alligato, statim rodit corpus. Ad strumas & furunculos & apostemata, vt sine ferro aperiantur: Herbam Sceleratam tusam & subactam cum fimo porcino impone strumis, furunculis & apostematibus, intra paucas horas discutit, & pus eijcit.

RANUNCULUS *aquatilis* *angustifolius* *ferratus.*

1





Flammens
RANUNCULUS
aquatilis
angustifolius.
 Flammula
 vulgi.
 Pele *Agri-*
hoolen. 1.
 carbo. *Ad-*
uersi. 299.^o



* *Veridic.* 1. Virtus hic nonnullam sibi demerit
 talitij & dentis, folijs ferratis,

Enchirid.

Pumilus RANUNCULUS folijs gramineis.
legit, Narbonensis Gallia pratensis, quatuor à Mospelio leucis,
ne quis cum D. Dodonæo urbem Narbonam putet.

RANUNCULUS Illyricus.*RANUNCULUS Sanguineus multiplex.*
Constantinopolitanus D. van Eckenbergs
apud Clusium.

Præter iam recensita Ranunculi genera, exotici duo Belgij nuper inquilini facti sunt; quorum alter ex Illyria delatus, ex vno apice quasi nodulo *Corradæ* æmulatione, quamplurimas acervatim cōgestas, tanquam cirros, tuberantes *Chelidonij* minoris ferè pares, sed oblongiores habet radices; è quibus rotundi doctantales pedales & sesquipedales cauliculi, & folia oblongiora atcè minutim fissà, nō nullo tomento incana, exeunt. Flores luteo pallentes, Ranunculi pratensis & semen racemosum, exile.

RANUNCULUS Sanguineus multiplex.



Meritò hanc Ranunculum dixere; tantopere namque cum Ranunculis quadrat, ut illis propior sit, quàm *Anemones* speciebus: cuius sanè elegantia captus illustris vir *Carolus Rym. D. van Eckenbergs* eius effigiem affèbrè expressam Constantinopoli rediès secum detulit, quam amicis & *Carolo Clusio* communicavit, qui eam pro solito candore omnibus rei herbariæ studiosis iconis, & his ferè verbis exhibuit. Caulis pedalis in duos aut plures ramulos divisus, quorum extremitatibus insidēt flores peramantem, pulcherrimo cocco colore nitentes, multiplicibus foliis aspectu iucundissimis: folia circa radicem quina aut sena dilutè viridantia, palustris & echinati Ranunculorum media: quæ verò per caulem sunt, minora, nec adedè incisa, nec admodum frequentia. Multæ illæ radices simul congestæ, Lusitanici Ranunculi radicibus persimiles, flavescentes.

RANUNC.

RANUNCULUS LVSITANICVS.*
autumnalis Clusij.

Nemorosus RANUNCULVS, Advers. pag. 300.
Ranunculus quarum Fuchs. lacteus & luteus.
Anemones quinta & sexta species Dod.
Candidus ranunculus Cordi & Tragi.

Folia sunt
rotundiora,
& flores grā-
diores quam
pictura.



* Nihil habet cum Ranunculis commune, præter semina racemosa, & flores luteos in palmaribus pediculis. Folia rotundiora, rigida, rugosa, nervosa, ambitu crenata, Bugulæ latiora. Radix Illyrici ranunculi, magisq; protuberans. Ipsa bruma floret Mechliniæ in horto clarissimi viri D. Ioannis Bræcionis & D. Ioannis vander Dill. Gustanti acris vt Ranunculi genera: Olydippe inter oliueta frequēs, & plerique Bætiæ locis, Clusio teste.

Nemorosus RANUNCULVS.

Hanc duplis floribus nonnunquam in Belgio meminimus.



Alpinus RANUNCULVS Septentrionalium, Muscatelli, Cordi.
Advers. pag. 300.

RANUNCULVS Montanus Alpinus glomeratus.

Offensis vallis, Mindinensium, Auernæ, Germaniæ, & Helueticorum montium amans & festiva hæc Ranunculi aconiti facie species, cuius folia fissa per amplis multique diffusis, Ranunculi polyanthemi aut Aconiti barchoïdis, rotundiora viridantia: luculento flore luteo Caspæ palustris Worter bletææ vulgò nuncupatæ, sed in orbem glomerato, minimè expanso aut tesserato. Radix talem fibrata, qualis pratensis Ranunculi, aut Barchoïdis pœonisti.




Aconitum
A. napellus
A. lychnitoides
A. veratrum
A. flavum
A. napellus
A. lychnitoides
A. veratrum
A. flavum



ACONITUM
Hyemale
Belgarum.
Ranunculus
monophyl-
los, & Ane-
mone Bene-
dictus.

ANTHORA.
Adonis vernalis



ACONITUM
luteum Pô-
ticum.



ACONITUM *hyemale* Belg. &c. *lego* **BYLBOSA** *UNIFOLIA* **BATRACHIOIDES**,
Eleboracea plantula. Aduers. pag. 300.
Aconitum luteum minus Theoph. & Dod.

Radicis bulbillus: initio quantus Fumariz Pliniana. Adultus & valde verus, tuberculis eminet, & veluti geniculis obliquis accrescit, pluribusq; folijs donatur, vt scite animaduerit Dod. qui pernecabile virus asserit.

ANTHORA.

Aduersus morbos contagiosos & febres vrantur Veneti, qui Zedoaria & Mosis Napellum fecerunt.


Aconitum. **ACONITUM** *luteum* *Ponticum* *lupicida.* *Germ. Wolfstaurt.*

Gall. Tue Loup. Hisp. Mata Lono. Aduers. 301.

DIOSC. Radice ad laporum venationes vrantur. Inseta carnis crudis, & à lupis deuorata eos enecant.

Aconitum **LYCOCTONVM** *flore Delphini.*

LYCOCTONVM *Caruleum paruum,*
facie Napelli.



Ob floris differentiam, Lycoctonum flore Delphini discernitur nuperi, cui radices ternae, quaternae Antithorae, quasi nodulo aptae in fibras desinentes. Caulis obtusum, interdum ternum cubitorum. Folia alae & minutim diuisa Anthorae vel Napelli, sed minora. Semine & siliquis non diuersis.

LYCOCTONVM *caruleum paruum.*

In Belgij hortis etiam hoc Aconiti genus aspectu iucundum, caule, folio & flore Napello proximè. Sed radix bulbosa coni effigie, è cuius media basi ceteri multi & fibrae tortiles exerantur. Flos singularis in petiolis cetera purpura nitet. Caulis pedalis & sesquipedalis alis diuisus. Floret Augusto & Septembri mensibus.

ACONITVM *minus.*

Alterius huius speciei flos item ceruleus, cauliculi spithamei: Semen & folia Aconiti lateri, omnia tamen longè minora. Radix non admodum Aconito proxime descripto fibrillis donata. Toxicis vis omnibus eadem, astate floret.


ACONITVM *autumni de facie Napelli.*

Toto valde & paritate Napellum refert: Augusto & Septembri floret. Radix illi Napelli. Belgij hortenae est.



Helleborus niger. Ind. Elleborus nero. Hist.
Verdegambre nero, & yerua de valleiros.
Aduers. pag. 304.
Nasellus Auicena. Guiland.

Astrantia nigra. Aduers. pag. 304.
Elleborus niger Diosc. Dod. Scenicula
famina Euclyf.



Veratrum
Saturia
da, col. m.
albo, m. m.
h. l. v. m.
m. m.

Diosc. Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituita[m]q[ue], datum per se, aut cum sc. antimonio, & tribus obolis, siue diachma sales, decoquitur cum lence & insculis, que purgationis causa sumptantur, prodest morbis comitialibus, melancholicis, insipientibus, articularijs doloribus, & resolutis, menses in auctum trahit, partus necat, purgat fistulas impostum, & tertio die detrahitur, item contra grauitatem auditus in aurem demittitur, ibique in alterum aut etiam tertium diem esse finitur, scabiem sanat illitum cum thure, aut cera, & pice, & cedrino oleo, vitiliginibus, lepris, impetiginibus, ex aceto madatur, dentium dolorem & collutione mitigat, erodentibus modicantibus commiscetur, hydropicorum ventri vitiliginis imponitur factum ex eo, farina hordeacea, & vino, cataplasma, confutum proximè radices vitium, vinum purgandi saculato donat, illius resharsh de mos expiari arbitrantur.

Gal. Helleborus uterq[ue] tum albus, tum niger, extergentis est, & excalescentis facit leatis. Quamobrem ad alphas, lichenas, psoras leprasque accommodi sunt. Quin etiam niger, si in fistulam callo induram infundatur duobus tribusve diebus, callum detrahit. & dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt autem in tertio ordine excalescentium & deficcantium. Porro niger gustu calidior est, candidus amarior.

Veratri nigri extractum Chymicum.

G. Andem.

Cortices corticum Veratri nigri medulla exempta, in aqua Anisi amaro oleo per horas viginti quatuor macerantur, bulliri sinuntur, dum aqua serè consumatur. Postea validè exprimuntur, colanturque: ac tandem illis cum syrupo rosaceo solutio ad spissitudinem quantam sufficit, in coctis, liquer



in vitro reponitur ad usum. Ex hoc stragulas vel 5. dimidia datur ad humorē melancholicum expurgandum, morbosque inde ortos emolliendos. Valde commendatur Veratri nigri ex aqua Anisi maceratio, dum Anisi semen ex aqua cinamomi stillatitia prius macerant; deinde super cortices radicum Veratri nigri purgatos incisoque fundunt; & in vase vitro iambui sinunt, donec vis omnis extracta videatur: postea aqua effusa cortices sub prelo validissime exprimunt: & succum expressum ampullae imponunt, operculoque applicato, aquam extillant, dum ille ad justam crassitudinē pervenerit.

ASTRANTIA nigra.

Elebori nigri facultates Astrantiae nigrae tribuit Dod. additq; Germanos medicos eius radice felici successu curasse melancholicos.

CHRISTOPHORIANA. *Advers. pag. 304.*
an Actea Plin.?

PEONIA *semita.* *Germ.* Böonie blumen, stungblum,
Belg. Pionien en macisloemen *Gal.* Pecoitoe, pi-
uoinc. *Angl.* Peaupe. *Hisp.* Peonia, Rosa del mō-
te & Rosa albardeira. *Advers. pag. 305.**



* **Diosc.** *Femine à partu non purgatis succo radix datur. ciet* menses nullis & graea magnitudine pota, sic vè* a eadem Gal.
tris doloribus cum vino auxiliatur. valet contra regium morbum, & renum, ac vesicae dolores. deoita in b. pulchro
olium sistit. Rubra grana rubentis menses sistunt decem vel duodecim pota in vino austero & nigro. stomachicis & c. Gal. etiam
erosionibus ea esse prodest. à pueris pota, inuisa calculorū eximunt. Grana nigra mulierum suppressionibus & nodur- uerit obstru-
nis, vulva strangulationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua multa, aut vino. eunt, &
** G l. radicem habet leniter adstringentem cum quadam dulcedine: ac si placentulum dentibus* Tephala
mādas, acrimoniam item quampiam subamaram subesse percipies, proinde menses eis ex melierato. vocant.
Regium morbum & renum.} Gal. Sed haec efficere nata est, qua acris & subamara est, qua verò quid-
dam etiam adstrictorium obtinet, fluxiones ventris sistit.

Gal. Est porro omnino & resicatoria: ea propter haud desperaverim eam ex collo pueris suspensam merito comitalem morbum sanare. Equidem vidi pueillum quandoque octo rotis mēsis morbo comitali liberum, ac postea forte fortuna, quum quod a collo suspensum erat decidisset, protinus deus convulsione correptum, rursusque suspensum in locum illius alio, inculpate postea egisse.

Porro visum est mihi satius esse rursus id collo detrahere, certioris experientie gratia. Id cum fecissem, ac puer iterum esset convulsus; magnam recentis radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsum sanus effectus est puer, nec postea convulsus est. Rationabile itaque erat aut per vas quaspian à radice defluentes, ac deinde per inspirationem attractas, affectos ita locos curare, aut aërem à radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus Cyrenaicus columellam phlegmone affectam inuat, & melanthium frictum palam catarrhos & coryzas desiccatur, si quis id in calidum lineum rarum liget, assidueq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. At nunc Pæonia cognoscendam temperamentum est, tum exsiccatorium, tum subtilium esse partium; haud tamen insigniter calidum, sed aut symmetrum, aut pauxillo calidius.

Plin. eadem ferè quæ Diosc.


Varietas. Albo flore diversam ex Germania superiore nactus est D. Brancion.

*Melanthium
desiccatur
coryzas.*

*PÆONIA mas.
Aduers. 305.*



*PÆONIA promiscua seu neutra. 305.
Pæonia Fœmina prior Dod.*



Paeonia femina Polyantha.

Belgij hortis specioso florâ incremento, qui duplicatione & fetura, vti papavera, maximum Althææ hortensis florem æquant, & interdum longè superant.



LEONTOPETALON.

Ad. crs. pag. 305.



ALBA.
STRICES
SUA.




Diosc. Radix auxiliatur serpentium ictibus, ex vino pota, nec alia res ceteris dolorè sentit. misceatur ischiadiorum clysteribus.

Gal. Radix digerendi facultatem & exiccandi calfaciendiq; in tertio ordine possidet.

ALABASTRITES altera. Dentaria altera herbariorum. Coralloides alicui Cordis.

Nobis hæc herceps est; à superiore foliorum situ & posita ducatur denteria, ceterum non ab- similis. Folia Valerianæ tylicæ sunt generositate digesta: flos albus: radices & filia non differes. Dru-



DENTARIA *pusilla*. ENZAPHYLLOM.

Accersendas etiam Dentarijs has duas exoticas à C. Clusio Vienna Austriae missas, facies ortusque suadent. Vni autem folia tripartita & radix alabastriti priori quadam tenuis affinia, sed longè minor.

DENTARIA *Bulbifera*.

Alterz verò folia atrociora Valerianæ sylvestris positu & æmulatione parilitate alterius. è radice ceruice bulbos pullos nitidos emittit. Flores nondum vidimus. Lieræ Brabantorum studiose alitur in vrceis à C. V. Dilho.

lege Castaneæ
equinæ.




RICINVS. Gallis Palma Christi. Hisp. Figuera di l'Inferno. Ger. Wunderbaum & seckenhojn. Brenbaum. Belg. Molencruyt & wonderboom. Ital. Girasole. Ang. Palma Christi. Aduers. pag. 306.

Diosc. Grana triginta numero purgata, trita potu puritas, bilem, aquamq; per aluum extrahunt. vomitiones mouent. sed iniucunda admodum est, & molesta purgatio. siquidem stomachum vehementer subuertit. Tu, & imposita, vitia cutis in facie, varisq; expurgat. Folia cum polenta trita, inflammationes oculorum, tumoresq; leniunt. rigentes mammas cohibent. eadem ex aceto illita, ignes sacros restinguunt.

Grana saccharo condiuntur eludendis domicellis.

Gal. Semen Ricini, quod etiam purgat, extergendi & digerendi facultatem obtinet. Sic verò & folium; sed vndequeque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius, tum tenuiorum partium, quam est oleum commune, ac proinde quoque digerit.



RICINVS AMERICVS, Curcas.

A doctissimo C. Clusio descripti Ricini grana dono accepto anno elapso Londini à pharmacopœo doctissimo Ioffroy Gallo; qui è Brasilijs adiectus affererat. Pericarpio aut tecta triquetra clauduntur, cornice nigro striato muculo indiano ferè parti, medulloso intus nucleo, violenter internè & superne purgante, vel vnico assumpto nucleo. Curcas vocari testis est Clusius, qui se vidisse in Hispania ad fretum Herculeum huius Ricini plantas humanæ crassitudinis & triem hominæ proceritatis, refert.

Str. 4. 78. 4.

STAPHISAGRIA. *Hisp.* yema picenta & piolheya. *Ang.* Staut's alter.

Advers. 300.

Diosc. Grana quindecim si trita in aqua mulsis decoctis, crassa per vomitum purgant. Sed qui liberius, ambulare debent. Quinetiam assidue attendere oportet, & aquam mulsam potui dare, quod strangulationis pericula inferant, & sanies deorsum. Trita eadem, & ex oleo manna, pediculationi, pruriginis & scabiei auxiliatur. Plurimum est pituitam commaniscat. Dicocta in aceto, dentium dolori, si ea collinatur, subducit. Gingivaram rheumatismum hinc. Ulcera oris, aphthas nominant, cum melle sanat. Miscetur praeterea vrentium malagmaris.

Gal. Vehementer acré obtinet facultatem, adeo ut ex capite purget pituitam, abstergatque valenter. Itaque ad scabiem accommodata est. Sed & vrenti vim aliquam habet.

Pediculationi. *Plin.* Hinc quidem in aceto decocta, etiam vestes eo tacto liberat.

Ex dem fore
Plin.



QUINQUEFOLIUM sive Pentaphyllum vulgare. *Ger.* Fünfingekraut & Fünfblat Hele. *Hisp.* ungerkraut *Gal.* Quinetfoelle. *Hisp.* Cinco en rana. *Ital.* Cinquefoglio. *Angl.* Stachy or spue fingere grass. *Advers.* pag. 306.



QUINQUEFOLIUM. Pentaphyllum.

DIOSC. Plurimum pollet remedijs. ius radice decocta ad tertias, si in ore continetur, dentium dolores sedat. pu-
rida oris ulcera, collatione sistit. arteria febris, gargarizatu lenigat. contra alui profusiva, & dysenterias auxi-
liatur item articulum^o coxenducum^o & cruciatibus potum. Colla in aceto, & illita serpen. ia^o vlcera cohibet. firmas,
tumores, duritias, abscessus, & collectiones discutiit. ignes sacros, veduntias, condylomata, psorasq; sanat. Tonerari-
dici succus contra locustis, pulmonumq; vitia prodest. item aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto
vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in ter-
tiana vero, ternum: in quotidiana, vnum. ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. foliorum succus,
tribus cyathis aliquot dies potus, celerime regio morbo medetur. illita cum melle & sale, tam vulneribus quam fi-
stulis remedio sunt. enterocelicis auxilium praestant. Quinquefolium sanguinis profusiva & potu & illitu sistit. ad ex-
pirationes, lustrationesq; sanguinis profusiva & castimonias inciditur.

^a decoctis in lacte radicibus & potis ad dysentericos deploratos Quinquefolium laudant.

^b eadem Plin. ^c fistulis quae omni parte serpunt Plin. ^d eadem Plin. ^e Plin. Decoctum ad ter-
tias in vino ictericis dari atque illini vulissimum est.

Gal. radix desiccatur vehementer, minimum vero acris est, quare in multo est vsa, velut alia quoq;
omnia, quae cum sint tenuium partium, citra mortuum desiccant. Est enim desiccatoria ex tertio quo-
dammodo ordine, minimum habens euidentis caliditatis.

Aevi. Ad vitia artuum si percussi fuerint: herba Quinquefolium tusa cum axungia vetere sine sale &
imposita sanabit. Ad ventris dolorem: Quinquefolij succum dabis bibere cochlearia duo, sine mora
dolorem tollit. Ad cancerum exiccandum: herbam Quinquefolium cum vino & cum adipe suilla
vetere sine sale pisatam de ligno in lignum vino sanè veteri asperges, & sic impones, rem vnicam expe-
rieris. herba Quinquefolium trita & cum oleo mixta pedes perunges, tertio die tollit pedum dolorem.

Articulos expurgat vt Hermodactylus.

PENTAPHYLLUM petraeum Mutoni.

Minus longè est vulgato Pentaphyllo; flos luteolus, & folia auersa parte albida. Cautibus Torna-
co proximis frequens & lubens oritur.

PENTAPHYLLUM supinum Tormentille facie. EUPATORIUM Gracorum. Agrimonia officinarum.
Aduer. f. pag. 308.



PENTAPHYLLUM *supinum*.

Pentaphylleo generi facile cognatum est: medium enim est inter Tormentillam Pentaphyllum & Potentillam, quod primum nactus sum in horto cultissimo Coldenbergij nostri. Floresulos latera pal- lentes, summa folia, caudicos colliculos, & radicem Pentaphylli habet, sed folia ima atro-lentia in lō- go pediculo aptantur Argentinæ sive Potentillæ amulatione: fructus autē Fragariæ sterilis similimus.


EUPATORIUM *Gracorum*.

Diosc. *Contra huius folia, & cum veteri succo adipe impofita, viceribus difficile cicatricē contrahentibus me- *Eadem: pl. dentur. Semen aut herba in vino pota, dysentericis, ischiurasis, & serpentium morfibus auxiliatur.*

Gal. Herba ipsa tenuiam partium, incidendi exurgendi que facultatem citra manifestam calidita- tem obtinet. Quæ circa obstructions iecoris expurgat. Inest in eadem ei & adfufidio quædam per quam robor visceri addit.

ARGENTINA. *Advers. pag. 308.*
Asferius Tragi.

TORMENTILLA *an Chryfagonum Diosc.?*
Advers. pag. 308.



Pota & illita alba profusiva sistit. *Subdit Tragi.* Herba vino decocta & pota torminibus & dorsi dolore laborantibus subuenit. adstringit.


TORMENTILLA *an Chryfagonum Diosc.?*

Quinquefolij viribus proxima. Vulneribus ferraminandis, fistulis, dysentericis, febre correptis, epidemicis, & pestiferis morbis convenit. Ius radicis & foliorum sudores elicit, Dodonæo teste. Itaque à corde virus propellit. Pulmones & hepar infarctis liberat. Regis morbo medetur. Muliebris & san- guinis profusiva pota & illita sistit. Ad oris ulcera decoquitur. Ex sicco Plantaginis epota vimâ sup- pressam elicit, adfufione inibi relicta, & robore parti restituta. Viceribus & fistulis quæ omni parte ferunt, humoris erodentis insulcus cohibendo, opem fert. Sanguinem extra vas cœterotum discor- tit, eoque vulsis, & ex alto præcipitatis medetur.

Medicamentis articularibus Hermodactyli rita inferebatur Rondellio.

FRAGARIA & FRAGA. *Ang.* Straub-
berre. *Ital.* Fragolaria & fragole. *Ger.* Erd-
beere. *Belg.* Erdbeeren. *Gal.* Frcles. *Aduers.* 309.

Vulgaris CARYOPHYLLATA. *Geum Plin.*
Aduers. pag. 309.



Varietas.

FRAGARIA, & *Fraga maiora alba*, Gallo-belgis des Chapitons.
Hanc Angli & Belgæ alunt fructu duplo maiore, coloris non sanguinei, sed herbaceo luteo pallore
& candore confusis, cætera eadem prorsus.

FRAGARIA *sylvestris* minimè vesca, sive sterilis.
Strigosior tota: folia, flos, facies cunctaque similima; sed fructus spem suppleat herbidi conser-
tim stipiti acinuli, fragam pusillam, pallidam eminentes, asperigastus, & præsici. Ruptibus &
cautibus Cornubiæ ad cædes generosi viri D. Muli frequentissima, apud Belgas inuenti perfacilis cau-
tibus & syluosis Nervientis agri.


Vulgaris CARYOPHYLLATA.
Menses & sanguinis grumos propellit; obstructiones referat. Decoctum radicis ad rupta, & in-
terna vulnera efficac: concoctionem inuat. Colicos dolores à frigido ortos lenit. Venenis aduer-
sario.

Ge. in Plin. lib. 26. cap. 7. Radiculis tenues habet, nigras, bene volentes. Medetur non modò pæcoris
doloribus aut lætæ, sed & creditatis dicitur incundo lapore.

CARYO

CARYOPHYLLATA *in herb rotundifolia.*
Caryophyllata montana Matthioli.

Veronensis CARYOPHYLLATA *flora Santicula*
vsina. Cortaja Matth.



Quandā Caryophyllatæ raram & perelegantē speciē Italo semine ortā nihil dissimilē à Septentrio-
 naliū rotundifolia Caryophyllata nobis impertuit singularis amicus Petrus Coldēbergius rei herbarie
 doctissimus pharmacopœus, qui hâc in suo distillatio vireto alit, nisi folio quadruplo maiore, & radi-
 ce crassiore digitum æquante, minusque fibrosâ foret.

Veronensis CARYOPHYLLATA.

Articulorum & nerarum doloribus mulcendis, oleo amygdalino & rosaceo eius flosculi macera-
 ti commendantur Matthiolo.


IMPERATORIA. OSTRUTIVM.

Facultates ex Fuchio & neotericis.

Vnicè venenis aduersatur. Item pestilentia populariter grassantis arcet contagia. Lentorem pituiti. Tragus ca-
 toforum humorum incidit ac dissecat, quapropter * tussis quam frigus attulit, medetur. Crassa que ^{dem.}
 in thorace coeunt, dissecat, coloris corporis bonitatem ipsi quo vesicant, efficit. Concretum in cor- ^{* tussis gra-}
 pore lac & sanguinem resolvit. Stomachum esu corroborat. Pituitam ventriculi deiecit, & elangue- ^{stomat.} Tra-
 licentem appetitiam iuuat. Menses & urinam [†] ciet. Rabiosi canis morsu, aut serpentis icte liberat, ^{††} Trag &
 si contra folia vulneri indantur. Hypochondriorum virijs auxiliatur. Item lumborum doloribus. ^{†††} feris mor-
 * Carbunculos cum polenta tritum & impositum sanat. Cum vino potum rigores dissecat. Herba ip- ^{††††} sines & secū
 sa in vino & aqua cocta vulnera interna glutinat: & in summa omnia que Angelica vocata herba, & ^{†††††} destrahit.


* Trag. mitigat ischiadicis ac frigidis dolores, sudorem elicit, hydropem elacit, & emortuam
 genituram restaurat, id quod utilissimè credere & experiri certè poteris. Omnes tumores & colli-
 ctiones ac durities possunt hac radice aut succo eius incidit, deprimi ac sanari. Succus carnes putre-
 scentes, seu gangranosas erodit & absumit.

De 3. 1. 1. 1.



IMPERATORIA, OSTRUTIVUM, sine Afric.
 ita. Laserpitium Fuchs. Smyrniacum Tragi. Germ.
 Schaeffer Wurte. Belg. Meerster wortelc. Magi-
 strantia. Perperam Smyrniacum Tragi. Ligusticum
 Angul. Aduers. pag. 310.

PODACRARIA Germanica aut Belgica. Ce-
 rardi herba Dod. & Mechlinensium.
 Belg. Scraets crupt. Aduers. 311.



ANGELICA
 L. 264.



ANGELICA, Smyrniacum Cerdi. Ger. Kamp Kuechle.
 Gal. Belg. & Mal. Angelica. Aduers. pag. 311.
 Cajus niger nuper strax.

Radix venenis vnicē aduersari: quā si caput den-
 titus teratur, pestifera aëris contagia arceat, halitu
 grato, & iucundo, vitius excludit, etiamque eōra-
 ctum per vrinas & sudores à corde propellit eadē
 quā Rata, Theriaca & huiusmodi antipharmaca,
 rariore. Vrinas, menses & calculos pellit, pituitam
 crassam extenuat, asthmaticis dum regens est &
 humido plera, (ne expectando expectatio im-
 pediat) foras educendo, incidendo, & abster-
 gendo, potius. Crampas & cibi fastidium de-
 conuertit, ventriculi tonas, cordi curam. Illi-
 tu vero sanguis & eorum moribus suc-
 cedit.

ANGELICA *fol. Germ. 1316 Englisch. Advers. pag. 215.*
Phelandriem Flin. Guillelmo.

ARCHANGELICA.

Gallobelgic Angelicæ de Norrvegen.

Folijis est Satiug multò maioribus, atrociteribus, lanigine hamis fulis, aversa parte glaucis; primo pul-
 lulatu, rubris. Caulis nudis concavis alis, proceritatis humanæ imò rubens. In lata umbellia flores
 luteoli, & semen foliaceum Angelicæ satiore, maius & rotundius. Radix altè depacta, parum odora.
 Ex Nortuegia, Belgi in quilinam factam afferunt.

lego PANAX *Heracleum. Herculeæ sine Heracleæ fronde Smyrnijs vel Imperatoria.*
Advers. pag. 312.
Sphondylium alterum Dod.



lege, duùm enim cubitorum caule, lanigine
 quadam incano.

Floribus luteis.] nostris Belgij viretis flores albos
 promit; meminì tamen me vidisse Venetijs Pana-
 cem facie nò diuersam in Franciscanorum paradi-
 so luteis floribus.


Diosc. Excipitur succus incisa radice, recenti can-
 lym pullulatu. Ea candidum succum emittit, qui siccatu-
 in summi. cuto croceum colorem contrahit. Effluentem aut
 succum exprimunt, solijs excantato solo stratis, qua sicca-
 ta tolluntur. Simili modo caule mesibus inciso, profluentem
 succum eximunt. Meliores ex radicibus, alba, vigentes, di-
 stent, qz, sicca, que cariem non sentiunt, et omnia ser-
 uantes gustu. Fructus ex media serua cibo idoneus est. sed
 ex agnatis stolonibus, ab usu cibario abhorret. Maxime in
 hoc succi genere probatur, quam amarissimus, inter nò al-
 bus, aut subsulvus, foris ad croci colorem inclinans, lenis,
 pinguis, subtilis, tener, statim in aqua eliquescens, gratè
 odore. niger improbat, ac mollis. Adulteratur ammoni-
 co aut cera. Sed sinceri experimentum est. si digitis in aqua
 fratus resoluatur, & lactescat. Excalscit, mollior, & ex-
 tenuat. horribus febrium, circuitibusque, vultis, ruptis,
 laterum dolori, torminibus, illiicito vrina continet. cõ-
 tra vesica scabiũ ex aqua mulsã aut vino bibitur. menses
 trahit, fœtum enecat. inflationes qua vuluam male ha-
 bent, duritiãsqz, ex melle dilutus, discutit. ischiadicis illini-
 tur. acopis & capiti medicamentibus admiscetur. carbon-
 culos rumpit. palagrica, cum yua passa illitus subuenit.
 dolore dentium liberat, canis inditus, oculorum aciem illi-
 tu excitat. ex eo & pice optimum fit emplastrum contra
 bestiarum morsus, que in rabiem effragantur. Radix in ra-
 menta conscissa, vulua admodũ, partus extrahit, si vetera
 vlcera efficit, ax est. nudat. ossa, corpore operit. si trita cum

Opopanax.

Eadem Gal.

molle illinatur. Semen cum absinthio sumptum, menses pellit, cum aristolochia, prodest aduersus animalia qua vene-
 rari solentur contra vultu stranguitatus in vino bibitur.

Gal. Excalsfaciens, emolliens & digerens; ponatq; ipsum quispiam in calfaciendo tertij ordinis, in
 desiccando verò secundi. Cortex radicis exiccatorium simui & excalsfactorium est medicamentum:
 sed minus quàm succus. Quin & nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoque vtuntur
 ad nuda ossium & vlcera maligna & contumacia. Sufficenter eorum ista carnem procreant, selsi-
 cet abstergendo simul ac desiccando, nec ita magnopere calfaciendo. cur omnia ad carnem genera-
 dam necessaria sunt, velut in libris De curadũ ratione ostendimus. Fructus calidus & ipse est, ac
 mensibus mouendis medicamen accomodum.



PANAX
SIN-
CIS.



Caput PANACIS altera hinc, pag. 312.
sic restituendum.

Venatorum quidam peritiores, etiam Leo ille circulator, alebant & ostentabant quandam Panacis speciem fetulaceo caule, binum, ternum, & quaternum cubitorum, multos in ramulos superne divisos. Folia autem scabra, asperiora in singulis petiolis singula prodeunt, ampla, tharsi instar, plumatimue ex internallis æquis postu Pastinacæ, & folijs constans multis in vno petiolo obliquo, Africani ferme floris: Luteoli aut pallentes flores in umbellis Pastinacæ aut Bauciæ, quæ etiã assimilat tota planta, hirsutie incana, radice longiore, albida, nec ita dissimilis. In Veneris & Flandriæ hortis meminimus gustu aromatico, calfaciente, & digerente, gummeo, Opopanacum redolente: quare merito puteris, ut si qua alia, Panax legitima. Semine reperto in Opopanace in viridario stirpium exoticarum ditissimo Coldenbergij nostri feliciter enatam vidimus.

Costus spuria Matthioli.

Varietas.] Folio rotundiore, hirsutiore, breviora Pastinacæ, vulgaris sine Elaphobosci, odore potiore.

Silphium. LASERPITIVM.

Advers. 313. 314.

Diosc. Radix exallicit. in cibis egregè concoquitur. vesicae nociva. singillatim illita cum oleo, & strumis, ac tuberculis cum cera, modetur. ischiadicis

conuenit cum vino aut cyprino cerato. excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum praxine mali punice, & aceto decocta. venenis pora resistit. os conueniat, cibo aut salis permista. Laser è radice atque caule scarrificatis colligitur. præfertur autem rufum, translucent, myrrha amuluni, non porraceum, odore valens, suauem gustu. quod dilutum facile albescit. Cyrenicum si quis degnitatis, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore, adeo ut ne os quidem gustanti nisi paululum spirat. Medicum & Syriacum minus viribus valens, & magis virosum reddunt odorem. Laser omne antequam succescat adulteratur sagapeno, aut saba lomento, quod maleficium deprehenditur gustu, odore, visu, & dilutione. Ceterum aliqui silphium, radicem magnam, & folia massetou vocant. Effluacium laser, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet: insatiabilis facit, perundat cum aceto, pipere & vino alopecias sanat, oculorum aciem exacuat. incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat. caneris dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteis circumligatur, aut cum hyssopo, seu, coctis in posca, os colluitur. ijs prodest quos bestia in rabie efferata morosiderit, valere illius immixtum, valde aduersus venena telorum, & animalia omnia, qua virus ei aculuntur, potum aut illitum. scorpionum pleris oleo dilutum circumluatur. gonorrhoea præcedenti immixtum: & cum ruta, nitro, & melle, vel per se, carbunculis, elanos callosis, prius circumcirca per vicia, cerato aut archidami suauem carne pramollitum, recentis lichenas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, præputio, si iniquit dicitur, cum armento fetorio, aut sanguine illinatur. exuberantia cum scorsio exalbit. Veneris autem scarrificis spiratur. gressu, sudoreque inquelescentem vocem, dilutim aqua, sorbitione confectum expedit. vnam illitum cum melle reperimus. augnis ex aqua malsa velisimè gargarizatur. vescentes latiore colore magis, et, tussit, commadon subitilino datur, & plenitibus, in sorbitionibus in sellis suffusione, & aqua inter cutem, cum adhaes sic, honores discantia cum vino, pipere & thure potum. neruorum contralitionibus, opisthotonis, datur, oboli pondere deorsum dant. harentes gula hirsutines, gargarizatum cum aceto decutit. ad lic mens coagulatum bibitur. equitissimum ex aceto mullso proficit. metes dicit, cum pipere & myrrha potum: coliacos aduenat, in acino vna sumptum, cum licentia autem potum datur, repente conuulsi ruptisque prodest. ad potiones resoluitur, nucleus amaris, aut ruta, aut calido pane. Foliorum succo ad ement proficitur, sed multo inefficacius. cum aceto mullso manditur, ad expehendum asperum, maxime cum vna resudatur, eo cum lacte in vntur, exitq. in vicem ernea.

Diosc. Fertur & altera magnularis in Lybia nasci, radice laserpitio simili, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non proficit succus. Eiusdem cum lasere calcatis.

Gal. Silphij liqua calidissimus est: verum enim verò & folia & caulis & radix sat strenue exalbit. Sed omnia flatulentia magis et lenche sunt, ac proinde coctum distillat foris manen imponit, expori efficaciora. & omnium potissimum liquorem admodum tradentem flatulentiam possidens. Accretionem & excrescentias amouendi, & si quatuor vna quamdam propter propositam temperiem obtinet.

Levesia

LEVISTICVM. Germanicam Laserpitium.

Aduers. pag. 313.

Laserpitium Diosc. Geid. an Laserpitium Theoph.


Anguil. ? Gallobelgis, Liuelche.

Smyrniun Latana. Hippocelmum Matth.

SPONDYLIVM. Aduers. pag. 313.

Acanthum Germanica Fuchs.

Spondylium Diosc. Anguil.;



Legelin 39.
vires. & ibid.
quis. & paulo
post suat.

Levistici semen menses, urinas, & sudores ciet. calculum pellit. lienis fartus reserat: vulnera cogit. flatu dissipat. moribus serpentium imponitur. Scillacitius eius liquor aciei oculorum confectio prodicitur Dodonzo.

SPONDYLIVM.

Dioscor. Potum semen picuitam per alium extrahit. modatur iocinoris vitio, regio morbo, comitialibus, orthonocis, valuarum strangulationi. Veterinosos suffren reuocat. Cum oleo comode insunditur capitis phreniticorum, & lethargicorum. Item capitis doloribus cum ruta illitum. serpentina vicia cohibet. Datur radice contra regium morbum, & iocinoris vicia. Circumasa eadem & iniecta calidos fistularum derodit. Recentis floris succus, avulcorum aridibus, perulentisq; accommodatur. Qui ceterorum succorum more expressi, dein recondi solet.

'Gal. acris quippe & fecapris facultatis. 'Eadem Gal. 'Subactis Fuchsis. exliccat, incidit.



PANAX DIS-
ta.



Capit. PANACTIS altera huncum. pag. 312.
sic restituenda.

Venatorū quidā peritiores, et sic, Leo ille cir-
culator, aiebant & ostentabant quandā Panacis
speciē ferulaceo caule, biniū, ternū, & qua-
ternū cubitorū, multos in ramulos supernē di-
uiso. Folia autē scabra, asperiora in singulis pe-
tiolis singula prodeūt, ampla, tharsi initar, plu-
matimē ex internallis æquis postu Pastinacæ,
& folijs cōstans multis in vno petiolo oblōgo,
Africani fermē floris: Luteoli aut pallētes flores
in umbellis Pastinacæ aut Baucis, quā etiā assi-
milat tota planta, hirsutie incana, radice lōgio-
re, albida nec ita dissimilis. In Veneris & Flan-
diæ hortis meminitus gustu aromatico, cal-
faciente, & digereate, gummeo, Opopanacum
redolente: quare r. eritō puteris, vt si qua alia,
Panax legitima. Semine reperto in Opopana-
ce in viridario stirpium exoticarum diuissimo
Coldenbergij nostri feliciter enatam vidimus.

Coffus spurius Matthioli.

Varietas.] Folio rotundiore, hirsutiore, breuiore
Pastinacæ, vulgaris sine Elaphobolci, odore
potiore.

Silphium. LASERPITIVM.

Adact. 5. 13. 312.

Diosc. Radix exarscit. in cibis agrē conco-
quitur. vesica noxia. sugillatis illata cum oleo, & stria-
tis, ac tuberculis cum ceruo, modetur. isphiadis

conuenit cum vino aut cyprino terato. excrescentibus circa sedem tollendis illinitur, cum putamine mali punici,
& aceto decocta. venenis pota resistit. os commendat, cibus aut salis permista. Laser è radice atque caule sca-
rificatis colligitur. præsertur autem rufus, translucens, myrthe amulium, non porraceum, odore valens, sicut
in gustu, quod dilutum facile albescit. Cyrenaicum si quis ægustauit, humorem toto corpore ciet, blandissimo odore,
adē vt ne os quidem gusti nisi paululum spiret. Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virosū
reddunt odorem. Laser omne antequam siccet aduicratat sugapeno, aut saba lomento, quod maleficium depre-
henditur gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliqui silphium, radicem magdalinam, & folia masticem vocant.
Efficacissimum laser, mox folia, postremū caulis. Acrem vim habet: inflationes, scilicet, peruncias cum aceto, pipere & vino
alopexia sanat, oculorum aciem exacuit, incipientes suffusiones, illatum cum melle, dissipat. taurum dentium in dolo-
re induit, aut cum thure in intes circūligatur, aut cum byssopo, sic, coctis in posca, os colligitur. is prodest quos
bestia in rabie efferrata moritur, valueribus humisum, valet aduersus venena telonū, & animalia omnia, qua vniu-
ersaliter, potum aut illatum, scorpionum plaga oleo dilutum circumluitur. gan roni præcipua cura in miltum: &
cum rata, nitro, & melle, vel per se, carum, ubi, elanos callosa, primum in carna, & deinde in vino, terato aut aridopani sicutum
carno promoluitum, recentis hibernas ex aceto sanat. Et excrescentia in carne, & in os, & aliquot diebus, cum aceto
mento siccato, aut arugine illatur, extirpantia cum fofice extrahit. Vereribus sicutum scabrum, & caput, & gant,
sicutumque in canescentem rotam, dilutum aqua, sorbitione confectum expedie, vnam illam cyranelle repitum, ar-
nis ex aqua mulsa vtilissimū gargarizatur, vesicentes latiore colore in praeputio, tuffi, commode in foras uno datur, &
pleuritis, in sorbitionibus in sibus suffusione, & aqua inter cutē, cum aridopani horvortis discaris cū vino, pipere & elu-
ro potum, neruorum contr. ell. omibus, opisthoracis, & datur, oboli pondere decorandum, herentes gula hradinet, garga-
riturum cum aceto decurit, ad lac intus coagulatum bibitur, conitias in ex aceto mulso proficit, melle, & det, cum pi-
pere & myrrha potum, caliacos aduertit, in aceto vna sumptum, cum lixido autem potui datur, & sponte contulit
ruptisque prodest, ad potiones resoluatur, nucibus amaris, aut vna, aut calide pane. Falorum succo, ad ead. ad profici-
tur, sed multo inefficacius, cum aceto mulso mandetur, ad experendam arteriam, in vna cum roni rati, &
cum lactis pntur, exit, in vicem erit.

Diosc. Fertur & altera magdalis in Syria nasci, radice leserpicio similis, sed minus crassa, acris & fungosa,
ex qua non proliu succus. eiusdem cum lasere sicutatis.

Gal. Silphij liquor calidissimus est: verum enim verū & folia & caulis & radix sat siccioris, excocta, & gargarizata.
Sed omnia sanantia magis essentia sunt, ac proinde cocti difficilia: Foris tamen in miltum, &
potest efficaciora, & omnium potissimum liquor admodum tractatam incantatem possidens. Ad arteriam
& excrescentias amolendi, & ligandi vna quandam propter proprietatem temperiem obtinet.

LAVERA

LEVISTICUM. Germanicum Laserpitium.

Advers. pag. 313.

Laserpitium Diosc. Guid. an Laserpitium Theophr.


Angul. & Gallobelgis, Lincléne.

Smyrniun Lacuna. Hippocistum Matth.

SPONDYLIVM. Advers. pag. 313.

Acanthus Germanica Fuchs.

Spondylium Diosc. Angul.;




Legelin 11.
vini. & ibid.
quis. & paulo
post sume.


Levistici semen menses, urinas, & sudores ciat. calculum pellit. lienis farctus reserat: vulnera cogit. flatus dissipat. moribus serpentium imponitur. Scillitius eius liquor acici oculorum confecte proditur Dodonæo.

SPONDYLIVM.

Dioscor. Potius semen pituitam per alium extrahit. medetur icterici vitii, regio morbo, comitialibus, or. hoptois, vulvarum strangulationi. Veteranos suffiu reuscat. Cum oleo comino de infunditur capitibus phreniticorum, & lethargicorum. Item capitis doloribus cum ruta illitum. terpenia vlcera cohibet. Datur radice contra regiam morbum, & icterici vitia. Circumasa eadem & iniecta calculos fistularum derodit. Secantia floris succus avulcerat acie auribus, purulentia, accommodatur. Qui caeterorum succorum moris exprimi, dein rocondi solet.

'Gal. acris quippe & secantis facultatis. 'Eadem Gal. 'Subactis Fuchsis. exsiccat, incidit.





Libanotis
Majior.



LIBANOTIS Theoph. Advers. pag. 313.
 SESSELI Aethiopicum herba Dod.
 Seseili Aethiopicum Matth.
 Daucus secundus Fuchs.

LIBANOTIS Theoph. minor.




Varietas. Foliis magis carnosis, rotundioribus
 amplioribusque nitentibus, semine cristato, Lu-
 tenia nullam alant vireta Belgica: caetera similia &
 reapse vna.

LIBANOTIS Theoph. minor.
 Panacis species normalis.

Altera foliis exilioribus multo Savignag Veneta
 proxima, gemino situ Panacis altere situ, sed oris
 tumillius arenatis & laciniatis: caulis bicubitalis
 & procerior. Semen Anethi, candidum: Flores in
 umbellis albi. Radix aromatica, grati & incundi
 odoris.

CORIAN.



CORIANDRUM. *Linnaeus, p. 29. 314.*
Angl. Coriandry, & Collandry. Belg. & Germ. Co-
liander. Hiff. Culantro, & Celiandre. Gal. Co-
riandre. Lusit. Coentro. Ital. Coriandolo.

DIOSCOR. Coriandrum vim refrigeratorem ha-
 bet. Quare illud cum pane aut polenta, ignibus sacris, &
 vlceribus quae serpunt, medetur. epiphyttidas cum melle vel
 vna passa, testium inflammationes, carbunculosq; sanat.
 cum faba fresca, strumas & tubercula discutit. tinea inter-
 raneorum expellit semen, cum passo potum. genitricem ad-
 auget, largius tamen sumptum, mentem non sine periculo
 mouet, quare continuo, & copiosiore vsu abstinendum. Suc-
 cus cum cerussa, sulphure argenti, necnon aceto, & rosa-
 ceo illitus: ardentes summae cutis inflammationes emendat.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

Gal. Coriannon, siue Corion, aut vtrunque vo-
 care lubet. Vetusiores Graeci Coriannon * nomi-
 nabant: at recentiores medici omnes Corion ap-
 pellant, sicut & Dioscorides, refrigeratorem ef-
 se herbam ipsam dicit, sed perperam. Siquidem
 ex contrariis facultatibus constat & composita est,
 plurimum habens essentiae amarae, quam ostendi-
 mus esse tenuium partium & terrenam. Nec parum
 etiam aquae humiditatis obtinet, quae repentina est
 facultatis: his adiunctum est quoque adstrictionis
 pauillum. Ex quibus omnibus variè quidem agit
 ea quae scribit Dioscorides, sed non tantum ex re-
 frigeratione. Caeterum ego cuiusque particulatim
 actionis causam enarrabo, tamen si propositum fue-

rat mihi vnus duntaxat hoc in libro sententiam expromere, sed fortè nihil obstabit: imò, si verum fa-
 tendum est, proderit non nihil, superiores methodos, quae * in paucis medicamentis sunt dicta, hic re-
 perere. Primum ergo non Dioscorides tantum, sed & alij complures medicorum indeterminatè de
 morbis pronuntiant, sicut sanè hac quoque tempestate non paucos inuenias medicos, vel insignes, præ-
 ter alia, hac in re turpissimè hallucinantes. Interdum enim atra, iuuada, frigidaque reddita parte quae
 erysipelas habuit, nec amplius refrigerantia poscente pharmaca, ceu antea, sed ea quae influxum pari
 præter naturam humorem vacuant, quidam tamen refrigerare perseverant: alij ad digerentia qui-
 dem transeunt, caeterum ea erysipelas sanare dicunt. Quanquam scribant, incipientibus etiam dum
 atque ghscentibus crescentibusve erysipelatis alia esse medicamenta, alia verò iam declinantibus
 ac flaccescentibus. Sed ita res non habet. Neque enim erysipelas etiam vocari debet postea quam in-
 flammatio eius & seruit, ac biliosum illud abierint: neque quae facultate sunt frigida, neque * quae illa
 sanant, remedio esse putandum: sed velut si vel in initio prouisus aut percussus, aut alia de causa quatuor
 tumor in parte quapiam aut iuuada, aut niger extiterit, eum esse frigidum affectum existimabis, & quae
 digerant excussantque medicamenta poscite: ad eundem, opinor, modum si calida affectio in fri-
 gidam reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda posita: aut si displicet no-
 minis mutatio, saltem sicut quidam alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud amplius
 frigida esse autumantes declinationis remedia: concedendum sanè est, si cui ita placet, vt talis affe-
 ctio etiam erysipelas vocetur, sed eam etiam calidam dicere vbi iam refrigerata est, id verò neuti-
 quam concedendum. Itaque ne quod tunc ei auxilio est, refrigeratum esse credamus, sicut Dios-
 corides Coriandrum, qui cum pane aut polenta: erysipelas curet illud. Nam quod ad vnguentum est
 erysipelas, quod vtiq; inflammatum est & fluxum, haud vnquam sanare queat cum pane coriandrū,
 sed illud quod iam refrigeratum est. Proinde nos superioribus voluminibus, cura determinata ac desi-
 nna experientia cuiusque medicaminis facultatem explorandam censuimus, quam maximè fieri pos-
 set simplicissimum eligi affectum consulimus. At plerique medici neque quod vel plurimi morbo-
 rum protinus ab initio compositi inuadant, norunt: neque quod alius affectus sit erysipelas exactum,
 alius verò is qui vocatur ab omnibus nobis vltatè, vt à veteribus quoque phlegmone; alij autem inter
 hos medij plurimi, partim vt sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelate dicit.
 Ac inuentas nonnunquam vbi neutrum vincat: sed ad vnguentum paria sunt. Quinetiam nonnunquam

* ad hunc me-
dum.

* neque hu-
iusmodi.

* vt ipse in-
quit.

oedemacodes esse erysipelas conspicitur, sicut aliud scit rhodes: ut compositorum morborum non parvus aceruatur numerus. De quibus copiosius cum alibi differimus, tum in curandi rationis voluminibus. Dicitur autem & nunc quoad saltem eorum meminisse necesse est, quod exactum erysipelas haud vaquam ab antedicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum à biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quod longè à refrigeratione abist coriandrum, vel ex iis quae ipse scripsit Dioscorides, discere liceat. Nam chœradas siue strumas cum eregmo siue lomento, inquit, * discutit. Porro quod nullum refrigerantium medicamentorum idoneum sit † discutiendis chœradibus, vel ipsum Dioscoridem non dubitaturam arbitror, quippe qui sexcenta scripserit medicamenta chœradas sanare potentia, quae omnia tum temperie calida tum actionibus digerentia esse confessus est.

* discutit.

† iterum.

Sethus: Stomacho bonum est, & eundem corroborat. Cibos in ventriculo donec probè concoquantur retinet. Tostum igne ventrem sistit. Prodest ad phlegmonas & calidas temperaturas. Sanguinis profluvium porum, & si imponatur, compescit. Cum vino potum, lumbricos educit: immodicus tamen eius vsus delirium facit. Huius etiam succus potus venenum est & occidit. Qui enim hunc bibunt, muti fiunt, & desipiunt.

Innoxium esse certum se habere nobis asseruit D. Dionysius Thomas Lusitanus apud Antuerpienses Medicus doctiss. qui eam virentem Cerefolij & Selini ritu iusculis suis & suorum inseruerit, nullo percepto incommodo.

CORIANDRUM alterum, minus odoratum.





Ita folia habet minutius facia, & semen habet, copiosum in partibus spithameis procerum, & est vultu, & his. Alicitur in horto Jacobi Platana stirpem exsiccatam solidissimam, perissimam, & sic conservantur.

SALINON

SELINON, *sive Apium hortense. Aduers. pag. 314.*
Petrofelinum Guilandini & Angul.
Ger. Petersüßgen, & Petereln. Belg. Peterfelle.
Gal. Persil. Hisp. Perexi. Ital. Petrofelino.

ELEOSELINUM, *sive Paludapium. Aduers. pa. 315.*
Angl. Smallage, & Mariche. Ger. Epflieh. Belg.
Zoufrouw merck, & Eyne. Gallobelgis, De
l'Appo, & Gal. Alche. Hisp. & Ital. Apio, &
Perexii dagea.



Dioscor. Hortensis apij herba ad eadem ad que Corianum conuenit. inflammationibus oculorum, cum pane aut. polenta illinitur. astuantem stomachum mulcet. mammarum duritiam ex lacte concreto contractam: reseruit. yrinam cicat, siue cridum, siue co. Tum edatur, decoctum eius radiceq. potu, venenorum uoxa resistit, quoniam vomitiones excitat. alacritatem cohibet. Semen ybementius yrinam pellit, contra serpentium uenena, aut epuram argenti spumam aueritatur, infusum oscentur. admisceatur medicamentis qua dolorum lenamenta praestant, tiberiacis quoque ac iustis remediis.


Gal. Selinon usque adeo calidum est, ut & yrinam & menses cicat. flatus quoque discutit, & magis semen quam herba ipsa.

Dioscor. Eleoselinum in humidis nascitur satius grandius, & ad eadem efficitur.



OREOFELINVM. *sive Petroselinum.*
Aduers. pag. 315.

PETROSELINVM *Macedonicum.*
Aduers. pag. 315.
Angl. Steen perleip. Germ. Steen Epflisch. Belg.
Steen Eyppe. Gal. Asche des rochiets. Hist.
Apio que crece en las piedras.



Diosc. *Vinam ciet, semine ac radice in vino potis, mensos trahit, antidotis, nec non medicamentis vrinam ciantibus, & excalectoris, inseritur. Nec hallucinari nos oportet, existimantes oreoselinum esse, quod in saxis provenit, aliud enim est petroselinum.*

Gal. *Similis Selino vis est oreoselini & Hipposelini: verum Hipposelinon imbecillius est, Oreoselinum valentius.*

Dioscor. *Petroselinum in Macedonia provenit, in praeceptis locis, semine animis, odoratiore, sapore acri, aroma olente. Vrinam ciet ac menstrua, contra stomachi & coliculationes & tormina prodest, laterum, renum, & vesicae doloribus in potu subvenit, admiscetur antidotis vrinam ciantibus.*

Gal. *Petroselini semen maxime vlti est, cum tota citius herba vna cum radice similem, sed imbecilliohem, facultatem sortitur. Est autem vt gustu acrum cum amaritudine, sic & in operibus calidum, vna cum incidendi effectu. Hinc menses & vrinam affatim provocat: est & flatus discutiens. Facit itaque & ipsam tertij ordinis tum excafacientium, tum desiccantium.*

HIPPOSELINUM, sive *Olasarum* Diosc. *Advers.* pag. 315.

Macedonicum Belgarum, Græcorum nuperorum & Matthioli perperam Smyrniacum.

Hipposeelinum Cordi, Marcelli Lacuna & Brasavoli. Angl. Alexandrie. Germ. Grolz officin.

Ital. Smirnio, & macerone. Hisp. Apio Macedonico, sed perperam.

Dioscor. Radix cruda coctave estur. Folia cum caulibus decocta manduntur, & per se, aut cum piscibus preparantur, crudaq; muria conduntur. Vm hanc habent, vt pote semine ex mulso vino menses ciant: algentes calfacit potu, aut illatu, vrina stillicidio auxi iatur. Radix eosdem praestat effectus.

* Anglis & Belgis ad eadem hodie vsus plurimus.

SMYRNIUM. *Advers.* pag. 316.

Gal. Smyrniacum de Candia ou Crete.


Ital. Smyrnio di Candia.

PASTINACA domestica vulgi. *Advers.* pag. 316.

Gal. Pastinades. Belg. Pastinaken. Germ. etiam

Pastinachen, & Pastenep. Hisp. Pastinagues, &

canahoria blanca. Ital. Pastinaca domestica.



De Pastinaca
Diosc. proxime
cum
Creticum.

Dioscor. Vis radice, herba, & seminis excoalsacere. solis muria maceratis ad obscurum recidunt. cinapi si sunt. radicem contra serpentium illis bibere convenit. tusses & orthopnoeas mitigat. vrina de sicut ac moderat. vices res smores, collectiones, duritiaq; discursu illa, vulnera ad cicatricem perducit. partus abortu vincit. si serues acta submittitur. Semen, lienis, rumm & vesica vitis prodest. menses & secundas pelit. commune datur tuchidit in vno. in flatuones sem. nihilis. fulores ciet. & ructus. peculiariter datur bydropicis in potu. & contra febrim circuitus.

Lege floris
tutelis.

Gal. Eiusdem generis cum apio & petroselino: fueritque apio euidem validius, petroselino autem inbecillius. Plura ferè eadem quæ Diosc. Gal. & Plin.

SMYRNICIDES Mutoni.

Semine Smyrnij rotundo, folio nigriore & minore. è caule cubitali. flos in umbellis pallentibus aut albis. Radix longa & alba, guttu haud aromatico vt Smyrniacum. A similitudine Smyrnioidem dixit Mutonis, penes quem viret in horto.

LIGUSTICUM. *Aduers. pag. 316.*

DIOSCOR. Radicis feminis, vis exalfactoria, & concoquens. prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiores, item ad inflationes, praesertim quibus stomachus turgeat. & contra serpentium ictus. Urinae & menses potius trahit. Eisdem praesertim effectus appositae radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur. nisi perquam vile. quare pro pipere videntur et indigena, ad obsoria. Adulteratur semine quodam simili quod facile gustu discernitur, amarum enim est. Alij semen feniculi aut fesculae admiscentes, ligusticum dolo vitiant.

† Gal. Adeo calfaciunt, ut & menses cieant & urinas prouocent, flatulque discutiant. Calida & sicca ordine secundo.

BAUCIA, an Elaphobosium? *Aduers. pag. 317.*

DIOSCOR. Elaphobosci radix eius apta, dulcis. Caulis tener pro oleo mandatur. Contra serpentium ictus, datur semen in vino. Fama autem est, hoc pabulo, ceruas serpentium moribus resistere.

Gal. Facultatis est exalfactoriae & tenuium partium, ac proinde exicatoriae secundo maxime excessuum ordine.

SISARUM *Aduers. pag. 317.*

Gery. Siclin. Hist. Cheriua.

PASTINACA marina. *Aduers. pag. 317. & 318.*

Crithmum 2^o. Matth. Crithmum spinosum Dod.



DIOSCOR. Suis eius elixa Sifari radix, stomacho vtilis, vris amicit & appetentiam excitat.

Eadem Gal. & Aegin. Semen tenue est & discussorium, validumque: idcirco his quos singularis & tormina male habent, cum vino exhibetur.

Plin. Siler erraticum satino simile est & effectu. Stomachum excitat, fastidium discutit. Ex aceto laesepitiano sumptum, aut ex pipere & mulso, vel ex gero urinam ciet, ut Option credit, & venena. Praeterea cordi conuenire conualescentium, aut post multas vomitiones perquam vile. Hieracides contra argentum vivum dedit, & veneri subinde offensanti, argenteo se recolligentibus. Satini praesertim locis cum lacte caprino potus est ita iuuat.

THYSSELINUM Plinij. Sylva Pl. Valerand.
Peperum Meum Batavia & Antuerpiensibus.
Apium syl. Dod.

Thysselinum Plinio capite 12. libri 25. non est dis-
simile Apio, cuius radix commaducata purgat ca-
pitis pituitas.

Ad hanc sanè plantam facie & viribus proximè
accedere videtur hæc, qua officinæ Antuerpien-
legitimi Mei ignoratione pro Meo usurarunt. A-
pio enim Pastinacæ agræ & summis folijs Cori-
andri adeo propinqua, ut multi etiam hodie Apium
tylucstre dixerint. Caules inanes bicubitales è ra-
dice Mei ritu humi depacta, digitum & unciam
crassa, lacteum succum dum vulneratur funden-
te. Umbellæ Anethi lunio & Iulio: flosculis can-
didis defluentibus semen compressum foliaceum
Anethi maius & rotundius, gustu aromaticum &
feruens. Vdis Batavorum agris iubens oritur, &
Brabantie locis nonnullis alitur etiam in hortis.

BARBICAPRA & Vlnaria vulgi. an Rhodora
Plin. lib. 24. cap. ultimo. Germ. Wald Geisbaert.
Ital. Crostofanaria. P. nomen Brunselsij.
Aduers pag. 318.

Barba capræ radix pota, refrigerat & adstringit
gustu. eoque ventris fluores, & sanguinis sistit. flos
ex vino albo potus quartanario: inuat. Rizotomi
carpis appositam manibusque subactam febrile
æstus finire assentunt.

CENTAVRIVM maius alterum.

es orig. turkish
dela cerro
uulgo jupiter
toca



CENTAV-
RIVM ma-
ius.



CENTAV-
RIVM ma-
ius varie-
tas.



CENTAURIUM *maius*. *Hisp.* Rapontico vulgar. *Fr.* Centauria maggiore.*Aduersf.* pag. 318.

DIOSC. Radix cum adstrictione aliqua & dulcedine acris. Conuenit, inquit, radix ruptis, conuulsis, pleuriticis, spirandi difficultati, veteri tussi, sanguinem exuentibus, non febricitantibus cum vino; febricitantibus cum aqua drachmarum duarum pondere exhibitae: item & ad tormina, ac ad vteri dolores. Ducit etiam menses affectus collyrij forma vtero imposita. Est & vulneribus idonea, recens tusa, aut arida prius madefacta contusaq; coniungit etenim ea, ac glutinat. Quin & carnes coalescunt, si contusa simul decoquantur. In Lycia succum exprimunt, quo pro Lycii videntur.

GAL. Centaurij magni radix sicuti gustu contrarias qualitates, ita in vsu contrarios effectus praestat. Secundum omnium autem qualitarum actionem ruptis, conuulsis, dyspnoeae & inueteratae tussi conuenit.


APVL. Ad hepatis dolorem: herba Centauria maior in vino decocta & potui data, mirifice auxiliatur.

Ad splenicos: herba Centauria maior in vino decocta & potui data, splenem perfanat. Nos ipsi experti sumus.

CENTAURII *maioris* *varietas*.*Aduersf.* pag. 318.

Est & haec perquam similis Centaurio & penè par, qualibet sui parte superiori & imae, quam olim in hortis alebāt generosus vir D. Dilsius & Guilielmus Driesch pharmacopaeus peritissimus. Virentia ampla admodum sunt folia Runicis, ambitu serrata. Flos luteo purpurascens pallens, & semen Coici simile & par in turbinato & squamulis loricato capitulo.

Collibus lapidosis iuxta Tagum duntaxat spontè natum inuenit C. Clafius.

OTHONNA *Italorum*. *Aduersf.* pag. 318.*Ger.* Indisch biummen. *Gall.* Oilletz d'Inde.*Ital.* Garofano Indiano.*Tanacetum Peruvianum Cordi.***OTHONNA** *maior polyanthos*.*Aduersf.* pag. 318.

Ex graui foetidoque odore venenata vires, quale: Lycocastei Galeni proditur, quo utebatur Centurio ad articulorum dolores. Folem huius flore caeco permixto emoruum fidus testis est D. Bongos.



VALERIANA maior. *Hisp.* Yerua benedicta. *Ital.* Valeriana maggiore.

Diosc. Excalfacit. urinam mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem prestare potest. ad lateris etiam dolorem efficax. menses cit. antidoris inseritur. Acriteratur radice visci admista: sed maleficium deprehenditur: quoniam hac dura est, & frangenti consumax, sine vlla odoris gratia.

Ad epidemicos, pestiferos, & venenatos morbos, pota & olfacta, prestans viribus radix. Pectoris vitijs medetur; vulneribus ferruminandis efficax.

Nardo viribus similis Gal. sed infirmior ad multa. urinam plus mouet quam aut Indica aut Syriaca Nardus.

VALERIANA minor fl.
Aduers. pag. 319.



VALERIANA flaccidior.
Aduers. pag. 319.

Ruptis, vulsis, ex astro deaclusis nupetorum experimentis opem fert. Decoquuntur folia ad aphthas & oris vlcera. Antidoris item inseritur.



Pny minimum alceum.

VALERIANA
peregina
Belgarum.
Aduerf. 319.
Valeriana
Graeca, Dod.



PRAMPINELLA, aut Bipi-
nella. Aduerf. 320.
Syderitis
Anguillare
de Golland.



SANCTI
SOPHIAE
in maiori
ue Purp
nella. Ad
uerf. 321.



PHY minimum alterum. Gallobelgicis, Saliade de Chanoine. Welt troppen Belgarum.
 Quasi dicas Lactucam campestrum, quia folia primo pullulatu habet lactucis aut seriolis adhuc renellis similia, & in Quadragesima cibo & acetarijs expetatur lactucarum more. Frequentissima in agro Antuerpiano. Ros, & radix Monspeliacam æmulatur: folia minus laciniata.

MONTANA *Nardus*. *Aduersf.* 320.


Diosc. *Ad eadem qua Celtica, efficac.*
 Galeno prædictis debilior est.

Monspeliensium *PHYTEUMA*. *Aduersf.* 320.

Diosc. *Ad amatoria convenire, nonnulli scriptum reliquerunt.*

BIPINELLA *saxifraga hircina minor*. *Aduersf.* 321
Thalictrum Rondellij.
Natrix Plin. Guil. & Angul.

PIMPINELLA *maior Fachs. Saxifraga magna.*
Belg. Weurenarctt.



Non secus ac Eringij radix conditur ad iuvandam concoctionem ventriculi, & viscerum. Colicis affectibus, diurnæ febrî, convulsis comitialibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Urinas cieturæ, secundas & tertias moruos pellit. Pota ex aceto magnæ commendationi. ad pestiferos morbos: notatis & viceribus forditis succo: & folia comm. ad illucatur. faciem absterget & defardat, lentigines delet. Dentibus atritia pisit. in elicti; eoque dentium doloribus mulcendis, apoplecticis & convulsis prohibetur.

Minor saxifraga folijs rotundioribus Pimpinellæ proximis in agro Britannc & Belgio,


DAV.



DAUCVS *Selinoides secundus.*
Aduers. pag. 323.
 Rosmarinum siue Libanotis prima Theoph. fo-
 lio Apij palustris. Ital. Valdebona vulgè & Saxi-
 fragia Venetorum.

DAUCVS *secundus Selinoidis varietas. 321.*
siue Selinoidis Cordis.
 Pessimilis omni sua parte; sed minus exilius: in
 syluis Nerulo proximis oritur.

AMMI *Crescum aromaticum.*
Aduers. pag. 323.



In homo
 Coddent
 qui lipore
 Passione
 sunt de an.
 m. v. c. p. a.
 uent.

lege hanc
 in v. n. o.
 p. 323

AMMI per-
 pusillum.
Aduers. 323.



AMMI *Diose.*
 Dioc. Vis ei excalfactio, seruens & exsiccat.
 Facit ad torpore, vira difficultatem, serpenti v. h. s.
 cum v. o. potum. Menstrua ster. n. s. c. m. d. e. r. o. d. e. n. t. i. b. u. s. e. t.
 thari in medicamentis, e. v. a. e. d. o. r. i. a. v. o. c. a. n. t. u. r. e. t. i. n. d. e. e. x. a. n. t.
 vis difficultat. u. r. e. s. t. i. a. t. & Sugillat. cum nigelle e. d. e. *
 lit. colorem notu aut illu. m. e. t. a. t. m. t. p. a. l. b. o. r. e. m. S. u. s. t. e. n. t.
 cum v. o. p. o. s. s. e. a. u. t. r. e. s. i. n. a. v. i. n. a. s. p. u. r. g. a. t.


Colidum & siccat in sine terraj ordinis Gal.
 tenuem partem gustu subamarum & acre, &
 clarum est si od. digerat. & v. i. n. a. m. m. e. r. e. a.

Vulnus purgat, Subdit Plein Tradunt facilius
 concipere eas, que odorem id per coitum.

AMMI

AMMI vulgatus, an Eudoniam Hippocr. in mor-
bis mulierum Guil. Aduers. pag. 321. 322.

ANISVM, Angl. Anise & anise.
Aduers. pag. 322.




ANISVM.

Diosc. Anisum in summa excofacit, exccat. oris halitum iucundiorcm facit. doloris leuamentum praest. vri-
nam ciet. aquam qua subijs cutem, dissipat. potum siccum cohibet. animalium venenis aduersatur. valet ad inflatio-
nes. aluum & alba semen irum profusus sistit. Lac ad mammas † elicit. Venereu stimulat. Dolores capitis lenat, sus-
fitum naribus: cum rosaceo tritum in illatumq; sacris auribus medetur. legit dissipantibus & se-
me emittentibus.

† Sethus eadem, & obstructions tollit.

Plin. subdit: Praecipuum autem est ad ructus, idem inflationibus stomachi, & intestinorum torminibus, & colicis medetur. Singulus & osfactum decoctum potumque inhibet. Potum somnum conciliat: calculos pellit. vomitiones cohibet & praecordiorum tumores. Et pectorum vitijs, nervis quoque quibus succinctum est corpus, vtilissimum. Prodest eius & capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. Non aliud vtilius ventri & intestinis putant, idem dysentericis & tenasis datur tostum. Dalion herbarius dedit bibendum cum anetho parturientibus. Phreneticis quoque illinitur recens cum polenta. Sic & infantibus comitiale vitium aut contractionem sentientibus. Pythagoras quidem negat corripit vitio comitali in manu habentes, idemq; quamplurimum dormi serendum. Parere quoque facilius osfactantes. Sosimenes contra omnes durities ex aceto vsum est. Semine eius potu, lassitudinis auxilium viatoribus spondit. Strangulationes valuae, si rursus ducatur & linatur calidum, vel si bibatur cum castoreo in aceto & melle, sedat. Vertigines a partu cum semine cucumeris & lini pari mensura tritum digitorum. vinalibi tribus cyathis, discatit. Cum vino sudorem leuiter praestat. Oleam stillatum ad omnia efficacius.



lege **DAUCUS** Cretensis.
Aduers. pag. 323.


Eadem Gal.

Diosc. Omnium semen excoactum potum, vrinam, menses, & partus extrahit, torminibus liberat: veterem tussim mitigat, phalangiorum moribus potum in vino, auxiliatur, tumores illius discutit. Seminibus duntaxat in alijs generibus inualuit vsus: in Cretico, etiam radice, qua maxime contra venenatorum iniuriam in vino bibitur.

Plinius addit: Datur quadrupedibus percussis, capitis dolori medetur. Eius radix in vino pota, dysenteriam sistit, contusis & euersis potum duobus obolis, in multis cyathis tribus subuenit; aut si febris adsit, in aqua mulsa. Calculos eijcit: folia omnia tela infixæ corpori extrahunt.


Sifer Lacu-
nar.

PASTINACA Diosc. **CAROTTA** syl. vulgi.
Belg. Wilde Caroten. **Daucus** Offic. Ital. Pastinaca saluatica. Hisp. Canahoria saluage. Ang. Wilde Carot. Aduers. pag. 323.



PASTINACA
facua Diosc.

DAUCUS
Theophr.
Germ. Gel
Ruben
& Gueltem
pastinac
Belg. Gel
peet & Gel
woortelen.
Gall. Pasti-
nades & Co-
rottes
acc.



DAUCUS sylvestris officinarum.

Marsili.

Num Pastinaca sativa vulgaris nostras, non Diosc. è Bauciae Arabum siue Campestris vel sylvestris femine nata, sit Dioscoridis ELAPHOBOSCUM? & contra, nū potius CAROTTA syl. siue Daucus officinarū, & CAROTTA sativa, sit Dioscoridis PASTINACA syl. & sativa, folio Gingidij, subamaro, umbella Anethi, flore candido, in cuius medio exiguum quiddam cernitur colore purpureo, ferē ad croceum accedente? cuiusmodi affabrē exprimuntur in floribus Carottæ: flores autē Pastinacæ vulgi, Intei sunt, quales Elaphobosci esse debent. Radicis magnitudo, demensuræ nihil obstat, cum collibus & calidioribus regionibus sponte enatam palmaribus cauliculis & exili radice euulserim: cultu verò & mangonio altius Cichorij modo, quinque aut sex pedum longitudine pangatur.

Diosc. Radix cocta manditur. Semen potum vel impositum, menstrua mouet. h̄s conuenit in potione, quos vrina difficultas torquet, aut lueratis dolor excruciat, aut si aqua cutem subiit, serpentium moribus icibusque prodest. praesumens id nulla affici iniuria à serpentibus traduntur. conceptus adiuuat. Radix vrinam pellit. venerem stimulat. partus apposta, eicit. Folia tria, & cum melle imposita, phagedænas vlcera purgant. Satiua ad eadem pollet, inefficacior tamen, & cibo aprior.

Eadem Plin. & Gal. Sylvestris ad omnia potentior. Habet etiam absterforium in se quippiam: quamobrem pascentia vicera quidam folijs eius cum melle, quò pura reddant, illinunt.

Plin. Erraticæ Pastinacæ semen contritum, & cum vino potum, tumentem aluum, & suffocaciones mulierum, doloresque lenit in tantum, vt vuluas corrigat. Illitum quoque è passo ventri earum prodest. Viris verò cum panis portione æqua tritum. Ex vino potum, contra ventris dolores. Pellit & vrinam & phagedænas vlcera sistit, recens cum melle impositum. Vel atidæ farinæ inspersam radicem eius Dieuches contra iecoris & lienis, ilium, lumborum & renum vitia, ex aqua mulsâ dari iubet. Venerem stimulari hoc cibo certum est: idè conceptus adiuuare aliqui prodiderunt. Radice eius circumscalpti dentes, dolore liberantur.



PASTINACA sativa atrorubens.

DAUCUS nigri Theophrasti. Belg. absolutè Caroten. Gal. & Gallobelgic Pastinades & Carotes rouges.
Germ. Rot Ruben & Pestinep.



CARVM. Angl. Carawayes. Belg. Suettepeen.
 Germ. Feld Baumig. Hisp. Alcarouca.
 Advers. pag. 323.

GINGIDIVM folijs Banca Syriacum.



Diosc. Cari semen excofacit, urinam concitat, Stomacho vile. Os commendat, concoctionem adjuvat.
 Utiliter miscetur antidotis & oxyporis, anisi vicem prebet. Radix cocta & asinata modo, in anatis.
 Flatus extinguit, & urinas ciet, non semen modò, sed & planta. Gal.

GINGIDIVM.

Diosc. Ovis hoc crudum, coctum, conditum estur magna stomachi utilitate: urinam ciet. Decoctum
 ex vino potum vesica prodest.

Gal. Gingidium sicut gustu amaritatem & adstrictionem prebet, sic temperie quoque ipsa calidi-
 tatem & frigiditatem. Secundum utramque verò qualitatem desiccatorium est. Seditur stomacho
 amicum est ut pote non parvam obtinens adstrictionem. Quamobrem non admodum conspicuam
 caliditatem possidet; duobus autem numeris desiccatur.



GINGIDII species videtur CEREFOLIUM.

Angl. Cheruel. Aduers. pag. 324.

GINGIDIVM folijs Bauciae Syriacum.

Hæc dodrantalis planta missa Venetias Alepo Syria Sequini Martinelli opera: flos illi albus, & sapor Gingidij, folia verò Bauciae vel Elaphobosci minora.



VISNAGA. Aduers. 324.

Gingidium Angul.

VENERIS PECTEN Plin. et Scandix.

Angl. Pinkewide & flozken byli. Aduers. 324.

lege lin. 20.
quam etis
facie.



Plin. lib. 14. cap. 19. Veneris Pecten appellant à similitudine pectinis. Cuius radix cum Malua
causa omnia corpori infixæ extrahit, veteriosa curat: quæ exedum vocatur.


Diosc. Sylactre otus, amarum, subacre, T quod crudum coctumque manditur. Stomacho & ventri vile
est. Decoctum in poru, vesica, renibus & iocinori confert.

Gal eadem, siccatur & excaesat secundo ordine intenso: urinam ciet valenter: viscera obstructio-
ne liberat ex dictis qualitatibus constans.

PERCHETIA Anglorum, an sit Scandix?




CAUCALIS
albis floribus
vulgaris.
Aduerl pag.
324-325
Germ. Kes
Kerhletten.
Lappa agre-
stis Tragi.




CAUCALIS
Rorachin,
foliolosa



QUIN-
QUE-FIDIA
PANDULA.



QUIN-
QUE-FIDIA
PANDULA



CAUCALIS.

DIOSC. *Crudum coctumque aliu estur. vrinam mouet.*

Gal Quidam Daucum syluestrem nuncupant: est enim ei adsimilis gusta simul ac viribus. ex-
calfacit enim vtile & deficcet, tum vrinam ciet, & muria ad repositionem conditur.

Sapor Pectinis venerci, medicatus.

Varietas. Flosculis exilioribus, multò candidis: & semine loricato minimè horrido, hortis Belgij
inquilinus.

lege Cerefolij
proxima. &
pau o rōst
lege descri-
ptam arbi-
tratur.

OENANTHE, FILIPENDULA dicta, en MOLON Plin. Aduers. 325.

DIOSC. Folia cum mulso vino pot. a secundas eijciunt. Radix è vino vrinæ stillicidia conuenit.

OENANTHE angustifolia.

Exiliore folio ab altera vulgata Oenanthe solùm diuersa.

Plin. lib. 26. cap. 7. Molon scapo est striato, folijs mollibus, paruis, radice quatuor digitorū, in qua
extrema Allij caput est. vocatur à quibusdam SYRON. Ex vino stomacho & dyspnœæ medetur.

OENANTHE Cicuta facie. Aduers. pag. 326.


videtur eadem cum OLSENICHIO Cordi.

lege pag 326.
fitamentis.

OENANTHE aquatica.

Oenanthe quarta Matth. Dod.


an Syluis Plin. folio Apij palustris?



Facie & facultatibus inter Cratœge Laurer & Oe-
nanthè naturæ dædala munifico luxu & lusu me-
dia est hæc riuulorum lectatrix septentrionalis plā-
ta. Cauliculos emittit graciles, teretes, pedales &
cubitales è radice prolixius rebrante, sparsa & fi-
brillis donata: alis & summis folijs è gemino situ
positis exilioribus, Oenantes minoris Mon-
spelliacæ. Ima verò folia & terræ proxima Apij
hortensis, Oenantes vel Cicutariæ. Flos in um-
bellis, candidus, Thlaspi minoris: Semen Cicutæ,
in riuulorum marginibus, vbi spontanea & in hor-
tos translata, radices Oenantes ritu tuberosæ eu-
dunt. Vrinam cit. Stranguriæ Laureris & Oe-
nanthes modo auxiliatur.



CICUTA. Hisp. Cegura, Canahcia.

CICYTARIA maxima & Brancioni, in Thapsia
tertia Salamanticensium Clusio.

DIOSC. Cicuta letale venenam iussit, suamque vi refrigeratoria necat. Remedio est vini maraculi potus. Succus exprimitur contusus cacuminibus, priusquam semina & coma siccescant, qui solo densatur in pastillos. multus ad mendicariorem usus est aridi. commodè miscetur collyriis, qua levandi doloris gratia semper ardet. ignes sacros, & vlcera qua serpunt, illis restinguit. Herba cum coma trita, & resibus circumlita, illudinum imaginationes in somno compefcit, sed genitale resolvit. Lac puerperarum mammis apposita extinguit. in virginitate mammas coarctat, & incrementum non patitur, pueris praestat, ut eorum testiculi cibum non sentientes, unabsceant. Efficacissima vis Cretica, Idagarensi, max Artica, & in Chio & Cilicia nascenti.

Gal. quod extremè refrigerantis facultatis sit, omnes notunt.

CICYTARIA maxima, in Thapsia tertia Salamanticensium Clusio, vulgo Canahcia: Caule humanae proceritatis, crassitie quatuor digitorum, folijs, semine & radice Selsoli Peloponensis longè maioribus, quæ clinicis ceduntur ad mentes, vomitus & alias deiectiones ciendas: an num potius Cicutaria nostra maxima fertida?



CICUTARIA
latifolia fatidifolia
Seseli.



CICUTARIA fatua. Aduers. 327.
Cicuta minor Cordi.

CICUTARIA latifolia fatidifolia, perperam
SESELI Peloponense quorundam.

Herbarij septentrionales Belgæ multos iam annos habuerunt Cicutariam hanc, & nondum inuento genuino Peloponensi Seseli folio Cicute latiore & crassiore (cuiusmodi huius sunt) SESELI Peloponense folio Cicute dixere. Facultates tamē reclamant. Vniuersa namque planta simul ac tantillum tangitur, virus halat, qua nota à Peloponensi Seseli discernitur. Radice crassa & tota facie Myrrhidem odorem vescam quadamtenus exprimit; sed folia latiora, longiora, nigriora, & semen breuius Angelicæ vel maximæ Cicutarie fatuæ par in umbellis latis excusso candido flore. Caulis alis brachiatus, sesquicubitum & duos cubitos æquans.

Eius flores non appinximus, quia nondum flouerat hoc anno, quos aliàs daturi in Appendice nostro.



MYRRHIS altera parua. Aduers. pag. 327.
Daucoides minor Cordi.

MYRRHIS.
Aduers. 327.
Seseli Peloponense Angli.



CICYTARIA palustris.
Phellandrium Dod. & Sion certium.

PELOPONENSE SESELI minus.
Thapsia latifolia Clusij & quorundam.



Et folia
pariter
differunt

Nonnullæ stirpes Plinij Phellandrium adumbrare videntur. Lutetiani quidam Pigami species, siue pratenses Rutas, Dodonæus Cicutæ facie Coriandri foliam plantam aut Cicutariam nõ fetidam, scrobibus & fossis oriundam, Phellandrium Plinianum fecere; cuius nullæ meliùs dotes quàm Saxifragiæ nostræ hircinæ, vti superius pag. 321. monuimus, explere videtur. Dodonæi quippe Phellandrium siue tertiam Sij species folijs coriandrinis, Selini hortensis exilioribus, atroviuentibus, exiguis floribus in umbellis Oenanthes cicutariæ, candidis. Caulis ferulaceus, multis concavis alis, inanis, geniculatus, binum & ternum cubitorum: radice è geniculis fibrosa: & semine Cicutæ. Angliæ, Nortmanniæ & Belgij stagnantibus, fossis lenesluentibusq; aquis plerumque obuia. Cicutarijs quia facie propior, eis annectenda fuit, vsque dum facultates exactiùs sint competæ & exploratæ calida gustanti, odore Leuicis.

MYRRIS. Aduers. pag. 327.

Dicosc. Radix cibo non insuauis, qua in vino pota. phalangiorum moribus auxiliatur; citi mensura & partus secundos, purgatq; à puerperio feminas; subuenit & phebiscis & colicis in sorbitione. Sunt quoque eandem hu die terne partem ex vino in postulantium salutarem esse, & ne morbi contagio sentiantur, obstat.

† Thoracem ac pulmonem degrauiant Gal. Itaque secundo ordine calfacit adiuncta quadã partium tenuitate.

PELOPONENSE SESELI.

In Belgij stirpiam cultioribus & ditiorebus hortis Hispano semine ortum altero tanto maius, maioribus lativibusve folijs & semine visitur.

Dicosc. Folia habet Cicutæ, lactiora, & crassiora: caulem supra 2. pedes longi magnitudinis, ferulaceum, & lazarum in cucurbitæ umbellam, in qua semina latius, odor acutus, & carnosius vendit. Silem ritibus prædicantur esse, quibus 2. d. d. d. d. d.

Gal. Sesele & radix quidem, sed & fructus vsque aded. vti dicitur, ut admodum vitæam otiosè queat. Sed & tenuitum est partium, vt comitiali morbo & oris pueri competat.

Tordilione
Seseli Creti-
cum



427

Tordilione
Seseli Creti-
cum maius.

Varietas.



Seseli mon-
speli-
ense.



Seseli Pra-
tense Mon-
speliense.
Aduerf. pa-
328.



TORDILION. *Seseli Creticum.* *Advers.* pag. 328. *Ordeison Nicandri Angul.*

DIOSCOR. *Semen contra vitæ difficultatem bibitur, potu citius mensetur. Succo semina caulibusque viventis, ternis obolis ex passo decem diebus haustibus sanantur. Efficax est radix ad cunctas pectoris excrescencias in delinctu cum melle.*

TORDILII. *sive SESSELI Creticæ varietas.*

Fruticosus multo, longioribusque foliis & bicubitalibus caulibus in pratis Larrensibus Monspeliciagri & Lugdunensis Gallie perfoeniferia occurrit. Belgis hortense est.

E seminis
magnitudi-
ne differentia.

SILER *Montanum officinarum.* *Ligusticum Diosc. Dodonæ.* *Seseli Massiliense Diosc. Matthiolo.*

Angl. Siler montanum. Germ. Ssel. Gal. Sermountain.

Latiore semine brevior in Belgij hortis variat.

SOPHIA *Chirurgorum, sine Thalierrum Diosc.?*

Advers. pag. 328. Thalierrum Dod. vel nunc sit

Eruca Geratina Italarum? perperam Scripsum

Germanicum Tragi, Fuch. & Cordi. Germ. Do-

phiekraut, & Welsamen.


Legt. An CONSOLIDA Regia, sive Calcariæ flos

recentiorum, sit DELPHINIVM Diosc.?

Chamamelum et anthemum perperam Fuch.

Calcitrapa candida Cordi. Advers. pag. 329.

*Bel. Ridder sporen. Ital. Spioni di cavallieri.**



DIOSCOR. *Tritum illud antiqua vlcera ad cicatricem perducit.*

Gal. Vis ei inest exicatoria circa morsum, itaque vlcera ininterata ad cicatricem perducit.

Potum in aqua ferrata sanguinis deiectiones sistit. Cancro mederi asserunt Germani.

Vires ex Trago. Calidæ & siccæ temperaturæ, internis corporis partibus, & ad chirurgicam accom-

Leg. p. 329
li. 3. q. 1. l. m. n.
admodum.

*modatissimum. Singularem enim experimento observatum est, semini eius, quemadmodum Plantagin-
is alui fluxiones quasvis cohibere cibo & potu. Multi etiam crediderunt ossium contractions (mo-
dò illa rite redintegrentur, ac reponantur) in pecoribus sanari, quum primum herba & semen affectæ
parti adalligentur.*

*Herba in vino decocta & potu lumbricos expellit, sicut & alia lubæ orina serena. Tusa & impo-
ta, aut eius succus instillatus vermes è sordidis vlcibus & vulnibus hominum & pecorum expellit,
& ossium contractionibus, ut Symplytum medetur.*

CONSOLIDA hortensis maior, flores etiam albos promit.

Dalman

DELPHINIUM.

DIOSCOR. Semen in filiquis nilio proximum, quo nō aliud vtilius bibi potest, ab scorpione percussis. Aiant enim obiecta herba, scorpiones resolvi atque ignavos torpescere: semota vero ea, sese recolligere. Alterum superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilior, viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

leg. florum
cuculata in
fundibula,
lin. 22.

Spigatum CONSOLIDAREgia strigosior tota.
Aduers. pag. 329.

MELANTHIUM, sive Nigella Romana odora.
Aduers. pag. 329. Germ. Schwartzkopflander.
Hisp. Neguilla, & Alipiure. Ital. Niella.



Varietas. Visitur & hæc albis & rubentibus floribus in horto Mutoni nostri.


MELANTHIUM.

DIOSCOR. Semen panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit. Discutit recentes oculorum suffusiones, vitum ex tritico & insusum naribus tollit lepras, lentiginis, duritias, tumoresq; vetustos, cum aceto illitum. Circumscarificatos clauos excutit, cum veteri vrina impositum. Dentium doloribus adocum cum aceto & teda, prodest. Teretes ventris tmeas expellit peruncto ex aqua vmbilico. Destillatione laborantes adiuuat, tritum in linco, & olfactum, vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum. & lac extrahit difficultate sperandi cum vino sumptum leuat. Phalangiorum moribus ex aqua, drachma pondere haustum auxiliatur. Incenso serpentes fugantur. Tradunt largius epotum enecare.

Eadem Gal. Quia exalfacit atque desiccet tertio ordine: videtur etiam tenuium esse partium. Si intro in corpus sumatur, vel maximè flatus extinguit, vnde constat essentia ipsam esse subtilis, & ad vnguem à caliditate elaboratæ. Propterea sanè etiam amarum est. * Ostensam verò in quarto horum voluminum est quod cum ad extremam tenuitatem atque elaborationem terrena pertingit substantia, amara proueniat qualitas. Itaque mirum non est si lumbricos interimat non esum modò, sed etiam foris ventri impositum. Siquidem & id prestare posse saporem amarum, monstratum est.

* Gal. Qui ob crassitiam aut viscositatem retenti fuerint. In summa verò, vni sectione, exresione, desiccatione, exalfectione est opus, præstantissimum id remedium est.

Melanthium
Cylind. fl.



MELANTHIUM *Hylnest.*

Advers. pag. 329.
Cominum *Hylnest. Cordi.*

MELANTHIUM *Hylnest. alterum capitulis reflexis*
Aquilgia. Advers. pag. 329.



Cuminum
Diosc.



CUMINUM *Diosc. Satbunum & Hylnest.*

Advers. pag. 330.
Belg. & Angl. Comyn. Hisp. & Ital. Comino.

DIOSCOR. Cuminum sativum vi gratum est. sed
multo magis Aethiopicum, quod Hippocrates regium ap-
pellavit. secundum locum tenet Aegyptium. reliqua se-
quuntur. Provenit in Galatia, in Asia, Cilicia, & Terentia,
& plerisque aliis tractibus. Excelsa est, adstringit, emicat.
ad tormina inflationesq; convenit, coctum & cum oleo in-
ditum, aut cum bardeacea farina illitum. orthopneicis da-
tur in posca: demorsis à serpente, in vino, coctum, colobri-
nibus auxiliatur, inpositum cum vna pass. aut loli. sa-
rina car. ab. mensura abundantiam inhibet. constrictus
antenna in aceto, & narius obiectum, sanguinis profusa la-
ssit. colorum bibentium aut peruncellorum naturam pei-
lorem.

Hylnest

SYLVESTRE Cuminum.

Semen acerofum, gustu Satiuo acriori. bibitur ex aqua, aduersus tormina inflationesq. Item contra venenatas bestias, ex vino. fanguis ex aceto sedat. Stomacho vtili, quem humor vexat. fugillata tollit, si manducatum cum melle & vna passa illinatur. testium inflammationibus, adiectis eiusdem illitum modetur.

Est & aliud Sylvestris Cuminum genue, Satiuo non dissimile, quod à singulis floribus pensilis promit cornicula, in quibus semen est melanthio simile. Quod potum omnium serpentium moribus praesidio est. calculosis & iis qui vrina stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur, sed apij semen seruefactum postea bibendum est.

Gal. Cuminum femine maximè vumur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, petroselini. Est verò & facultatis excalescentis, sicut illorum vnumquodque, tum vrinam mouentis & flatum extinguentis; ex tertio ordine excalescentium.

CUMINUM sylvestre alterum Diosc. Italicorum.

Hypocoum Clusij & Dodonai.


Cuminum syl. Matth. alterum.

NUCULA terrestris. Aduers. pag. 331. & 325.

Apios Turneri Angli, an Bunen Diosc.?

& Bulbocastanum Trallianij Angl. Carduus.

Perperam Oceanthe Matth.



Eadem est hæc effigies cum corniculata plantula descripta pag. 331. Aduersariorum; arido solo Galloprovinciæ eruta & à picore deprauata: cuius semen olim Massilia in Belgium transmissum, vbi feliciter enatam, sculpendam curauit Clusius noster. Foliis est Rutæ syl. montanæ aut Melanthij, flore luteo.

NUCULA terrestris.

Dioscor. Excalescit Bunion. vrinam ciet. secundas detrahitis. lieni, renibus, & vesica vtili. eo dumentis aridus vruntur, exempto radice & caulis succo, o. aqua malsa.

Trallian. lib. 7. Bulbocastani radix calida & sicca moderatè, simul & adstringens percipitur, sed efficacius semen.

Sanguinem spuentibus & mingentibus vtilis Dod.

Ελευθεριον. GAZA verit Aureliam. Aduers. pag. 331.

ELICHERYSON. Amaranthus Galeni.


Hisp. Scoba hedionda. i. Scopa fetida

C. Clusio interprete. *

MILITARIS, siue Millefolium terrestre vulgare,
est STRATIOTES Millefolium Diosc.

Aduers. pag. 333.

Leg. p. 331.
sive in v. p. 331.



Leg. p. 332.
lin. 1. flor.



* DIOSCOR. Contra serpentini ictus, coxendicum dolores, vrinae stillicidia, ruptaq;, coma e vino pota opitulatur. ciet menses. Sanguinem concretum ventris ac vesicae absumit, pota cum mulso. ieiunio, erium obolorum pondere, fistulae distillationes, data in vino albo diluto, vesicibus inseritur, vt eas ab erodentium iniuriis tueatur.

Gal. Amaratham facultatis est incidentis & extenuantis: coma igitur eius menses cum vino pota educit, sed & grumos sanguinis liquare ac soluere creditur, non solum in ventre, sed & in vesica: sed tunc potius cum mulso bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones pota desiccant, stomacho infesta.

SANGVISORBA. Bipinella nostras, an SIDERITIS altera Diosc. Aduers. pag. 332. & 310.

DIOSCOR. Huius seminis vis, soliorumq;, ad vulnera, praecipua est.

SIDERITIS Robertiana. Aduers. pag. 332. Heraclea Cratena Diosc.

DIOSCOR. Gustanti amara. Huius ea vis est, vt quamuis recenti vulnere inposita, sanguinem supprimat.

Gal. Sideritis habet quidem etiam abstergendam quandam facultatem, sed plurima eius pars humida est, & mediocriter frigida: paucula vero inest adstrictio: quare phlegmonem sedat & glutinat.

SIDERITIS Achillea Diosc. Aduers. pag. 332. Stratiotes millefolia Dod. editione vernacula.

DIOSCOR. Trita coma sanguinolenta glutinat, & ab inflammationum periculo tuetur. Erumpentem sanguinem inhibet, & cruenta vulua profuua, in vellere. Decocto quoq;, inficent saemina fluxione vulua laborantes. Ad dysenteriam biliter.

Gal. Quidam etiam vocant Achilleon Sideritin, quae proposita quidem, quod ad iam dicta vitia, vitibus non est dissimilibus; caeterum adstrictione exuperat. Quare ad sanguinis eruptiones, dysenterias & muliebre profuuium congruit.

MILITARIS, siue Millefolium.

DIOSCOR. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaq;, profuua sanguinem, & fistulas.

MILITARIS

MILLEFOLIUM terreſtre purpureis floribus.

Aduerſ. pag. 333.

Varios.




PEDICULARIS.

Gal. Terreſtris verò Stratiotes nonnihil
habet adſtriſtionis: proinde ſanè & vlcera
glutinare pòteſt, & vlceribus eſſe vtilis.
Sunt qui eo & ad ſanguinis eruptiones v-
tantur, & ad fiſtulas.

MILLEFOLIUM luteum. Aduerſ. pag. 333.

Achillea luteo flore C. Cluſij. in agro

Nemaufenſi plurimum.



PEDICULARIS Aleærotophoz.

Aduerſ. pag. 334.

Fiſtularia Dod.



Notare ſu-
perius proxi-
mo Altharid
pura Ad-
uertiſſ.



Tanacetum.



TANACETUM, *Advers. pag. 334.*
Angl. Tanip. Ger. Seinfarn. i. filio
in ripis nascens. Ital. Tanaceto.
Artemisia monoclaos Fuchs.
Athanasia & Artemisia tercia
species Ruellio.

Speciosius TANACETUM cristatum Anglican.
Advers. pag. 335.



Tanacetum
non odoratum.



TANACETUM non odoratum.
Advers. pag. 335.
Porpositum Sydenhami & aliorum.



MATRICARIA *Boissier. Advers. pag. 335.*
Artemisia tenuifolia Fuchs. Ger. Mutterkraut.
Angl. Feucrista, & Feederstem. Ital. & officina.
Amarella, & Matricaria. Belg. Moederkruid.
Fr. & Matr. Gal. Matricaire, & espar-gourte.

ASSINTIVUM *valgar.*
Ponicum Fuchs.



Dioscor. *Assintivum*, aliqui *bathy piron*, herba velgo cognita. Praestantius in *Ponto* & *Cappadocia*, in *monte Tauro* nascitur. *Vim* habet *caesiciendi* & *adstringendi*. *bilem expurgat*, qua & *stomacho* & *ventri* *inhabit*. *vrinam cit. crapulam praesumptam arceat*. *ad inflationes ventris, & stomachi dolores prodest*, cum *seseli* & *nardo gallico* *potum*. *fastidia discutit*. *arquatos sanat* *madefacti diluam*, aut *decocti ius*. *quotidie tribus cyathis haustum*. *mensis cit potum*, aut cum *melle appositum*. *Contra fungorum strangulationes convenienter ex aceto bibitur*. *adversatur iuxta venenis cum vino*. *item cicuta, & muris aranei morsu*, & *draconi marino*. *angina eo cum melle & nitro perunguntur*, & *epinthis* *ex aqua*, *ad segillata* & *oculorum caligines ex melle illuntur*: *item acribus, si manet sanies, dentium arinua, dolores decoctum vaporis suspiru composcit*. *decoctum in passo dolentibus oculis oblitur*: *item praecordis & iocineri, tritum cum cerato cyprino*: *stomachis quoque longa valetudine laboranti, cum rosaceo, cum seis cutem, aceto & liliaceo, serena aqua inter cutem licetosisq; subuenit*. *Vinum ex eo fit, quod assintivum vocant, praesertim in Propontide & Thracia, quo ad aure dilata truntur, cum febris caret, alioquin in astate propinant, & acceptam huic vino in olivum, artem referent*. *Insparsum arcu assintivum, vesicis ad erodendum iniuria vindicat, culices ex oculo perunctum abigit, & a corpore arceat, atramentum librarium diluto eius temperatum, litoras a maris corrosione tuctur*. *Existimatur liquamentum eisdem praestare effectus*. *Atramentum potionibus improbat, quoniam stomachum male habet, & capitis ceter dolorem*. *Sunt qui colla amurea, liquamentum adulterant.*

² *Gal.* *Adstrictoriam*, & *amaram*, & *acrem* *simul* *qualitates possidet* *excalfaciens potiter & exreges*, & *roborans* & *desiccans*; *proinde biliosos ventris humores per egestionem inferitiam propellit, ac per vrinas euacuat*. *Magis autem quod in venis est biliosum per vrinas expurgat*. *Ob haec contentam in ventre pituitam nihil adiuuat sumptum*: *sic sane si in thorace aut pulmone continetur*. *Nam adstringens in eo facultas, quam amara, valentior est*. *Porro quod insit quoque acrimonia, facit eo maiori portione calidum esse quam frigidum*. *At si opus est generatim comprehendam eius temperiem secundum primas circumscilicet facultates (scilicet anomeromeres & dissimilare sit) calidum ipsam dixerim primi excessus, sic cum tertij. Succus autem eius longe quam herba calidior est.*

Gal. Absinthium Seriphio Santonico & Abrotano minùs calidum, nempe plurimam obtinens ad-
 strictionem. Quod eùm sit & minùs quoque tenuium quàm illa partium, & vtiq;e minori etiam
 quàm illa, ad eundem modum extenuandi facultate: at tamen non minùs desiccatorium est. At cæ-
 terorum Santonicum, proximam habet facultatem. Seriphio paulo imbecillius in extenuando &
 calfaciendo desiccandoq;e. Porro ipsum Seriphium Abrotano minùs est calidum; verùm calidius
 Absinthio, stomacho impediò inimicum, nempe cum amaritate salfedinem quandam præferens;
 sed & quandam licet minimam adstrictionem obtinet. sic & Abrotonon & Santonicum admodum
 infesta sunt stomacho.


ABSINTHII Pontici multa similitudines & varietates.

Quia foliorum demensus, paritasque & odor doctos magnoperere torserunt; Turnerus Anglus
 quoddam Absinthium in Apeninis Italiae montibus foliis minoribus à se repertum posteritati Anglico
 idiomate prodidit; cui aliud minimum & tenuifolium quoddam genus etiam subdunt & statuunt;
 qualia hodie etiam studiosè alunt, & cæteris præferunt de dote aromatica & iucundo remissione ama-
 rore, ventriculo & visceribus gratiore, doctissimi pharmacopœi P. Coldenbergius & Ioannes Muto-
 nus. At superiùs docuimus *ευνδία*, non gratiam odoris vel suauitatis, sed fragrantiam & vehemen-
 tiam ple: atque indicare; & potentiore id pollere facultate, cuius ope potentius agit. Amari autem est
 aperire, abstergere, urinas ciere & bilem purgare.

PONTICVM supinum herbariorum.

Alterum quippe horum Ponticum supinum vocant, vt cuius cauliculi procumbant: folio & semi-
 ne Absinthij arborecentis mox infra descripti. Odor suauissimus, gustus aromaticus, amaricans.



PONTICVM Tridentinum Herbariorum.



Ex Ponti & Tauri montibus & Romania nobis & Tridentinis Imperatrici adscitus, cuius omnia
 minima folia sunt albida, aromatica, adstringentia & sabbamara.

ABSINTHIUM arborescens.
Absinthium del Comasco Anguillara.

ABSINTHIUM album, capitulis squarosis, floribus albis, umbella Achillea montana.




Vulgari non ita folio & flore dissimile, sed fruticis arboreæ habitu, Abrotani modo hominis proceritatem adipiscitur: candidiore & minore paulò folio semper virente. In Belgio aliquando emoritur ob hyemis & celi inclementiam. Gustu amaro, aromatico, odore non ingrato.

ABSINTHIUM album.

Rarius multò hoc Absinthij genus in Belgio, Gallia, Anglia, & Italia, nullidum memoratum scriptori: vni C. Clusio nostro agnatum, & D. Dilio Vienna Austriae transmissum. folio Chrysanthemi diffusura, Artemisiae marinae concolori in cauliculo dodrantali. flos albus Parthenij in umbellis senis foliolis: gustu subadstringit, nonnihil amaricat.

ABSINTHIUM umbelliferum atrovum italicum. Ital. Assenzo ombelifero.

Ne hoc quidem adhuc literis proditura, quippe non frequens obvium vel minus notum; ore, colore incano & habitu ipso non ita diversum cum superiore, sed omnia exillora multò. Cauliculos plures spithameos emittit, summis flosculos in glomeratis capitulis incanis gerens. Itali stirpium exploratores, à quibus studiosè alitur, Umbelliferum Absinthium dicere. folia enim Absinthium Fonticam Tridentinum, non multum magnitudine superant.




SERRIPHIT *Abrotani feminae facie differentia.*


Aduers. pag. 336. & 337.

Santonicum minus Cordi.

Santoline Dod.



Diosc. Galatium Sardonum ABSINTHIUM,
Perperam SANTONICUM vulgi,
est Absinthium ROMANUM officinarum falso creditum.
Abrotanum candidum Cordi. & femina Fachs.
foliis & similitudine quadam Achillea,
Ponticum Absinth. Dod. & Fachs.
Santonicum Ruellij. Aduers. pag. 337.



Huius sex varietates in horto alebar noster Ioannes Muttonus, quarum pars totius est Chrysocomes Monspellicae angustifoliae pars vero foliis cristatis Chamæcyparissi, Sabine vel Ericæ, minutis. Ex Hispania & Galloprovincia Belgij inquilina facta sunt. Horum nullam est officinarum Semen sanctum, siue contra vermes, vt credidit D. Dodonæus.

Scriphtium Galloprovincis. Aduers. pag. 337.

Succellu temporis degenerat: fragrantia, tomento & candore exuitur in Belgij & Angliæ vitæpis.

Martium ABSINTHIUM, siue SERRIPHIVM.

DIOSCOR. *Herba est tenuis, abrotani parui similitudine, referta minutis seminibus, subamarâ, stomacho inimica. ea grauius olet, & cum quadam calfactione astringit. per sese aut cum oryza colla inter canorum animalia, reterefq; rinas, adiecto melle enocat. alium leuigat. cum edulio autem velleuicula decocta, eadem præstare potest. peccora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpibus finitima scælet. id patrio nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, vtrum subamarum est, non adeo seminis fecundum. Eadem qua Scriphtium potest.*

Gal. Non aequè vt Absinthium astringit, & plus exaltat, amaritatem que quandam cum salfedine respicit. Stomacho infestum est, magisque absinthio lumbricos necat, siue foris impositum, siue interd in corpus assumptum Et sanè calfacere ipsam in secundo ordine intento censendum est, exsiccare in peric.

SERRIPHIVM vulgare, *Dioscoridi perperam putatum.* **ARTEMISTA** marina tenuifolia.

Artemisiam tenuifoliam potius refert, minutissimis incis. foliis albis, semine & floribus; odore Licuendulæ & Abrotano proximis vel Artemisiz marinae.

ABSINTHIUM insipidum.


Absinthio Pœtico supino folio, ramulis & florib. quodammodo simile, sed gâstus & amaritudinis ex parte.

XANTONICVM vulgare, è Xantonum Gallorum agro, Sainctonge vernaculè.

Scriphtio vulgari non ita absimili, longiore & viridiorè folio, ingrati & saporis & granioris odore. Belgis hortensæ apud Ioannem Muttonum nostrum.

*Aliud peregrinum fons Ægypti in ASSI-
THIVM. Advers. pag. 337.*

SIN 23
Sedrum.
Barbotine
Galorum.
Advers. pa.
337. In. Se
monia.




*CARNOS. Advers. pag. 338. Angl. Fumoterp.
Ital. Fumoterra.*

DIOSCOR. *Succus claritatem facit oculis, dela-
crymationemq; unde nomen traxit. Illius enim gummi e-
nulsas palpebras venasq; prohibet. Commanducata a herbis
biliosam urinam trahit.*

* Eadem Gal. & Plin. † Gal. addit: sanatque ie-
coris obstructions & debilitates: quia acris simul
& amare qualitatis est particeps: nec tamen planè
expers est acerbè. Plebeias quidam ea vi solebat
ad stomachum roborandum, vnaque ventrem lu-
bricandum. Siquidem herbam primùm siccatam
condebant: dein cum vi volebat subductionis qui-
dem gratia melicrato inspergebat; roborandi verò
causa, vino nimirum diluto.

Plin. lib. 26. cap. 7. Carnos herbam qui edere,
bilem per urinam trahunt.

Serum humoris adusti & melancholici ducit.
necnon pituitosum additis Storchade, Zingibere,
Betonica, Selino, Maratheo, & huiusmodi pituita
concoquentibus & preparantibus.



pa. 338. In. Se
monia.


CARNOS

SERIPHUM *Abrotani feminae facie differentia.*

Aduers. pag. 336. & 337.

Santonicum minus Cordi.

Santolina Dod.



Diosc. Galatium Sardonium ABSINTHIUM,

Perperam SANTONICUM vulg.

est Absinthium ROMANVM officinarum falso creditum.

Abrotanum candidum Cordi. & femina Fuchs.

foliis & similitudine quadam Achilleae,

Ponticum Absinth. Dod. & Fuchs.

Santonicum Russlij. Aduers. pag. 337.



Huius sex varietates in horto alebarnoster Ioannes Matenus, quarum pars totius est Chrysocomes Monspeliaca angustifolia; pars vero foliis cristatis Chamæcyparissi, Sabine vel Ericæ, minutis. Ex Hispania & Galloprovincia Belgij inquilina facta sunt. Horum nullum est officinarum Semen sanctum, siue contra vermes, vt credidit D. Dodonæus.

Seriphium Galloprovincis. Aduers. pag. 337.

Succellu temporis degenerat: fragrantia, comento & candore exuitur in Belgij & Angliæ vitetis.

Marinum ABSINTHIUM, siue SERIPHIVM.

DIOSCOR. Herba est tenuis, abrotani parvi similitudine, refert a minutulis seminibus, subana a stomacho immita ea grauiser olet, & cum quadam cassatione adstringit. per sese aut cum oryza cocta, inter cæcæ animalia, reuerefç, timeas, adiecto melle enocat. alium laugat. cum edulio autem velleuicula decocta, eadem prallare potest. pæora maxime pinguescunt hoc pabulo. Tertium genus absinthio assignatur, quo Gallia alpbis fructim a scates id patrie nomine Santonicum vocant, regionis in qua nascitur cognomento, absinthio non dissimile, vtrum subam arum est; non aded seminis secundum. Eadem qua Seriphium potest.

Gal. Non æquè vt Absinthium adstringit, & plus exalfacit, amaritatem que quandam cum falsedine respit. Stomacho infestum est, magisque absinthio lumbricos necat, siue foris impositum, siue in corpore assumptum Et sanè calfacere ipsum in secundo ordine intendo censendum est, exficcare in tercio.

SERIPHIVM vulgare, Dioscoridis perperam putatum. ARTEMISTA marine tenuifolia.

Artemisiam tenuifolia potius refert, minutissimis incisiss foliis albis, semine & floribus; odore Legendulæ & Abrotano proximis vel Artemisiz marinae.

ABSINTHIUM inspidum.


Absinthio Põico supinofolio, ramulis & florib. quodammodo simile, sed gustus & amaritudinis exora.

XANTONICVM vulgare, è Xantonum Gallorum sero, Saintronge vernaculè.

Seriphio vulgari non ita ab simili, longiore & viridiorè folio, ingratè & saporis & grauioris odoris. Belgis hortensè apud Ioannem Mostonum nostrum.

*Aliud peregrinum fuit ÆGYPTIVM ABSINT-
THIVM. Aduers. pag. 337.*

SEM IN
Siccum.
Barbottine
Galorum.
Aduers. pa.
337. Im. Se-
mentia.




CARNOS. *Aduers. pag. 338. Angl. Fumoterra.
Ital. Fumoterra.*

DIOSCOR. *Succus claritatem facit oculis, dete-
crymationemq; unde nomen traxit. Illius cum gummi e-
uulsas palpebras renasci prohibet. Commanducata herba
biliosam urinam † trahit.*

* Eodem Gal. & Plin. † Gal. addit: sanatque ie-
coris obstructions & debilitates; quia acris simul
& amarae qualitatis est particeps nec tamen plane
expers est acerbè. Plebeius quidam ea vi solebat
ad stomachum roborandum, vnaque ventrem lu-
bricandum. Siquidem herbam primùm siccata
condebatur: dein cum vi volebat subductionis qui-
dem gratia melicrato inspergebat; roborandi vero
causa, vino nimirum diluto.


Plin. lib. 26. cap. 7. Carnon herbam qui edere,
bilem per urinam trahunt.

Serum humoris adulli & melancholici ducit,
necnon pituitosum additis Storchade, Zingibere,
Betonica, Sesino, Marathro, & huiusmodi pituita
concoquentibus & præparantibus.



pa. 338. Hic
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel
Carnos, vel

CARNOS




Capnos tenuifolia.




CAPNOS tenuifolia cauliculis serratis.
Aduers. pag. 338. Hisp. Palomilla.

Varietas. Hæc eadem Belgicis in viretis nostris
caducis & procumbentibus cauliculis oritur vbi
semel lata fuit. Semen compressum subluteum:
flos hilari purpura rubet.

CAPNOS alba latifolia.
Splith album quorundam.



Fumaria lutea montana.



Varietas. Floribus albis & latoribus foliis in se-
getibus Comutiæ, & syluosis agrorum margini-
bus Brabantie provenit: capricolis sepes arripit.



Reputatio. FUMARIA lutea montana,
sive SPLITH.
Chelidonium Capnicos Aegy.
Corydalis Anguil.

Virnes strenuè cit, Anguillare testis.



RADIX CAVA herbariorum, sive Bulbosa
Fumaria Plin. *Advers.* 338. & 339.
Perperam Piskolochia Fuchs. *Germ.* Holwurtz.
Belg. Holwurtz. *Gal.* Racine creuse.
Chelidonia phragmitis, *Capnium Aetij*, &
Capnos phragmitis Plinij *Cerdo*.

Fabacea radice **CARNOSI** altera.
Advers. pag. 339.



Radix amara, excessu secundo calida, & sicca. Digerendo, abstergendo & defluxiones inhibendo, anginis & laringum tumoribus gargarizata prodest, pituitamque extergit.

Fabacea radice **FUMARIAE** varietas:

Herbacei: florum rudimentis variat in hortis G. Driesch & Mutoni.

CHELIDONIUM minus. *Advers.* 339. *Nam Virga Tinctoris Aetien.*
Ital. Celidonia maggiore. *Hisp.* Celidonia & yerua de las golondrinas.

DIOSCOR. Succus in aereo vase, cum melle prunis decoctus, oculis claritatem adfert. Folis, caule, radice, succo exprimitur inenante estate, & siccat in umbra digeritur in pastillos: Radix cum aniso & vino albo pota, medetur regio morbo, & ulceribus que serpunt, imposita cum vino, aut manducata, dentium dolor em sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod aduentu hirundinum exoriatur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrent, hircinimas matres exsiccatis pulvis admota herba visum restituere.



Eadem Plin. & Gal. Admodum extergentis & calida facultatis est: vtiq; in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur discussione indigens, & ad acendum visum succus eius commodus est.

Et cicatrices extenuat Plinio. albugines etiam iumentorum.

Essentia Chelidonij Theophrastice.

G. Andern. Chelidonij herba recens adhuc cum floribus & radicibus simul pulvis instar contunditur, inditurque ampullæ, & in fimo equino per mensem maceratur. Deinde in balneo humor ad facum siccitatem usque extillatur: postea hæc conterantur in puluerem, & humore paulò antè prolecto, perfunditur. Rursumq; diebus triginta in fimo maceratur, ut prius. tunc ex cineribus calidis destillatur, separaturq; aqua ab oleo: quod Chymici verâ Chelidonij essentiam appellant. Ex facibus in cinerem reductis cum aqua sal elicitur. atque hoc modo tria illa simul principia Paracelsi conficiuntur, quorû apud Chymicos utilitas ad multa commendatur.

AQUILINA. *Aduers. pag. 339. Ital. Aquilicia & Cclidonia saluatica. Lege, num sit Potbos Theoph. Leontostomi Gesneri, sine Leo herba Dod.*



Tragus & Matth. seminis ʒ. j. cum croci obolo ex vino, obstruatis hepate & vesica, feilica regio morbo vtiliter dari asserunt.

Ad pestiferam luem commendatur.



Chelidonia
viva
lus.




Aquila
plena
tipi
sua
fioribus
ueris
horum
tipi

Variet.

Academ
ma
1744





DIOSC. *Veraque exsiccatis, extenuat. feruofacta conuenienter in muliebres deffus adijciuntur, ad detrahendos menses, partus, secundasque. item ad preclusiones vulua, & eiusdem inflammationes. calciuus comminulie. remoratum vinnam cient. menses pellunt pibi illie. Succus vulua inditus ex myrrha, eadem qua in seffo trahit. Co-*

lege leptophyllis. lin. 18.

ma tribus drachnis coronad educendorum gratia bibitur.

Gal. *ad renum calculos mediocriter, & ad vetrici fomentationes profunt.*
Addit Pli. *eandem quoque secum habentibus, negant nocere mala medicamenta, belhamie vilam, ne solem quidem. Bibitur & hac ex vino aduersus opium. Alligata priuatim potens traditur, potatue aduersus ranas. Alligatam qui habet viator negatur lassitudinem sentire.*

Ead? Apul

APVL. *Hij virtutibus pradita est: herbam Artemisiam monoclonon, si quis iter faciens secum in manu portauerit, non sentiet itinetic laborem. Fugat & demonia in domo posita, & prohibet mala medicamenta, & auertit oculos maloru hominu. Herba Artemisia monoclonos tusa cum axungia & imposta, pedum dolorē tollit. Pisata & in puluerem redacta, cum aqua mulla potui data, intestinorum dolorem sedat.*

Ad stomachi dolorem: herbam Artemisiam leptaphyllon tusam & cum oleo amygdalino bene subactam more malagmaris induces panno mundo, & impones stomacho, quinta die sanabitur. Ad neruorum dolorem atq; tremorem: Artemisiae leptaphylli contrite succo expresso, & mixto cum oleo rosaceo, si peruges eos, desinet tremor, & omne vitium tolletur.

ARTEMISIA
marine superioris folia inci a, quoru manifestas incitatas pictor omiserat. Aduerf. 247.

ARTEMISIA
marina Ad. 247. 347.



*ARTEMISIA marina.**Absinthium angustifolium* Dod.*Perperam herbariorum Absinthium odore Lavendulae.*

Videtur Pliniana suavis odoris: odor ille quippe
Lavendulae & Abrotani maris ferme.

Vera Artemisia marinae folia habent manifestas
incisuras, quae littoreis natalitijs conspiciuntur,
& nonnunquam etiam in hortis. plura require in
Abrotano foemina pag. 341.

legit. 9. inci-
sura, Portu-
laca marinae
&c.

*AMBROSIA sativa hortensis procerior.**Adversf. pag. 341.*

legit. folia Ru-
tae. l. 24.

Esalem Gal.

AMBROSIA variates.

In triplici differentia est Ambrosia, quarum hor-
tensis propter cultum campestrem & sponte ena-
tam foliorum magnitudine longè superat. odor,
sapor, habitus non diuersi.

*AMBROSIA tenuifolia: Abrotani vel Artemisia
leptophylli species sunt.*

Ambrosijs haec specie cognatae, sed folio & flori-
bus multò minoribus: nec alius aut odor aut sa-
por illi.

*Diosc. Vis eius reprimere ac repellere, & illius
adstrere humores, qui in aliquota partem incumbunt.*



AMBROSIA
tenuifolia
argentea



AMBROSIA
tenuifolia



AMBROSIA
altera Martii



ABROTANVM *femina*.

Chamaecyparissus Plin. *Herbariorum*. *Santonicum*
minus Diosc. *Cordi*. *Hisp.* *Yerua Lombriguera*.
Adverf. 342.

ABROTANVM *var. Gal.* Aueronne. Belg. *Mue-*
ronne. *Gallobegis nonnullis*, Bois S. Jean.
Ang. *Botherntwoud*. *Adverf.* 342. *



Chamaecyparissos Plinio herba ex vino pota contra
 venena serpentium omnium scorpionumque pollet.

* DIOSC. *Crudum sementritum & feruesactum ex aqua in potu auxiliatur orthopnoicis, convulsis, ruptis, co-*
rendicibus, urina angustis, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenarum antidotum
est. Horroribus eorum oleo illinitur. Serpentes & subleatu & nidore fugat. Contra ictus eorum cum vino potum pro-
dest. Pruratum efficacius contra scorpionum & phalangtorum venena. Oculorum inflammationibus commodè illinitur.
Cum cotoneo colico, aut pane tritu cum farina hordeacea, decoctumque, tubercula discutit. Trini compositionibus ad-
miscetur. Idem femina grauioris odoris videtur hic Diosc. agere.

Calidum & siccum tertio ordine Gal. stomacho infestum, de quo capite De Absinthio.

Gal. Abrotonum vltum calidam siccumque facultate est, magis quam Cucurbita sicca vlti & A-
 æthi radix: illa enim viceribus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conuenient: ac
 proinde maximè viceribus quæ pudendorum præputijs competere videntur. At cinis Abrotoni vi-
 ceribus omnibus mordax est: ac ideo cum oleo tenui, cicino scilicet, aut capitanino, aut sicyo-
 nio, aut veteri, & maximè Sabino ad alopecias accommodatur: tum barbam segetis tardiusque ena-
 scentem cum aliquo diodorum oleorum elicit: Sed nec minus illis lentifcino imaceratum, quippe pro
 eo quod est tenuium partium, rarefaciendi vim obtinet, & mordax est & calidum.

Kk s

Oderatum



ARTEMISIA marina.
Absinthium angustifolium Dod.
Perperam herbariorum Absinthium odore Lauendula.

Videtur Pliniana suavis odoris: odor ille quippe Lauendulae & Abrotani maris ferme.

Vera Artemisia marinae folia habent manifestas incisuras, quae littoreis natalitijs conspiciuntur, & nonnunquam etiam in hortis. plura requiruntur in Abrotano femina pag. 341.

lege lin. 9. incisura, Porru-laca marinae &c.

AMBROSIA sativa hortensis procerior.
Aduersf. pag. 341.



lege folia R. u. 24. lin. 24.



Artemisia fontana Argolica



Artemisia tenuifolia

Artemisia alcaem Mar

Salern Gal.

AMBROSIA patris.

In triplici differentia est Ambrosia, quarum hortensis propter cultum campestrum & sponte enatam foliorum magnitudine longè superat. odor, sapor, habitus non diuersi.

AMBROSIA tenuifolia: Abrotani vel Artemisia leptophylli species forisè.

Ambrosijs hæc facie cognata, sed foliis & floribus multò minoribus: nec alijs aut odor aut sapor illi.


Diosc. Vn eius reprinere accipellere, & illius adstringere humores, qui in aliquibus partibus incumbunt.



ABROTANVM *femina.*

Chamaecyparissus Plin. *Herbariorum.* *Sansonium*
minus Diosc. *Corô. Hist. Yerva Lombriquera.*
Advers. 341.

ABROTANVM *mas.* Gall. *Aueronne. Belg. Sut-*
ronna. Gallobelgis nonnullis, Bois S. Jean.
*Ang. Dorchterbusch. Advers. 342. **



Chamaecyparissos Plinio herba ex vino pota contra
 venena serpentium omnium scorpionumque pollet.

* *Diosc.* Crudum sementitum & feruesactum ex aqua in potu auxiliatur orthopnoicis, contusis, ruptis, co-
 cendiibus, vrina angustijs, mensibus suppressis, aut remorantibus. In vino potum exitialium venenorum antidotum
 est. Horroribus ex oleo illinitur. Serpentes & substratu & nidore fugat. Contra ichus eorum cum vino potum pro-
 deit. Priuatim efficac contra scorpionum & phalangiorum venena. Oculorum inflammationibus commodè illinitur.
 Cum cotoneo cocto, aut pane tritu cum farina hordeacea, decoctumq, tubercula discutit. Vini compositionibus ad-
 misceatur. Tde femina grauioris odoris videtur hic Diosc. agere.

Calidum & siccum tertio ordine Gal. stomacho infestum, de quo capite De Absinthio.

Gal. Abrotonum vltum calidum siccumque facilitate est, magis quam Cucurbita sicca vlt & A-
 sethi radix: illa enim vlcibus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conueniunt: ac
 proinde maximè vlcibus quæ pudendorum præputijs competere videntur. At cinis Abrotoni vl-
 ceribus omnibus mordax est: ac idcirco cum oleo zenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut sicyo-
 nio, aut veteri, & maximè Sabino ad alopecias accommodatur: tum herbam lenius tardiusque ena-
 scentem cum aliquo dictorum oleorum elicit: Sed nec minus illis lenifcino maceratum, quippe pro
 eo quod est tenuium partium, rarefaciendi vim obrinet, & mordax est & calidum.


Kk 2

Oderatus



Odoratum ABROTANVM *humile*
densè fruticosum.

ABROTANVM *inodorum.*



Materiae medicae peritiores hanc vna nobiscum Abrotanorum vnam sanxerunt, quibus bellè quadraret. Est quippe folijs non absimilibus, sed viticulis densissimè stipatis scuticatis sesquicubitalibus duorumque pedum, tenuibus, lignosis, copiosis flosculis Abrotani ex herbido laevis, odoratis. Radice lignosa, flexuosa & prolixa. Belgis hortense est.


ABROTANVM *inodorum & insipidum.*

Varietas. Abrotanum insipidum & inodorum vltra, folijs, flore & semine Artemisia tenuifoliae è collibus Gallobelgij alit Matonus, Coudenbergius & Iacobus Plateau harum tenuissimè & peritissimè.



ANTHEMIS vulgarior. Hisp. Manzanilla & Manzanilla salvage. Ital. Camanilla. Gall. Camamille des champs vulgaire. *Advers.* pag. 342.

ANTHEMIS seu LEUCANTHEMIS odorata. Parthenium Trag. Germ. Edel Chamill. Gall. Camemille & Camomille. Hisp. Manzanilla. Angl. Camomple. *Advers.* 342.




Diosc. Vinã habet radices, flores & herba excalfaciendi, extenuandique potu & infusione. pellunt menstrua partus. ^{eadem Plin.} vinam, calculosq; ^{eadem Plin.} aduersus inflationes & ilei tormenta bibuntur. bileni suffusam expurgant. iocineram vi- ^{eadem Plin.} tia sanant. decocto earum vesica fouentur. Ex omnibus ^{eadem Plin.} his generibus ad calculos efficacissima est, qua ^{eadem Plin.} siccum purgati- ^{eadem Plin.} roñ habet, cuius amplitudo mascula est. hanc proprio ^{eadem Plin.} Hieranthemon vocant. Ea cui ^{eadem Plin.} Leucanthemon nomen est ^{eadem Plin.} item qua chrysanthemon dicitur, vehementius vinã chunt. agilopijs ^{eadem Plin.} illis modentur. cõmandata vlcera erupio- nes in ore, sanant. nonnulli in clysteribus ex oleo vtiuntur. teruntur in farinam, ad abigendos febrium circuitus. Flo- res & folia recens debent, & prius in tusa, in pastillos dgeri; radix quoq; sicca, dumq; ingruit necessitas, bina partes herba dari, modo floris aut radice pars vna, modo contra, floris partes dua, & herba vna, permutatis du- plicato pondere, ad vni diebus. bibere autem oportet in vino muiso, diluto.

Gal. Calfacit & desiccet in primo ordine est & tenuium partium; ac proinde digerendi, laxandi & rarefaciendi vni obinet. quapropter lassitudinibus vbi quid aliud confert, doloq; mitigat. Pra- terea tena remittit & laxat, quæ mediocriter dura sunt, emollit, quæque constipata condensataue sunt, rarefacit. Ad hæc febres quæ circa visceris alicuius inflammationem insistant, dissoluit, pro- fertim quæ ex humoribus biliosis aut curis densitate consistunt, aut eas quæ iam concoctæ sunt. In- uat autem pulchre reliquas etiam omnes quæ melancholicæ sunt, aut pituitosæ, aut ex visceris infla- matione prognatæ: nam & harum remedium Chamamelam vel strenuissimum est, vbi iam con- coctis adhibetur quapropter & hypochondrijs, vbi si quid aliud, gratum existit.



ΑΝΘΗΜΙΣ *Chrysanthemum*.
Aduers. pag. 343.

ΒΥΡΗΘΑΛΜΥ *tenuifolium Narbonense*.
Chrysanthemum Valerianum Clusij.



ΒΥΡΗΘΑΛΜΥ. Gal. Oeil de beuf. Hisp. Oio de buey. Ital. Occhio di boue.
Germ. Steichdiumen & Dreindiumen & Rindts augh. Belg. Strupchloemen.
Chamamelum Chrysanthemum Fuchs. Aster atticus Cordi.
Aduers. pag. 334. & 345.


DIOSC. Flores cum cerato triti, tumores duritiesq; discutunt. Aiant sporam post exitum à balneo, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Gal. Buphrthalmi flores acriores Anthemidis floribus; proinde & vehementius digerunt, adre vt & duritias sanent cerato misti.

ΒΥΡΗΘΑΛΜΥ *tenuifolium Narbonense*.

Strigosis Galloprovinciæ & Narbonensis Galliz provenit floribus radiatis, luteis Buphrthalmi & folijs Anthemidis vulgaris siue Cotulæ non factidæ, minutis nonnihil incanis. Radix palmum æquat; cauliculi pedales, cuiusmodi etiam memini apud Franciscum Penninum & Valerandum Doxreum doctissimos & fidissimos pharmacopros Belgas exutas agro Montspelliaco.

ΕΡΑΝΘΗΜΟΝ. Aduers. pag. 344.
Tragus Asterem Atticam, cuius flos modo luteus, statuit.
Euchus vobè perperam Bogiam Confolidam.



Kovardais. PARTHENION, vel *Virginea* est COTULA fetida, non Matricaria.

Centasilla fetida. Germ. *Hondtzipt & hondtstum.*

Beig. *Padde bloemen & haedple.* *Advers.* 344.


Fu. *hs.* *perperam Buphthalmum & Thalietrum Cordi.*

DIOSC. Siccatum, cum aceto misso aut sale potum, non secus atque epithymum, & bilem & pituitam detrahit. suspiriosis prodest & melancholicis. herba sine flore à calculis & anhelantibus magna viilitate bibitur. Vales decoctum ad insidendum in duritia vulnerum, & inflammationibus. illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

PYRETHRUM officinarum. *Salutaris.*


Germ. *Bertam.* Beig. & Ital. *Pyrethrum.* Gall. *Pied*

d'Alexandre. *Hisp.* *Pelitre.* *Advers.* 346.




DIOSC. Radix gustu feracissimo, pituitam elicit. desin^o dolore dentium. decocta in aceto, collecto inde ore, exciliatur: mansa pituitam extrahit: sudores citet, peruncto ex oleo corpore. Diuturnis horribus^o efficax esse, & contra perfrictiones membrorum, resolutiones, & arimas conducit.

^o *Dentes refrigeratos Gal. mitigat.* ^o *ad rigores ante periodum, Gal. eadem Gal.* ^o *& frigidos capitis affectus, vertigines & comitiales.*



FOENICVLVM, *Hisp.* Hinojo & Funcho Lusit. *Ital.* Finocchio.
Germ. etiam Fenichel. & *Angl.* Fenichell.
Aduers. pag. 347.



Diosc. Fœniculum si herba edatur aut semen
 cum pitana bibatur, mammae lacte replet. coma de-
 coctum in renum doloribus subditum proficit, quippe
 quod urinam excitet. contra serpentium iclus in vino
 conuenienter bibitur. menses ciet in febribus nausæ &
 stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. con-
 trita radices & cum melle illita, moribus canum me-
 dentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in solo sic-
 catus, in medicamenta adyicitur, qua ad excitandam
 oculorum aciem † commodè temperantur. Extrahitur
 succus ad eadem valens, etiam semine viridi & amulsi,
 & radicibus prius germinatione incisis. In Iberia qua
 ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem.
 Caulem medium, dum herba floret, rustici demittunt,
 igniq; admouent, quò facilius vi caloris exudans, gum-
 mi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamen-
 ta oculor.

† *oculorum aciem*] non modò succus oculo-
 rum hebetudines expurgat foris illitus: sed in-
 tro quidem in corpus sumptus Fœniculus sic-
 cando humores tenues spiritus incrassantes,
 claritatem adfert; vel etiam per urinas educit
 aquea excrementa cerebro perfusa, qua hebe-
 tudines oculorum inferunt.

Gal. Ex tertio ordine calfacientium: defic-
 cat verò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc
 primi esse ordinis posuerit: proinde lac pro-
 creat. Quod si admodum deficcaret, non sanè
 efficeret. Suffulis eadem ratione auxiliatur, uri-
 nas mensesque ciet.

FOENICVLVM erraticum siue Hippomarathron.

Diosc. Est & syluestre fœniculum, magnum. fert autem semen cachryi simile. Cuius radix incensè olei,
 potaq; strangurie medetur. menses imposta ciet. ventrem silit, radice aut semine potò. contra serpentium morsus
 auxiliatur. calculos comminuit. regium morbum expurgat. lactis abundantiam facit. decoctione foliorum haustum,
 feminas à partu purgat.


Traditur aliud Hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio, semine variis, rotundis, acris, & odora-
 tis. Excalfaciendi naturam habet, & vivibus † fœniculo respondet, ad omnia infirmis.

† **Gal.** Hippomarathro facultate simile, sed debilius.

Gal. Radix & semen amplius quàm domestici deficcandi vim obtinet: quocirca ventris quo-
 que eo nomine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius boni radix
 modò, sed & semen Cachryi assimilè est, potestque & calculos frangere, & auriginosæ facies,
 mensesque & vginas mouere, non tamen lac congerere, sicut illud sepepius.

ANETHVM. Hifp. Eneldo.
Gal. Anet. Ital. Aneto.
Aduerf. pag. 347.

MEVM. Ital. Finochiella. Hifp. Cataloni: Siftra,
Piuillo oloroso. Angl. *Mustard*. Aduerf. 347. 348.
perperam Fuchf. & Trago *Datura*: Creticus.
& Corde Tordilium.



Diosc. Aridi Anethi coma seminifq; decoctum, potui lac euocat: inflationes & tormina sedat; aluum, vomitionesq; sistit. Urinas ciet. Singultus lenis Oculorum aciem beberat: genituram restinguit, asf dui potuan. Seminis vulua malo opportunis, ad defefiones viile. Condylomata iulius eius cinis tollit.

Gal. secundi ordinis intensi calidum, aut tertij remissi; exiccantium verò est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaque meridò in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos & incoctos humores concoquit. fit enim ex eo oleu cuius propinqua sit temperies pus mouētibus, & concoquentibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tum subtilius est, ac proinde digerens. Vstum autem tertij ordinis tum exalfacientium, tum deficcantium fit, & proinde vlcēribus nimis humidis mollibusq; prodest; potissimùm ijs quæ in pudendis consistant. At quæ in propuio sunt inueterata, ea probè cicatrice includit. Cæterùm viride humidius est & minus calidum; itaque magis concoquit, & somnum conciliat; sed minus digerit.

MEVM.


Diosc. Radicibus longis, rennibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ seruosilla ex aqua, vel vine cietra coctionem, praclusorum rennium vesicah, sarrila vitta potu ionant. vna diffentatis videntur. Stomachi inflationes discutiunt. Torminibus, affecta vulua, articulozum doloribus, atque iulionibus pectoris, vna cum melle in elegmate auxiliantur. sanguinem per menstrua pellunt, defefionibus feruosilla. insaniabus autem illare imo ventri, vna vna vna.

Gal. & Aegin. Mei radices calidæ o rdo ordine, sicca secundo: proinde vna mer se sepe ciet re volentes hoc vrantur pharmaco. Sed si plasculum sumatur, capiti dolorem mouet, et pote tunc plus u lum fit calidum quàm sicca, quippe quodd eius caliditas humiditatem crudiorum etiam nam, & dataphorem ad caput defetat, atque ita ipsum afficiat & laedatque.

in vna amygdala, vinum & huiusmodi.

*Spiraea NIVM alteram Italianam.
Micum secundum Matth.*

*FERYLA. Ital. Ferola. Gall. Ferule.
Advers. pag. 348.*



Superiori Meo facie non abstrahile; sed folia, caules cubitales, umbellæ, crassiora & habitiora subitrosi odoris. Radix item maior, foris pulla Peucedani facie & concretionem, tetti & iniucundi cum odoris, tum saporis.

FERYLA.


Diosc. *Viridi. Ferula medulla pota utilis est ad eruentas excretiones, colicisq; contra viperarum morsum in vino datur. erumpentem naribus sanguinem indies sistit. Semen potum torminosi auxiliatur. sedores eius, viti ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt. mura conduuntur. Ferula itaq; candem profere ternem sape subitrosam; folia sarriculi, longe asperiora & laciora. qua ad imo caule vulvulara sagapenum efficitur.*

Sagapenum.

Gal. *Ferula semen exaltescit & attenuat. Cæterum id quod intus inest, quod medullam vocant, adstringentem qualitatem participat, cuius nomine sanguinem spuenticibus & colicis conuenit.*



GALBANIFERA Ferula.



Oritur in hortis nostris hæc peruenusta plāta semine copioso lato, foliaceo, aromatico, re-
perto Antuerpiæ in Galbani lachryma. Totā fa-
cie Ferulā refert: folia exilia: strobili item in um-
bellis hilarioribus. radix crassa, succo pragnas.


Diosc. Galbanum succus est nascentis in Syria
ferula, quod nonnulli meotropium vocant. Maxime lan-
datur cartilaginosa, incertum, thuris effigiem prabens,
pingue, minime lignosum, retinens nonnihil acie di-
sternis & ferula, graui odore, neq; valde humidum ne-
que nimis aridum. Adulteratur saba fræsa, resina, &
ammoniaco. Galbanum excoctat, vrit, extrahit, di-
scurit, menses ac partus trahit, appositu vel suffitu. Icti-
gines aceto & nitro perunctas tollit. denotatur ad tuf-
sim veterem, difficultatem spirandi, suspensio, rupta,
convulsio: aduersatur toxicis, potum cum vino & myr-
tha. simili modo sumptum mortuos pariter extrahit.
imponitur lateris doloribus, & furunculis. comitiales,
& vitæ strangulatus, & vertiginosos olfactu suscitatur.
si vritur, fugat nidore serpentes, & perunctis ferri
non patitur. serpentes cum oleo & sphondylo circum posi-
tum, necat. dentium dolorem oblitum, aut cavernis
inditum, mitigat. vrina difficili prodesse existimatur.
Resoluitur ad portiones amaris nucibus, aqua, aut rura,
aut calido pane, mulsane. aliis meconio, ere vitæ, aut
felle liquido. Si purgare galbanum vult, in feruentem
aquam demittito. nam, cum lignescitum fuerit, eius
sordes sicut abunt. quas hoc modo facile separabis: munda
luteo raro, alligatum in filis aut area pyxide ita
pondeat, vt inuivrasis ne tangat, operroq; vase in
feruidam aquam demittito. sic enim hincernum, veluti
per colum eliquescet, & lignosum in luteo remanebit.

Gal. Galbanum succus est plantæ ferulaceæ molliendi & digerendi vi: fueritque sanè ex tertio or-
dine excoctantium incipiente, aut secundo completo, in deticcando verò ex secundo incipiente.

Ammoniacum.

Diosc. Ammoniacum, ferula succus est, quam iuxta Cyrenen Aphrica gignit. cuius fruticem cum radice a-
gasylin vocant. Probatum bene coloratum, li: ni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum,
sincerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausina, id est frater am,
appellatur: quod vtrò terram & calculos collegit, phryama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum
stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calcificat. tubercula duritia, discurit, potum, aluum soluit. partus
extrahit. lienem consumit, de achina pondere haustum. articulorum coxendiciumque doloribus liberat. auxilio est ar-
thelatoribus, arthopnoicis, comitialibus, item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum pisa-
na succo sorbeat. cruendam vruam pellit. albugines oculorum absterget. genarum scabritiam absumit. tritum
autem cum aceto, & impositum, iocineris lienisq; duritias sedat. discurit topas, qui in artibus conalluerunt, cura
melle aut cum pice illitum, lasitudines & coxendicum dolores eo perangi velle est, cum nitro & cyprino oleo, vi-
ce acopi.

Gal. Ammoniacum emolliendi facultatem habet intensam, adeo vt & articulorum topas dissol-
uat, & lienes induratos sanet, & choeradas per halitum digerat.



FOENICULUM. Hisp. Hinojo & Funcho Lusit. Ital. Finocchio.
Germ. etiam Fenichel. & Angl. Fennell.
Aduers. pag. 347.



Diosc. Feniculum si herba edatur aut semen cum pitana bibatur, mammae lacte replet. coma decoctum in renum doloribus subditam proficit, quippe quod urinam excitet. contra serpentium ictus in vino conuenienter bibitur. menses ciet in febris nausea & stomachi feruorem, ex aqua frigida potum sedat. contrita radices & cum melle illita, morsibus canum medentur. Succus caule & folijs exprimitur, & in sole siccatu, in medicamenta adyctur, qua ad excitandam oculorum aciem † commodè temperantur. Extrahitur succus ad eadem valens, etiam semine viriditate multiss, & radicibus prima germinatione incisis. In Iberia qua ad occidentem spectat, succum reddit gummi similem. Caulem medium, dum herba floret, rustici demetunt, igniq, admovent, quò facilius vi caloris exudans, gummi remittat. quod efficacius succo est, ad medicamenta oculor.

† oculorum aciem] non modò succus oculorum hebetudines expurgat foris illitus: sed intrò quidem in corpus sanptus Feniculum siccando humores tenues spiritus incrassantes, claritatem adfert; vel etiam per urinas educit aquea excrementa cerebro perfusa, qua hebetudines oculorum inferunt.

Gal. Ex tertio ordine calfacientium: desiccatur verò non æquè, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit: proinde lac procreat. Quod si admodum desiccaret, non sanè efficeret. Suffusis eadem ratione auxiliatur, urinas mensesque ciet.

FOENICULUM erraticum siue Hippomarathrum.

Diosc. Est & syluestre feniculum, magnum. fert autem semen cacheri simile. Cuius radix incunatè dicit, potaq, strangurie medetur. menses imposta ciet. ventrem fistit, radice aut sermone pota. contra serpentium morsus auxiliatur. calculos conminuit. regium morbum expurgat. lactis abynatipiam facit. decoctum foliorum haustum, feminas à partu purgat.


Traditur aliud Hippomarathi genus, longo, exili, & angusto folio, semine coriandri, rotundo, acri, & odoreto. Excelsionatè naturam habet, & viribus † feniculis respondet, ad omnia infertius.

† Gal. Hippomarathro facultate simile, sed debilius.

Gal. Radix & semen ampliusquàm domestici desiccandi vim optinet: quocirca ventris quoque eonamine sistere videtur. Nec sanè manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius non tantò modò, sed & semen Cacheri assimilabile est, potestque & calculos frangere, & auriginosos facere. mensesque & urinas mouere, non tamen lac congerere, sicut illud superius.

ANETHVM. Hisp. Eneldo.
Gall. Anet. Ital. Aneto.
Aduers. pag. 347.

MEVM. Ital. Pinocchiella. Hisp. Catalonis Sifra,
Pinillo oloroso. Angl. *Meu*. Aduers. 347. 348.
perperam Fuchs. & Trago *L'ancus Croatica*.
& Cordo *Tordilium*.



Diosc. Aridi Anethi coma seminifq; decoctum, potulac vocat: inflationes & tormina sedat; alium, vomitionesq; sistit. i rinas ciet. Singultus lenis Oculorum aciem heberat: genituram restinguit, asf due potum. seminis vulua malo opportunis, ad defestiones viue. Condyomat a illius eius cinis tollit.

Gal. secundi ordinis intensi calidum, aut tertij remissi; exiccantium verò est secundi incipientis, aut primi finientis. Itaque merito in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum conciliat, & crudos & incoctos humores concoquit. fit enim ex eo oleu cuius propinqua sit temperies pus mouentibus, & concoquentibus vocatis medicamentis, nisi quatenus paulò illis tum subtilitas est, ac proinde digerens. Vstum autem tertij ordinis tum excalfacientium, tum desiccantium fit, & proinde viceribus nimis humidis mollibusq; prodest; potissimum ijs quæ in pudendis consistunt: At quæ in preputio sunt inueterata, ea probe cicatrice includit. Caterum viride humiditas est & minus calidum; itaque magis concoquit & somnum conciliat; sed minus digerit.

MEVM.


Diosc. Radicibus longis, tenuibus, odoratis, linguam excalfacientibus. Quæ seruescunt in aqua, vel trita cietra colligunt, praclusorum renum vesicæq; sacra vitæ potulament. vri: a difficultatis medentur. stomachi infestiones discutunt. Torminibus, affecta vulua, articolorum doloribus, æque fluxibus pectoris, trita cum melle in cellegmate auxiliantur. sanguinem per menstrua pellunt, defestionibus seruescunt. infantibus autem illa ino ventri, vri: mouent. quod si plus quam decem ex his bibatur, caput dolore afficitur.

Gal. & Aegin. Mei radices calidæ: tertio ordine. sicca secundo: proinde vri: inter seque cietre volentes hoc vtuntur pharmaco. Sed si plasculum sumatur, capiti dolorem mouet, ut pote cum plasculum sit calidum quàm siccum, quippe quod eius caliditas humiditatem cruditiorem etiam tum, & flatuositatem ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat & ledatque.

¶ vti amygdala, vinum & huiusmodi.

Spirium MITHRIDATICUM alterum Italicum.
Idem secundum Matth.

FERULA. Ital. Ferola. Gall. Ferule.
 Advers. pag. 348.




Superiori Meo facie non absimile; sed folia, caules cubitales, umbellae, crassiora & habitiora subitrosi odoris. Radix item maior, foris pulla Peucedani facie & concretionem, terti & iniucundi cum odoris, tum saporis.

FERULA.


Diosc. *Viridi Ferula medulla pota utilis est ad cruentas excretaiones, celiacosq; contra viperarum morsus in vino datur. erumpentem naribus sanguinem indicat sistit. Semen potum torminosi auxiliatur. sudores elicit, vitio ex oleo corpore. Caules, si odantur, capitis dolores faciunt, nituria conducunt. Ferula itaq; eodem proferi terminem saepe cubitorum: folia sericula, longe asperiora & latiora. quae ad imo caule vulnerata sagapenum efficitur.*

Sagapenum.

Gal. Ferulae semen exalfacit & attenuat. Caeterum id quod intus inest, quod medullam vocant, adstringentem qualitatem participat, cuius nomine sanguinem spurcibus & coctis coarctat.



GALBANIFERA Ferula.



Oritur in hortis nostris hæc pervenusta planta semine copioso lato, foliaceo, aromatico, reperto Antuerpiæ in Galbani lachryma. Tota facie Ferulâ refert: folia exilia: flosculi item in umbellishilarioribus. radix crassa, succo prægnas.


Diosc. Galbanum succus est nascentis in Syria ferula, quod nonnulli metopium vocant. Maxime latetur cartilagosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minime lignosum, retinens nonnihil adiecti feminis & ferula, grati odore, neq; valde humidum neque nimis aridum. Adulteratur faba fresa, resina, & ammoniaco. Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, discutit. menses ac partus trahit, appositum vel suffitum. Itirigines aceto & nitro perunctas tollit. deoratur ad usum veterem, difficultatem spirandi, suspensia, rupta, contusa: aduersatur toxicis, potum cum vino & myrrha. simili modo sumptum mortuos partus extrahit. imponitur lateris doloribus, & furunculis. comitiales, & vitæ strangulatus, & vertiginosus olfactu suscitatur. si vritur, fugat nidore serpentes, & perunctis feris non patitur. serpentes cum oleo & spondylo circum positum, necat. dentium dolorem oblitum, aut cavernis inditum, mitigat. vrina difficili prodesse existimatur. Resolvitur ad potiones amaris nucibus, aqua, aut ruta, aut calido pane, mulsæne, aliis metonio, cre vilo, aut felle liquido. Si purgare galbanum vult, in ferventem aquam demittito. nam, cum liquefactum fuerit, eius sordes fluit abunt. quas hoc modo facile separabis: mundo linteo raro, alligatum in fideili aut area pyxide ita pendeat, ut insurrasis ne tangat, oportet, vase in feruidam aquam demittito. sic enim sincerum, veluti per colum eliquescet, & lignosum in linteo remanebit.

Gal. Galbanum succus est plantæ ferulaceæ molliendi & digerendi vi: fueritque sanè ex tertio ordine excalfacientium incipiente, aut secundo completo; in desiccando verò ex secundo incipiente.

Ammoniacum.


Diosc. Ammoniacum, ferula succus est, quæ iuxta Cyrenen Apivica gignit. cuius fruticem cum radice agasylum vocant. Probatum bene coloratum, liqui & calculorum expers, thuris similitudine, minutis globis, densum, sincerum, nulla sorde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausina, id est felaturata, appellant: quod verò terram & calculos collegit, phryama. gignitur in Aprica iuxta Ammonis oraculum, succum emittente ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit. tubercula durissima, discutit. potum, cibum solvit. partus extrahit. lionem consumit, drachma pondere haustam. articulorum coxendiumque doloribus liberat. auxilium est ad delatorem, orthopnoicis, comitialibus. item quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cum pistana succo sorbeat. eventam vrinam pellit. albugines oculorum absterget. generem scabritiam absumit. tritum autem cum aceto, & impositum, iocineris lioniq; duritias sedat. discutit topas, qui in artibus concalluerunt, cum melle aut cum pice illitum. lassitudines & coxendium dolores eo perungi videri est, cum nitro & cypræ oleo, pice accipi.

Gal. Ammoniacum emolliendi facultatem habet inensera, adeo ut & articulorum topas dissolvat, & lienes induratos sanet, & chæradas per halitum digerat.



THAPSIA vulgaris Carota effigie.

Math. & Ital. Thassia, Gall. Turbit gris.
Sagapeni odore Ferulacea, an Sagapenifera Ferula?



Sagapenu admodum odore affinis est ea Ferulacea planta quam alit generosus vir Ioannes de Brancion, patulis & ramosis folijs procumbentibus, delicatioribus, Syderitidis Achilleæ & Cotulæ frigidæ ritu diuisis. Radice succulenta Peucedani foris puila, intus candida, odoris virosi. Flos in latis umbellis luteus, & semen foliosum Sefeli Peloponensis. Nascitur plurima in Apulia Gargano monte Matth. teste.

SAGAPENVM. Aduers. 349.

Sagapenum potentissimè digerit: estque epipalticum medicamentum; alopecijs vile, educendo, & digerendo seruum pituitosum, quo locus affectus obruitur; & sanguinem ad partem alliciendo.

Diosc. Sagapenum ferulacea herba succus est, quam in Media nascitur. Optimum est translucent, sulcos formæ secus colore, & intus albo, nescio quid inter laser & galbanum resolens, gustus acris. Prodest laterum & pectoris doloribus, tussibus vetustis, convulsis, & ruptis, crassam pulmonis pituitam expurgat. datur comitibus, opifi botonicis, hepatis, item contra nervorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circums in potu. in unguentis probe admittitur mensis pellit, sed faciem exanimat, cum hyromelice potum. prodest ex vino haustum, serpentium scorbis, viscibus aceto vulnarum frangulatus excicat, oculorum cicatrices, offusam caliginem, heberudines, suffusionem, detergit. Resoluitur ut laser, ruta, aqua, & auriarum mitionis, aut melle, aut calido pane.

Gal. Liqueor est calidus & tenuium partium, sicut & alij liqueores. Sed & absterforium quoddam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat atque extenuat. Quia & suffusionibus & heberudinebus oculorum que ob humorum provenit crassiciem, non malum est medicamentum. Aripia planta ex qua provenit Ferula affinis, imbecilla & inutilis est. Sanè ipsa primum Sagapenum appellatur. Ac liqueor eius abusus hoc nomen obtinet, etia alia quoque multa ex nominis defectu per abusum nuncupamus.

THAPSIA. Diosc. Turbith Mesue. Aduers. 350.

Diosc. Radix foris nigra, intus candida, longa, acris, crassiore libro vestita. Lactis extrahendi ratio hac est: Bello in ambitu scrobis, cortices inciduntur: aut radix in fornice speciem in se excavata, cooperitur, quod merus succus conficitur, oportet illuc sequenti die se conferre, & congestum succum extrahere. Tunditur etiam radix in pila, & succus organo per quatuor expressus, siccis crasso insolatur. Aliqui solum unam terunt, sed inualidior huiusmodi succus. Hic autem increscit, quoniam qui ab radice manant, grauius olet, & humidus permanet: è folijs autem extractus, excucatur, atque seredonum inuicem sentit. Qui succum colligit, stare debet non obuersus vento: aut potius, cum dies apricus est, & à flatu silet, quoniam ob halitus acrimoniam facies vehementer intumescit, nudaq; corpora inuadunt pustula: ob id prius liquido cerato & adstringente, nudas partes illinunt, & ita nuntio accedunt. Tam cortex radice, quã succus, purgandi vim habent. Lacteus succus in aqua mulsâ potus, vtrinq; bilium extrahit. Radicis modus, quaterni oboli, cum tribus seminis anethi drachmis: succi, terni oboli. Lactis, oboli vni, quod eo amplius assumitur, periculosum est. Huiusmodi purgatio conuenit suspensiosis, & diuturnis laterum doloribus, reiectionibusq; datur in cibis aut obfensio, quibus difficile sit vomere. Tam radix quam succus omnium maxime, qua partes cum eis vires adeptasunt, vni habent extractoriam ex alto, vbi ex imo aliquid euscandum est, aut meatum laxius alio transferenda est. vnde succus illitione, aut radix recens affricus, alopecias explet. Radix succisq; cum aquis cere thurisq; portionibus, sugillata liuoresq; tollunt: sed non plus bimis horis dimittantur: locus deinde aqua maris calida foueatur. Vicia cutis in facie emendat, cum melle illius succus. lepras tollit, tubercula discutit, perunctus cum sulphure, in diuturnis pulmonum, laterum, pedum, articularumq; valetudinibus vtiliter illinuntur. valet ad inlegendam colic glandem, ijs qui natura, non circumsione, curti sunt, tumorem enim excitat, qui pinguium fori emollitus, præputij iacturam resarcit.


Gal. Acrem habet ac valenter exalfacientem facultatem cum humiditate coniunctam. Quamobrem ex alto violenter extrahit, & ipsum quod extrahit digerit. Verum plusculum ad ea efficienda tempus postulat, vt quæ larga humiditate excrementitia impleta est, ob quam celeriter corrumpitur.

Mesue. Turbith calidum est ordine tertio, purgat trahendo mediocriter, flatu excitat ventriculum ad nauseam euerentes: siccatur quoque excrementis etiam tenuibus vacuatis. Correctum enim Turbith pituitam crassam & lentam & putrem à ventriculo, thorace, neruis, etiam à remotis, præcipue iuncturis educit. Ob id ad dolores arthriticos vsus eius est: à psora, lepra, baras, & alijs vitijs pituitosis, tum cutis, tum aliarum partium; & pituitosis febribus, aut præseruat, aut vindicat. Hoc autem sumpto, vitabis austerum, & vsam piscium. Purgat tardè & imbecilliter, & stomachum ad nauseam subuertit, & vsu crebro corpus extenuat. Ob id cortex eius ad albũ vsque abradendus est. Acribus autem, vt Zingibere, sic eius actio intenditur, vt proprietate quadã mirabili per id cumulatam, etiam à iuncturis, & his remotissimis & profundissimis pituitam crassam & lentam extrahat, cum per se solam tenuem pituitam educat, idq; tardè. Ne verò stomachũ exagitet, ac euertat, medicamenta stomachica miscentur, & odorata agitationem eius placatura, vt Mastiche, Zingiber, piper longum, gallia, & aromatica alia. Ne denique corpus emaciet, oleum amygdalinum, vel amygdala vel saccharũ ei miscenda sunt; vel cum Russo pistachia. Si quam in corpore noxam reliquit, pota mulsâ calente, aut quæ saccharo rubro est dulcorata, aqua calida, cam profligabis. Coctionem & trituram mediocrem sustinet. Datur puluere à drachma vna ad 5. duas: Decocto autem à drachmis duabus ad drach. quatuor.

PEUCEDANVM. Itai Peucedano.

Hisp. Yeruatun y fenicho de porco.

Gal. Peucedane, Aduers. 350.



PEUCEDANVM.



DIOSC. Tener gradim cultello conciditur, profuensq; e plaga succus umbra mandatur. in sole siquidem confestim enanescit. Colligitur capite prius. & naribus rosaceo persusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiat. assatione radix inutilis fit. Tam lac quam succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti e mādāragora. verum inefficacior succo lacryma habetur, & velocius expirat. Interdū etiā concreta inuenitur lacryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adharēs. Praefertur succus e Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruēs gustu. Ex oleo & rosaceo illitū Peucedanū prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutū, ischiadicis, conuulsis. ^a omnibus, in vniuersum, vitijs neruorum, ex oleo & aceto illitum, prodest. eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veterinosi reuocantur. incensum serpentes abigit. aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur. cauernis dentium ^b inditum, mitigat dolorem. contra tussim ^c efficacissimè ex ovo assumitur. spiritus, terminibus, & inflationibus subuenit. ventrem leniter emollit. lienem ^d absumit. difficiles partus mirè adiuvat. facit ad vesica cruciatus, & renum distentiones potum. vuluam aperit. Radix ad eadem utilis est, sed inefficacior. eius decoctum bibitur. farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit. Squamas ostium extrahit. in cerata & calfaciētia malagmata additur. Radix eligi debet recens qua cariem nō senserit, firma, odoris plena. Succus ad potiones amaris nuncijs aut Ruta aut pane calido, aut atterbo resoluitur.

^a Gal. quia succus exalfaciens admodum & digerens.

^b eadem Gal. quia tenuium partium & exalfactorius.

^c Gal. morbis in pulmone thoracēque ex crassitudine & viscositate humorum prouenientibus. Atque intro quidem in corpus sumptus: sed tamen etiam olfactu prodest.

^d eadem Gal. incidendo, digerendo atque extenuando crassos humores: Sed & radice ad hæc uti liceat, quæ & squamas celestimè ab ossibus detrahit, quia videlicet validè desiccet, minus tamen quàm succus exalfaciens. Et vlcerebus contumacibus remedium est optimum arida illita: ipsa enim expurgat, carnem inducit, & ad cicatricem perducit: Exalfaciens quidem ordine secundo iam completo, desiccans verò tertio iam quodammodo in eipiente.




Peucedanum
Sardinia
Italia



Varietas. Pencedannum Italicum est Narbonensi quadruplo maius omni sui parte. Provenit copiose in collibus Laurentis & agri Romani.

PANAX ASCLEPIUM.

Aduers pag. 331.



CACHRYS verior.

Libanotis Galeno.



Circa Iustinopolim & Aquilegiam Istriæ spontè oritur.

Diosc. Auxiliarem vim habent flores & semina, contra vlcera, phagedænas, & tæ creta, si trita cum melle imponatur. *Aduersus serpentes* ex vino bibuntur, & cum oleo illuminantur.

Gal. minus est ciliam Heracleio Panace: quæ nobrem floribus eius & semine melli mistis, ad vlcera, phymata & phagedænas vtuntur.

ROSMARINUM ferulaceum superius descriptum

Aduers. pag. 331.

Est patris Rosmarinum alterum ferulaceum Diosc.

CACHRYS verior.

Semine est tereti, oblongo strobilo sine nucleo Pisi subpari, bipartito serulari riu, gustu aromati-
co acri. Seseili Aethiopiæ resinoso, canie cubitum & sesquicubitum æquante. folia fœniculo crassio-
ra, pallidè virentia. Quidam Seseili Massiliensè statuunt; & tanè faciliates respondent, uti & Ros-
marino fœcundo, cuius semen Cachrys dicitur, & appositè substitui possunt. Belgis horrense est.

Diosc.





DIOSC. Trita omnium herba communitur hemorrhoidum profluvia sistit. sedis inflammationes & conglobata mitigat. concoquit strumas & abscessus, qui ad maturacionem egre perducuntur. Sicca radices cum melle tictas purgant. torminibus inceduntur, cum vino pota. & contra serpentium morsus conueniunt. menses & vrinas cient. veteres tumores illitu discutunt. Tam radice quam herba succus, adiecto melle illitus, oculorum aciem exacuit. Potum semen ad eadem pollet. si comitiale malum sentiat, aut vetus pectoris vitium, auxilio est. regio morbo laborantibus cum vino & pipere datur. sudores monet, cum oleo perunctum. ruptis & conuulsis prodest. podagricum liliaceo farina & aceto tritum, illinitur. purgat vitiligines, addito aceto quam acerrimo. Semine in potionibus vrenali, eius quidem quod Cachryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, folijs lactuca syluestris amara asperioribus, candidioribusq;, radice breui, Theophrastus auctor est. potumq; id ipsum alterutra parte purgare. Cachrys vim habet exarsificandi, & vehementer exiccandi. quare abstergentibus medicamentis inservit. contra oculorum fluxiones capiti illinitur, ita vt tertio die soluitur.

Gal. Libanotides tres sunt, vna sterilis, duæ fructum ferentes. Omnes verò eiusdem facultatis, emollientis & digerentis, abstergentis, incidentis. Succus tum radice, tum herbae mistus melli obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine curat.



ELLEBORVS FERVLACEVS Theoph.
Consiligo Matth. Helleborinum Cordi, & Sesamoides minus Ges. Aduers. 351. & 345.
Ruphrbalmum Dod. & Anguillera.

SAXIFRAGA Anglorum, facie Seseoides
gratensis Monspelliensium.



Seseli Massiliense. Advers. pag. 332.

LIGUSTICUM alterum Belgarum.



Seseli Massiliense Ferulae aut Danci Cretici facie; maioribus, crassioribus, latioribus, latiusque sparsis Fœniculi foliis. Caulis bicubitalis & procerior: semen in umbellis Mei, compressum, anethi carnosius, gustu Seseli Æthiopici aut Peloponensis, valde aromaticum. Munere Ambrosij Boone, Bru-xellensis, Regij Consiliatij, peritissimi, & Francisci van Zinnich pharmacopœi doctissimi, & rariorum simplicium, ut si quis alius, studiosissimi in vireto Mutonus Tornaci serendum curavit, nosque plantis donavit.


DIOSCOR. Seseli Massiliense folia fœniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim acre. radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excelsi facienti vim habent. potu sicut anguria & † orthopneumæ medentur. suffocationibus mulierum comitialibusq; prosunt, menses & partus trahunt. ad omnia interea mala possunt. tussim veterem sanant. semen cum vino potum, concouit & tormina discutit. epialis febribus: vtile. contra perfrictiones in itineribus, cum pipere & vino bibitur. capris, ceterisq; pecudibus datur in potu, quò facilius suos fecerunt. utitur.

† Eadem Gal. superius cap. de Seseli Peloponensi.

LIGUSTICUM alterum Belgarum.

Non inelegans planta multis iam annis à me reperta in Taurinis ardensissimis collibus non procul à Padi fluentis. In hortis Belgicis alitur, caulem promens cubitalem & sesquicubitalem, quem ambiunt folia Rutacea Siseris Montani latiora, rotundiora, Absinthij fruticis serè paria. Flores & semen rotundum nonnihil aromaticum in umbellis Smyrenij Creuici.

ASPARGVS domesticus vulgaris.



ASPARGVS. Advers. pag. 353. Sylvest. Asparag. March.

In Graecis nullam mentio.

Maritimus numerosis maioribus baccis rubellis & foliis longioribus, mollioribus, acrior est propter saluginem.

DIOSCOR. Cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. Assus autem coctusve, vrima stillicidium, difficultatemq; ac dysenterias mitigat. Radix cum vino aut aceto cocta, luxatos artus mulcet. decocta cum sicis aut cicoribus sumpta, regium morbum sanat. Coxendicis cruciatus, stranguriamq; leuat. Alligata radix, aut haustum eius decoctum conceptum adimit, & sterilitatem auferit.

Hortenses vel marini mitiores multo, magisque temperati. Rhasis calidos & humidos putat: quod de tenellis turionibus intelligendum.

Plin. Vtilissimus stomacho cibus, vt traditur, Asparagi. Cumino quidem addito inflammationes quide stomachi, coliq; discutunt. Idem oculis claritate afferunt. Ventrem leniter molliunt. Pectoris & spinæ doloribus, intestinorumque vitis profunt. Vino coquantur addito: lumborum & renum dolores mitigant. Venerem stimulant. Vrinam cient vtilissimè, præterquam quod vesicam exulcerant. Radix quoque plurimorum prædicatione trita, & in vino albo pota, calculos exturbat. Quidam ad vuluæ dolorem radicem cum vino dulci propinant. Eadem in aceto decocta contra elephantiam proficit.

Inflationes (potius quam inflammationes) stomachi & coli discutunt addito cumino, vt magis

siccant, quod Auicennas in colica pituitosa prodesse ait. Flatus dissoluit qui dolores faciunt. Calculos exturbat renum: Est enim tenuium partium & caloris particeps: quare dum incidit pituitam crassam, arenulas coniunctas diuidit: vel vrinam multam ad renes deducendo, calculos tantum in vterere quam vesica exturbat.

Alligata radix] Sterilitatem auferre, & conceptum adimere, ex diametro pugnant. Nam quæ venerem stimulant, solent fecunditatem adferre; quemadmodum ex Plinio Asparagi, nisi quisquam crediderit, Rubiæ consimili vi, non modò copiosam vrinam ciete, & nonnunquam sanguinem, sed haustam & decoctam, partus, menses, secundasque trahere, & cum Plinio vesicam vicerare: etiamque vterum. Quare si hoc efficiat, non mirum fuerit, si sterilitatem inducat. Hoc tamen præstare rarò videmus in mulieribus nostris; quæ frequenter Asparagi vtuntur cum ad morbos, obstructions iecoris & renum: tum ad cibos; quæ tamen fecundissima sunt. Asparagi quippe natura, etiam S. Scilio media posita est inter olera & carnes, propter nutriendi facultatem plantarum & carnium; quæ similiter se habet. Olerum enim omnium maximè nutrit Asparagus.

Gal. Tanto firmitus alunt quam olera Asparagi, quo ipsis sunt sicciores. Auicennas contrarium scripsit, quod magis probatem: Augere nempe semen, coitam, & conferre difficultati imprægnationis.

Idem oculis claritatem afferunt.] Huius facultatis non meminere Diosc. neq; Galenus, neque alij. Sed vt Funiculus sicca do humores tenues spiritus incrassantes claritatem afferre possunt. Vel cum vrinam mouent & purgant caput, incrementis aqueis minus abundat cerebrum; & ob id sensus efficaciores redduntur.

Ventrem leniter molliunt.] Vt acia omnia tandem ventrem mouent.

Vrinam cient.] Vicerare vesicam ferè omnia medicamentis commune, quæ potenter mouent vrias: quare his quibus affecta est vesica, frequentior vsus Asparagorum periculosus est.



Seebus.



CORVSA

CORRUDA varietas. *
Asparagus petraeus & myatanthinus Gal.

CORRUDA tertie Clusij.



* Hispanica altera aut Lusitanica Corruca folio est maiore, longiore & duriore quam Narbonica, Scorpio Theophrasti æmulo. Cætera cuncta non absimilia. Belgis studiosè in fictilibus aitur munere C. Clusij.

CORRUDA tertie.


Tertiam Corruca differentiam memini in Galloprovincia à C. Clusio literis præditam, ramosis candidis cubitalibus virgulis; Corruca Narbonensi similibus, in quibus horrida spina reflexa è foliorum prioribus longiorum exortu aptantur. flosculi ex viridi pallentes inter folia ex alarum sinu, longo tenuique pediculo hærent. Baccæ veluti tricoecæ, unico intus grano, raro duobus, Smilacis asperæ; alteram Corrudam radix æmulatur.

Dioscor. Cauliculi in cibo colli ventrem emolliunt, urinam cient. Radicis decoctum contra vitæ difficultatem, Regium morbum, renum vitia, & coxendicem cruciatum, in potu proficit. Cum vino autem, phalangiorum moribus auxiliatur; si de colli succus super dente contineatur, eius dolori medetur. Semen potum ad eadem valet. Cavet, ut aiunt, si decoctum bibant, emoriantur.

Gal. Abstergendi vim habet, idque citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc reos aciecur infarctu liberat, & maxime herbæ ipsius radices & semen. * Quin & dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam vel maxime dentes requirunt.

Primæ pullulationes edendo aptæ, & ut marini Asparagi, abstergunt citra manifestum calorem aut frigiditatem, quæ humido absumpto calidiores & sicciores evadunt. Semen calidum & siccum: fovendo ordine.


DRYPIS Theoph. Anguillara.



MYRIOPHYLLUM Equisetifolium.



Radice reptice, Graminis tantisq; in graci-
 floribus gemculatis ramulis cubitalibus, folia spe-
 ciosa Juniperi minoris, Nepae aut Corruzae Hilde-
 nicae. flosculi albi umbellatum conferti. Semen in-
 quit Anguillara, glumis nondum exutum, Ory-
 zae simile; exutum autem Sertulae Campanae, cro-
 cum.

MYRIOPHYLLUM aut Maracriphyllum palustre.
Aduers. pag. 334. & 333. 334.

DIOSCOR. Vulnera recentia ab inflammatione
 vindicat, si vel viride, vel siccum ex aceto oblinatur. Praci-
 pitatis in potum cum aqua & sale datur.

Gal. Usque adeo desiccatoriae est facultatis, ut
 vulnera glutinet.

MYRIOPHYLLUM equisetifolium fuscicollis

Aduers. pag. 334.

Myriophyllum alterum Matth.

Viola aquatilis Dod.

Belg. water bisticeen.

Gal. giroflées d'eau.

EQUISETUM thaluz cum asparagis novellis. *Aduers.*
pag. 355. **CAUCON** Plin. Anguil.
ital. & Hisp. Coda di cavallo.

DIOSCOR. Vis herba suffire. quare sanguines
naribus erumpentem succus ipse sistit. prodest dysentericis
in vino potus. urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutin-
antur, tritis foliis, & illis. Radix cum sua herba tussim,
orthopneam, ruptaq; adiuvat. Foliis in aqua potis, disse-
ctiones vesicae & intestinorum, enterocelaq; in vnum coa-
lescere, cogiq; feruntur.

Alterum Equisetum caulis est rectus, cubitalis, aut ma-
ior, inanis. comis per intervalla brevioribus, candidioribus,
& mollioribus. id cum aceto tritum vulneribus remedio est,
eademq; fungitur facultate.

'Eadem Gal. & rubrum muliebri profluuium.



Gal. Adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde valenter, simulque ci-
tra mordacitatem exiccante. Itaq; vulnera vel ma-
xima conglutinat, etiamsi praefectos esse nervos
contigerit; praeterea vocatas enterocelas glutinat.

'Eadem Galenus ex relatu aliorum scribit.

Nervos laceros glutinat, ruptis & vallis mede-
tur.

Plin. lib. 26. cap. 7. Caucon ad tussim & suspi-
ria ex vino austero tritam commendat.



HIPPURIS fontalis, secundum Diosc. Equisetum.
Aduers. pag. 355. Equisetum alterum Matth.



HIPPURIS
caulis con-
gner cum
maioris E-
quiseto.
Aduers pag.
355.

TRACCS, sine *Vna marina maior*. *Aduers.* pag. 354.
nem Equisetum 2^m. hacth. depictum, non descriptum.
An Croton Nicandri Anguillara?

LYNCARIA *Salamanticensis Clusij.*



Narbonensi maior Hispanica, erectis virgultis, semine quadruplo maiore, quam opera Clusij in Belgij hortis feliciter enatam vidimus Mechliniæ & Liæræ.

Dioscor. Racemorum acini gustu multum adstringent: quorum decem ex vino poti, calicis, & semine fluxione vulva laborantibus, auxiliantur. Tendentur à plevisque, & in pastillos digesti, offeruntur: quibus vivunt, cum opus est.

LYNCARIA *Salamanticensis Clusij.*

Cui plantæ generi referenda hæc exotica planta, ambigimus. Sed cum doctiss. huius historici C. Clusius illam lunceam totam fecerit, Equiseti tamen ritu asperam & geniculatam, illius familiaræ nunciatendam duximus. Describitur autè à Clusio his verbis: *Salamanticensis à Lunceorum canaliculorum forma & gracilitate lyncariam appellant. Tota enim Luncea est, sed Equisetimodo aspera & geniculata, foliis utrinque lini, & frequentibus ramulis ex alarum sinu prodeuntibus, copiosos & paleaceos candidantesque flores proferentibus; semen deinde exiguum, nigricans: radix tenuis & candida. Tota herba subdulcis est. Pronenit locis arenosis, inter vinea secundo à Salamantica lapide. Floret Iulio, semen profert Augusto: quo tempore etiam subinde recens germinat.*



Sp. pl. d. 1000. R. V. B. A. maior. Rubia tinctorum officinarum. Aduers. pag. 357. Thapsia Asclepiadis Engelm.
Germ. Rorre. Belg. Grappé, & Ader. Angl. Redder. Gal. Gadanço. Hisp.
Rauia, & Granza. Ital. Robbia & Rubia.

Dioscor. Vinam list, qua de causa regio morbo opiculatur pota cum aqua mulsa, item ischridioto & castellis, crassam copiosamq, vinam pellit, ne unquam & sanguinea; bibentes tamen quotidie sanari oportet, et incrementorum qua redduntur differentias spectare: adversus serpentium morsus, ramulos cum solis bibere præstat.
** Semen ex aceto potum hincens absunt. Inposita radice parvis mensis, secundæq, trami, albæ riniq, illa et. Seco medetur.*

1 Eadè Gal. & Ven. 2. & 4. Eadem Gal.

TRAGON Matth. Aduers. pag. 356.
 Drypis Theop. Guiland.
 lege TRAGON improbatum Matthiolo.

RUBIA maior. Rubia tinctorum officinarum.



Radix semenque trahunt menies, aluum sistunt, collectiones discutunt Plinio.

* Gal. Amara gusta & * acerba est; itaque quaecumque agere diximus, ubi eiusmodi conuerint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicies: quippe cum lienem & iecur expurget: ac mediciter quae extersionem postulant, extergit.

* Contra serpentes rami imponuntur Plinio.

* Acerba Gal.] Acerbi, visceri & amari dulcis in maciando non nihil est particeps; unde implicatas, compositas & mirificas dotes colligas; quibus potu sanguinis grumos dissoluit & discutit, non secus ac Carabe, f. Bitumen, Pissa sphaltu sive Mumia Graecorum, egerit eliquatu per urinas, quod, Dioscoride teste, discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione * tuetur: purgationes mulierum cum vino & castoreo porum elicit: cum aceto discutit sanguinem concretum. *Addit Gal.* Merito eo utuntur ad glutinationes vulnerum cruentorum; & ad alia omnia quae exsiccari debent cum modica calfactione. Acerbitate, dulcedine glutinosa & siccitate moderatis defuxiones cohibet, calefacta refrigerat, & refrigerata calefacit, eadem qua superius in Circa Aduers. pag. 104. diximus ratione. quibus potius a docto & modesto Dodonaeo, ad rupta, caesa, vulnera, praecipitationes, sanguinis fluores, inflammationes, omnia denique etiam thoracis & intestinorum vulnera commendanda erat; quam Dioscoridea, Galenica & Pliniana perpetam refutare & incusare: Calore enim, & quodam, qui illi inest, amare non inuicendo abstergit & educit sanguinis internorumque vulnerum & vicerum colluctum; & rursus attritione inibi resista, robore que parti restituto, sanguinem suppressere, & per sanare potest.

[Carabe] Quod sanguinem eliquat & serum separat. * Quia discutiendo collectiones dissipat.

RUBIA maxima varietas.


Longe maior Montepellium circa in oliuetis, seneciois & vipereis foliis annouirentibus visenda, ubi Rubia maxima nuncupatur: semen nigrum & caetera cuncta a nostra non differunt.

RUBIA


Similem rationem habet Galenus de Symplyto paruo.



DRYPI'S Theop. Anguillara.




MYRIOPHYLLUM Equisetifolium.



STARPIVM

Radice reptice, Graminis canini simi, in gracilio-
rioribus geniculatis ramulis cubitalibus, foliis spe-
ciosa luniperi minoris, Nepae aut Corrucae Hispani-
cae. flosculi albi umbellatum confecti. Semen, in-
quit Anguillara, glumis nondum exutum, Ory-
zae simile; exutum autem Sertulae Campanae, cro-
ceum.

MYRIOPHYLLUM aut Maritriphyllum palustre.
Aduers. pag. 334. & 333. 334.



DIOSCOR. Vulnera recentia ab inflammatione
vindicat si vel virida, vel siccum ex aceto oblinatur. Prae-
cipitatis in poru cum aqua & sale datur.

Gal. Vique adeo desiccatoria est facultatis, ve-
ruinera glutinet.

MYRIOPHYLLUM equisetifolium flexuosissimum.


Aduers. pag. 334.

Myriophyllum aegyptium Mart.

Viola aquatilis Ded.

Belg. Water Dillereu.

Gal. giroflees d'arve.



EQUISETUM minus cum aspergillo novellis. *Aduers.*
pag. 355. **CAUCON** Plin. Anguil.
Ital. & Hisp. Coda di cavallo.

DIOSCOR. Vis herba spissare, quare sanguineis
naribus erumpentem succus ipse sistit. prodest dysentericis
in vino potus. urinam cit. Sanguinolenta vulnera glutin-
antur, tritis foliis, & illitis. Radix cum sua herba tussim,
orthopnoeam, ruptaq; adiuvat. Foliis in aqua potus, disse-
ctiones vesicae & intestinorum, enterocelaq; in unum coa-
lescere, cogiq; seruntur.

Alterum Equisetum caulis est rectus, cubitalis, aut ma-
ior, inanis, comis per intervalla brevioribus, candidioribus,
& mollioribus. Id cum aceto tritam vulneribus remedio est,
eademq; fungitur facultate.

¹ Eadem Gal. & rubrum muliebri profuuium.

Gal. ² Adstringentem cum amaritudine facul-
tatem possidet, ac proinde valenter, simulque ci-
tra mordacitatem exiccante. Itaq; vulnera vel ma-
xima conglutinat; etiamsi praefectos esse nervos
contigerit; praeterea vocatas enterocelas glutinat.

¹ Eadem Galenus ex relatu aliorum scribit.

Nervos laceros glutinat, ruptis & vullis mede-
tur.


Plin. lib. 26. cap. 7. Caucon ad tussim & suspi-
ria ex vino austero tritam commendat.

HIPPURIS fontalis, secundum Diosc. Equisetum.
Aduers. pag. 355. Equisetum alterum Marth.





MARSHALLI TRACON

Hippuris
maior ro-
gnat cum
maior E-
quisetum.
Aduers pag.
355.



TRAGOS, sine Vna marina maior, Aduers. pag. 354.
 cum Equisetum 4^m. Matth. depictum, non descriptum
 An Croton Nicandri Anguillara?

LYNCARIA Salamanticensis Clusij.



Narbonensi maior Hispanica, erectis virgulis, semine quadruplo maiore, quam opera Clusij in Belgij hortis feliciter enatam vidimus Mechliniæ & Lieræ.

DIOSCOR. Racemorum acini gustu multum adstringunt: quorum decem ex vitro poti, coliacis, & feminis fluxione vultu laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti afferuntur: quibus vruntur, cum opus est.

LYNCARIA Salamanticensis Clusij.

Cui plantæ generi referenda hæc exotica planta, ambigimus. Sed cum doctis, huius historie C. Clusius illam Iunceaam totam fecerit, Equiseti tamen ritu asperam & geniculatam, illius familie annexendam duximus. Describitur autè à Clusio his verbis: Salamanticenses à Iunceorum canaliculorum forma & gracilitate Lyncariam appellant. Tota enim Iuncea est, sed Equiseti modo aspera & geniculata, foliis utrinque lini, & frequentibus ramulis ex alarum sinu prodeuntibus, copiosos & palencos candidantesque flores proferentibus; semen deinde exiguum, nigricans: radix tenuis & candida. Tota herba subdulcis est. Prouenit locis arenosis, inter vinea secundo à Salamantica lapide. Floret Iulio, semen profert Augusto: quo tempore etiam subinde recens germinat.

ῥοδὸδωρον. R. VBI A maior. Rubia tinctorum officinarum, Aduers. pag. 357. Thapsia Asclepiadis Angeli.

Germ. Rott. Belg. Grappe, & Met. Augl. Madde. Gal. Garanco. Hiff.

Ruina, & Granza. Ital. Robbia & Rubia.

1. Ed. Gal.
& Lin.
2. & 3. Ed.
dem Gal.

DIOSCOR. Vrinam dicit, qua de causa regio verbo opuntiarum pota cum aqua multa, item ischiadico & rosolucis, crassam copiosamq; vrinam pellit, nonnunquam & sanguinem, bibentes tamen quotidie lacini operti. & excrementorum qua redoluntur differentiam spectare: aduersus serpentium morsus, vntulor cum solis bibere p. vntulor. Semen ex acetosorum lixeni adsumit. Inoposita radix paruis manes, fetoribus, et ab. sibi vntuligini illis ex vntulor medetur.


TRAGON

TRAGON Matth. Aduers. pag. 356.

Drypis Theophr. Guiland.

lege TRAGON improbatum Matthiolo.

RVBIA maior. *Rubia tinctorum officinarum.*



Radix semenque trahunt menses, aluum sistunt, collectiones discutunt Plinio.

² Gal. Amara gustu & ³ acerba est; itaque quaecunque agere diximus, ubi eiusmodi conuerint qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicies: quippe cum licem & iecur expurget: ac mediocriter quae extensionem postulant, extergit.

⁴ Contra serpentes rami imponuntur Plinio.

⁵ *Acerba Gal.*] Acerbi, visceridi & amari dulcis in mādendo nō nihil est particeps; vnde implicatas, cōpositas & mirificas dotes colligas; quibus potu sanguinis grumos dissoluit & discutit, nō secus ac Carabe, Bitumen, Pissa sphaltū siue Mumia Græcorū, egerit eliquatū per vrinas, quod, Dioscoride teste, discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione ⁶ tuetur: purgationes mulierum cum vino & castoreo potum elicit: cum aceto discutit sanguinem concretum. *Addit Gal.* Merito eo vniuntur ad glutinationes vulnerum cruentorum, & ad alia omnia quae exsiccari debent cum modica calfactione. Acerbitate, dulcedine glutinosa & siccitate moderatis defluxiones cohibet, calefacta refrigerat, & refrigerata calefacit, eadem qua superius in Circa Aduers. pag. 104. diximus ratione. quibus potius a docto & modesto Dodonæo, ad raptā, caesa, vulnera, præcipitationes, sanguinis fluores, inflammationes, omnia denique etiam thoracis & intestinorum vulnera commendanda erat; quam Dioscoridea, Galenica & Pliniana perperam refutare & incusare: Calore enim, & quodam, qui illi ipse, amaro non inuicendo abstergit & educit sanguinis internorumque ue vulnerum & vicerum colluuiem; & rursus attractione inhibita, roboreque parti restituta, sanguinem suppressere, & persanare potest.


[⁷ Carabe] Quod sanguinem eliquat & serum separat. ⁸ Quia discutendo collectiones dissipat.

RVBIA maxima varietas.


Longè maior Monspellium circa in obsaetis, senicetis & vipretis foliis atroideis visenda, ubi Rubia maxima nuncupatur: semen nigrum & cætera cuncta à nostra non dissimilia.

RVBIA

Similim rationem addit Galenus de Symphyto p. 100.



RUBIA minima.




Altera perpusilla, quam in rupibus Vincentij non procul Bristolio Angliæ enatam legimus. foliis est Herniarie paribus mucronatis positu rubiæ, cauliculis repticibus sesquiunciam altis, in quibus flosculi luteoli. Radix exilis Rubiæ, corallio concolor.

ASPERVLA, aut ASPERGVA.



APARINE. οἰσίστο & οὐαίρ-ἴπυρ Hipp.
Aspera Lappago, sive Asperugo Plin. Dod.
οὐαίρ-ἴπυρ & οὐαίρ-ἴπυρ, quæ vesilibus adhaereat.
Angl. Goetshaerte. Ger. Kleech kraut. Belg. Clou-
rupt. Gal. Reble, & grateron. Hispan. Prefera,
aut amor de hortulano. Ital. Speronella.



Dioscor. Seminis, caulium, & foliorum expres-
sus succus, à phalangis & viperis demorsis, auxiliatur. au-
rium dolores succus infusus curat. Herba cum axungia tri-
ta strumæ discutit.

Gal. Modicè extergit & siccet, habetque non-
nihil tenuium partium.

Plin. addit: Sanguinis abundantiam ex vulneri-
bus reprimunt folia imposita.

ASPERVLA, aut ASPERGVA odora nostrat.

Advers. pag. 357.

Ger. Herdesfreudt, & Waldensiller.




Alysson Plin. Corbo.

Matrifylus Tragi.



RUBIA *laevis Taurinensis.*

Asperula amulatione summis cauliculis flores candidi stellati verticillatim procedunt. Folia quaternaria decussatim sibi mutuo exorta Cacubalo Pliniano paria, Solano tetraphyllo minora, in cauliculis sesquipedalibus & bicubitalibus ex interuallis geniculatis. Frequens haec in Pedemontium colibus Taurino finitimus.

ASPERULA *carulea, Perperam Abyssin Gal.*


Caruleam in Flandria hortis, interdumq; agris videre meminimus; sed in odorem, foliis hirsutis Asperulae. Semen item & flores non dissimiles, sed carulei summis stellatim digestis foliis procurrunt Radice rubente, tenui & oblonga.

MOLLUGO *vulgatior herbariorum.*
Galien album quorundam.


Collibus incultis & cretaceis agrorum marginibus Gallobelgij & Angliae plurima. Folia laeva & Maio mense flosculi candidi copiosi Aparines minores in pluribus angulosis viticulosus geniculatis cauliculis, cuncti & sese vicubiti proceritatis, humi sparsis. Radix ignosior, fibrosa, ciceritia.

No MOLLUGO

MOLLIGO Belgarum.
Mollugo montana Dod.



ALYSSON Germanicum Echisides, sive facis
Molluginis Herbariorum; Aparinae Plinij patatum.




Molluginem statuunt stirpiū cultores nostri ex collibus Falkenburgensibus Leodio proximis erutam inque hortos transfaram. Galio albo tota sui parte similis, nisi completum florum exitum speciosa foetura, in caule cubitali & bicubitali surrecto donata. Folia molliora. Radix nigricat. vñ hactenus incomperta.

ALYSSON Germanicum Echisides.

E radice geniculatis bicubitalibus cauleculis asperis, Aparines ritu vicina quænis atreperit: folia bina & ternata atrouirentia Echij modo hispida Rubia paria, & aliquando maiora. Flosculi purpurei violacei, Echij minores verticillatim Cruciatæ modo, à medio caule summo tenus. Semen inuolacris foliaceis sinuosis Sesamo simile aut Thlaspi fuscum, gustantū dulce clauditur, cuiusmodi primus nobis imperitū peritus iuxta ac amicus Maroanus Nervienfis. Vniuersa planta gustu Echium æmulatur.



Sagina Sper.




Sagina SPERGULARIA. Advers. pag. 357.
Afferitur Polygonum & hnatwai Germanorum Tragi.

Vomitu pituitosos humores huius semen educere, refert Dod. gallinasque eius esu plura excludere ova aiunt.

Trag. Ad stranguriam & stillicidium urinae mirifice facit, ideo lactis copiam auget.

Γάλιον à lacte, GALIVM luteum. Advers. pag. 358.
Ger. Stäckerkraut, wallros. Gal. petit Muguet.
Hisp. Coia leche yerua. Ital. Galio.
Angl. Stardes here.




Dioscor. Flepētus ambustis illinitus, & sanguinis prostruina sistit: Nisi et in cerato rosaceo; insalutur dūnic albescat: & tale est acopyni lassitudinibus vitio: & lacte renem extitit.

Eadem Gal. Eniccoriam & subacrem obtinet facultatem.


CRUCIATA minor. Ger. Goltzen Wäckerker.
J. Asperula aurea. Belg. Cruette. Gal. Croisec.

Pota thoraci, ventriculo, meseraicarum & viscerum infarctus referando, remedio est. Amarore potenter abstergit, illuuiem & excrementa pituitosa foras exigit: ideo appetentiam facit, & concoctionem inuat.


Cruciat minor.



SILVASTRI
Rubia mi-
nor reddida
Aduerf. pag.
317.





PERYSSA
v. m. minor
Rubig. folia
Chamedari
de Dioscor.
Munro.
Aduerf. pag.
318.



PALLIUM.



Hemter-
tis.



De PHYLITIDE, & HEMIONITIDE, earumq; varietatibus.


PHYLITIS. *Lingua Cervina officinarum, & perperam Scolopendria.* Angl. *Barts tung.* Germ. *Birtsjung.* Belg. *Berts tonge.* Gal. *Langue de cerf.* Hisp. *Lengua Cervina.*

Hemionitis Anglica nobis icone & oratione exhibita, Aduers. pag. 359. Mechliniæ apud D. Brancionem & Georgium Rye, quibus eam dono miseramus, studiosè in scitilibus diu propter raritatem & teneritatem enutrita; tandem admirabili sui metamorphosi & transmutatione, in Phyllitidem abiit. Quod facit ut facile credam Phyllitidem & Hemionitidem easdem & congeneres esse, & cultu subire huiusmodi mutationes: nec magis differre quàm agreste Cichorium à satiuo: neque facultates quas utriusque tribuit Diosc. refragantur. Nam quæ passim murorum, viarum & sylvarum vdis fertilior & lætior oritur, in longiora folia erumpit, quæ in mucronem deficiunt, & ima sui basi contrahuntur.

* Sed quæ nonnullis rupibus saxorum interueniis provenit, folia breviora multò, ad basim latiora & falcata habere conspeximus, quorum aliqua palmum vix superabant, nonnulla verò sesquipalmum longitudine æquabant. Attamen longitudo foliorum illius Hemionitidis, quam Roma transmissam, in scitili Mechliniæ alebat piæ memoriæ D. de Brancion, vix uncialis & sesquiuncialis erat; fortè transplantatione iniuriæ adeo obnoxia fuit, & velut semianimis, ac multum imbecilla.

* HEMIONITIS.

PHYLITIS multifido folio.*



HEMIONITIDIS varietas altera.

Hemionitis altera peregrina Clus. & peregrina elegantia.†



Hemionitis duplicatis foliis ad basim.

* *Varietas Phyllitidis.* Multifido folio in Sommerseti Angliæ caucibus frequens oritur, aliocui Phyllitidi vulgatæ per similes.

† Naturæ luxu foliis duplicatis ad basim latioribus falcatas apophyses utrinq; lateribus mucronatas exerit, &c. Modus, ortus & parilitas superioris Hemionitidis.

PHYLITIS. Aduers. pag. 359.

DIOSCOR. *Phyllitis gustu acerba est.†. Folia in vino pota serpentium moribus aduersatur. Quadrupedibus per et infusa auxilio sent. Et si dysenteria aut resolutus alius exeret, potus dantur.*

Gal. † Cum qualitate sit acerba, non absurdè diarrhœas, siue profusiva, & dysenterias iuuat.



HEMIONITIS. Aduers. pag. 359.

DIOSCOR. *Austero sapore: Ea ex aceto pota lienem absunt.*

Gal. Simul & adstrictionem & amaritudinem possidet, quare obtem cum aceto pota lienosis auxilio est.

Dege. lib. 4. p. 101. & hinc. 101. Itaque lib. 10. p. 101. & hinc. 101.

Asplenium.

Lunaria Ma-
gorum Ara-
bun.

ASPLENVM. Aduersf. pag. 360.

DIOSCOR. Vim hanc habent folia in aceto serua-
facta, vt per dies quadraginta pota, lientem absumant. qui-
bus etiam contritis lientem ex vino illini oportet. Strangi-
ria & regio morbo prodest, singuliu sedat. † Calculos in ve-
fica comminuit. Conceptum adimere creditur, per se aut eū
muli liene appensa. Tradunt noctu, silente Luna, huius rei
gratia effodiendam.

Gal. Tenuium quidem partium, non tamen ca-
lida est herba. Hac vtique ratione & † lapides fran-
git, & lientem liquat.

LUNARIA racemosa. Aduersf. pag. 360.



Eximie ferrumitandi.] Ideo ad enterocelas &
hernias magne commendationis, & vtilitatis, po-
ta & imposta.

LUNARIA Magorum Arabum.
Ital. Lunaria di Magi Arabi.

A foliis itidem sinuatis Lunae crescentis simili-
bus hac rara planta Lunaria nomen adeptam pe-
ritis res herbaria, quam non nisi conualibus Allo-
brogum inter montem illum præcellum, vnde
Mons Seny vocatur, & D. Ioannem Maerum,
vernaclis St. Iean de Morienne, collegi, nomine-
que Lunaria donauit, alii quo discernatur ab aliis
Lunariis, Lunariam Magorum Arabum dicere.

Exer.

Exeunt Martio, tenella folia à radice lignosa, flexuosa, cinerea, Oxalidis Francq̃ rotundi foliè primulum erumpentis similia, Thlaspi hederaceo ferè paria. flores verò & semina necdum nobis visa fatemur, eoque nihil afferimus, eiusq̃ ue nullum vsum exploratum habemus.


Legè **OPHIOGLOSSVM**, sive **ENEAPHYLLVM**.

Lingua vulneraria Cordi.

Lingua serpentis. Germ. Aaterjungeln.

Belg. Aatertongen. Aduers. 360.

TRICHOMANES Diosc.



Eadem quæ Lunaria potest, sed inefficacius.

ADIANTVM. Aduers. pag. 361. *Callitrichon Aquilej.*

DIOSCOR. Decoctum herba potum, prodest spirandi difficultati, † suspiriosis, licet, & felle suffusis & vixit difficilis calculos frangit. alium sifit. serpentium moribus auxilio est. Contra stomachi fluxiones in vino bivit. Secundas ciet, & menstrua. sanguinis reiectiones inhibet. Contra serpentium morsus et uel troba illinitur. alopecia, densat, strumas discutit, surfures, & manantia capitis vlcera, ex lincio emendat. desuantes capillos continet, cum ledano & myrtino, & susino, aut hyssopo, vinoq̃. Decoctum eius cum lincio & vino infusum, talem prallat. cotarnices & gallinaceos pugnaciores facit, in cibos eorum additum. Seritur gratia utilitatis pectorum, circa ouilia. Vmbrosis, & palustribus, circa parietum aspergines, & fontium specus enascitur.

† Gal. Viscosorum crassorumque è pectore pulmoneq̃; excretionibus non mediocriter confert.

Gal. In caliditate quidem & frigiditate symmetrum est, verùm desiccet & extenuat, & digerit. Etiam caput ex alopecia glabrum capillis conuestit, & strumas & abscessus digerit.

Eadem Gal. Non tamen villam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verùm potuerit ipsam quispian secundum hanc oppositionem & temperiem in ordine medito.

APVL. Herba Callitrichon pisata per se & imposita virginibus strumas sanat.



TRICHOMANES.

Diosc. Folia acerrba, quæ eadem cum Adianto præstare constat.

SALVIA *vita*. *Advers.* pag. 352.
Adiantum album Theoph. *Guilandina*.
Adiantum album Cordi.

Zege RORIDA, *sive SOLIS ROS*, & *Aplous*
Recentiorum alia à *Drosio* *Alchimilla*.
Advers. pag. 354. 355.
Rorella & *Salsifolia* Cordi.


RORIDA, *sive Solis ros maior.*



RORIDÆ *varietas.*

Locis vdis Belgij nonnunquam ad dodrantalem altitudinem affurgit.

Non possunt sibi practici persuadere longa experientia & vsu edocti vim causticam Roridæ Solis phthificis & tabidis esse nocuam: & certè non alia ratione in corpora agere putant, quàm Scylla, Panchratium, Cape, Allia, Ruta, Sinapi, Eruca, Dracunculi radix & huiusmodi acria, quæ extrinsecus admota, vrere, & exulcerare solent; assumpta verò, interiora minime atrodunt, sed ad viscida, pituitosa, puridave excrementa, (quibus phthifici aliquando suffocantur,) extenuanda, incidenda, à putredine arcenda, & exiccanda vlcera, caloremque nativum inde obvium & animi vigorem excitandum faciunt. Corrigannt enim proventum & saburram crassorum, viscidorum & putridorum humorum. Quam plurima hodie esitantur, quæ admota ex alto diuellant & trahunt, etiãq; crustas inurunt. Sic Ros Solis senum spiritus vegetat, crassos & lentos humores concoquendo, incidendo, attenuando, atque abstergendo educit.





FILIX MAS.

Galii Feugiere. Hist. Helecho. Ital. Felce.

Aduers. pag. 362.

FILIX FEMINA.

Aduers. 362.



Diosc. Gustu subastringit. Radix lata & tinea excutit, sumpta drachmis quatuor ex aqua mulsa, melius si cum scammonia aut Veratri nigri rotidem obolu detur. Sed qui sumunt, alia gustare debent. Laborantes lienis incremento recreas. Radix & potu & illitu cum axungia vulneribus sagitta arundinacea factis, est auxilio. Cuius rei probatio talis fertur. Peribat filix, quam per ambitum sata copiosior arundo coronat: & contra euasens, abibat arundo, quam obsepiens multa filix in orbem cinxerat.

Eadem Gal. est enim amara, paulum habens adstrictionis, quam ob rem viceribus impasita vim habet valenter desiccandi; non tamen mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

Femina.

Diosc. Radices possunt lata interaneorum animalia, cum melle eleganter sumpto. Poterunt vino & triber, scilicet tinea excutere. Dato feminis, sterilitatem faciunt, & praegnantibus abortum, si supergraciantur. Farina humidis viceribus, & cicatricis respuantibus, inspargitur. Lumentum uero ceruicibus inodoretur. Polia recentia in oleribus cocta mandantur, ut puerum emolliant.




OSMUNDA. *Advers. pag. 363.*
Filix latifolia Cord.

OSMUNDA.
Races.



APVL. Ad vulnera: herbę Filicis radicem pi-
stam in vulnus pones, & argemonię drachmas
duas cum vino potui dato, mirificę curat. *Ad ra-
micem puerorum: herbam Filicem, quam in radi-
ce esculi arboris inueneris, tunde eam cum axun-
gia, & panno inducens impone, & fasciam sursum
versus ligabis, quinta die sanabitur. Ad dolorem
femorum vel surę: herba Filice fumigabis loca.
Item infantem languidum si ex eá fumigabis, fa-
cillime conualecet infans.
*Recentiores hoc Osmundę attribuunt.


CHAMÆFILIX *marina Anglica.*




OSMUNDA.



Non nisi saxorum rupiumque interuenijs aut
petrosis asperginibus Cornubię inuicem repe-
ri ad maris alluiones non procul ab ædibus
genetosi viri D. Moyle. E pusillamaleis implexa
pulis cirris & compacta radice Trichomanes
aut Adiantum Pliniani, foliola binum ternumque
viciu, rigida, carnosu, numerosa, acromitenda,
laucio, Filicis maris diuisura, orta, posita, & gu-
stuluris itera aersa parte extantibus ferrugi-
neis, quorum pediculi & medius neruis lateo-
nitem ex fusco latent.





POLYPODIUM. Filicula. Aduers. 363.

Herba Radioli Apulei.

Hisp. & Itai. Polypodio.

Diosc. Radix austera aliquantum, † & gustu subdulcis; purgandi vim habet. Coquitur cum gallina, aut piscibus, aut beta, aut malua, ad aluum solvendam. Arida farina aqua mulsâ inspersa, detrahât bilem & pituitam: trita laxatis efficaciter illinitur; & aduersus rimas quæ inter digitos sunt.

† eadem Gal. austera habet vincentem qualitatem: ut facultatis admodum quidem desiccantis citra morsum. cum vino minus adstringit.



APUL. Herba Radiolo contusa atq; antè curiose depurgata, cum aceto scyllitico vsque adeo cocta donec appareat, perungito, capitis dolorem tollit. Herba Radioli radicem euulsam & cultro corticem purgatam cum malua coquito, & sus earum bibatur, sine labore vel aliquo tactio ventrè deducit & omnes æstus.

* DRYOPTERIS. Aduers. 363.

Pteridion semina Cordi.

Diosc. Radix gustu acerbâ, in dulcedinem vergens Eadem Gal. Pfloriturum est cum radicibus trita: illinitur enim primum vsque dum sudorem euocet: mox sudor abluatur, & recens imponitur.

LONCHITIS Marantha.



LONGITIS ALTERA Dioscoridis. Aduers pag. 364.

Struthiopteris Cordi. Asplenium syl. Tragi.

Diosc. Pulveribus virum in modum prodest; in visq; inflammationes excitari non patitur. Pota ex aceto lenem absunt.

Eadem G.

LONGITIS Marantha. Ceterach Ramosum quorundam à similitudine quadam.

Pseudolongitis aspera Matth.

videtur Pteridion masculum Cordi.

Spithameis nitidis cauliculis, fuscis, rigidis & folijs Adianthi Pliniani; sed gemino situ, Filicis feminae ritu, crassioribus multò; altera parte virentibus; altera Asplenij modo rubiginis. Radix pusilla capillamentis crebris fibrata.

ACANTHIVM, an *ἄκανθα* Athenai Anguil. folio lato, incano, aliquantum serrato, ubique viarum obvio? Aduers. 365.

lege ACANTHIVM ILLYRICVM.

Onopordon alterum herbariorum & Dod.

Aduers. pag. 365.



Eriam Scri-
bus albis ve-
riat.

Diosc. Folia vel radices ad remedia opisthotoni bibuntur.


Gal. radix & folia facultatis sunt exalca&oria, vt & ijs qui consellantur auxiliantur.



ACANTHVS sativus.
Aldrov. f. 365.

ACANTHVS fyl. Scolymo similis aculeatus Diosc.
an Chamaeleontia Monspeliensis? an nunc potius
hac nomen aculeatae BRANCA vrsina?

BRANCA vrsina, sive Acanthus aculeatus.



Diosc. Acanthi radices vris & * luxati illita profunt. pota urinam mouent, & aluum sistunt. Tabidis, ruptis, convulsis, mirè vtilis sunt.

* torsionibus & ligamentorum tractionibus aptius vertendum monuimus.

Eadem Plin. podagris quoque illinuntur trita.

Gal. Folia mediocriter facultatem digerentem obtinent, ac radix exiccatoria est & detur facili-
foris, & tenuium partium.

BRANCA vrsina aculeata.


Branca vrsina
sive Acanthi
varietas. { In agro Bononiensi Lombardiz ad eò flores & folia similia sunt huic Acantho spi-
noso, vt nobis persuasum fuerit Diosc. esse Acanthum syluestrem, quem Diosc.
assimilauit Scolymo fyl. & satino Acantho breuiorem & aculeatum dixit.

Diosc. Radix ad eandem qua superior, efficitur.



SCOLYMOS. Hisp. Cardo & Cardos de comer.
Ital. sicut Carcioffo. Angl. Artichokes.
Aduers. 365.

SCOLYMOS Theoph. *Eryngium luteum* Monsp.
Eryngium Vegeti Classis & Scolymos Theoph.
Romanis Spina Borda. Eryngium Archi-
geni Anguil. Aduers. 366.



Diosc. Radix illius graecolentiam alarum totiusq; corporis emendat. Item si decoctam in vino bibatur, copiosam autem urinam fatidiamq; † expellit: herba cum recens senescit, in eleua, asparagi modo, transit.

† Gal. Ac proinde graecolentiam sanat tum alarum, tum totius corporis. Aequè hoc sane medicamento ex tota inest essentia, nimirum cum succus sit purgatorius. Ad quæ secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamen indicat, siccum vero in secundo.

SCOLYMOS Theoph.


Huius primi Asparagi cum radicibus crudi aut carnis incocti eduntur apud Salamanticensis: quo ipsius lacteo succo, lactis omne genus coagulant, ut author est Clusius.

Anguil.] Aenius ex sententia Archigenis Eryngium describit, folijs Attacylidis, durioribus, nitidioribus, & pallidioribus, plures ab vna radice cubitales ramos emittentem, Flores Buphrasini, & a medium Spanna sic distinguunt, ut oculi formam amplius non seruet.



SILYSYM, sine Carduus Lacteus.
Leucographis Plin. Aduersf. 366.

CARLINA herbariorum. Aduersf. 367.
Chamaeleon albus Diosc.
Helicme Pliniana Anguil.



Eadem Gal.
& Apulicium.

Diosc. *Hæc recens cum sale oleo q̄, cocta estur. Radicis succus drachma pondere potus, venitiones eiet.*
Leucographia Plin. quidam volunt; sed qualis esset, Plinius scriptum non repperit, ut ipse testatur his verbis, lib. 27. cap. 11. Qualis esset scriptum non repperi, quod & magis miror, inquit, quoniam utilis proditar sanguinem excreantibus tribus obolis cum Croco. Item cœliaciis tria ex aqua apposita. Profluuio fœminarũ, oculorum quoque medicamentis, & explendis vlceribus, quæ fiunt in teneris partibus corporis.

CHAMÆLEON Diosc.

Diosc. *Radix pota acetabuli mensura, latic inter ancorum tinea pellit. Bibitur autem in vino austero, cum virgans ferus facti succo. Hydropicis † commodissime drachma in vino datur, etenim eos extenuat. Contra difficultatem vrisa decoctum propinatur. Hausta in vino, serpentium venenis resistit. Occidit canes & fues. Mures item nocet, subacta cum polenta aut aqua, & oleo madefacta.*

Eadem Gal.
& Apul.

† Gal. exhibent ipsam aqua inter cutem laborantibus assimilem habentem temperiem ipsius nigri radicis, nisi quatenus illa acrior est.

APUL. *Ad hepaticos: herbe Chamæleonis succus potui datus cum vino, febricitanti cum aqua calida, mirè proficit. Ad hydropicos: herba Chamæleon & Chamædaphne & Chamædrye & Chamæptys æquali pondere trita & quâ mollissime cribrata, si in portione vini mixti, iuuenib. cochlearia quinque, vris cochlearia novem, item minoribus puellis & mulieribus cochlearia tria, puerulis cochlearium vnum dederis, mixticè aquam omnem de corpore per † vrisam digerit.*

† quemadmodum labrum veneris thomacis excrementa per vrisas educit.

Cha-




CHAMALEON *albus caulis donatus.*
Cardopachium. Chamaleon albus &
niger, sive Carlina Officinarum.
Chamaleon niger vulgaris Herbariorum. Chamaleon
albus Fuchs. Germ. Eberwurtz. Belg. Gue-
wozels. & Carlina. Gallis item Carlina.
Aduers. pag. 367.

Huiusrad. cē antidotis suis miscet vulgus medi-
 cantium ad pestis contagia. Dentibus attrita eius
 dolores mulcet. commodius vnguentis ad pforas
 & lepras inseritur.

CARDVVS *aculis Septentrionalium.*
Chamaleon albus Cordi, & Tragi exiguus Chamaleon.

CHAMAP-
 LEO niger
 Diosc.



Anglia collibus, Picardia, Gallobelgij & A-
 xiacti castri lateris marginibus obtusus & frequen-
 tissime Carduus, vultu & folijs Carlinae, sed tenu-
 tius lacijs, minoribus; flores purpureos
 & capitula Cardui vulgaris, caule caetero.



CHAMELÆO niger Marantia.

Diosc. Radix trita, addito atramentis sutorij exiguo cedrimo oleo, & acungia, scabiē abigit. eadē cum sibi sulphur & bitumen asciunt, & colta in aceto illinitur, impetiginēs † absterget. decoctum caliditate dentium dolorem mitigat, cum pari pipere & cera oblitā radix, dolenti denti auxiliatur. radice concisa, & in aceto decocta, dentes foveantur. eos quoq; frangit, si scriptorio stylo feruens admoveatur. vitia cutis in facie, vitiliginesq; cū sulphure emendat. erodentibus medicamentis admiscetur. phagedenas, tetrag, vlcera illitu sanat. Quere chameleo vocetur, à varietate foliorum enemi. mutant enim cum terra colorem. hic viridis, illic albicantia, alibi carulea, nonnusquam rubra inveniuntur.

*Gal. eadem, quia letale quiddam obtinet.

†Gal. in summa quæ detersionem postulant: præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commiscetur & phagedenica vlcera sanat illita. Est enim sicca tertio ordine, calfacit vetò secundo absoluto.

CROCODILION. Aduers. 368.

Diosc. Fervens facta in aqua & pota radix sanguinem copiosum per nares pellit. datur lienosis, eos euidenter adiuuans.

CROCODILION Fuchs. & Cordi.
perperam Chamæleon versus Tragi.
Aduers. pag. 368. 369.



Gal. Crocodilij semen acre est atque odoratum, urinam mensisque ciens. Itaque facultatem habuerit calidam digerentem & exiccantem, succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similis sint facultatis, nephriticis adiuuant. Radix pectoris excreationibus valenter conducit, minus quidem quàm semen, acris, non tamen minus amara.

Eadem Gal.

SPINA alba.
lege ἀκανθα αἰγυπία.
Aduers. 369.

Diosc. Huius radix pota, † colicis, stomachicis, & ijs qui cruenta exustiunt, efficax est, urinam citius numeribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen convulsis * infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro annuleto, serpentes abigere traditur.

†Gal. quia radix eius desiccatoria & modicè adstringens.

*Gal. quia semen tenuis essentia & calidæ facultatis est.

SPINA ARABICA. Aduers. 370.

Diosc. Arabicam spinam natura alba spina similem esse constat. ipsa siquidem stringit. ad sanguinis reiectiones, mensuram abundantiam, ceterasq; fluxiones radix etiamnum valet. Provenit in asperis.

Gal. Acantha Aegyptia (quidam Arabicam vocat) spinæ albæ nostratæ similis, verum facultate validius adstringente pariter & desiccante.

Itaque prostratum muliebri radice eius iuvat, & alia quæ exumore quibus auxilio est quæ

apud nos nascitur spina: sed efficacius tamen omnia iuvant, tum radix cum fructus ipsius. Hic verò & columellæ prodest, & ijs quæ in sede inflata sunt: tum vlcera ad cicatricem ducit, modicam habet & non molestam adstrictionem.



LEUCACANTHA. Aduers. 377.

DIOSC. Leucacantha, praedita est radice cyperi, valida & amara. Quae manducata a dolore dentium sedat, veterilaterum dolari, atq; ischiadici prodest, decocto cyathis tribus ex vino pota. eadem ruptis & conuulsis moderatur, radicis cyotus succus eosdem praebet effectus.

* Gal. proinde incidit & exiccet in tercio ordine; in caefaciendo autem ex primo est ordine.

CARDVI BVLBOSI Monspeliensis varietas.

Aduers. pag. 371.

Huius alteram speciem alit Ioannes Mutonus nullis spinis donatam.

SPINA alba Mattioli: Silybum Guilandini.

Scolymus verus Diosc. quorundam.

Forsè Cardus Galaxias Plin.

Iam diu scuit hanc & virentem habuit Ioannes Mutonus, folijs, ortu, totaque facie est Spinæ albæ nobis descriptæ, sed echinata capitula mollicora, minusque spinis infesta sunt.


CARDVVS tomentosus Anglicus. Aduers. 370.

CORONA fratrum Herbariorum.

Cardus erioccephalus Dod.

CARDVVS stellatus sine Stellaria & CALCITRA-
PA. perperam Polyacantha Cordo.Gall. Chausse trappe. Germ. Wallem thiel
& siaden distel. Belg. Sterre distel.

Aduers. 372.



Artheuse, & Neruiensis agri collibus passim non seors ac in Angliæ Sommerseti præfectura obuia hæc planta, cuius effigies Aduers. pag. 370. flore dehiscente à pictore deliniata.

CARDVVS stellatus, &c.

An Myacanthus Theoph. cap. 4. lib. 6. Spina alba vero Rondel. An Theoph. Tubulus folio Cereulea Ruellio.

Varietas: Candidis floribus variat in agro Neruiens.



Capitula spinosa *CARDVVS STELLATVS, seu CALCITRAPA altera,*
Videtur eadem cum laca altera Granatensium Clusij.



Hoc Calcitrapæ genus videndi & habendi copia fuit in horto Ioannis Mutoni Hispano semine er-
 tum. Non ita diceretur ortu & habitu; sed folia maiora, molliora, lacæ nigres ferè paria & concoloria,
 Calcitrapæ similia: flores purpurâtes & cauliculi minimè diuicicati, sed surrecti cubitales & vegetio-
 res & habitiores & capitulo densioribus spinis circumuallato.

CARDVI STELLATI varietas.

LACA lactea Clusij.
Tragacanthum Salamanticum.

ATRACTYLIS.

Aduers. 372.




Huius generis plantam quam debemus Carolo Clusio, non abs re hinc Acanaceorum familia
 annectendam duximus. Conuenit enim radiatis & aculeatis capitulis, folijs, floribus & semine
 cum Carduo stellato & Stella siue Spina solstitiali; sed omnia longè maiora: capitula namque
 Cnicum syluestre superant. Semen item & flos non absimilia, quo marcescente, è medio centro, ver-
 miculatam Gummi lixæ concolorauit Tragacanthi ruffi a mulam, manet: vnde Tragacanthi nomine
 occasio Salamanticisibus, apud quos in vineis agrorum que marginibus lubens & frequens oritur.

ATRACTYLIS.

DIOSC. Folio, coma & semen trita non pipere, vinoque pota, contra scorpionum ictus presant.
Gal. desiccandi & modicè digerendi facultate præcisa.
Vicera fistulosa ad cicatricem perducit.





CARDVVS BENEDICTVS. *Advers.* 372. 373.
Germ. Carthobenedict. *Gall.* Chardon benit.
Cnicus supinus Cordi. *An Carduus syl.* 2^o. *Theoph.* 8

Magni vsus & comendationis ad capitis vertiginosos dolores & pestiferos morbos. Insigni amaro obstructions viscerum referat; putredinem arceat; vrinas & calculum propellit. Pectoris vitia emendat. Hepati, cordi & visceribus peramicus, vt cuius stillaritia, decoctum, puluerisue ʒ. j. diuturnis & exitialibus febribus proſit. venenatis icteribus herba tusa, & contagiosis tumoribus imponitur.

Sequanorum. **CIRSIVM LUTEVM.**
Carlina syl. Dod.
Asactylis minor Fuchs.


lege Eryſita. Us.



PICNOMOS CRATA SALONENSIS.
Galloprovincia. *Advers.* pag. 273.
Obstaculo nigri speciei forte.
Acarna huiusmodi quorundam.

lege Eryſita. sed maioribus in spinosis & mentosis oblongis capitulis.

ACAZO




Sequanorum
Cardus
semita.



ACARNAS, sive Sequanorum
CIRSII CARLINAEVE varietas.
CARLINA Syl. minor Clusj &
Eryngium Archigenis.


PHOENIX, LEO. CARDVVS Feron.
Ital. Cardo fiore, Leone ditto.



Agro Salamantico oriunda ex Acanaceorum genere hæc plantula Carlinae syl. non abfimilis, sed tota minor: & flos luteus, non pallidus è singulari palmari cauliculo. annua planta est.

PHOENIX, LEO.


Hunc totius Acanacei generis facile Phœnicem, Leonem & ferocem dixere nup̄ erit à spiculis & infestissimis spinis: nihil enim aliud è folijs altius diuisis & capitulorum exordijs quam sp̄. cilia & vesp̄ vnciam & sesquiunciam longas videas. cauliculus vix palmam æquat. flos Cnicus syluestris, pallidus, spinis & aculeis sequentibus horridisque cinctus. Quia planta rara & vix nota, eius vltus nullus: audio tamen quibusdam aridis collibus Italiae ab Apenninis non ita diffusis, magno prouentu glicete.





ACARNA Theophr. Anguillara.

Valerandus Doctores Iustinopoli, Illyriae
rediens Venetias Carduus duos detulit, quorum
alter flaventibus aculeis horridus vixentibus si-
nuatis folijs, aucta parte tomento incanis, ut
tota planta, plures fundit. sesquicubitales cau-
les. floribus luteolis, semine Cnici, sed minore,
in squammoso & spinis horrido capitulo.

ACARNA Valerandi altera.



CHAMAE-
LEON Sala-
manticensis
Clusij.



Folij longioribus, spinis horridis caulem pin-
natim secundum longitudinem ambientibus,
qualisque pennae velo affixis: incana lanugine
tota pubet, caulis dodrantalis interdum cubitalis.
Flores Carduibenedicti, confertim stipati, mino-
res, & Senecionis maiores. semē cnici minus.

CHAMAELEON Salamanticensis Clusij.
Ortu, folio, totaq; facie huic Acaenae admodum
affinis est, & forte eadem, nigri Camgleonis hęc
species agro Salamanticensi oriunda, & à doctis
Clusio literis prodita, Cauliculo pedali, interdum
maiore, multis nris dituto, striato, & veluti pin-
nis etiam foliato. Folia longa angusta, aculeis
horrida. In capitulis confertim stipatis, & spi-
nosiss: flos purpurea dilutus.



CARDVVS BVLLORVX sine *Dipsacus sativus.*
sive Labrum Veneris. An spina Selenis Theoph.
 ; Guilandino? Galeadragon Xenocratis Anguil.
 Germ. Hatten distel, Weberherren. Belg. Caer-
 den & velders caerden. Angl. Tassel. Hisp. Car-
 dencha & Cardo penteador. Ital. Dillaco, &
 Cardo da panni. Gall. Chardon a carder.
 Advers. 373.

Diosc. sanat rimas sedis, fistulasq; si tusa & de-
 cocta in vino radix, usque dum sit crassitudo cera, imita-
 tur. Medicamentum erca pyxide retinendum. Aiumi for-
 micationibus, verrucisq; pensilibus remedio esse. Vermiculæ
 capitularum in folliculo alligati, colla aut brachio appensi,
 prodromi quartanis febribus remedio esse.

Gal. ex secundo ordine exiccatoria radix est,
 habetque nonnihil & absterforium.

LABRVM VENERIS.

Advers. 373-374.



VIRGA PA-
 TORIS.
 Advers. 374.



CNICUS sativus Theophr. Germ. & Belg. Wilden-
garden saffran. Gall. Saffran baillard. Hiff. Ala-
zor & semence de papagaies. Ital. Zaffrano
matto saluatico & Saracenesco. Angl. Barlett
saffron. *Advers.* 374.

CNICUS flor. caeruleo.
Cnicus aler Clusij.



Diosc. Huius flore in obsoniis utuntur. Seminibus cusi & expressi succus, cum aqua mulsa, vel iure gallinacei, al-
uum purgat; sed stomacho aduersetur. Ex eo autem sunt offula, quas placentulas vocant, adiectis succo amygdalis,
nitro, aniso, & melle decocto, qua aluum emolliunt. Ha in partes quatuor fiunt, qua nuci iuglandis magnitu-
dinem impleant: è quibus ante cantum duas vel tres sumpsisse satis est. Ratio temperandi haec est. Cnici candidi sexta-
rius, amygdalarum costarum & delibratarum cyathi tres, anisi sextarius vnus, aethronitri drachma vna, cum carni-
bus triginta caricarum. Seminibus succus lac cogit, & magis ipsum resoluenda alui facultate donat.



Mesvz. Cnicus est agrestis & sativus, idemque melior semine. Nec inuauis est flos. Calfacit or-
dine primo, * siccat secundo; agrestis calidior, siccior: minus flos. Pituitam & aquas vomitu, & defec-
tione vacuat sumptus, & clystere iniectus. Ob id morbis inde natis, vt colico affectui, & similibus
confert. Thoracem quoque & pulmonem expurgat: vnde & vocem claram reddit. Sperma quoque
vsu auget, sed alimentum est prauum. Stomacho valde noxium, in coque & mammis lac cogere di-
citur. Fastidendum ac nauseabundum est, ac conturbans. Facultate est lactariarum plantarum, sed
remissa. terget, aperit, etiam flore cum mulsa icterum sanante. Ne ventriculum laedat, ei misce sto-
machica, Anisum, Galangam, Mastichen: acria verò, vt Cardamomum, Zingiber, sal panis, sal gem-
mae, addita, actionem ipsius celerent, & intestinorum noxam prohibent. Sic medullae eius drachmae
decem, cum Cardamomi aureo vno in catapotia cicerum magnitudinis drachmis quinque sufficien-
ter purgat Paulo auctore. Datur à g. quatuor ad aureos quinque. Ros à ʒ. vna ad aureos duos.

CNICUS flor. caeruleo.

Huius effigies peregrini Cnici nomenclaturā vt qui scitō quadret Cnico vulgari, fecit. Exirentem car-
tiliculis pedibus & cubitalibus, è pulla vnciam aequante radice, in quibus folia Cnici vulgaris, sed
in capitulis squarosis loricatis flores caeruleis apicibus constantes. Semen item Cnici, minus
secus. Hortus cultissimus stirpiumq; exoticarum distillatus P. Couderbergii nostri hanc a. Circa
Cordubam & agro Hispalensi in legibus prouenit Clusio auctore, vbi flores Maio & Iunio apti
nos vero Iulio & Augusto.

CARDVVS vulgarissimus vicarum.
Onopycos Guiland.

CARDVVS spinosissimus vulgaris. Polyacantha.
*Theophr. Advers. pag. 274.**



Vbiq; vicarum obuius est Carduus ille vulgarissimus, quo quidem nihil notius, nulliq; regioni negatur. E radice caules cubitales, & sesquicubitales alii concauos edit, quibus folia Sonchi aspectu insunt, seduis aculeis infesta, nigricantia: flos purpureus in muticatis capitulis, pappis diffluens. Semen & reliqua nonora quam vt fusiore descriptione egeant.

* *ACULEOSA Gaza. Agriacantha Ruelij. Carduus siluestris,*
& Scolymos Dod.

ERYNGIUM Marinum. Drypis Theophr. quorundam. Batavis embelcase & mirrewoirele.

Angl. Keahelp. Ital. Ieringio. Advers. pag. 275.

Videtur ACANOS Plinij cap. 9. lib. 22.

Plin. Sunt qui & Acanon Eryngio adscribant spinosam, breuemque ac latam herbam, spinisq; latioribus. Hanc impositam sanguinem mirè sistere. Alij Eryngen falsò eandem putauerunt esse & Glycyrrhizam: quare subiungi eam protinus refert. Et ipse sine dubio inter aculeatas est, folijs echinatis, piouibus, tactuque gummosis: fruticosa binorum cubitorum, altitudine: flore Hyacinthi: fructu pilularum Platani magnitudinis. cetera pete ex Plin. ad finem capituli vsque.

Diosc. Folia in principio sale condita in cibis recipiuntur. Radix vinu habet calafforiam. post menses & vinas pellit. Tormina inflammationeq; discutit. Contra iocineram vitia, serpentium morsus & hausta venena, cum vino prodest. Bibitur aduersus plurima cum semine pascina de achma vna. Appensa illudae, tubercula discutere prodicit. Pota cum hyaromelice radix, epistibotonicis & cernitibus medetur.


Gal. Caliditate quidem aut parum, aut nihil, quas temperata sunt, superat. Sicciorem verbò in conui essentia consistentem non parum obtinet.



ERYNGIUM
maritimum.
Aduerf. 375.



ERYNGIUM
campestre
Mediterraneum.
Aduerf. 377.
8. 368.



Pugillum
ERYNGIUM
Piaoum
Munac.



ERYNGIUM
pumilum
Clusj.



Psidium ERYNGIVM planum Mutoni.

Alterum rarè ruri vel in hortis apud Belgas visitur, folijs quàm Dipſacus longè minoribus angustioribus, coliculis dodrantalibus & pedalis anfractuosis & diuaticatis, in quibus summis & secundum longitudinem flosculi minores quàm Campestris Eryngij. Radix Corradæ aut Asparagi, sed minor multo perennat. Nuspiam me vidisse memini, nisi in hortis Ioannis Mutoni.

ERYNGIVM Montanum tenuifolium ambitu profundè sinuatum.

Aduers. pag. 375. & 368.

ERYNGIVM pumilum Clusij.

Eryngij pumili à C. Clusio descripti genus à superiore in collibus agri Salamaticensis valdè variat, ubi è lignosa & tenui annua radice cauliculum gracilem multis diuisum alis, palmum, dodrantem altum, etiamque maiorem, quem stellatim ambiunt spinosa altiùs laciniata & in cisa folia. flos & echinata capitula cærulea folijs septa visuntur: ima autem folia latiora, mollioraq; radiatim cespite intrata iacent; & in ambitu laciniata cernuntur.

ERYNGIVM montanum reconditorum alterum, est


Critinum quartum Matth. Aduers. pag. 168.

Copiose prouenit in Flandria sabulosis secus

Blanquebergem Brugarum.

POTERION. Aduers. pag. 377.

Cyprius Mazino & Stiuida.*



* DROSE. Radices iusa, praecipis nervis & vulneribus giacim. andis illinuntur. decoctum quoque vix nervorum affeclibus prodest.

Gal. Desiccandi absque motu facultatem possidet, ad eò ut & nervos incisos glutinare credatur, Radice eius potissimum eiusmodi vini obtinetur: quin & decoctum earum quidam exhibent ijs quibus affecti sunt aerui.




TRAGACANTHA Aduers. 377.

DIOSC. Est etiamnum tragacantha, lachryma: qua, vulnerata radice manens, conuenit. Praestat pelucens, gracilis, lauis, sycera, & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. huius incredubus vsus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, ceterasque distillationes, cum melle in delinctu. Subdita quoque lingua liquefit, in passo madefacta drachma pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicae rostones, mixta corne cerui vsu & eloto, aut scissi aluminis momento.

Gal. similem Gummi vim obtinet, emplasticam quandam & acrimoniam hebetiorem. Et sanè similitur illi deficcat.

TRAGACANTHA altera,
sunt POTERION
Classo.

ONONIS, aut Anonis. Aegyptus Cratena Anguil. Aduers. 378.
Ital. Bonaga. Gall. Areste beuf. Bugrandes & bugraues. Gallobelgii. Bourrande quasi bubulam. Ger. Schenbrech, Stalkraut, & hauwerhel. Belg. Drangwoyrel, & statcrupt. Hisp. Detiene bucy & Gattilhos. Angl. Camothe & pezi wyne.



Aliam plantam Poterij aut Tragacanthæ nomine donauit C. Cladius ortu, surculis, folio, omni que sui parte frutillimam, sed folijs hyeme caducis deciduis, cuius tamen neque florem neque semen obseruare potuit circa Guadix & la Venta el peral, arido & inuili solo, vbi vberè prouenit. Plura pote in eius doctissima & rarissima historia.


ONONIS, aut Anonis.

DIOSC. Muriâ conditur, antè quàm spinosa fiat. cibi gratissima. rari acutioribus spinis, & rebus spiculis frigidioribus horrent. radicem mittit candidam. Qua excofacit, & extenuat. huius cortex ex vino potus, venter, & calculos commouit. in vnguis, vlcera eradit. radix cum decoquitur in posca, dolorem dentium collusione & mitigat. Ra. sem. decoctum eius potu haemorrhoidas sanare creditur.

Gal. Ononis radicem habet tertio quadantenus ordine excofacientem. Radix eius maxime ostentilis habens quippiam & absterforium & incisorium. Itaque non tantum viuas peiuorat, sed & lapides constringit. Eodem facultate & cristas detrahit.

NATRIA Plinij berberiorum.
Aduers. 374.
Malilotus fyl. pinguis F. Pennisi.

TRIFOLIUM Pratense. Aduers. 380.
Hisp. Trebol. Ital. Trifoglio.
Angl. common Clover.*



*Refrigerat, exsiccat cum partium tenuitate. Inflammationes cataplasmate, ventris torsiones colicisq; dolores iniectione mulcet. Exsiccandi & mediocri concoquendi vi menstruis albis mederi proditur.


Varietas.

Fronde duplo maiore luxuriat in Gallo-belgio & Ambiano agro, pinguiori veruscto sacum, saginanda veterinae longè optimum.

Trifolium guttatis maculis varietum Euphrasiae ritu ocularibus decoctis & collyrijs nostra aetas feliciter commiscet.



TRIFOLIUM pratense Salerni. *Classj.*
Hisp. Trebol de prados.



Ramulis serpit tenuibus dodrantalibus; folijs ternis parvis minus crenatis, pusillis floribus ex luteo dilute purpurantibus. Semē paruum rufescens in membranis folliculis, Trifolij vulgati modo, frequens in pratis circa Salamanticam. In horto D. Ioannis Dil. alitur.

TRIFOLIUM Asphalticum sive *Bituminosum.*
Trifolium odoratum Plin.

TRIFOLIUM Americum.



Diosc. Semen & folia in aqua pota pleuriticis, vrinæ difficultati, comitialibus, & ijs quæ aqua inter cutem principia sentiunt, feminis quoque vulua vitio opportunis, auxiliantur. menses eius. terna drachma è semine dari debent, è folijs vero quaterna. Contra serpentium ictus erit a folijs, & ex aceto mulso pota, presidio sunt. Tradunt aliqui, totius fruticis, radice, foliorumq; decoctum sanare dolores eorum finire, quos serpentes percusserint. quæ autem aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiam alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde afficitur ac à serpente demorsus. Quidam terna folia aut semina in tertianis, cum vino potui dederit: & in quartanis, quaterna. vt qua febrim circuitus discutiant. Radix antidotis inseritur.


Gal. Vis plantæ calida & sicca vt bitumen, cui odore est similis, vtrinque tertio ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione natos iuuat, & vrinam mensesque prouocat.

Menses & partus appositum extrahit, ex vino albo potum **Dod.** ex **Hippoc.**

TRIFOLIUM Americum.

Similitudinis huius est quoddam peregrinum Trifolium ex America ad nos deuectum, vbi flosculos cæruleos purpureosue Agni casti, vel Lauendulæ spicatum promit. folio arouirente Lagopi aut Trifolij asphaltiis, Domino Ioanni Brancioni & Ioanni Muroto floruit.

OXYS PLINIANA.




OXYS PLINIANA.
Germ. Saureklee. *Belg.* Coeckhoep,
 broot. *Gall.* Pain de Cocu. *Angl.*
 Wood sou. *Aduers.* 381.

Plin. datur ad stomachum dissolutum: edunt & qui enterocelen habent.

Gal. eadem quæ Oxalis præbet. Tenuium est partium, exsiccaans.



Oxys-lutea corniculata repens.
Oxys lutea Clusij.



Gracilibus nitidis reptantibus colliculis: flos luteus. Folia & radix Oxidi scriptæ non absterilia. Belgis hortensis est & planta annua, hyemis senectia emoriens, sed ex corniculatis oblongis rediuisa femine pusillo, subraffo & compresso. Quibusdam circa hispalim vmbrosis locis sponte exiri auctor est Clusius.


lege **QUADRIFOLIUM phacm.**
Aduers. 382.

TRISOLIUM Paludosum, sit no Isopyrum Diosc. f.
Trifolium palustre Corā. & Deā.
An Menianthe palustris Thöopb.?

**ISOPYRUM.**

Diosc. Contra tussim, & cetera pectoris vicia, semēn ex aquā mulsā bibitur: hepaticā, & sanguinem ex-
creantibus vtile.

Gal. absterget, incidit &c.



**HEPATICUM Trifolium, sine Hepatica & TRI-
MITAS herbariorum. Epimedium Tragi Cordo.**

Germ. Edelhekräut. Nostris edule turcicis.
id est Hepatica nobilis. Gall. Hepatique.


Aduers. pag. 382.

Refrigerādo siccat, modicē adstringit. Hepar,
ventriculū & viscera roborat: ad enterocelen
Oxys Pliniana ritu bibitur.

Varietas. Flores colore variant, alias cerulei,
purpurei & quandoque niui, (qui tamen
cū primū pendent ex ceruleo tandem li-
uescūt) in cultioribus Belgij vt Georgij vanden
Rye hortis cernuntur.

Nonnunquam etiam folia maiora maculis no-
nulisve variegata spectantur. Tardiusq; flores.

POISSON-

Polyanthos HEPATICA trifolia.HEPATICA *Polyanthos.*

Purpureocæruleis multiplicibus floribus stipatam elegantia peregrina, præclaro D. Joanni Brancioni, superioribus annis doctissimus piæ memoriæ Alfonso Pancius Ducis Ferrariensis medicus misit: cæterò quin folia, radix, cum superioribus haud absimilia.

RANUNCULUS aquaticus Hepatica facie. Polyanthemum palustre Dod. & Dillij.
Belg. Water leucereupt, & Witte water botterblommen.





Figura & natalitii, nempe fossis ubi torpent vel torpuerunt residues aquæ, Ranunculo aquatico, Ranunculo Morsui vel Hepatica trifoliz accedit: cuius superiora foliola aquis inhabitantia, circinato ambitu obtusis leuibusq; dentibus incisa sunt; inferiora verò capillacea Faniculo aut vulgata Anthezidi annula è flexuosis tenellisq; aquis item fluitantibus cauliculis. Flosculi odorati candoris lactei, antano aspectu micantes, medio umbone luteo, foliolis constantes quintis. Semen racemosum in congestis capitulis Ranunculi. Radix exilis fibrata.

R. FOENVM

FONTVM
Burgundia-
cum.



Medica
foliis
noto.



Varietas

Lagopus, Pes Leporis.

3

Lycaria
radiata
Lacour.



FOENVM Burgundiacum, & MEDICA. *Advers.* pag. 381.

DIOSCOR. Semen id siccatum, iucundis saporis gratia, conditaneo sale admiscetur. viride, quibus refrigeratione opus est, illud suffragatur. Herba tota pro gramine vituntur, qui pecora alunt.

Triplex est floris colore differentia: $\left\{ \begin{array}{l} \text{Cerulea,} \\ \text{Violacea \& } \\ \text{Lutea.} \end{array} \right. \left. \begin{array}{l} \text{Refrigerant omnes. Scorpionum ictibus non} \\ \text{secus ac Trifolium Asphalticum contusis im-} \\ \text{ponuntur.} \end{array} \right.$


MEDICA folliculo spinoso. *Adu. pa.* 383. Trifolium cochlearium *Dod. Gal.* herbe à limassons. }
 Epoti omnes & impositi commorlis à vipera & scorpione ictis auxiliari creduntur. } *Medica va-*
Lunata, siue falcata MEDICA, LUNARIA radiata *Italorum.* } *rietates.*
 Quae lunato folliculo duntaxat differt, Italis Lunaria radiata dicitur.

LAGOPVS. *Pes Leporis. Advers.* pag. 383. 384. *Angl.* Harts foot. *Germ.* Hasen fusz, &
 Hasen hies. *Belg.* Hasen pookena. *Gal.* Pied de Lieure.

DIOSCOR. Adstringit & exsiccet, siliis aluum cum vino pota; febricitibus cum aqua danda. alligatur eadem contra inguinum inflammationes. *Eadem Gal.*

LAGOPVM maximum, folio & facie Trifolij
 pratensis. *Advers.* pag. 384.

Folio pinnato LAGOPVS altera.
 an Cytisus Tragi, & Trifolium magnum Cordis



Varietates. Sanguineo siue caesento flore Lagopus folio Trifolij Asphaltici; flore spicato, duorum vit-
 ciarum longitudine, aspectu hilari purpurosanguineo, sapore tristici aut gramini. Belgis hortensis est.

Folio pinnato LAGOPVS altera.

Persicaria in folio varietas, quod marcescens calidioribus & Pedemontanis potissimum regionibus,
 nitore, laetore, & striis elegantissimis autumn pennae imitatur, Filicis Osmundae vocata per, postea ter-
 tio è pediculo haerente, Flos iterum sanguineus superiori persimilis.

Hortorum odor LOTVS. *Advers.* pag. 384.
Perperam Trifolium Asphaltum Diosc. Fuchs.
Lotus sativa, sine trifolium odoratum alterum Dod.
Lotus syl. Anguil. & Matth. An Mel frugum Theoph. &
Angl. Garden clauer. Hiss. Trebol Real.

LOTVS asperior fruticosa, sine
 Narbonensis incana LOTVS. †



LOTVS Vidana Dioscoridis.

DIOSCOR. Extractus succus addito melle, oculorum argema, nubes, cataractae, caligines discatis.
 Exsiccandi & concoquendi vim mediocrem possidet Gal. in caliditatis frigiditatisque coniugatione media quodammodo & temperata.

LOTVS fluet. *Advers.* pag. 385. *Hiss.* Trebol saluage.

DIOSCOR. Vim calefaciendi & leniter adstringendi, obtinet: vitia cutis in facie maculae, cum melle peruncta extirgat. Trita per se aut cum alia semine in vino aut passo bibitur, aptissime contra dolores qui vesicam male habet. Semen Gal. 2^o. est ordinis excalescentium.

Italica LOTVS altera.

Perpusillam hanc Lotum in agro Bononiensi D. David van Maude Antuerpiensis Medicus legit. Cauliculis repit spithameis, in quibus parva folia Trifolij pratensis, & rosuli latei Scorpioidis vulgaris. Semen muricatum Tribuli terrestris aut Cristae gallinae.

LOTVS Aegyptia. *Advers.* pag. 385.

•Ead. Gal.

DIOSC. Caput quale papaveris, maximum: & incus grana, cep. milij, quae Aegyptij exsicant, & in panes coquant. Radicem lotos has habet, mali cotonei similitudine, qua cruda, cost. q. manditur. decoll. q. loti omni qualitate exhibet.

† Lotorum familiae reddenda est haec, ut quae tota facie Lotus assumitur. In rigidis quippe & duriusculis pallidis spithameis ramulis folia terna incana Loto pratensi Monspeliaca angustiora, Cytisio subparia, Doryenij latiora. Cauliculis summis luteo rosuli, minores & aliquantum ceni.

MELILOTVS. *Advers.* pag. 386. *Sertula campana, & Corona Regia.*

Angl. Melilot. Ital. Meliloto, & Trifoglio cavallino.

DIOSCOR. Vim habet adstrictoriam, inflammationem omnem emollit, praesertim quae in oculis, velut, sed et in testibus erumpat, si ex passo cost. illinatur: interdum autem addito oleo luteo assuto, aut Faenigraci farina, sin. ferulae aut polline, capitulis papaveris, intybove. Recentis meliceridas per se extirpat, & viscera transmissa in capite illis, cura creta Chia, vino aut Galla sanat. Stomachi dolores & cruda & coct. cum aliquo de aurodistis lotus, doloribus auribus mitigandis, cruda ex passo insillatur. In aceto aut rosaceo madefacta, capite do. orem lenit.

Eadem Plin.

Gal.

Mellilotus
lutea.

Gal. Plus calfacit quam refrigerat Galeno. Di-
gerit, maturat & discuit pauxilla vi adstrigente.
Emollit. Digerendo per insensilem transpirationem.

MELLILOTUS *italica*
& *Patauna*.

Aduers. pag. 386.

Trifolium corniculatum

alterum Dod.

Germ. *Welscher*

schuchler.

MELLILOTUS *Germanica. Aduers. pag. 386.*

Melilotus lutea & alba Avicenna.

Trifolium odoratum Dod.

Mellilotus
coronata.

MELLILOTUS *Coronata.*

Trifolium corniculatum Dod.

Melilotus Germanica Fuchs.


Germ. *Gulter frauen*

schuchler.



FOENVM Gracum. *Advers.* pag. 387.
 Angl. Fenegreek. Germ. Beckstreu. Belg. Fenigriet.
 Gal. Fenegrec. Ital. Fiengreco.

FOENVM Gracum *fol. herbariorum.*



Dioscor. Foeni Graci farina vim habet emollicendi discentiendiq. in aqua mulsa decocta adversus tam internas, quam externas inflammationes efficaciter illinitur. Lienem cum aceto & viro trita extenuat. succus decocti eius sceminarum malis subuenit: & siue tumor siue pro acinosis sit vulva fouentur, & insident. Foeni graci in aqua decocti cremor expressus, capillos, furfures, & manantia capitis vlcera purgat. locos dilatat & emollit, si cum anserina adipe pessa vice subiiciatur. viride cum aceto vtilissimum imbecillibus locis, & vicera sentientibus. decoctum eius prodest adversus tenesmos satidamq. dysentericorum proluciem. Oleum quod ex eo exprimitur, ex myrto, capillos & genitajum cicatrices absterget.

Gal. Calidum est secundi ordinis, desiccatur primo; proinde feruentes phlegmonas irritat, quae vero minus sunt calidae, & magis durae, eas digerendo curat.

FOENVM Gracum *fol. herbariorum.*

Sylvestre quoddam non inuentum statuunt Belgae ob folia trifolio Fenogreco aemula, non nihil etiam ambitu serrata. Flores exiles Scorpioidis leguminosae Narbonicae agro calidiore iisdem natalitibus quibus Scorpioides gaudet. Siliqua succedunt oblongae, graciles, minus aduncae, quaternae aut quinae, semen paruum claudentes. Hortis hic duntaxat quibusdam reperitur, Hispania delato semine.

CYTISVS. *Advers.* pag. 387.

Dioscor. Folia digitis trita Erucam olent, gustata q. Cicer sapunt. Folia refrigerant. si virosos internitibus discentiatur, si cum pane trita illinantur. decoctum potu urinam ciet. Nonnulli, quod apes alliciat, prope alucaria factis.

Gal. Folia digerendi facultatem obtinent aquae & temperatae mistam, sicut & Maluae folia.

CYTISI varietas.

Cytisus alter facie, ortu & florum figura Genistellae insectoniae, generoso viro D. Joanni Braccioni egregie fruticat quamplurimis surculosis, flexilibus & viride sanctibus, Mogularibus sesquicubitalibus & bicubitalibus ramulis, cuius etiam caeterorum modo folia terna prodeunt.

CYTISVS


CYTISVS
Maranthæ
Marb.




CYTISVS MARANTHÆ & Matth.

Foliis ic̄ ternis nōnihil incanis & albidis vt frutex vniuersus, ramofus, ternū, quaternū, & quinū cubitorum: toriles filiquæ compressæ tantillum falcatæ: flos geniftæ: folia digitis irita Erucaem olent, & gustata legumen sapiunt, vt Dioscor. exprimit. Belgis hortensis.

CYTISVS Hisp. primus Clusij.



CYTISVS
frondosus
Hisp. Clusij.




Huius generis quatuor præter hæc differencias per Hispanias obseruauit Clusius, quos in sua stirpium rariorum doctissima historia posteritati proposuit.

Prior numerosa foliola habet trifoliis Cytisus similia, ramulos hirsutos ambientia, dilute virentia, quæ gustu legumen sapiunt, amara tamen. In summis ramulis flores Geniftæ spicatum procedentes, nonnihil odorati. Solidioribus prædatis stratis & incanis sarmentis, quinā cubitorum, è lignosa impleta & variè sparfa radice.

CYTISVS

CYTISVS Secundus Hisp. Clusij.

Huic similis alter, multò tamen minoribus sarmentis, duorum duntaxat cubitorum, & candidioribus virgis & foliis incanis carinatis & canulatis, nunquam expansis, gustu perquam amaris. Flosculi rò ab similes, saturè tamen aureòve colore micantes. Vterque Salamanticensi agro & aliis vtriusq; Castellæ locis secus vias oritur Clusio auctore.

CYTISVS Tertius Hisp. Clusij.
Valentini, Boga & Boxa blanca.CYTISVS Quartus Hisp. Clusij.
vernacule, Escabon.

Tertium & quartum Belgij inquilinum factum hætenus non comperi.

Tertius subfrutex describitur ab eodè Carolo Clusio pedalis, raro cubitalibus ramulis assurgens, exilibus omnino incanis, foliis ternis breui pediculo aptis, quorum medium reliqua longitudine duplo superat, colore cinereis & incanis, sapore adstringentibus & linguam exsiccantibus. Ramusculi ferè ab imo ad summum per singulorum foliorum exortus floribus onusti sunt, binis aut ternis simul nascentibus, ex vaginula quadam molli, & candida lanugine hirsuta, aureo colore fulgentibus, odore iucundo, simili cum superioribus forma, sed minoribus. Inuenitur variis Hispaniæ locis, præsertim Bætica & Valentina, vbi eius plurimus est vsus: siquidem illius ramis supra tegetes squaritis ab his qui bombyces alunt, iam saturi Mori foliis bombyces stamina sua sericea his ramis aduolunt, quæ deinde à mulierculis & pueris explicantur.

Quartus CYTISVS Hisp. Clusij.

Quartus humana est altitudine oblongis virgis, non admodum fruticosis, neque obsequiosis, cortice nigrescente obductis: folia ei sunt Trifolij aut Medicæ, terna simul vni pediculo inhaerentia, supina parte virentia, prona verò subrufa lanugine hirsuta, sapore leguminum amariuscule: flores ex alarum sinu reliquis maiores, cum Genistæ floribus comparandi, luteo auti colore fulgentes. Circa Calpen ad montium radices & Bæticæ maritimis Februario floret. Hætenus Clusius.


ANAGYRIS minusærens, vel Laburnum. Aduers. pag: 288. Anagyris 2°. Matth. in Hebenus 2°. Theoph. 1.

Cytisus secundus Theoph. Guiland. Faba inuersa Card. Germ. Baumkronen.

Varietas. Germina è folio in Belgio conspicua varietas. Quæ autem latiore folio, habitioribusque ramis fruticat, sterilis est in Belgio potissimum, vt in horto Muxoni.

CYTISI facie ALYSSON fruticans
quorundam.

Ægyptus. ANAGYRIS Diosc. *Advers.* pag. 389.
Ital. Fava lupina.



Legelin 9.
civitas. 3. li. 7.
Mentanthia.

Perquam parū notus hic perelegans, & parum frequens exoticus frutex, nisi cultioribus Belgij virens, ubi floribus luteis leucorum micantibus æstate lacer, è sparsis numerosis anfractuosis Polemonij striaris canaliculis. Folia Cyusi, habitiora, albida, hispida, setaceis pilis rigida. Radice lignosa duriore, & in folliculis semine.

ANAGYRIS Diosc.

Dioscor. Tenuia folia trita tumores illita reprimunt. si partus hæreat, & secunda mensesq; morventur, drachma pondere debentur in passo. sic & suspensio, sicut dicitur, & contra capitis dolores in vino. difficili ex parientibus adalligantur. ita ut à partu statim auferantur. Radicis cortex concoquendus discutiendusq; adhibetur. Scrimon^o commanducatum vomitiones vehementer ciet.

Gal. Frutex graniter olens & digerentis calfacientisque facultatis. Sed folia etiamnum virentia, cum propter humiditatis admistionem minus sint acra, idcirco tumentia reprimunt: at resiccata, incidentis sunt exiccanti^o que facultatis. Similem ferè facultatem habet radicis eius cortex.

^o Eadem Gal. Magis autem subtilium est partium.

DORYCNIVM. *Advers.* pag. 389.

Dioscor. Id somniferum esse constat: copiosius^o haustus mortem adfers. Nec desicere qui dicunt, semen in amatorio expeti.


Gal. Temperamentum Papaveri simile est & Mandragoræ; ac quæcumque partem habent refrigerandi potentiam excellit in frigiditate aquea: quamobrem pauculum quidem soporem conciliat; plurimum vero somnum interimit.

POLEMONIVM. Aduers. pag. 389. 390.

DIOSCOR. Bibitur in vino radix contra serpentes & dysenteriam. & ex aqua, aduersus vrinae diffinitionem, & coxendicum & cruciatum. datur ex aceto drachma pondere * lienis. eadem scorpionis plaga alligatur. Tradunt, cura qui radicem gustauerit, a scorpione non feriri: cumq; si ictus sit, nihil molesti passurum. dentium dolorem mansa mingat. Gal. † Quia tenuium partium est, & deficcandi vim obtinet.

RUTA hortensis. Aduers. pag. 390. 391.
Angl. Rue. Gal. Rue. Germ. Ganten, & Wein-
ruten. Belg. Gante, & Winrute. Hisp. Ruda.
Ital. Ruta.

Hibern. RUTA syluest. montana. Gal. Rue sau-
uage. Ger. Wald Rauten. Belg. wilde ruyte.
Hisp. Ruda saluage. Ital. Ruta saluatica.
HARMEI officinarum.



RUTA Dioscoridis.

DIOSCOR. Ruta montana syluestrisq; satua & hortensi acrior est, & in cibis damnata. satua vero qua sub
fetu arbore enascitur, magis in cibis admittitur. & traque vrin, calfacit, exculcerat: & vrinam ciet. menstrua pellit. aliam
filit potu cibore. letalium medicamentorum antidotum est, si semen ex vino, acetabuli mensura, ebibatur. folia per se
presumpta, aut cum nace inglande, aridisq; sic inefficace: venenorum vires reddunt. contra serpentes simili modo su-
mere conuenit. genitur. in cibo potuue extinguit. cum anetho sicco decocta, vrina sedat. facit ad pectoris & laterumq;
dolores, difficultatem hirandi, tussis, pulmonis inflammationem, coxendicum articulorumq; cruciatum, & horrores fe-
brum circuitu repetentes, pota vt ante dictum est item ad inflationes coli, vniua, rethiq; intolini, cum oleo decocta &
infusa. feminis & vniua strangulata liberat, si a genit. ali, sede tenuis cum molle subiciatur. forasacta ex oleo, & pota,
ventris meas excutit. articularis doloribus ex melle, aqua inter * cutem cum fice illinitur. eisdem in potu auxiliatur, co-
rocta in vino ad dimulias partes, & obliu. cruda conditaq; cibo, visus aciem excitat. dolores oculorum illa cum po-
lenta lenit. doloribus capitis cum rosaceo & aceto illa auxiliatur. profluentem naribus & sanguinem sistit, triu & di-
dita. testium inflammationibus cum laureis foliis imposta, & eraptionibus papularum cum myrto & ceruo prodest.
Cum pipere autem vino & nitro affricata, alba vitiligini medetur. cum eisdem illa fornicationes tollit, & verrucas qua
thymi florem repraesentant, contra impetigines cum alumine & melle vtilissime imponitur. succus in mali pueri calyce
calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur. Hoberudinem oculi qui sensere, vasa cum fanticuli succo aut melle perunt.
Et iuuantur. ignem sacrum, vicia qua serpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & ceruise persanat. man so-
cillitum ceporumq; acrimoniae domat. Mentana si copiosius estur, interdicit. cum flerem pomis, & ad raris celli-
gior.

* Eadem Plin.

* Eadem Gal.

? Eadem Plin.



gitur, cutem inflat & robore quodam inficit, cum pruritu ac vehementi inflammatione: oportet ut aqua eam vinctis an-
tea manibus & facie colligere. Tradunt succum gallinaceis pullis in partem seles arere. Adiciunt eam qua in Macedonia
circa Halicmon amnem prodeat, comedentes interimere. Mososus autem is locus, viperis scater. Semen eius potum
contra intestina vitia efficacis est. in antidota commodè additur. contra incontinentiam vrina totum semen sepe
diebus potui datur. Radix huius montanum moly vocatur. Sylvestris Ruta sativa similis est. Prodest comitialibus &
coxendicum doloribus. menstrua monet partus enecat, acrior est viribus quam hortensis, & validior. Sylvestris, ut po-
toxia, cibi abdicatur.

¹ Gal. incidere atque digerere crassos, lentosque humores potest. Ob eam autem vim & vrinas mo-
uet. Quinetiam tenuium est partium, flatusque extinguit. Quare ad inflationes prodest, ac veneris ap-
petentiam cohibet; discutit atque exsiccat strenuè: est enim ex eorum medicamentorum numero quæ
valenter exsiccant. ² Idem Plin. Et morsus canis rabiosi.

³ Plin. Idèd profusio genitali datur, & venerem crebro per somnia imaginantibus. Præcauendum
est gravidis, abstineant hoc cibo: necari enim partus inuenio.

⁴ Eadem Plin. subdens, iecinorum, renum vitia.

⁵ Eadem Plin. Discutit caligines succus eius cum melle, vel cum lacte mulieris puerum enixæ, vel
purus succus, angulis oculorum tactis. ⁶ Plin. Lenit capitis dolores pota cum vino, aut cum aceto &
rosaceo illita. Si verò sint cephalæa, cum farina hordeacea, vel aceto.


⁷ Sethus. Succurrit difficultati vrinæ si cum oleo coquatur, & ea vesica foueatur.

Plin. Si vrinam mouet, [†] ut Hippocrati videtur, mirum est quosdam dare velut inhibentem potui
contra incontinentiam vrinæ. Carbunculum ex aceto emendat. Imponunt & mannis turgentibus
decoctam, & pituitæ eruptionibus cum cera. Testium verò epiphoris, cum ramis Laureæ teneris, adeo
peculiari in visceribus his effectu, ut sylvestri Ruta cum axungia veteri illitos ramices sanari prodant.
Fracta quoque membra semine trito cum cera imposito. Radix Rutæ sanguinem oculis suffusum, & in
toto corpore cicatrices aut maculas illita emendat.

⁸ Plin. eadem: dederunt & lethargi ex aceto olfaciendum.

Sethus potæ & per clysterè in teetâ intestina robotare, nō solum caliditate, sed profrietate quadâ aie.

RUTA sylvestris. Advers. pag. 390.



Dioco. Remedium vltio melle croco & fardiculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra vltiam oculorum aciem.

SC 2

HARMALA

HARMALA
 Syriaca, an
 sit Scamoi-
 des magnū
 Diosc. Ad-
 uers. p. 190.
 Hispa. Ga-
 marfa, & Co-
 gombrillosa-
 margos. i. ca.
 cu. uere exi-
 guos ama-
 ros.



RUTA Gra-
 na. Adu-
 ers. p. 191.
 Galien. de
 ant. med. lib. 10.
 tra Dod.



RUTA Prae-
 tensis herba-
 riorum. Ad-
 uers. p. 191.
 Thais. Stru-
 m nigrū Cordi.
 Thais. Stru-
 m Dod.



THAIS
 STRUM
 Cordis
 folium Ad-
 uers. p. 191.

Leges. 4.
 A. J. J. J.



Varietates Rutapratensis, sine Thaliâri.

Binae aut ternae his accedunt varietates, non nisi magni udine, floris dilutiore & saturiore colore discrepantes. Nonnusquam enim totius & caule occurrunt longè maius, & multò speciosissimum, expropter in hortos transfertur. Folia ex caeruleo virent, caulis purpurascit, alioquin radix & omnia cum superioribus eadem. Quandoque florum stamina ex luteo & violaceo purpurascunt.

GALEGA. Aduers. pag. 392.

FABA minor Recentiorum. Aduers. pag. 392. 393.
Bana sine Phaselus Diosc. Dod. Germ. bonen,
Hisp. hauas. Ital. faua.



Venenis efficacissima] Ideo ad epidemicos morbos commendatur, antidotisque inferitur, & carbua-
culis tusa imponitur. Conuulsis & epilepticis medetur, ventris lumbricos euectat.
Varietas. Galegâ minoribus foliis, flore ex caeruleo purpurate alitur. Murobi manere in viretis nostris.

LEGUMINA & LEGUMINOSA.

FABA.

Dioscor. Faba^o inflationem excitat, agrè concoquitur, cum multuosa somnia facit, tussis conserit, tamen in giga-
ntis, media calidi frigidaq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esicata, dysenterias & entericorum profusio fi-
sit. Contra vomitiones conuulsenter mandatur. Inflatu lenior contrahitur, si aqua prior inter coquendum abicitur.
Viridis plus nequeq; stomachi exhibet, in aereq; natum parit. Lamentum eius & per se & cum potentilla illitum, in-
flammationes quas vulnus excitauit mirigat, et aridos concolores facit, turgentes granuloso lacte vrammas, etiam sin-
gulatione tententur, aduenat. Lar resinguit, furunculos, sagillata, parotidatq; cum semine proci farina & melle dis-
cutit cum rosa autem, thure & oleo candido, prodeures oculos, tumores, tussis, & periculis, subactum vino, fustis, honos &
illius oculorum recreat. In anabucis sine cortice sapa, ad auertendas fluxiones, frontis dicitur, dicitur in vino & collum
a eodem stat.
eodem stat.
eodem stat.
a eodem stat.

HARMALA
Syriaca, an
sit Sefamoi-
des magnū
Diosc. Ad-
uers. p. 190.
Hispa. Ga-
maria, & Co-
gombrillosa-
margos. i. cu-
cu. necrexi-
guos ama-
tos.



RUTA
na Adon
p. 191
Galeotti
sur Scro-
phulicita-
to Dod.



RUTA Pra-
tensis herba-
riorum. Ad-
uers. pa. 191.
Thalictrum
nigrū Cordi.
Thalictrum
Dod.



**THALIC-
TRUM**
Cordisem
folium ad-
uers. p. 191.

Legesit
A. J. J. J.



Varietates Rutapratenfis, sive Thalictri.

Bina surterna his accedunt varietates, non nisi magni udine, floris dilutiore & saturiore colore discrepantes. Nonnusquam enim totius & caule occurrit longè maius, & multò speciosissimum, ea propter in hortos transfertur. Folia ex caeruleo vident; caulis purpurascit; alioquin radix & omnia cum superioribus eadem. Quandoque florum stamina ex luteo & violaceo purpurascunt.

GALEGA. Aduers. pag. 392.

FABA maior Recentiorum. Aduers. pag. 392. 393.
Bona sive Phaselus Diosc. Dod. Germ. Bonen,
Hisp. hauas. Ital. faua.



Veneris effica istina] Ideo ad epidemicos morbos commendatur, antidotisque inferitur, & carbunculis tusa imponitur. Conuulsis & epilepticis medetur, ventris lumbricos enecat.

Varietas. Galegã minoribus foliis, flore ex caeruleo purpurate alitur. Mutoni munere in viretis notata.

LEGUMINA & LEGUMINOSA.

FABA.

DIOSCOR. Faba² inflationem excitat. agrè concoquitur, tumuliuosa somnia facit, tuſſi conſert, carmen gleg-
nii, media calida frigidèq; natura. Detocia in poſca, & cum ſuo cortice eſitata, dyſenterias & cancarum profuſi ſi-
ſſe. Contra vomitiones conuenienter manditur. Inſtatio lenior contrahitur, ſi aqua prior inter coquendum abſicitur.
Viridis plus negotij ſtomacho exhibet, maturamq; ſarum parit. Lomentum eius & per ſe & cum polenta ſilitum. In-
flammationes quas vulnus excitauit mirigat. et viticos concolores facit. turgentes greguſo ladis grammas, etiam in
ſtatione tenentur, adiuuat. lac reſtingit. furunculoſa, ſugillata, paritidèq; cum ſano græci farina & melle diſ-
cutit cum roſa autem, thure & oui candido, proccidentis oculos, tumores, ruſq; reperitur. ſuaſſima vino, ſuſſiones &
illine oculorum recreat. Ad anſucæ a ſuo cortice ſaba, ad auerſendas ſuziones, fronti ſilitum. decoctum in vino² eſſum
ceſſitates

collectiones sanat. quò tardius pubes erumpat, pueris imò ventri illinitur. vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post ouisionem renascuntur, gracilescunt, & minus alimenti capessunt. cum polenta, scisso alumine, & vetero oleo impositi cortices, strumas discutunt. decocto earum lana insciuntur. Faba dempto cortice in illas partes diuisa, in quas suapte natura scinditur, imponi solet sanguinis defluxionibus ab hirudine concitatis. namque eas supprimit, si semisecta apprimatur.

Gai. Flatulenta faba est, etiam si cocta diutissimè fuerit, ac quouis modo parata. Habent verò substantiam non densam nec grauem; sed fungosam ac leuem: quæ vim quandam habet detergendi. Apparet enim perspicuè, ipsarum farina sordes à cute detergere: ob quam sanè facultatem ventrem non cunctanter permeat. Quum autem fabarum puls sit flatulenta, multò adhuc magis erunt flatulentæ, si quis integris ipsis coctis vtatur. Si tamen frixæ fuerint, flatum quidem depohunt, sed concoctu sunt difficiliore, tardèque prætereunt, & crassi succi alimentum corpori exhibent. Quod si virides priusquam maturæ sint atque exsiccata, edantur, idem eis accidet. Quod fructibus omnibus, quos ante perfectam maturitatem mandimus, humidius scilicet alimentum corpori præbebunt: obque id excrementosius, non in intestinis modò, sed in toto etiam habitu: meritò igitur fabæ eiusmodi minus quidem nutriunt, sed promptius deiciuntur.

In vtroque medij temperamenti proximè est in exsiccando & refrigerando. Caro eius paulum quoque abstergentis facultatis continet; sicuti putamen nonnihil adstringentis: idcirco medicorum nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam, dysentericis, cæliacis, ac vomentibus exhibuerunt. Excretionibus ex pectore & pulmone idonea est. foris imposita desiccatur innoxie in podagricis: ea sepe numero vsi sumus ex aqua cocta, & ita adipi suillo admixta: ad neruorum tum contusiones, tum vulnerationes farinam eius cum oxymelite imposuimus; ad eos quos ex ictu plegmone occupauerat, cum polenta: sed & testium, & vberum aptum est cataplasma. Nam hæ partes quum inflammatione tenentur, moderatè refrigerari amant, maximè quando vbera ex lacte in ipsis concreto inflammationem patiuntur. Quin lac quoque ab eo cataplasmate extinguitur, sicuti puerorum pubes farina fabacea illita, plurimo tempore glabra permanet.


Varietas. Italis & calidioribus regionibus rarior hæc nostra maior faba quæ colore ex rubro purpurante variat in Belgio & Anglia.

SYLVESTRIS Græcorum faba. Aduers. pag. 393.



Lege argenti-
ca sine pisti-
doris, colore
pulo.




Capparis le-
guminosa.

CAPPARIS leguminosa, sive Fabago
Belgarum. *Pepleos Petri* *Queshe*
& *Pariferum*.


Leguminosam hanc plantam similitudinis
cognatione Capparin Fabagir e Belgae cen-
suerunt. Capparis namque folia longiora &
didyma faba similitudine arcuarentis, mi-
nora tamen & ad Rutam accedentia. Flores
geminates, Capparibus conditis similes: v-
sus eiusque hodie tamen disper. Expasti ve-
ro cadidi, foris quidem herbidi, sibi a me-
dio croccave stamina educuntur. Vniuersa
plata gustu amaro Salicis aut Capparis, Gal-
lis & Belgis nisi raro in hortis occurrit.

PHASEOLUS vulgaris. *Aduers. pag. 394. 395.*
Turcicae multicolor faba est Smilax hortensis
Diosc. Delicos Theophrasti Anguillara:
an Logos Gal? Angl. kidney beans. Germ.
Welshy bonen. Belg. Kocmsche bonen.
Gal. Fasiols. Hisp. Fasiolos. Ital. Fagioli.

DIOSCOR. *Siliqua cœta, cum semine in*
oleribus, asparagi modo, estur. vinam ciet. & re-
umitiosa scurrna facit.

Phaseolus
vulgaris.

PHASEOLI novi orbis. *Aduers. pag. 395.*
Faba purgatrix Clusij.



Hic Clusij verba subdidimus.

CLUS. Aliquot peregrinos fructus accepi Fa-
ba purgatrix nomine insignitos: sed nullus mihi
conspicuus est, qui faba a Garcia descripte conne-
dret, at potius inter phaseolos, omnes recensendi
videbantur.

P. 103.


Prior, cuius hic iconem exhibemus, orbiculari ferè est forma, sed planus utrinque & quodammodo pulvinatus, digiti vnus crassitie, duorum verò latitudine aut ampliore, ex vno latere aliquantulum cauo, qua videlicet hilus esse solet, & siliquæ, in qua continetur, adhæret: cortex durus & lignosus, læuis, ex rubro nigricans; quod intus continetur album, firmum, & in duas partes natura sectile, vsunt omnia phaeola ea: sapore primum quali sunt omnia ferè legumina, sed ilico linguam mordicante, & acri: quo fit (ni fallor) vt purgandi facultate præditus.

Nascitur in insula Diui Thomæ dicta, & cordis effigiem, quale vulgo pingi solet, imitatur: idcirco à quibusdã Cor Diui Thomæ nancupatur. Eius obiter meminit Petrus Cieça parte 1^a. Chronici ca. 112.


Alter Phaseolo vulgari haud dissimilis est, sed minor, densior, nigricans, & hilo prominente, & renis formam minimè referente.

CIVS. Cum Olyssipone essem, donatus sum Phaseoli genere ex Brasilia Americae provinciae delato, admodum recenti, pollicari latitudine, crasso, colore rufescente, magno hilo, & parte extrema veluti sessili. Eiusmodi quatuor aut quinque, singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & imposti bubones venereos curare dicuntur: flore traditur ex rubro pallecente: ego duntaxat iuniorem plantam vidi mihi semine natam, quæ foliis Phaseolo vulgari ferè similis erat, nisi quod minora erant, & auersa parte hispida, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fuluescente obsiti. Brasiliani Macouna vocant: similes planè, & colore, qui ex cinereo candidans est, duntaxat differentes, ex Africæ Mauritania delatos vidi.

PHASEOLVS Brasiliannus.





Siliqua PHASEOLI Brasiliani.



Quales purgarrices sadas & phaseolos Brasilianos affabre expressit Clusius noster plantarum ratorum, vt quis alius, studiosissimus & peritissimus, idèd primam laudè meritis, prima videndi & habendi copiam fecit literis & familia illustri heroïna Catherina Killegre. Paulo post Lutetiae festoiter enatam in horto Castellani pie memoriæ medici Regij clarissimi paulò ante illam funestissimam mortali stragem istic grassatam. Siliquas subdidimus quales habeo in opere illustri D. Ioannis Beancionis, & primum videtamus in musarù thesauris doctissimi Severini chirurgi & medici. Siliqua dodrantalis est, admodum elegans, duas uncias lata, quaternis & quinis loculis ventriosa, carnosa, corticosa & coriacea; siliqua Carobis vulgò dictæ concolor, innuata rugis exarata, qualis icone delineata.

PHASEOLUS alter Brasiliensis Clusij.

PHASEOLI parvi ex America delati.
Aduers. pag. 395.



Belgarum Beektoep an ERYSIMVM Theoph?
Ital. Fromentone. Gall. Bled Sarazin. fagopyrum
Ded. Ocymum veterum Tragi. Ger. Hopdenhorn.
Lampjana vera quorundam. Ocymum Marci Var-
ronis Anguil. Aduers. 395.

CLUSIUS. Vidi etiam nō procul Olyssipone in monasterio quodam Phaseoli genus vulgari nostri ad eū simile, ut nostrum putarem: pergulas istic vestiebat opere topiario, flore purpureo; ac siliquæ scabræ sunt, breuioræ, & duplo latioræ quàm nostri vulgaris: fructus est exiguus pisi vulgaris magnitudine, totus niger, nisi qua parte siliquæ adheret, quæ candida est. Brasiliensis frequenter esse audiui, & Lusitanis istic habitantibus Fava braua, id est, fabam siluestrem, nuncupari.

Fagopyrum.



Bieræ rubicundiores & dulciores eius farina concinnantur.

Melius alit quàm Milium; minus tritico.



Sesamum SESAMVM. Ital. Sesamo.
Hisp. Alegria. Aduers. 395.

Lupinus LUPINVS. *ἕλπιον ἕλπιον* Græc. Germ. Feige-
boonen. *faba ficulnea*. à folio. Ital. Lupino. Belg. Wijge-
boonen & Lupinen. Hisp. Entramocos. Gall. Lu-
pins. Angl. Lupines.



Diosc. Sesamū stomacho inutilis cibus. halitus grauitatem facit, quoties inter mandendum, commissuris
dentium inhaesit. neruorum crassitiem illis discuit. medetur auribus fractis, ambustis, inflammationibus, colū dolo-
ribus, & cerasta morsibus. capitis dolores qui astuatiōe concitantur, ex rosacco lenit. eadem efficit herba decocta in
vino. praesertim inflammationibus oculorum, doloribusque prodest. ex ea fit oleum, quo Aegyptii vtuntur.

Gal. non parum in se continet viscosum & pingue, quare emplasticum est. & emolliens, ac modicè
calidum. Eiusdem facultatis est quod conficitur oleum: & huius quoque decoctum similem viam
obinet. Semen pingue est, ideoque repositum celerrimè fit oleosum: quamobrem eos, qui ipso
vescuntur, celeriter implet, stomachumque subuertit: ac tardè concoquitur, pingueque corpori pre-
bet alimentum. Liqueat ergo quodā ventriculi partibus vigorem ac robur addere nequit, quemadmo-
dum nec aliud quoduis pingue. Est autem crassi succi, ideoque non properè peruatit. Ipso autē solo
non admodum vescuntur, sed cum melle crudo, quas *anacardias* vocant emungentes. Panibus etiam in-
spersit, temperamento sit calidum, ob eamque causam situm etiam excitat.



Diosc. *Satiuus LUPINVS* notus est. Cuius farina cum melle delectata, aut potu ventris animalia expellit. ipsi quoque macerati, & cum sua amaritudine estati, eadem efficiunt. Decoctum eorum idem munus prostat, cum ruta & pipere potum. quare lienosis prodest. eodem vlcera tetra, quae heriomata vocant, gangranas, incipientem scabiem, eruptiones pustularum, vlcera in capite manantia, vitiligines, maculasque fevere vitilissimum: menses & partus extrahit, cum myrrha & melle subditum in vellere. farina eorum cutem laevem, expurgat. Inflammationes cum polenta & aqua mitigat. Ischiades & tubercula cum aceto lenit. In aceto colla & illita strumas dissipat, & carbunculos rumpit. Decoctis pluviali aqua donec in faccum liquefiant, faciem abstergunt. Cum radice nigri chameleonis ovium scabiei medentur, si tepido decocto abluantur. Radix cum aqua colla & pota urinam cit. Vbi autem edulcati fuerint, trui cum aceto, & poti stomachi fastidium leniunt, & cibi aviditatem excitant.


Gal. Lupinus edi potest coctus, multis ante diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita, sitque tunc nutrimentum succi crassi: caeterum ut medicamentum ita praeparatus ex genere est emplasticorum. At ubi nativa etiamnum manet amaritas, extergendi digerendique vim obtinet. Interficat lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum ex posca epotus: tum etiam foris identidem perfusum vitiligines, achoras, exanthemata, pforas, gangraenas, vlcera maligna iuvat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo siccandoque. Expurgat iecur & lienem cum ruta & pipere suavitatis gratia assumptum: elicit menses ac faetum, cum myrrha & melle impositum.

Porro lupinorum farina, sine mordacitate digerit; nec enim liuida tantum, sed & charradas & phymata curat; sed tunc in aceto aut oxymelite, aut posca coquatur oportet, idque pro laborantium temperamento & affectus diversitate, quod ex usu est eligendo: digerit item & quae liuida sunt, & quaeunque modo diximus praestare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina.

Lupini dura & terrestris est substantia: quocirca ipse concoctu sit difficilis, succumque crassum gignat est necesse, ex quo non probe in venis confecto, crudus proprie appellatus succus aceruatur.

LUPINVS fl.

Amarior est, & ad omnia valentior satiuo, eiusdem generis cum iphis & facultatis.




Plin. An PISUM angulosum hortorian, sit quadratum Plin. ? Pisum maius Dod.
Perperam Cicer aristinum Tragi.
Hisp. Arueias. *Aduers.* pag. 396. 397.

Gal. Pifa tota substantia cum fabis quandam habent similitudinem, eodemque cum fabis modo sumuntur. His duabus tantum rebus ab eis discrepant, tum quod non, aeque ac fabae, sunt flatulenta, tum etiam quod detergendi facultatem non habent, ideoque sepius quam illae per aluum secedunt.

Lib. 1. de alim. & facul.


Pro fabis pifa substituuntur dummodo non sit opus absterfione.





Pisum sativum ex *luteo virgatione*.
Advers. 397.

Coccineum Americanum Pisum, ad *ORBE*
species



Quæ prostant in officinis Antuerpianis Pisâ ex nouo orbe delata, non decerpta ex quadam arbore, vt quidam putarunt; norunt amici nonnulli qui seuerû, legumen que Pîso non ita absimile vel Er- ruo enatum viderunt. Siliquis semine adhuc præ- gnâtibus me donauit D. Petrus Quickelbergius mercator Antuerpianus, historiz piscium, testa- ceorum, conchyliorum, marinorum excremen- torum & Naturæ miraculorum summus & explo- ratissimus, si quis alius, admirator. Folliculo Pîso syluestri ferè pari, semina medullosa, durissima, te- tertia, oblonga, Præoniæ æmula, sed minora, pur- pura min. a, rutila, ad basim vbi germen, ornata cõspicuis nigris vestigijs, clauduntur: gustu amara & leguminosa.

Ochrys fol. sive ERVILLA. Advers. 397.
Cicer Oroboides quorundam.

Pisum cor- datum, Cor Indum. *Malicacabû peregrinum* Fuch. *Veicaria repens* Matth. *Perpetam Dorycum* Cordi.



leg. flore tin- dido, interis purpureo, & siliqua.





LATHYRIS Narbonensis latiore folio. Angl. Cichelinge. Clymenum Matth. Ervum sativum Cordi. Pisum Gracorum Tragi. Aduers. 398.


lege angustiore gramineo folio LATHYRIS. Aduers. 398.



lege sicut & simulacione.

lege in vdis.

Aracys aut
CICERA.



ἀρακός. ARACYS aut CICERA.
Ital. Mochio. Aduers. 398.

Gal. vltus omnis Araci, & facultas Lathyridis facultati est assimilis, nisi quod Araci sint curiores, minusque facile elixantur: quæ causa etiam est, cur Cicerculis concocta sint difficiliora.



apium APRACA. Ital. Vecione & Ceferone.
Aduers. pag. 398.

Diosc. Semina adstringendi vim habent. Quare torrefacta stomachi aluiq; fluxiones sistunt, si fresca lentis more decoquantur.

Gal. eadem. Similiter ut ipsa lenticula edi solet, verum egrius quam illa concoquitur: valentius autem desiccata, & moderati caloris est.



TERRÆ GLANDES. Apios Fuchf. & Tragi.


Perperam Ornithogalon, & Apios Cordo.

Ger. Eerdnussen, erdpr thelen. Belg. Eerdnoten ende eerdekehelen, & mupsen met Gerten. id est, glans & nux terrestris, & mus caudatus, à similitudine tuberosae radice. Aduers. 398.



Dewey in l.
5. pag. 398.

ERVVM
sylvaticum.



Manducatae radices ut castaneae tardius conficiuntur, sterculentum, suorem tamen succum creant. Venenis incutiuntur sunt. Sanguinis veteri, penitis & ventris fluores compescit. Nauseam & vomitiones proterere creduntur.

lego ERVVM sive herbariorum, sive
perardylat Aduers. 399.

Diosc. Virago, narrat in anatolia exsistit.
Eadem Nix, Dioscoridem citans.

CROVA

CICER OROBEVM. *Advers. pag. 400.*
Cicercula Plin. F. Peanini.

CICER *Sativum, Arietinum, Angl. Ciche. Ital. Ceci.*
Gall. Pois Cices & Cices de belier. Germ. Kps
fern. & erweissen Kpsern. Belg. Ciceren.
Hisp. Grauancos.

OROBVS *receptus Herbariorum. Ital. Mochu.*
Hisp. Yeruo, & yeruos. & Provincialibus Eres
quasi Eraum. Mochus sine Cicer sativum Diosc.
Dodoneo. Advers. 400.



Diosc. Cicer sativum alio idoneum est, vrinam ciet, inflationem parit, colorem commendat, menses ac per-
 sus expellit; lac anget. Cum eruo decoctum illinitur ad inflammationes testium; verrucosas in formicationes; ad scabiē,
 vicera capitis manantia, imperignescē; izem contra carcinomata & vicera qua cacocitē vocantur cum melle &
 hordeo prodest. Alium genus arietinum nominatur: vrinamque cit vrinam, dato cum vore marino, hydropicis aut re-
 gio morbo laborantibus eorum decocto. Ladunt autem ea exulceratam vesicam & renes.

Gal. non minus quā faba flatulentum, sed valentius nutrit quā illa. Ad Venere[m] autem in-
 citat: creditumque est, semen quoque generare, vnde quidam equis admiscatis ipsum exhibent.
 Inest præterea ciceribus facultas abstergendi maior, quā fabis: adeo ut quidam ex ipsis calculos
 in renibus constantes manifestè comminuant: nigra autem sunt ea & exigua, aridiorque ipsa nuncu-
 pant. Satius autem est, succum ipsorum in aqua coctorum bibere.

Diosc.




Diosc. Ervum capiti oviflorum est, alium esu turbat, sanguinem per urinas extrahit. Elizo bones sagittatur. Paranda farina ratio haec est, vberiora grana candida, delizantur, permiscendaq, aqua resperguntur, donec sufficienter combidant. postea torrentur, vsq, dum hians cortex asfrumpatur, molitaq, sarmario cribro incernantur. postremo farina reconditur. Hac alio utilis est. urinam ciet. meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicam aut alium cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur. vicera cum melle purgat. lentigines & vitia cutis in facie, & maculas, totumque corpus emendat. nomas, gangranas, duritiaq, serpere non patitur. mammarium duritia enollit. atra ulcera qua cheriomata vocant, fauisq, emarginat. carbunculos rumpit. cum vino subacta illius morsibus viperarum, canem, hominumque, medetur. urina difficultates, tensusq, ex aceto mitigat. Ervum tabidis, qui alimentum non sentiunt, tostum, & ad nucis magnitudinem melle exceptum, sumptumque, conuenit. Eius cremor peritiones, & pruritus in toto corpore, sanat fouendo.

Gal. de acceat ordine secundo intenso, calfacit vero primo. Porro quatenus amaritatis est paticeps, carens incidit, extergit, atque obstructions expedit. Caeterum si sumatur copiose, sanguinem per urinas euocat.

Hominum cibus prorsus hoc semen damnatur; est enim & insuauissimum & prauis succi. Ervo autem instar lupini preparato, ex melle vtitur, vt medicamento crassos pulmonis, thoracisque humores expurgante. Candidum minus est medicamentosum, quam id quod ad flauum aut pallidum colorem tendit.

CICER SYLVESTRE verum.
Aduers. pag. 400.




CICER Syl. Herbariorum. Ital. Ceci saluatico.
Aduers. pag. 400.



LENS. *Hisp. Lenteyas. Belg. & Germ. Rintzen.*
Angl. Lentillaz. Aduersf. 401.

LENS minor.
omnia simillima sed minor.




Diosc. *Lens crebro comesta, oculorum aciem hebetat, agrè concoquitur. Stomacho nocet, eumque & intestina inflat. Aluum cum cortice suo comesta sistit. Praestat quae facillimè concoquitur, & nihil attri in maceratione reddens, vim habet adstringendi, quae ex causa aluum cohibet, si detractio antea cortice discoquatur accuratè, primaq; aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrem resoluit) somnia tumultuosa excitat. capiti, nervis, ac pulmone inutilis, melius suo fuerit munere contra alui fluxiones, additò cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut bacis myrti, aut putamino punice, aut aridis rosis, aut mespilis, sorbisue, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plantagine, aut gallis integris, quae post decoctionem abijciuntur, vel vuarum rhobis quae obsonijs inspargitur. Acetum autem cum eo diligenter percoqui debet, alias aluum conturbat. Contra subuersivam ventriculi triginta grana lentis suis corticibus denudata, deuorata profunt. Decocta cum polenta, & illita, podagram lenit. Sinus cum melle glutinat. Crustas rumpit, & viscera purgat. Decocta in aceto duritias & strumas discerit. Cum meliloto aut cotoneo malo, medetur inflammationibus oculorum & sedis, addito rosacco, in maioribus sedis inflammationibus & sinus amplè, cum malicorio aut siccis rosis adiecto melle decocta. Contra venas gangranicas similiter videntur, aut adiuncta maris aqua. Aduersus autem pustulas, herpes, eryspelata, perniqnesq; si ante dictum est. Contra mammas grumosas lac continentis, & lactis copia turgentes, aqua maris colla & illita auxiliatur.*

Gal. *Lentes mediū tenēt caliditatis & frigiditatis, desiccāt tamē secundo ordine. Ipsum itaq; curum corpus desiccāt & sistit ventrē: ceterū decoctū prouocat. Proinde etiā prius aqua abijcitur vbi retentionis causa adhibetur. Nam quae ventri obueniūt fluxiones desiccāt, os ventriculi, intestina, & totum denique ventrem corroborans, quamobrem colliacis & dysentericis accommodatus est cibus.*

Gal. *Lens verò decorticata, vtiliā adstringēdi vehementiā, & ea quae ipsam consequuntur, amittit, ita magis nutrit, quā quae cortice spoliata nō est; succū crassum praeiūntq; gignit; tardèq; cōmeat; non tamē alui fluxus desiccāt, vti ea cui cortex nō est ademptus. Iure igitur, qui largius hoc edulio videntur, elephantiasin, & cæcos incurrunt. Siquidem crassa siccaque cibaria, succo melancholico generando sunt idonea. Quare ijs duntaxat, quibus aquea in caribus est natura, lens in cibo vtiliter praeberetur: aridis verò & squalētibus admodum nocens. Eandem ob causam vltimū integrum & inculparū hebetat, ipsum immoderatè exsiccās: rei verò, qui cōtrario modo se habet, efferat. Ad mēstruas autē purgationes nō est accommodata: crassum enim & tardissimū sanguinē reddunt: muliebri profusio est vtilissima.*

LENS minor. *Est & Lens minor, flore, siliqua, seminis figura omniq; sui parte priori simillima, sed omnia minora. A rei herbaris studiosis scribitur in hortis Belgicis,*




ARACYS si-
ue Craca mi-
nima. Ad-
vers. 401.



Vicia. Angl. Fiche.
Trago & Officinis Belgij perpetua Orobus.
Advers. 401.

Gal. Semina non modò insuavia, sed conce-
ctu etiam difficilia, & aluum retinentia. Per-
spicuum ergo est eum huiusmodi naturâ ob-
tineant, alimoniam quoque quæ ex ipsis in
corpus permanat, improbi crassique succi esse,
idoneam ad humoris melancholici generatio-
nem.

ARACYS. Advers. pag. 401.
Gallie velce sauvage & Crocusus.
An vera Aphaca Diosc. Dalese. &
Gallobelgi semine columbas saginant.




SECURIDACA minor. Adverf. 401.

ASTRAGALVS Montpellier. f. 102.

Hedysarum alterum Dod. *

Securidaca minor. f. 102.



Hedysarum alterum clypeatum.



* Huius altera differentia in vireto ditissimo Hugonis Morgani, hyemis, calis & soli nostri patientissima.

Diosc. Hedysarum amarum gustu, stomacho vile in potu. additur in antidota. Cum melle ante coctum subditum, concipiendi spem admittit.

Gal. Serratam amarum & subacerbum apparet. Quamobrem potum gratum est stomacho, & viscerum obstructiones expurgat. Idem præstant totius fruticis germina.

HEDYSARVM alcorum clypeatum.

Helenium Aegyptium quorundam.

Speciosius multo superiore alunt Hedysarum vireta Belgica, quod Aegyptium Helenium eiusque speciem quidam dixerunt: alij vero apposito Hedysarum censuere. folijs enim & procumbentibus cauliculis est Securidacæ: floribus amœnis Genistæ, sed rehentibus in cauliculis summis: è quibus postea siliquæ compressæ hirsutæ ternis, quaternis & quinis orbiculatis clypeoli effigie loculis complures videntur: semine in- tur Genistæ minore. Cuiusmodi benevolentia Francisci Pennici pharmacopæi Antuerpiani doctissimi primò in vireto & habuimus.

ASTRAGALVS Lusitanicus Clusij. Lustr. Alfabea, Basilis Garauancillos.
quasi dicas Cicer exiguum.



Priscis & nuperis indicta hec, posteritati iconae & literis prodita sedulitate C. Clusij, quae quasi caeteris rarior & perelegantior foret; Astragalus generica habenda certe est, quibus quidem, ut si quae alia, exactè æquiparatur. Prodit enim facie, ortu & cauliculis cubitalibus, digitum crassitie æquãtib; duris subrubentibus, angulosis & lanuginosis; longioribus pediculis, plurimum foliorum exortus ex aduerso exactè gerentibus: folijs item hirsutis & incanis, gustanti primùm adstringentibus, deinde feruidis. Flores copiosi, Lupini, aut Fabæ vulgaris secundum oblongos pediculos ex alarum sinu prodeuntes, ordine digesti, albi omnino, sed antequàm aperiantur, ex luteo foris nigricantes. Radix pro stirpis magnitudine amplissima, brachiali interdum crassitie, palmari longitudine, deinde in binos aut tres ramos se findens, foris nigra, rugosa; intus candida, dura & lignosa, ingrato sapore, quæ arefacta cornu duritie superat. Collibus quibusdam supra Olyssiponem, quos Ægus fluuius alluit, inter vepres; syluosis in earlocis non procul Hispali, iunere Granatensis cauit. Hæc Clusius.

Diosc. Astragalus radix aluum sistit in vino pota, urinam mouet. Vetus viceribus sicca efficaciter inspargitur. Sanguinem supprimit, agrè propter duriciam tunditur.

Gal. Fruticellus est exiguus, radices habens adstrictorias; quamobrem etiam ex numero est non instrenuè exiccantium. Nam vlcera vetera glutinat, & aluum fluxu tentatam sistit: si quis in vino decoctam radicem bibat.

ASTRAGALOIDES altera Herbariorum.

Glycyrrhizæ vultu cubitalem herbam quadam cum Astragali similitudine. Astragaloidem fraxerunt Matorus & herbarum peritiores. Radice longa, digitum crassa nititur. caulis erectus in quo flores purpurei, siliquas nigras per maturitatem relinquentes.



ASTRAGALOIDES Herbariorum,
Astragalus forte Matth. vel iam demum
Polygala eiusdem.


ASTRAGALVS Syriacus.



Non ita dissimilem vultum sortita est planta, quam circa arcem ditam & urbem Treou vocatâ Lugdunensis Gallie, in collibus illis, vbi solebamus effodere Aetitem lapidem, sæpius erui-
 mus & vidimus; quæ quia ad Astragalum accederet, Astragaloidem cum Valerando Donreo nostro
 Insulano & nonnullis alijs peritis herbarum exploratoribus diximus. Cauliculos spinulosos & pe-
 dales erigit. folia Ciceris aut Galege, sed minora in pediculis utrinque ordine sita. Flosculi ex pal-
 lido puniceo, aspectu jucundi. Radix crassitie digitum æquat.


ASTRAGALVS Syriacus.

Perelegans & rarior multo quæ hic depicta leguminosa planta, Astragalus genericus habenda certè
 est: quippe foliorum & cauliculorum similitudine, & implexu radicum proreptantium Astragalum
 refert. Sed florum densa exorta congestorum decore, effigie, elegantiæ, magnitudine & robore
 ornatur amantissimo. Alepo Syriæ hanc plantam primùm habuimus; postea in vicis pensilivæ D.
 Brancie nis Mechliniæ Isalo semine enatam scimus,



GLAUC vulgaris. *Fennugracum* syl. Tragi.
Polygonum Cardii, & Gesneri *Glycyrrhiza* syl.
 à confimili radicis sapore. Angl. Sea Trifoly.
 Adurf. pag. 401.

GLAUC *Dioscor. Clusij.*



Glaucis genus illud quod doctissimus Clusius describit, ne nobis quidem inspectione notum fetur, quod quia plurimum ad Glaucem Diosc. accedere videtur, non possum non hisce subnectere, ut eius species & varietates indictas neatiquam transliamus: utque complures differentias notis inter se discernamus & notiores habeamus, de cuius assertione Clusio libenter assentimur, & gratia habemus, illiusque iudicio & descriptione oblectamur. Ternis aut quaternis à radice assurgit cauliculis dodranalibus gracilibus, incanis, folijs online quodam utrinque digentis secundum eorum longitudinem Lentiscut Astragali Hispanici iam descripti in modum, mollibus, superne virentibus, inferne cana lanugine obstitis, gustu nonnihil amaro: flos extremis cauliculis confertus, & capituli spica ut obtusa & brevioris modo inascitur. *Glycyrrhiza* vulgaris forma & colore perquam similis: radice exili, candicante, nusquam alibi quam ad ripas Thormis fluvialis, quod Salamanticam alluit, pauid infra eam urbem observati mense Iunio: verum is locus procul à mari distat, iuxta quod Dioscorides nasci tradit. hæc Clusius.

CAPVT GALLINACEVM Belgarum: an *Onobrychis* Diosc.?



Polygala vera Dalese. *Onobrychis* Dod.

Diosc. Herba suapte si fricta illinatur, tubercula dissipat. Cum vino pota, strangurias sanat. Illita ex Rad. Co. oleo sedores movet.

Gal. Rarsificandi, digerendi que vici obtinet, proinde solis eius virentis simposita ad motum cataplasmatis phymata digerunt: arefactæ verò si in vino bibantur, strangurias sanant.

CAPVT


CAPUT GALLINACEUM Belgicum.



ORNITHO-
PODIUM.
Polygala
Dioic. Do-
denno Belg.
Boegel-
hart Ad-
vers. 403.

SFERRO CAVALLO. Advers. 403.
FERRUM BOVINUM.

STELLA le-
guminosa.



Varietas. Spōtē in fylis Auxiaci castri Gallobel-
gii tota minor provenit, hyemis patientissima. Gu-
ber amara & Hedytaro nature a similitudo facit Dod.



STELLA leguminosa. *Arturo Cortusi.*

Hæc rarissima planta debetur Cortulo Patavino stirpium amantissimo, avidissimo & peritissimo: folijs exit leguminosæ Scorpioidis, flosculis Lampsnæ. Semen exile pulium in corniculis tantillum falcatis vno pediculo aptis & radiatim congestis, itellam exprimentibus, gustu leguminoso & glutuoto. Num eadē sit cum stella illa decantatissima herba Hibernis celebrata humi depacta, fides esto penes illos qui viderunt & referunt. Ad amatoria summis laudibus celebratur hæc.

TRIBULVS terrestris.

Hisp. Abroios.

Aduers. 404.

GLYCYRRHIZA echinata Diosc. Belg. Duppehout &

Callisehout. Germ. Süßholz, Süßwurz. Angl. Lic-

coris. Gall. Raigalisse & Raiglice. Hisp. Regalitia &

regaliza. Ital. Regolitia. Aduers. 405.



Diosc. Drachma pondere eporus & impositus commorisi à vipera auulsiatur. Aduersus item venena cum vino potus. Decoctum eius sparsum pulices nocet.

Gal. Terrea & frigida qualitas, quæ & adstringens superat: fructus eius cum tenuium sit partium, potus lapides renium comminuit.

GLYCYRRHIZA echinata Diosc.

Diosc. Succum radicis densatur Licij modo. Is in arteria scabrisa efficaciter habetur: vnam oportet ut lingua subditus eliquescat: adstant ogy m. acbo, thoraci ac iocinori conuenit. Sanat vesica scabiens, & renem dolores, cum passo potus. Idem eliquatus situm sedat: vulneribus illius accommodatur. Commanducatus ori predest. Recentis radicis decoctum ad eadem conuenit. eiusdem farina pterygij commodissime inspargitur.

Gal. Familiaris est nostræ temperaturæ: & cum adstrictio quædam adiuncta sit, eius temperamētum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepida potissimum caliditatis fuerit, quantum proximè accedens ad temperamētum, potus quantum & dulcis, cūmivam & modicè humida est.

GLY-

GLYCYRRHIZA filiquosa.
Advers. pag. 105.

CORONILLA *sive Colutea minima.*
Polygal. Valeriana prima Classif.



Eadem & plura quàm echinatae Glycyrrhizae tribuit Dioscorides, hæc potest.
Respiratione, omniaq; thoracis vitia iuvat; pectus dilatat; acres & salfos humores lenit & retundit.
Moderato humentique calore, recens potissimum succoq; prægnans, & quadam tenui abslergente
visceribus amica dote, eorum farctus referat; asperitates lenit, & concoctionem iuvat.

COLUTEÆ Scorpioidis varietas. Advers. pag. 407. Colutea Scorpioides coronata.
CORONILLA del Rey Hispanorum.

A superiore non nisi exilitate, & floribus speciosioribus, hilarioribusq; corollam fertiliamve auream effigiantibus differt, unde Hispanis Corona Regia dicta fuit. Belgij hortis cultioribus frequens. Lege COLUTEÆ.

CORONILLA, sive Colutea minima.

Harum omnium, cum sint omnia longè minora, minimam diximus; sicut etis foliis Rutulæ coloribus, alioqui assimilis cæteris. Spithameus cauliculus. Belgij hortensis. Coluteæ varietas.

Agro Salamanticensi, Granatensi, Murciano & Valentino spontè oritur secus vias, ut auctor est C. Clusius.



ANTHYLLIS leguminoſa Belgarum.



ANTHYLLIS leguminosa Belgarum.
Anthyllis prior Dod. Glaux quorundam.

Quæ Septentrionalibus Anthyllis prior vocatur, à ſimilitudine videtur cum leguminibus cognata: quippe foliorum & cauliculorum effigie, lentem refert, mollioribus & incanis, & carnoſis. flores lutei Trifolij pratensis quadamtenus, nõ aded in glomerationem compreſſi, ſed hiantes magis & depreſſi. Semen item Trifolio non ita abſimile. Creberrimi cauliculi procumbentes ſpithamei: radix exigua. Agrorum marginibus Lutetiani agri, Narbonenſis, Germaniæ & Angliæ paſſim occurrit.

COLUTEA Theoph. Adverſ. pag. 406.



SENA.




SENA. Adverſ. pag. 406.

MESVE. Folliculo quàm foliis eſt efficacior, ſens præſertim ſi is ex viridi nigricat, modicè amarus, ſubadſtringit abſolutus, recens in quo ſemen amplum, compreſſum. Calſacie initio ſecundi ordinis, ſecat primo. Folia etiam primo calefaciunt. Terget, expurgat, digerit, purgat clementer melancholicam.

eholiam, & bilem vltam à cerebro, sensoriis, pulmone, corde, hepate, liene. Proinde morbis dictarum partium ab humore huiusmodi proficiscentibus succurrit, vt melancholicis febribus antiquis: gaudium gignit ablato humore sine causa externa triftante, & floridum corpus efficit, obftructions vifcerum aperit. Foliorum huius & chamæmeli decoctum lotionem cerebrum, neruos roborat. Eadem quouis modo vlturpata, vifum & auditum firmat. Eius purgationem tardam & imbecillam celerant & intendunt mifta acria, vt Zingiber, Sal Gemme, fal Indus. Ne verò ftomachum lædat, cardiaca & ftomachica funt mifeenda. Ob id Galeni decreto coquenda largo pondere ex iure Galli, Gallinæ, vel aliarum carnum, vt citra moleftiam purget: vel fero lactis infufa, cum fpica, deinde parum diu feruefacta, vel puluis eius ex lacte dulci fumendus eft. Vino albo musteo mifebat quidam vim magnam Senæ, post tres menses potandam dabat, ficque purgabat cerebrum & sensoria, & gaudium augebat. Sunt qui decocto eius cum prunis & fpica feliciter purgant. Mediocretem autem coctionem fuffinet. Infunditur ab aureis tribus ad 5 vnam.

Lege SPARTIVM. *Genifta scoparia vulgi.*
Genifta Plin. cum Hippofpartio,
fue Rapo Geniftæ. Aduerf. pag. 407.
*Hifp. Scobas.**

Vulgi GENISTELLA *infectoria.*
An Lutea Plin.? Aduerf. pag. 407.
Perperam Ferula Tragi.




*Vrinam amaritudinis ratione mouet & calculum frangit vi incidendi & extenuandi.

*GENISTELLA infectoria. Aduers. pag. 407.
Genistella tinctoria Clusij. Scoba Marciensis.*



*SPARTIVM Dioscorideum Narbonense &
Hispanicum. Aduers. pag. 408.*



Varietates.

2. E solo folio latiore secundam differentiam alit Mattonus noster.
3. Et tertiam iuxta Zuthphaniam lectam, procumbentibus pediculis ramulis, cæteroquin non ab- similem.
4. Quartam differentiam Clusius icone & oratione his verbis dedit. Ad binorum cubitorum altitudinem crescit interdum hic frutex, nudo stipite, enodi, recto, digitali crassitudine, candidate cortice obducto, in multiplices brevesq; ramos summa parte sese diuidens, tenellos & fragiles, quos ornant folia Lini aut Thymlæ frequentia, supernè virentia, infernè verò incana & planè argenteo splendore, gultu primam linguam exsiccante & nonnihil adstringente, deinde subamaro: flores suavis capulis nascuntur spicatum Genistæ tinctoriæ Germanicæ similes, lutei. Totâ planta elegans aspectu. Nusquam hunc fruticem conspexi, quàm Murciano regno secundum vias mentè Maio florentem. Incolæ Scobam vocant.

SPARTIVM Dioscorideum Narbonense & Hispanicum.

DIOSCOR. Purgant per superna vehementer, Hellebori vice citra periculum flores & semina, quibus obolis in aqua misa pota. Semen sic illi non mouet. Remit in aqua maceratis, mox raris, extractus succus, ischiadici & angustifolii laborantibus auxiliatur. Si cyathi modum diuini bibant. Quidam in aqua macerare malunt, & infundere si vis diuisi cyathi refrigerant autem elicit cruento.

Col. Non indrensè urahentis est facultatis.


Ægin. eadem quæ Diosc. pota quinque obolorum pondere per superna sine periculo veritati modo.

Herbar. Scobam.

SPARTIVM

SPARTIVM *Hisp. alterum flore luteo Clusij.*
Spartum monospermum Hisp. Mutoni.

SPARTIVM 2^m. *fioribus albis Clusij.*
Facie vulgati Spartij Narbonensis aut Hispanici,
Hisp. Retama, & yniesta, & Hiniesta.



In siliquis rotundis, semine reperto in vasis Damascenis in Belgio enatum habuit Mutonus, eiusque postea ramulis nos donavit C. V. D. Ioannes vander Dill. Frutice, radice, stipite striato, vimineis virgis iunctisve, foliis caducis & flosculis luteis, sed minoribus vulgare Narbonense aut Hispanicum Spartium refert. Sed in singula siliqua, lobove sine cartilagineo tereti oliuari folliculo, herbariorum Ciceri sylvestri ferè pari subrufo, singulum semen atrum & durum, renis effigie, claudit. Variis Castellæ vniuscue locis arenoso solo oritur, vt auctor est Clusius.

SPARTIVM 2^m. *fioribus albis Clusij.*

Genistam Damascenam odoratam flore albo Hispani referunt: quam subiunxit præcedenti Spartio Carolus Clusius his verbis: Aliud superiori simile, longè tamen maius & hominis altitudinem superans. Virgulis priore tenuioribus & lentioribus magisque obsequiosis: flore paulo maiore & omnino candido: lobis à superiore, forma non differentibus, sed minoribus, semen etiam minus continentibus.

Huius me primus monuit Antuerpiæ C. medicus D. Dionysius Thomas Lusitanus, materis Medicæ gnarus.

Gadibus solum provenit & locis vicinis aut marina perflatis.


GENISTELLA montana. Aduers. pag. 408. Genista angulosa Cordi.
Genista sagittalis nuperorum. Chamæspartium Tragi.

Caput luxa-
ta. Aduers. pag.
408. hoc restitui
cur.

Spartea & hæc herbula est, & duntaxat montium celsiorum conuallibus quibusdam obuia, vt Cal-
cari montis Narbonensis, propter cœnobium: In Germaniæ etiam arduis spargens sesquipalmaria fo-
lia pinnatim triquetra, sagittæ affixæ aut innatæ pennæ ritu, articulatum veluti geniculatâ per spatia &
commisuras insecti, qualia videre est virentia etiamnum Londini, Mechliniis, Antuerpiæ & Liæræ in
hortis; floribus luteis Genistellæ insectoriæ fastigiata, quibus succedunt siliquæ, & semen Genistæ lon-
gè minora.

GENISTELLA pinnata altera Hispanica.
Chamægenista peregrina Clusij.*

ASPALATHVS secunda Monspelliensium,
An Scorpio Theoph. Clusio & Anguillær?




lege sili-
tas, & Gene-
ras.
Item post
põit lre
Aspalathus.

* Hanc superioribus mensibus ad me misit Franciscus van Zynich Bruxellensis pharmacopœus uni-
uersæ materiæ medicæ, vt si quis alius, gnarus, ex Hispania delatam opera D. Ambrosij Boone Consi-
liarij Regij, quæ quia exactissimè à Clusio descripta, eius descriptionem sequemur. Vix palmari altitudi-
ne assurgit, admodum fruticosa, foliis Chamelææ proximis, duris & carnosis, per ambitum aliquan-
tulum sinuosis & crispis, rigidiusculisque, vno ex altero è medio folij neruò prodeunte, quemadmo-
dum in Chamægenista, quam nonnulli Sagittalem vocant, interdum verò binis ternisve simul exo-
rientibus: hic verò neruus paulatim intumescit, & in ramulum conuertitur, quandoquidem tota plan-
ta foliosa sit: in extremis istis foliis, quini, senive aut plures flores simul functi ex villosis caliculis nas-
cantur Genistellæ similes, sed minores aureo planè colore, sed quorum bina inferiora folia incana lanu-
gine pubescunt. Floret Marcio incultis locis Valentini regni.

SPARTUM aphyllon fruticosum inaequis aculeis,
lanatis capitulis. *Adverf. pag. 409.*
*Valentinis Hifp. Erizo .i. erinaceum. **

GENISTELLA aculeata. *Adverf. pag. 409.*
Forſt Vlex Plin. Germ. fchärende-Stink.



Est idem cum hac *ERINACEA* Clusij, cuius
flores ex caeruleo purpurantes non videramus,
nullave foliola, quae raro producit, scite à Clusio
animadverta, & descripta.

GENISTASPARTIUM spinosum alterum.



Menses & ventris fluores sistit, *Fuchl. auctore: &*
ad eadem valet quae Hippuris.



GENISTASPARTIUM spinosum alterum.
** SCORPIUS* secundus Clusij.

Debetur & haec *Nepa* Carolo Clusio, qui eam
primus ab altero *Spartio* spinoso distinxit. Pedem
proceritate vix aequat, aut superat. Spinæ horridæ
ex adverso binæ quadam serie exeunt, colore palli-
diores quam alterius vulgatae: flores summis ramu-
lis lateri & semina erui, magnitudine, incana, lan-
gine hirta latent sub spinis. Radix totaque facies
cæteroquin non abstulit superiori. Collibus Gra-
natæ vicinis itinere *Cordubensi* solummodo evul-
sit Clusius.

Spina

Spina ACATIA Diosc. *Advers.* pag. 409.
Acanthus Theophr. *Angul.*

ACATIA altera Dioscoridis.
Advers. pag. 410.



Siliquæ Lu-
 pini effigie.



DIOSCOR. *Acatia* in Aegypto nascitur spina instar arboris, fruticosa, non se in rectum attollens, florem habet candidum, & semen lupino simile in folliculis, ex quo succus expressus siccatur in umbra, niger ex maturo semine, sub-
 rufus ex viridi. Eligatur modicè rufus & odoratus, ut in hac arbore esse potest. Aliqui exprimant ex foliis & semine
 succum. Manat & gummi ex ea spina, vis ei ad spissandum, refrigerandumq; efficax. Succus oculorum medicamentis
 vilis. valet ad ignem sacrum, ulcera qua serpunt, permiones, pterygia, & oris ulcera, proidentes oculos reprimat. men-
 suram abundantiam sistit. prociduam vuluam cohibet. citam aluum supprimit, aut potus aut subter indigus. capillos deni-
 grat. Lauatur oculorum medicamentis, trito in aqua, mox effuso quod concreuerat, donec pura extet aqua. & ita cogitur
 in pastillos. vritur etiam in cruda fidelia, donec fœcile fornacibus percoquatur: torreturq; in carbonem hâlitu persata.
 Spina decoctum solutos artus sotu committit. Praesertur eius spina gummi, quod in vermicularum speciem contrahatur,
 & vitri modo perluceat, ligni expers, proximum est candidam, sordidum verò ac resinosam, inutile. Cutis meatus ob-
 struit, & medicamentorum quibus admiscetur, acrimoniam hebetat, ambustis ex ovo illitum, pustulas non patitur
 erumpere.

Gal. *Acatia* & planta ipsa acerba est, & fructus & succus, qui lotus quidem & imbecillior & minus
 mordax redditur, utpote acrimoniam quandam in lauatione deponens. Porro si parti alicui sanæ illina-
 tur, protinus eam & sicciorem & contractam efficiet, nullum quidem caloris sensum inueniens: sed
 nec frigoris admodum valentem. unde constat medicamentum id esse frigidum & retrosum, immixta
 quadam etiam essentia aquæ. Et sanè coniectura est, non esse simile, verùm quassam in se se disper-
 sas habere partes tenues & calidas, quæ in ipsa ablutione segregentur. Et hocque & hoc tertij ordinis
 illorū verò, exiccantium, & secundi refrigerantium, vbi quidem elorum fuerit, absque eo verò primi.

ACATIA altera Diosc.

Succus eius adstringit, viribus inferior, & ocularibus medicamentis inutilis.

FRAXINELLA Cordi & officinarum, an sit Tragium Diosc. Advers. pag. 416.
Tragium Gaillardini qui non pariter, sed pariter legendum probat, Plinium sequens, qui
illud Terebintho aequale facit.



DIOSCOR. Tragij semen, folia, lachrymaq; illius spicula è corpore eiciunt. omnia quoque corpori impacta 2. Eadè Gal.
otlocant. pota stranguria medentur, calculos vesicae frangunt. menses trahunt. Modus in sumptione est drachma vna. 3. Eadè Gal.
fama est huiusmodi canes sagittis confossas eius herba p. abulo spicula excutere.

Gal. Tragij folia, fructus, lachrymaq; trahentis digerentisque sunt facultatis. Est verò & tenuium
partium, & facultate in principio tertij ordinis calida.

ARBORVM, Fruticum & Creniorum observationes.

LENTISCVS Diosc. Advers. pag. 411.

DIOSCOR. Nota arbor est cui vis inest adstringendâ. semini enim, folio, ramo, cortici, & radicibusq; cognata in-
sunt vires. Liquefactum autem ita fieri solet: Folia, cortex, & radix in aqua coquantur, & ubi abundè colla refri-
gerataq; sunt, folia abiciuntur. aqua densè coquitur, donec melle habeat crassitudinem. Lentiscus sua astringendâ dote,
valet aduersus sanguinis reiectiones, alui profusiva, & dysenterias in potu. item contra eruptionem sanguinis ex vulua, &
eiusdem aut sedis prociencia. In totum acacia & hypocistidis vicem repraesentat. Idem facit succus è tritis foliis. Deco-
ctum soto cana explet. & fracta ossa ferruminat. vulua fluxiones sistit. nomas arces. priamq; pellic. motus dentium colle-
ctione stabilis. Vitentes surculi calamulorum vice dentibus repurgandis affricantur. Fit è semine oleum, quod prodest cum
quid astringi opus est. Lentiscus resinam gignit, qua lentiscina cognominatur, & ab aliquibus, mastiche. Pota utilis est
sanguinem reicientibus, & tussi veteri. stomacho auxiliatur, sed ruffum mouet. additur in dentivitiâ & illusiones fa-
ciat, ad nitorem cuti conciliandum. palpebras oculis incommodas replicat. manducata halitum oris commendat. gingi-
uas contrahit. Optima & copiosissima in insula Chio prouenit. Praesertim nitidula modo resplendens, & tandem Ty-
rhenica cera similis, adula, retorrada, friabilis, odorata, stridor em edens. Viridis autem inferior est. Adulteratur thuris,
resinaq; pinza nuch mistura.

Gal. Frutex hic ex aqua essentia leuiter calida, & terrena frigida nō pauca compositus est. Desiccatur igitur secundo ordine completo, aut tertio incipiente: in caliditatis & frigiditatis differentia quodammodo est medius & symmetrus. Similem omnibus sui partibus adstrictionem obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus, germinibus ac foliis, praeterea fructu, & cortice: ac si succum ex foliis eius viridibus exprimas, siccilis hic ordinis est, moderatè adstringens. Itaque bibitur & per se & cum aliis medicamentis, quae dysenterias & alui affectus sanant. Quin & ad sanguinis expulsiōnes, tum sedis vulnèque procidentias idoneus est, utpote ad hypocistida nonnihil propè accedens.

LENTISCVS Diosc. Narbonensib. Restincla.
Angl. Mastitree. Germ. Mastitzaum. Gal.
Lentisc. Hisp. Mara. Ital. Lentisco.

TEREBINTHVS cum flore. Aduers. pag. 411.
Angl. Turpentine tree. Gal. Terebinte. Hisp.
Cornicabra. Ital. Terebinto.



Lege saepe
virens.

*Diosc. Terebinthus cognita arbor est, cuius folia, & semen, & cortex astringunt, & ad eadem a Galieno
sensus conueniunt, simili parata modo sumpta. Fructus esui aptus est, sed stomacho aduersatur, excoescit, vrinam mo-
uet, venereum excitat, contra phalangiorum morsus conuenienter in vino bibitur. Resina eius ex Arabia Petraea deservit.
Prouenit etiam in Iudaea, Syria, Cypri, Aethiopia & Cycladibus insulis. Sed praesertim candida, perlucida, vitreo colore &
in caruleum vergente, odorata terebinthum olens. Terebinthina resina omnibus antecedit, proxima lentiscina, & è pinis,
& abiete, haec sequitur è picea & pinetis uucibus resina. Natura omnibus caliditate, molliore, discutiore, expurgare, inflac-
tibus conueniunt per se, aut in eclegmate ex melle. vitia pectoris expurgant, vrinam cient, cruda concoquant, ventrem
emollunt, palpebras commodissime replent, lepras tollunt, etiam arigine ac furoris atramento, vitraque auribus sanant
emanantibus cum melle & oleo: item in pruritu genitalium viles. Malagmetis, acopis, admiscetur. Iacurum dolori-
bus per se, illis & appositu auxilio sunt.

Gal. Terebinthi tum cortex tum folia, tum fructus adstrictorium quiddam obtinent. Sed & se-
cundo ordine excoesciunt. Itaque quod etiam desiccant manifestum est. Recentes quidem etiam
humidique modicè; sicciorè ordine secundo. Caeterum fructus vitis propinquus est etiam
tertio ordini desiccantium. Est enim admodum calidus, ut mandentibus proximas eius caliditas percipiunt.
Itaque etiam vrinam prouocat, & licetibus prodest.

R. H. V. *Samach officinarum. Aduers. pag. 412.*

PISTACIA cum corniculis. Aduers. pag. 413.
Angl. pistaches. & Pistias.
Ital. pistachi.



Dioscor. Rhus qua obsonis aspergitur; corticosa tunica perquam utilis est. Folia vim habent* adstringendi, & acacia effectus praebent. Decoctum capillos denigrat. Dysentericis infunditur, & in potus eorum infususq; adicitur. Instillatur auribus purulentis. Gangranas & pterygia cohibent folia ex aceto aut melle illita. Liqueamentum fit ex aridis foliis, ad crassitudinem mellis in aqua decoctis, ad eadem ut lycium conveniens. Semen eosdem effectus exhibet. Cataplasmatum, dysentericorumq; obsonis aspergitur. Fracta, desquamata fluida q; illucum ex aqua, ab inflammatione vindicat. Lingua asperitates cum melle abstergit. Candida facinarum profusiva sistit. Haemorrhoidas sanat, cum querno carbone intrito admotum. Aqua in quo semen maduit decocta, cogitur coitq; efficacior ipso semine. Gummi defert, quod denarium canis imprimatur, ad dolores finiendos.

* Idem Gal. Tertio ordine exsiccatur, & secundo refrigeratur.

Lege **COCCIGRIA** Theophr. Corinus Plin. 413.

Quidam asserunt esse *Fusset Gallorum*, quo inficiunt aureo colore.

PISTACIA.

Diosc. Stomacho amica sunt. Trita cum vino contra serpentium ictus prosunt, siue edantur siue bibantur.

Gal. Fructus eius quodammodo tenuioris essentiae est, subamarum quid & odoratum habens: obstructions itaque liberat, sed maxime iecoris, verumtamen etiam thoracis pulmonisque.

GLANS ynguentaria. Aduers. pag. 414.

Diosc. Drachma pondere pota lienem absumit. cum loliis farina & aqua mulsa podagricis illinitur: psorasteprasiq; decoctum aceto vitiligines, & nigrae cicatrices cum nitro emendat; & cum lotio lentiginis, varos, & papulas in facie, & cutis vitia tollit. Vomitiones (3. j. Gal.) movet. Aluum cum hydromelite resoluit, stomacho aduersatur. Cortex eius magis adstringit: verum tusa & expressa succus abstergentibus medicamentis adicitur, quae aduersus pruriginem & scabrities idonea sunt.

M. E. S. V. E. Oleum emollit: frigidis nervorum affectibus conuenit, & vitias resoluit.

Balatum Oleum.

Diosc. Repergat maculas lentiginis, varos, & cicatrices nigrae. Aluum salis stomacho aduersatur, contra acutius dolorem, sonos, & tinnitus auxilio est, cum asferino adipe infillatum. Similis Sesevili rat.

SYRINA

SYRINGA
caerulea L.
Luzanica.



SYRINGA caerulea Lufraica.
Aduers. pag. 414.
Lilac Matth.

Flores racematim cohaerent caerulei, suauissimum odorem fundentes: populnea fronde in ramulis Rhois modo fruticantibus.

SYRINGA Italica.



STAPHYLO
DENDRA.



Folia habet Betulae longiora, & flores Arantij vel Tiliae, albos odoratosque. Hortis Belgij hoc nomine hodie notissima.


Staphylo dendra. STAPHYLODENDRUM Pini.
Aduers. pag. 414. Gal. Baguenaudes à patre-
nostres. Ital. Pistachio salustico.

Kopier



Kassia Siliqua. Aduers. pag. 414.
Gal. & Provincialibus Carobe. à Chaldis sic etiam
dicta. Angl. Sillicā tree. Ital. Silique, & Carobe.
Hisp. Algarrouas. Germ. & Thons bjer.

CASSIA purgatrix. Aduers. pag. 414. 415.
Officinis, Gal. Germ. Belg. Ital. & Angli, Cassia.
Item Hisp. Casia fistola.*




*Tutissimum medicamentum qualibet die, hora, aetate, sexu, etiam huc pręgnantibus nulla molestia
aut incommodo, flauam bilem, pituitam, hepatis, renum, & quoslibet viscerum feruores, educens.

M E S V E. Cassia fistula calido frigido temperata, nisi quod paulò est calidior, humida primo gra-
da, clementer & innoxie à ventriculo bilem & pitutam purgat leniendo, febribus inde ortis confert,
sanguinem hac ratione puriorem reddit, ac eius sangyinis, & bilis flauę acrimoniam frangit, resolut
thoracis & pulmonis, & asperę arterię phlegmonas, easque partes lenit ipsa morsu expers, suum sedat,
pręsertim sumpta cum succo intybi, vel cichorij, vel solani arte depurato. Intemperiem denique renum
calidam mitigat, cum diureticis sumpta, & glycyrrhizę decocto, ob id que calculum in his gigni pro-
hibet. Deligenda est fistulę insigni, plenę, ob id graui, splendente foris ac etiam in pulpa pingui, que
recens sumenda est potius, quam vasis seruata: si autem viscera sunt ficciora, cassię lubricitas augenda
est oleo amygdalarum dulcium: si debilia & lubrica sint, minuenda myrobalanis vel rhabarbaro, vel
aqua cum mastiche cocta, vel spicę additę: si ad vias vrinarias ferri est volumus, vreticę miscantur.
Quoniam verò tardius & imbecillius purgat, acre aliquid (quale thymum, hyssopum) actionem eius
intendens miscatur, aut potius aliquid medicamentorum valenter purgantium: effuscinq; purgat
hęc, si ex sero lactis propinetur. Tam est benignum & innoxium hoc medicamentum, vt omni aetati, &
ipsis etiam pueris & pręgnantibus tato sumatur.

MOLLE Clusij.

GELSEMINUM vulgare. Advers. pag. 415.



Molle, quale exercitatissimæ cognitionis descripsit peritissimus Clusius, hic subdere visum fuit, instituti nostri, & ordinis consecutione: ut cuius semen & herba ab illustrissimo viro D. de Brancion mihi communicata fuerint.

Molle. CLVS. Caterum odor fœniculi mihi in memoriam reuocat arborem in Peru nascentem, Molle vocat, cuius ego pusillas duas plantas, è semine natas, vidi ante aliquot annos Meohliniæ in horto splendentissimo illustris viri Dn. Ioannis de Brancion, sed quæ tertio anno perierunt hyemis iniuria.

*Molle histo-
ria.* Erant autem ex arbusculæ franco (quia tenellæ) ex viridi nigricante, multis conferto veluti maculis cinereis, folia pennata vt fraxini, sed multo minora, ex viridi nigricantia, serrata, & sub extremum angustiora, quæ ab arbusculis reuulsæ lacteo succo, eoque lento & viscido, & odorato manabant, & ipsa folia trita fœniculi odorem reddebant, gustata adstringentis facultatis non nihil habere videbatur. Fructus ex quo nati sunt, piperis serè magnitudine, oleaginosus, pellicula rubescènte tectus, racematim coherens, vt ex eius iconè, quam ad vitium depingi tum temporis curauimus, conspiciere licet: florem quem habet ignoramus, sed quibusdam auctoribus, nigritus est, viti similis.

Natalis. Hæc arbor abundanter nascitur in conualibus & locis planis Peruanæ regionis, vt referunt omnes qui Occidentaliū Indiarum descriptionem dederunt: sed Petrus Cieça maximè, qui eius descriptionem hoc modo cap. 112. primæ partis Chronici dat.

*Molle histo-
ria alia.* Toto hoc tractu conspiciuntur magnæ quædã, & etiam parvæ arbores, quas Molles appellant incolæ: folia habent minuta, odore fœniculi, cortice aded commendato, vt eius decocto crurum dolores & inflationes summa cum vtilitate foueantur: ex ramulis sunt dentis capia vtilissima. Ex huius fructu cum aqua decocto, pro cocture modo, fit aut vinum, siue potio ad modum bona, aut acetum, aut melle: utroque in precio apud Indos sunt hæc arbores, vt quibusdam locis eas consecratis suis Idolis habent. Addunt nonnulli eius arboris foliorum decoctum, doloribus ex frigida causâ ortis auxilio esse, guarani verò eius, quod Manu modo candidum est, lacte dissolutum, caliginem oculorum absterget.

CHAMÆESEMIMUM grandiflorum peruvianum.

Humilis Gelsemini quaedam etiam species elapsa astate Bruxellis, quam aiebat studiosè in vrbis penitibus C. V. D. Ioannes de Boissot, vidisse memini, surculos ramulis pede, vix cubito vel sesquicubito longioribus: foliis lasini vulgaris, minoribus, nigrioribus & rotundioribus. flos aspectu suavissimus, itidem non absterilis, sed quadruplò maior, patulus, Thalerum æquans, candidus aucta parte suauè rubens.

BALSAMUM Diosc. Advers. pag. 415.

DIOSCOR. Arbor * Cytisi, (non Alba viola) Lycij, sine Pyracantha, (non pyracantha) magnitudine conspicitur. Foliis Ruta proximum, longè candidius, perpetuo virens. in Iudæa solum quadam valle & Aegypto nascens. His differens modis, scabritate, proceritate, gracilitate. Quodigitur tenui & capillacea coma est, therisum vocant, quasi demissile: sorte asis quoniam ob gracilitatem facile demeratur. Aestivis sub ortu Canis ardoribus, arbor vnguibz ferretur inciditur, man atq; è plaga succie, quem opobalsamum vocant: sed tam exiguo stillatu, vt annis singulis, ne plures quidem quam seni septenive congij cogantur. inibiq; pondus, duplo rependitur argento. Succu probatio est, vt sit recens, validi odoris, sincerus non acorem vergens, dilui facilis, lauis, astringens, ac modicè mordens gustu. Sed variè vitatur, missi ab aliquibus terebinthi, cypri, lentisci, balani vnguento: item susino, metopio, melle, aut Cypria cera liquida. quod maleficium facile deprehenditur. Namque merus in laneam vestem susus, neque maculam facit, neque si eluatur, notam relinquit: vitiatu autem inhaeret. & lac instillatu coagulat, quod adulteratu non efficit. Quinetiam sincerus in aqua aut lacte celerrimè liquatur, coloreq; lactescit: vitiatu verò olei modo innatat, se conuoluens, aut in stella modum diffundens. Sincerus senescens crassescit, deteriorq; redditur. Hallucinantur, qui aqua concretum pessum vo, & ad ima sidere arbitrantur, postea dissipatum supernatate. E ligni genere, quod xylobalsamum vocant, probatur recens, sarmento tenui, fuluam, odoratum, quadam tenui opobalsamum spirans. Necessarius etiam seminis erumpit vsus, quare eligatur fluum, plenum, grande, ponderosum, mordens gustu, feruens in ore, modicè opobalsamum * olens. Adulteratur † semine hyperico simili, quod à Petra oppido defertur: sed coarguitur magnitudine, inanitate, vitium ignavia, sapore piperis. Efficacissima vis inesi succo, & quammaximè calfaciens, abstergit quæ tenebras ocalorum pupillis offundunt: medetur perfrictionibus vulua cum rosaceo cerato appo, bis menses quoque, secundas, & partu extrahit: horrores illiu discit, vlcera sordida expurgat, & cruda concoquit. vrinam potu citet. agrè spirantibus prodest. datur in lacte contra aconitum haustiu, aut serpentiu illiu. miscetur acopi, malagmatis & antidotis. In summa, præcipua auctoritas succo, secunda semini, minima ligno. Semen commodè potu datur doloribus lateris, pulmonu vitii, tussi, ischiadici, comitialibus, vertiginosis, orthopnoicis, vrina difficultati, terminibus, ac venenosarum bestiarum moribus. ad muliebres sessus perquam vile est, vuluam aperit in defensionibus balnearum decoctum, & † humorem euocat. Lignum easdem habet vires, aliquanto minores, ex aqua potum cruditatibus, terminosis, vulsis, venenatorum illibus opitulatur. vrinam citet. ad capitis vulnera cum sicca iri conuenit. squammas ostium extrahit, & ad vnguentorum sissamenta additur.

Cytisi, * pyracantha. In Auicena legitur visci pro Lycij, vt forsitan apud Plin. pro vite legendum lycij, vbi ait Viti similior quàm Myrtho, perpetuo folio eoque candicante. Theoph. Folio Ruta perpetuo virens. Addit Plin. lib. 12. cap. 25. Foliis proximum Rutæ perpetua coma. Pausanias Sampfico comparauit. * non videtur legendum Leucoij, sed Cytisi cum Strabone. Terebintho Theoph. comparauit. Plin. Hyperico; vbi potius legendum Petrao Terebintho, quia Terebinthi resinam ex Asia Petra defertur tradit Diosc. prouenire etiam in Syria, Iudæa & Cypro.

* Opobalsamum olens.] Luxata est Theoph. lectio, qui fructum magis, pro minus reddehere ait.

† Adulteratur semine Hyperico simili quod à Petra oppido defertur: sed coarguitur magnitudine, inanitate, vitium ignavia, sapore Piperis.] Quidam correctius legunt: Defertur ex Petra, quo adulteratur fructus, semen Terebintho simile, quod dignoscitur magnitudine, inanitate, vitium ignavia, non sapore piperis. Quæ omnia vulgato inodoro, vieto & exoleto officinarum Carpebalsamo conspiciuntur. Cùm perfricor. i. piperis sapore dicit, pugnare videtur cū viribus ignauo & adulterato; cum legitimo autem Carpebalsamo quadrare; quod mordens gustu, feruens in ore. In pipere autem non alius quàm acis & feruens reperitur sapor.

Dicat quispiam cavillator Balsamum calidum & siccum excessu 2°. Galeno, quomodo igitur gustu, feruens & mordens erit? Dioscorides credidit Balsamum præsentissimas ad exalfaciendum habere facultates, deceptus partium tenuitate; quod euidenter Galenus his verbis restatur Balsamum calidum & siccum excessu secundo. Est autem tenuium partium, adeo vt odoratum sit; sed liquor eius subtiliorum etiam partium est quàm ipsa planta, non tamen adeò calidus vt quidam existimant, tenuitate partium falsi. Porro fructus eius persimilis genere facultatis est; cæterum longè in subtilitate partium inferior.

In Nicotiana diximus, quæ calefaciens vel refrigerans cum tenuitate partium, citius & potentius agere, vt Acetum, & alumen scissile, efficiens & citissimè constringunt, ob summam partium tenuitatem. Capsum nonnullis inscribitur; vt medicamenti vis integra in abditissima sua tenuitate citius permeet & perueniat, quæ alioqui longa mora à natura alteraretur & immutaretur.

Abstergit quæ tenebras.] Præter illam calfaciendi vim qua pollet, absterget quæ pupillas ocalorum obumbrant, quod amarore quodam præstat, & partium tenuitate, qua in internam corneæ partem penetrat, non secus ac fella potiusque dissolvit quàm detarget. Verùm quia viscera etiam expurgare docet Diosc. dicemus in succo amarorem quendam inesse, quo extergit.

* Ad materig
ejectione.
expectoratio
nem & inel
tionem.
† a. i. super
fluitate.

Medetur perfrictionibus vulnæ.] Quia calidum est, tenuium partium & odoratum, quo gaudet uterus.

Cum cerâ Rosato.] Rationi alienum videtur, quia tenuitati partium aduersatur. Attamen Dioscoridis Rosaceum paratur cum Schœnantho. Serapio cum cera & oleo imponebat. Fortè Dioscorides Rosaceo voluit excipi, quia æstimabat efficacissimum & calidissimum medicamentum. Hinc colligere licebit, oleis stillatiis Chymistarum, & eminentis Balsami liquoribus, non nisi aliis probè commixtis & temperatis utendum esse, quia pleraque sæpe feruore & partium tenuitate lædunt.

Horrores illium discutit.] Sæpè horror pro rigore, & contrà rigor pro horrore supponuntur, quæ secundum magis & minus differunt. Rigor fit cum maiore concussionem in biliosis febribus; horror cum maiore refrigeratione in quartanis cõpositis vel *hupstabus*, id est, tertianis febribus imperfectis ad quotidianam accedentibus. Frigus in quotidiana. Horrores, rigores & frigora, non secus ac alia calidiora olea, Rutaceum, Anethinum, Abrotani, succus Saluæ, oleum Castorei, de Euphorbio, è piperibus, & similia, spina dorfi illita soluit.

Cruda concoquit.] Humores vlcerum vel abscessuum crudos concoquit.

Agrè spirantibus prodest.] Crassa & cruda incidendo, & facta reserando; concoquendo & discutiendo, respirationem facilem reddit.

Datur in lacte.] Quia aduersus venena pollet, miscetur antidotis: Lac veneni acrimoniam inhibet, & balsamum mirius efficit.

Lignum easdem habet.] Quia minus succi, plus crassarum partium: Igitur facultates adstringentes terreæ substantiæ obtinebit.

Vulnera capitis.] Quia potentiùs siccat, vulneribus capitis medetur, quæ summa siccitate egent.

SORBUS domestica. *Aduers. pag. 416.*

Oslria fortè Theoph. Germ. Spierling, & Spozbaum.

Gal. Cormier, & Sorbier. Hisp. Seruas. Lusitan.

Sorba. Ital. Sorhole, & Sorba.

SORBUS syl. Alpina. *Aduers. pag. 416.*

Fraxinus bubula Dod.


Gal. Cornier lanuage.



DESCR. Sorbi cilioreni lincum res vicia pinnatam in arborifera, dissecta & in sole siccata manducant, & alium siliare. Eadem est succin molle rari lincum, s. poluete lincum siliare, & lincum molle rari lincum siliare. Gal. Adstringentem obicit qualiteram. Sed non habet bacillioem quàm Mespilus: proinde sanam etiam etui lucunda est, minusque quàm Mespilus ventrem constringens.

FRAXINVS. *Aduerf. pag. 416.*
Angl. Mithre tre. Germ. Balbaum, Eichenbaum.
Belg. Eichen. Gal. Frefne. Hifp. Fralno. Ital. Fralino.

Nyx *inglans. Aduerf. pag. 416. Angl. Walnut tree.*
Germ. Aufe, & Welfchmalobbaum. Belg. Doeten,
& oekernotten boom, oft Dattelacze. Gal. Nois,
ou Noyer. Hifp. Noefes. Ital. Noci.



Dioscor. Foliorum succus & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ichibus auxiliatur. Corticis cinis ex aqua illius lepras eximit. Ligni ramenta scobemq; potu perniciosam afferre tradunt.

Spleniticos, nephriticos, & lue Gallica affectos scio curatos, qui igitur sint ramenta venenum; si quidem ipsa aduersator venenis: an quia corpori non venenato imprimi illam qualitatem, quem in venenum exertura fuit? Siquidem Cantharidibus hæc perquam grata est; in ea namque nascuntur, vitant, & moriuntur. Id verò vti de Iunipero dictum fuit, ramorum asperitate posse interimere quosdam, qui noxam non sentiunt ex decocto. Corticis radicis cinis nodulo cauterij potentialis supplet vicem madefactus & impositus: indeq; foraminulam contractum referatum, immisso hederæ folio, foetur Corticis, seminis & foliorum decoctum surditati suffitu medetur, occulta proprietate.

Sal Fraxini sudores mouet vreticis mixtus: medicamentis autem purgantibus serosa euacuat. Stimulosque agit.

Nyx INGLANS.

Diosc. Concoltu difficiles sunt; stomacho inuiles, biliosa capitis dolorum insistentes, tu sistentibus inimica, & vomituris ieiuniis in cibo apta. Cuius rura verò & sicis prasumpta, & à summo cibo, degenit' resiliunt, nec minus si à veneni haustu comedantur. Largius esurata timent Latas pollunt. Illi nuntur in amnere in inflammationi, abscessibus, taccisq;, cum mellis exiguo & Ruta. Cum caps autem, sale & molle, cario, hominib; * morsu profectum. Termina cum calyce suo peruncta, & umbilico adnota, sedant Putamen combustum, tritumq;, in oleo & vino, in scarrum capite peruncto, nutrit' capillum: alopecias replet. Stiltunt menser nucleis vsti, si triti ex vino admodumantur. Videm à veteribus, illis carbunculis, gangranis, & agulopis medentur. Alopecis commanucati & impasti prasent' sunt remedio. Nucibus tust' oleum exprimitur. Recentiores stomacho innocentes sunt, ut potè suauiores. At que alio mixta eximunt acrimoniã. Lictores in corpore illitu tollunt. Fit etiam è nucce inglansde oleum, quod caryum vocant. Eandem rura habet quatuor balaninam.

* Plin. Anginam cum Ruta & oleo aurium inflammationi imponantur cum mellis exiguo.

Gal. Arbor tum in foliis, tum in germinibus adstrictionem quandam possidet, ceterum euidentem multamque in nucis putamine recenti pariter & sicco: proinde eo fallones quæque vti solent. Ad nos eius expressi succo, sinuisset ut morocum & rubrum, in melle decocto, viti hominidici medicaminis

virtutur. Et ad omnia reliqua adhibentur ad quæ dicti succi conuenire censentur. Porro ipsius id quod edeado est oleosum est, & tenue: itaque etiam facile exprimitur: & quo diutius reconditus fuerit, magis tale efficitur. Quamobrem oleum ex eo inueterato exprimere liceat. Tunc sanè admodum fit per halitum euaporatorium. Itaque quidam eo gangrenas, & carbunculos & ægilopas sanant, ac nonnulli ad neurotota, hoc est, neruorum vulnera utuntur. Cæterum si recens sit, adstringentis nonnihil qualitatis obinet. At quod imperfectum est etiam dum, ac nondum siccum, velut reliqui fructus omnes qui virides sunt, plenum est semine & humiditatis. Nucleus tamen eius ubi inaruit, tenuium partium & efficatorium est medicamentum, morsus expers.

† Plin. Valeria. Potest & stomacho aliquid vigoris acquirere, & ventrem cum garro supra mollire.

Subdit Plin. Item sugillatis cortex iuglandium lichenum vitio & dysentericis prodeit: folia trita cum aceto, aurium dolori. In sanctuariis Mithridatis maximi regis deuicti C. Pompeius inuenit in peculiari commentario ipsius manu compositionem antidoti, duabus nucibus siccis, item sicis totidem, & rutæ foliis viginti simul tritis, addito salis grano: & qui hoc ieiunus sumat, nullum venenum nociturum illo die. Contra rabiosi quoque canis morsus, nuclei à ieiuno homine commaducati illi quoque, presenti remedio esse dicuntur.

Serius addit: Concoquantur facillè nuges in frigidis ventriculis, in calidis verò in bilem magis mutantur ante alios cibos sumptæ vomitum adiuuant. Ad satietatem comestas lumbricos educere scimus.

ZIZIPHA candida Monspeliensium, qua perpetam Venetorum & Italarum Sycomorus. Lusit. Arbol paradyso. AZEDARATH Auicenna.

VACCINIA nigra & rubra. Idem vult Theophr. Dalecampio, Clusio & herbarii peritioribus. Myrtillus officinarum Germanicarum & Myrtillus montana. Vna Vrbi Angul. aduers. pag. 417. Gal. Aurelle, & Airelle Ital. Vna orsa, & vigna dell'orso.



Florem Azedarath calidam in tertio, siccum in fine primi, Auicenna loco supra memorato scribit. & cerebri obstructions aperire asserit: stillatum verò eius liquorem pediculos interficere, & comelares, si eo vino permixto caput aduatur. Fructum autem pediculis noxium & valde perniciosum esse.

Genuina
Vua Vrsi.*Genuina Vua Vrsi Galeni apud Clusium.*


Genuina Vua Vrsi Galeni apud Clusium eadem videtur cum Alpigena Chamærhododendro exhibito Observationum nostrarum pa. 199. & Aduers. 145. cuius flores Arbuto similes, sed ex candido purpurei aut candidi conspiciuntur.

*PALVSTRIA Vaccinia Aduers. pag. 417.**Oxycocon Cordi. Poterion Dalejs.*

Rhus fyl. Plin. Dilys. Acinaria palustris Gesneri. Helueticis Moench i. acini palustres muscosis locis oriundi. Batavis, Deen, oft Moerbestic. apud quos luxuriant focus Vltraieetum. flosculis albis.



Hanc cur observator, &c. ad saltem capitis 94.

Gacel
Germanic.*Gacel Germanicum. Aduers. pag. 417.**Eleagnos Cordi.*

CISTVS Mas cum Hypocistide. Aduers. pag. 418.

Hisp. Estepa. Lusitanus Cergaços. Itai. Cisto.

Cistus mas primus Clusij.

CISTVS Mas angustifolius.

Secundus Clusij.



Hypocistis.

Lege quendam
rem Sclera.
& paulo post
Omnis in semina
to.

Diosc. Vires astringens, vnde flores in vino austero bis die poti, prosunt dysentericis. Et non as per se illi cohibent. Vetusit at ulcerum, & ignis ambulans cum cerato medentur.

Gal. Folia & parua germina trita aded desiccant adstringuntque, vt ulcera glutinare valeant. At flores magis sunt efficaces, aded vt cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque ac humiditates sanent. Cataplasmatibus ritu illita ulcerum putredinosa iuuant. Est enim facultas eorum non instrenue desiccans, fereque secundi excessus à temperatis absoluti. Aded verò frutex hic frigidus est, vt tepidi caloris sit particeps.

HYPOCISTIS Diosc.

Diosc. Vires Acacia habet, verum aliquanto magis siccatur & adstringit. Prodest dysentericis, cutiacis, sanguinem excreantibus, seminarum profusio, & pota & indita.

Gal. Porro Hypocistis, quam vocant, multo est magis adstrictior quam folia, admodum efficax remedium ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis reiectiones, profusiva muliebria, coliacos, dysentericosque affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, que videlicet placentio humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non instrenue addit. Sic sanè stomachicis, epithematis, hepaticisq; commiscetur, & ex viperis confecto antidoto inditur, nimirum quo corpora confirmet ac roboret.

CISTIS differentia quamplurima adscribuntur

Non modò viribus, & natura multiplices sortitur varietates, sed etiam florum colore, odore, & potissimum magnitudine, dissimilique effigie longè plures Cisti & Ledii differentias consequuta est posteritas. Quaedam enim foliis laevioribus, angustioribus, Populi, Salicis, Conyze, Portulacæ, Laurentiæ, Samplici, Thymi vtrinque, Rosmarini coronarij. Proveniunt fere omnes spontè in Gallia, Narbonensi Gallia & Hispania. Flos aut purpureus ruber, candidus, aut flavus. Omnibus semen pusillam rufescentes in triquetris pericarpis. In Belgio plures viginti & amplius differentias innotuit apud C.V.D. Ioannem de Boissot, Petrum Condenbergium & Ioannem Martoniam Hispano & Narbonensi semine ortas.

CISTVS *ma angustifolius.*


Cistus mas secundus Clusij, congener cum priore, folio longiore & angustiore & viridiorè duntaxat diuersus.

Cistus mas tertius Clusij.

Huius duas insuper differentias literis prodidit Clusius, quorum prior æquè fruticosus est; exilioribus tamen virgultis, foliis item breuioribus dilutè viridantibus, densioribus magis que rugosis, & odoratis, qua sola nota à reliquis Cisti generibus se prodit. Supra Vlyssiponem oritur itinere Conimbricensi, atque etiam in maritimis, vt idem Clusius auctor est.

Cistus mas quartus Clusij.

Alter densè fruticans, nonnihil incanus, assurgit in altitudinem humanam. foliis rotundè circinatis, maioribus rugosis & hirtis, floribus cum cæteris simillimis, saturè rubentibus & maioribus: capitula maiora hirsuta, dura, & semen maius quàm reliquorum. quod optimè creuit Iohanni Mate no & nobis Hispania missum.

CISTVS *mas supinus, sinuatis & fimbriatis foliis.*
Cistus mas quintus Clusij.*CISTVS *famina. Aduers. pag. 412.*
Hisp. Xara-cstepe.

* Concinnè huc quadrat alter qui minùs cognitus, & rarior multò, vni soli Carolo Clusio huius historiæ scriptori clarissimo memoratus, qui atenoso admodum Lusitaniæ solo, præsertim apud monasterium Peraionga dictum, quinto supra Vlyssiponem miliari erutum, & ibidem loci semen Nouembri lectum, in Belgium asportauit, amicisque communicauit. E lignosa radice pedales aut sesquipedales confertim ramulos supinos vel humi fusos spargit, quos ambiunt folia crispà, quodammodo fimbriata & sinuosa, incana, gustanti austera. Summis cauliculis flores æquali ferè sua umbellæ ritu quadamtenus innascuntur, hilari purpura micantes, superioribus paulo minores, quemadmodum & semen in capitalis minus & nigrius.

CISTVS *femina* folio *Portulaca marina*, *sive* *Cribra*.
Cistus primus folio *Portulaca marina*
aut Halimi Clusij.

CISTVS folio *Halimi secundus* Clusij.



Cum D. Clusius Cisti *feminae* differentias exactissime describeret, operae pretium duximus eius verba hic repetere, eiusque icones exhibere.

Cisti *feminae* 2. *classis*.

Clusius historia rariorum stirpium lib. 1. pag. 143. sic ait: Aliquot alia Cisti genera per Hispanias & Lusitaniam observavi, quae ad *feminae* veluti ad *primarium* genus meo iudicio referenda videntur potius, quam ad *marem*, aut *Ledon*: quandoquidem nullo pingui lentore sine praedita, neque florem roseum siue purpureum habeant. Nisi forte quis eam speciem, quae *Thymi* foliis est, inter *Ledi* genera recensere malit.

Cistus folio *Halimi* 1.

CISTVS folio *Halimi* prior (sic enim appellandus videtur propter foliorum similitudinem) cubitales, aut ampliores proferit ramos, graciles, satis fruticosos, in quibus folia *Portulacae marinae* similia, sed omnino incana ut *Halimi*, mucrone obtusiore, subacido & adstringente gustu: summi rami multos proferunt flores quinque foliis constantes, colore luteo cum suis in medio fibris, minores quam in superioribus, ei Cisti generi quod nonnulli *Helyanthemon* vocant similes: semen deinde in capitulis oblongiusculis & triangulis exiguum, & subrotundum.

Hypocistis *lutea*.

Ad huius radices *Hypocistis* nascentem observavi luteam omnino, siue ochrea colore, plantae ipsius florem colore referentem, quam pueri & pastores mandunt.


Cistus folio *Halimi* 2.

CISTVS folio *Halimi* alter, procerior est priore, ramis firmitioribus, incanis ut prior: folia superiore paulo longiora, angustiora, & magis mucronata, dorso elatiora, incana tamen tota & sicca, gustu eodem subacido & adstringente. Isuus neque florem, neque semen vidi.

Uterque frequens est in Lusitania solo arenoso, & aura marina afflato, inter *Ericas*, non procul *Vijae* sypone, nusquam alibi mihi conspectus.


Reliquorum vero *Cisterum* Clusij descriptiones ab operis omisso potest infra Observat. pag. 385.

Cistus
folio Lam-
pro Chaly-
2 Yonali.



Cistus fo-
lio Sampuel
Clusij, vide-
tur eadē que
Helianthos
Al'obrogū &
Gallie Del-
phinatis flo-
re albo.

Cistus
folio Thymi
Clusij.



Cistus hu-
milis angu-
lifolius.




CISTVS humilis primus Clusij.
Helianthus nostra, descripta Aduers pag. 185. & Observationum 238.

CISTVS humilis angustifolius, Choriv Monspeliensis foliis. Selego Monspel.
Cistus 5°. Assatij. & Erica Cdrysanthemis minima nostra. Aduers. pag. 447.
Cistus humilis 2°. Clusij.

CISTVS humilis annuus, folio Salicis humilis.
Cistus annuus primus Clusij.

*CISTVS annuus folio Ledi.**



*Narbonensis Ledi annui rara species; via quæ ducit Monspelio ad præceptoris Rondelletij prædiæ vulgo Terral, inter Sferocanallo & Cristas Gallinaceas herbulas fruticat; foliis Ledi angustifolij, hirtis, juxta summum pedalem & sesquipedalem caulem, semen exile, angulosum rubrum pulchellum in pericarpio nitido triquetro Selaginis Plinianæ dictæ, lactore glandis Illicis & magnitudine serè pari, Flos luteus. Hanc plantam Francisco Pennino doctissimo pharmacopœo Antuerpiato acceptam refero, ut qui primus natales signavit, & monuerit.

DE CISTI LEDI differentiis. Aduers. pag. 413.

DIOSC. Foliorum vis astringens, ac eosdem quos Cistus, effectus præbens.

De Cisti Ledi differentiis, quæ nõ minus quoque varis sunt, Clusij nostri historia oblectamur; eiq; que iudicium & descriptionem, (non possunt enim exactius describi) sequemur. Illi igitur gratias debiscum agant herbarum studiosi.

CISTUS LEDON *Primus.*

CISTUS. Primus fruticat ad hominis altitudinem, quam etiam interdum superat, ramis frequentibus, lignosis, duris, nigris: folia, ut rami, ex aduerso sita, oblonga, transversum digitum quandoque lata, nonnunquam etiam latiora, supernè nigra, infernè candicantia, quæ cū tenellis ramulis pingui quodam, odorato, calidoque & transparente liquore adeò copioso aspersa sunt, ut procul etiam conspici possit, & octava miliaris parte odor naribus percipi: flos est inter reliqua Cisti genera & pulcherrimo & amplissimo, magnæ Rosæ amplitudine, simplici quinque foliorum textura, omnino interdū candido: sed cuius maxima ex parte folia singula circa vnguem purpurea nigricante macula rhomboide nunc maiore & latiore, nunc minore & angustiore insignita sunt: flos umbilicus multis croceis fibris plenus, uti reliquorum Cisti generum: capitula in longis pediculis, foliisque suis denudatis, omnium maxima, rotunda ferè & plana non mucronata, & sæpe numero decagona, dura, intus flavescentia, quibus dehiscentibus semē decidit copiosum, subrusum, omnium minutissimum.

Tota planta exsiccata non nihil candicat, sed lentorem & odorem suavem retinet ad multos etiam annos.

Crescit hoc genus multis Hispaniæ & Lusitaniæ locis frequentissimè, ita ut pistonibus ad calcificandas fornaces, & tenuioris fortunæ hominibus struendo igni seruiat. Nusquam tamen magis copiosè, quàm in collibus, eorumq; de-


cliaibus inter Tagum & Anam flumina, & toto ferè monte Sierra morena nuncupato, ut mihi aliquando contigerit ad viginti ferè miliaria per huiusmodi frutices iter facere.

2. Superata Calpe, littore marino, quæ Malacam iter est, latiore nascitur folio, quasi ad Lauri angustifoliæ formam & amplitudinem accedente; non minus tamen pingui lentoque illo humore abundat, quàm id quod angustiore est folio.

Hispani utrumque *xara*, Lusitani prius *estepe* appellant.

1 Alterum genus, ubi spontè nascitur, non tam altè fruticat, sed bicubitalibus duntaxat affurgit Ledon 27. stolonibus, ramosis; fragilibus ramis: folijs omnium inter Cisti genera, quæ obseruavi, maximis, virentibus supernè, nonnihil candicantibus infernè, Hederae foliorum formam interdum, & Populi nigrae pierunque amulantibus, satis carnosis & rudiis, hyeme nonnihil rubentibus, gustu subacido & adstringente: flos Cisti feminæ, cùm forma tum magnitudine, candidus: capitula pentagona, acuminata, semine exili & nigricante referta.

Tenellæ plantæ neque pingues, neque odoratæ sunt, sed annotinæ duntaxat, & verustiores, autumno præsertim, quo tempore omnes Cisti qui pingues sunt, abundantiore succo, crassiore saltem & magis tenaci prægnantes esse videntur.



Huius generis alia species inuenitur, per omnia ferè similis, sed humilior, neque cubitum excedens, cuius folia etiam minora sunt: alioqui neque facie, neque flore, neque semine, neque sapore dissimilis. Vtrunque nascitur in Mariano monte (vulgo Sierra morena) qui superandus est iis qui Vlyssippo- no Hispalim faciunt iter. Inuenitur etiam collibus quibusdam Granatæ vicinis.


Primam speciem incolæ *xara-xarguna*, & *xaron* vocant: Granatenles *xara-estepa*, eodem quo Castellani nomine Cistum feminam appellant. Altera species incolis *xaguarça* dicitur.

Ledon 117.

Tertium in Hispâniis vidisse non memini, sed semine ex Italia misso Ledi Cyprij nomine, nobis & plerisque aliis rei herbariæ in Belgio studiosis natum est, cubitali, interdum ampliore altitudine, fruticosam, ramis nigricantibus, foliis carnosiss, nigricantibus præ virore, mediæ inter primi & secundi generis folia magnitudinis, breuioribus tamen quàm vtriusque, & rhomboidè quodammodo figura, quæ cum nouellis ramis lento & roscido humore obsita sunt, non aded tamen copioso & denso, neque etiam aded odorato, vt in primo genere: flos albus, secundo generi similis. semen etiam exile, nigricans in capitulis rotundis.

LEDON III.

CISTVS Ledon populnea fronde, alterum culm forte duntaxat diuersum. *



* Generoso D. Ioanni Boiforto hoc Ledi genus viret in amariſſimo & ditiffimo viteto, odore grato Ledi Gallici, folio latiore quàm ſuperioris. Flos nõ obſcuris, ſed fruticat ad hominis, imo ſæpe ſape- rat proceritatem.

LEDON

LEDON III.

Hisp. Ardiueja.



LEDON V.



Quartum genus multis ramis fruticat, cubito longioribus lentis & flexibilibus, hirsutis, albicantibus: folia reliquis Ledigenibus molliora, ad Cisti feminae folia accedentia, verum angustiora, hirsuta, nigriora, & pinguedine lenta cōspersa non modò verno tempore, sed etiam per totam æstatem: flos candidus est, Cisti feminae flore non minor, nec absimilis: capitula exigua membrancis quibusdam & laeis inuolueris teeta, semen continent omnium maximum, nigrum.

Nusquam hoc genus quàm in Castella veteri obseruavi, vicinis pago S. Martini del Castañal locis, vbi ab incolis *ardueja* nuncupatur, aded frequens, vt vulgare sit istic prouerbium,

Qui en al monte va, y mas no puede,

Alimenas ardueja coze. hoc est, Quicumq; montē accedit, potius quàm inanis redeat, *Ardueja* colligat.

Apud nos sanum feliciter prouenit.

Quintum eodem quo proximè descriptum assurgit modo, verum ramis duris, lignosis, nigricantibus: foliis longis oleæ, angustioribus, nigricantibus, pinguibus, & eam nouellis ramulis lento humore conspersis: flos albus omnium ferè minimus: capitula oblongiuscula, angulosa, in quibus semen ex rufo nigricans, exiguum.

Ad huius radices genus illud *Limodori* siue *Orobanches* quod *Hypocistida* appellat, inueni multis veluti squammis, vt alia, compactum, colore pallecente, lineis tamen quibusdam purpurascens, & nonnihil virescentibus distincto, cytinosis saos, vt quæ sub aliis Cisti generibus nascitur, summa sui parte proferens, succoque lento & glutinoso tota prægnans.

Nihil isto Ledigenere vulgaris toto regno Valentino, & Gallia Narbonensi, vbi aliud *Ledum* non obseruati, sed in plerisque aliis Hispaniæ & Lusitaniæ locis etiam inuenitur.

Sextum ferè simile est quinto, breuius paulò, minoribus angustioribusq; folijs, lento etiam humore aspersis, quemadmodum illius folia: flos maior, quinq; folijs constans, candidus, semen etiam simile.

Septimum

Ledon VII. Septimum cubitale est, multis & frequentibus ramis fruticans, colore cinereo, & frequentissimis folijs eos septentibus Rorismarini coronariæ, sed omnino canescentibus, & hispidis: non tamen minus pinguis & glutinosus cum suis tenellis ramulis, quam quintum genus: flos summis ramis copiosus, candidus, superiori similis, semen etiam non dissimile.

LEDON VII.



LEDON VIII.



Valentino regno hæc duo postrema mihi solum observata sunt circa Xatina, & ab incolis *maguaco* dicuntur.

Ledon VIII. Octavum eadem qua superius magnitudine crescit, ramis tamen magis expansis, & folijs tenuioribus, supina parte ex atro virentibus, inferna verò candicantibus, Rorismarini coronariæ ferè æmulis, sed gustu adstringentibus, tametsi lento quodam humore & pingui sint cum tenellis ramis obsita: flores numerosi secundum ramorum longitudinem, quoque folijs constantes, exigui, lutei: semen in exiguis capitellis ex cinereo nigricans.

Inuenitur hoc frequens in cultis illis locis citra Tagam, supra Vlyssipponem, cum Cisto folijs Halimi, & nonnullis Beticæ locis, vbi ab incolis *Romero*, hoc est Rosmarinus appellatur.

Ledon IX. Nonno minus est superiore, folia paulò maiora, neque subius incana, vti in Octavo, rariora item & magis glutinosa: ramuli quibus flos inhæsit, tenues & exsuccis planeque retortidi, in quibus capitula aliquot inania deprehendi, & omnino hiantia iam excusso semine,

LEDON IX.

LEDON X.



Ledon X.

Decimum pedali dūtaxat est altitudine, ramulis exilibus, lignosis, & satis fragilibus, nigricantibus, pinguibus, & lentore quodam madentibus; folia longè minora quàm in Nono, non multum à Thymi folijs dissidentia: flores, vt neque in alio, non obseruauī, sed in oblongis ramulis quasi vmbellatim prodeuntia capitula, exigua, & superiore parte aperta, iam inania & cum suis ramulis arida.

Nascuntur verò hæc duo postrema in extrema Bæticæ parte qua Castellam spectat, ab incolis *raguato* nūcupata; tamen posteriore nonnulli etiam *turmeruela*, quæ sub ea fortè tubera (quæ Hispanis *turmas* appellantur) nascantur; vel potius, vt existimo, Hypocistis quæ illis tuberis fortasse loco obseruata est.

Non minus perpetuo sunt folio ista Cisti genera, quàm mas & femina.

Porro *λιδον* Græcis hic frutex dicitur, Latinis Ledon, Plinio etiam Lada.

Pingue verò illud quod ex eo colligitur *λιδανον*, Latinis etiam Ladanum, officinis Laudanum.

Eius colligendi rationem Dioscorides & Plinius descripsere. Quam verò inter recentiores Bellonius libro 1. obseru. cap. 7. in Creta obseruasse ait, adscribere hic libet; eam ab alio nemine sit adhuc prodita.

Græci colligendo Ladano instrumentum peculiare parant, vernaculo sermone Ergastiri dictum. Est verò id instrumentum rastro sine dentibus simile; huic affixæ sunt aliquot ligulæ ex corio rudi neque densato aut præparato confectæ. Fas leniter adfricant frutibus ladaniferis, vt illis adhaereat liquidus ille humor circa folia & ramulos concretus, qui deinde à ligulis per summos Caniculæ ardiores cultis est abradendus. Itaque Ladanum colligendi summus, imò intolerabilis est labor, cum necesse sit totos dies summo Caniculæ aestu in montibus hæreere neque verò facile quisquam alius ad id colligendum operam sumit, præter Calohieros, hoc est monachos Græcos. Nusquam verò maiore copia tota insula cogitur, quàm ad radices montis Idæ, pago Cigalignus nuncupato, & apud Milopotamon. Hæc Bellonius.

LADANVM

LADANVM.

Diosc. *Natura ei spissandi, calfaciendi, molliendi: ora venarum petefacit: capillum fluentem continet. addito vino, myrrha, & myrteo obo: cicatricibus decorem reddit, cum vino illitum: moderat curiam doloribus, cum hydromelle, aut rosaceo insusum: suffitu secundas eijcit. Pessu in unguento vulua duriciem sanat. In medicamenta, que auris dolorem, rufumq; sinitu & malag mata vtiliter inseritur. Alum fistit cum vino vetere potum, & vrinam ciet.*

Cistus aut
Ladanum.

Gal. In calidis regionibus hic Cistus proveniens, rametli haud alius sit genere quam qui apud nos nascitur: eximium tamen a regione ac peculiarem digerentemque caliditatem nactus est: atq; utroque a nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorem assumpsit. Itaq; caetera quidem huius Cisti illis quae in nostrate visuntur, similia sunt.

Verum Ladanum quod vocant, ex eo provenit medicamentum primo excessu iam quodammodo completè calidum, ut videlicet & secundum attingat, habens etiam adstrictionis paululum. Ad hanc substantia tenui, ac proinde emolliens, siue malleaticum moderatè pariterque digerens, ac videlicet etiam concoquens. Itaque mirandum non est si peculiariter ad utri vitia conveniat. quòdquidem ad dicta paulum quiddam adstrictionis obtinet. Quocirca defluentes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorum pravi humoris sederit, id omne absorbit: tum meatus quibus infixi sunt contrahit. Caeterum alopecias & ophthalmias siue lippitudines sanare non potest, ut potè magis decussorias vires quam quae Ladano insunt, poscentes: quippe proveniunt isti ex pravis succis lentis crassisque, quos secantia ac digerentia medicamenta potissimum euocant atque euacuât. Caeterum tenuium partium sint facultatis oportet; non tamen usque ad eò tenuium partium & desiccatoriae, ut nimio plus desiccet, vnaque cum collectis inibi succis praeter naturam; naturalem quoque humiditatem incrementa pilis suppeditantem, absorbant. Nam sic non tantum alopecia liberabunt, sed & caluitiem afferent.


LEDVM folijs Rosmarini alterum. Rosmarinum
Bohemicum Matth.




Est & aliud nec minus venustum aut rarius Ledi genus, fruticosis, numerosis sesquipedalibus ramulis, summo ferrugineo torrento obductis. Folia Rosmarino coronario angustiora, medio intercursante nervo aersae parti, & qua furculis inhaerent rubiginosis, Rubig radice colore, odore suavi, pertinaci, succundo. Abrotani maris: gustu aromatico mali citrei, subastringente. Medijs & summis virgultis floiculi luteoli in alabastriculis Cisti Ledi, longioribus, Hyperico minoribus. Radix & erus Eleagni Cordi siue Gagel Germanorù: ad tincas & blattas Bohemis vlt receptus, vbi copiose fructuat, Matthiolo teste.



Arbor Cistifolia.
Aduers. 452.



MYRTUS
L. urca ma-
xima.



Exotica, MYRTUS Plin. pluribus
solorum versibus.



MYRTUS
maioris
quinta spe-
cies.



MYRTI varietates. *Aduers. 419.*

In Belgicis amicorum hortis D. Ioannis de Brancion, D. Philippi Deurnagle, D. Ioannis Boifot & Georgij Ryensis beneuolentia Myrti differentias decem legimus: quarum sex sunt Myrti maioris.

MYRTI maioris va-
rietates sex.

1. Omnium maxima Laurea dicta à folio laurino. Lauro Tyno siue re-
gie simili, sed minori, & magis acuto, arouiréte, nigraq; bacca alitur in cul-
tissimo stirpiumque rariorum ditissimo paradiso D. Philippi Deurnagle
Domini de Vroylandt.

2. Secunda folia habet paulo minora, supernè item mucronata & in acu-
tum fastigiata.

3. Tertia folio est oblongo, supernè latiusculo, cum superiore ferè pari,
bacca alba.

4. Exotica Myrtus Plin. pluribus foliorù versibus, siue Myrtus Maurita-
nica amatoria Veneriq; sacra, Arayhan Morisco maior Hispanicè vocata, fo-
lijs nõ disparibus, sed canulatis & cõfertim incudissimo spectaculo stipatis.

5. Vulgaris folia promit paulo minora in angustum desinentia.

6. Inter maiores minima est folio oleæ fyl. siue oleastri.

• Duas insuper Myrti latifoliæ differentias ex Clusio subdidimus.

MYRTVS Batica prima Clusij.

Myrtus Batica latifolia siue Laurea Clusij, folijs Arbuto ferè paribus, duplici vtrinque ordine sitis, di-
lutè virentibus, ramis crassioribus, texendis sepibus vilis & tonderi solita, eoque rarius florens.

MYRTVS Batica latifolia domestica, siue Laurea
secunda Clusij. Item Hisp. Arayhan
morisco.MYRTVS minor vulgaris. Gall. Myrte petit.
Ital. Myrto Mortella. Angl. Myrtre.MYRTVS Batica secunda Clusij.
Cum superiore eadem ferè est, folijs tamen minoribus & densioribus.

*Myrti minoris differentia
quatuor.*

7 Inter minores,
maior, folio est angu-
sto Phyllyree te nufol-
liæ breuiore.

8 Minor vulgata
breuioribus & nigrio-
ribus folijs stipata.

9 Minima, foliolis
angustis Thymi Cre-
tensis longioribus.

10 Pluribus folio-
rum versibus Myrtus
Mauritanicus alter.

Hisp. Arayhan mori-
sco minor, folijs irem
canularis, confertis &
densissimè striatis, vul-
garè Myrto ferè pari-
bus.

Diosc. Myrtus sativa nigra utilior est medicina quàm candida, & in hoc genere multò magis montana: semen
tamen imbecillus parit. Vis & myrti & seminis astringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguinem excrean-
tibus, & vesicae erosionibus. Succus virentibus bacis expressus eosdem effectus exhibet. Stomacho utilis, urinam cit: pro-
dest contra phalangij morsum, & scorpionis ictus in mero: seminis decoctum capillum tingit, ins decocti in vino vlcera
in extremis mēbris nata sanat. Oculorū inflammationes illarū cum polline polenta lenit: contra agilopai illinitur: crapu-
lam arcei praesumptum vinum, quod seruefacto aliquantum eius semine exprimitur: aliàs enim acorem contraheret.
Praestat idem seminis effectus: utile pro cidentia vulvarum in desestionibus, sedis vitijs, & feminis fluxione vulua labo-
rantibus. Purgat furfures, vlcera capitis manantia atque eruptiones papularum: fluentes capillos continet. Additur
quoque in medicamenta, quas lipras vocant, uti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad desestio-
nes balnearum conuenit, & contra luxatos artus, & male solidescētes: eo fracta ferruminationi repugnantiā vtilissimè
sonentur: vitiliginem emendat, purulentis auribus infunditur, & capillos denigrat, succus eorum eadem efficit.
Trita folia & ex aqua illita, humidis vlcēribus & partibus omnibus fluxione laborantibus, castiacisq; prosunt: & ad-
misto ompnacino oleo, aut exiguo rosaceo cum vino ad vlcera serpētia, ignem sacrum, testium inflammationes, epi-
tylidas, & condylomata. Arentium foliorum farina vtiliter inspargitur paronychijs, pterygjs, & contra alarum
feminumq; perfusiones: cardiacorum sudores cohibet. folia cruda, seu cremata cum cerato, ambustis, paronychijs,
pterygjsq; medentur. Exprimitur folijs succus, aduso veteri vino, aut aqua caelesti, cuius recentis vsus est: nam ex-
carius plane cariem sentit, & vires amittit. Myrtidarum dicitur adnatum in aquabile, ferrucosum, intus in seorsq; &
concolor: quod prinde quasi manus, myrti caudicem amplectitur. Magis quàm Myrtus * astringit. Rasum addito
austero vino reponitur. coactumq; in pastillos siccatur in umbra: multò efficacius est folio & semine, cerato, pestis, in-
festionibus cataplasmatibus admixtum, vbi adstringendum aliquid est.

* Gal. quanto dicitur succius est, tantò & delicates & astringit vehementius.



Gal. Myrtus ex contrarijs substantijs constat, vincit tamen in ea frigidum terreum. Habet verò etiam tenue quiddam calidum. Itaque valenter desiccatur. Porro tum folia, tum germina, tum fructus, tum succus, non parum inter se adstrictione dissident. Plura Gal. eadem quæ Diosc.

πύζυς Buxus. Germ. Wurbaum. Gall. Buys.
 Angl. Buys. Belg. Walmeboom.
 Ital. Bosso. Aduers. 419.




Virgulta, lignum & folia decocta Guayaci modo sudores eliciunt. famulam pauperulam Anglam à lue venerea vindicatam huius decocto memini. Ditiorebus propter ingratum & tetrum odorem rejicitur. ad capillos luteo colore inficiendos incoquitur lixiuio.

LYCIUM. Aduers. 419.

Diosc. Lycium alstringit. caliginem oculorum discutit, genarum sc. abieci, pruritus, veteresque fluxiones sanat. facit ad purulentas aureis, exulceratas gingivas, tonsillas, labiorum fissuras, seclerimas, acritatesq. illucum: colicis dysentericis potum inditumq. conuenit. Datur sanguinem excreantibus & tristi, ex aqua. Contr. rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur. Flauos facit pilos. Reducitq. vlcibus qua serpunt aut putrem pudentur. sc. minarum profusua appositum sistit. Rabiosorum istibus ex melle potum, aut vice catapotij lauoratum, auxiliatur.

Gal. subditia pætonychias vtuntur. Est autè facultatis exiccatoriae, compositum ex diuersi generis substantijs, quas *λεπτοεις* Græci vocant, altera quidem tenaiam partiam digerente, atq. ac calidâ, altera terrestri & frigida, ex qua adstrictionem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamento inest; digerit verò & desiccatur, non parum, nempe in secundo ordine: In calore autè medijs & synergeticis proximum est. proinde ad varia hoc vtuntur medicamine, vt abstergente quidem, (ad putredines & cacoëthe vicera) vt contrahente verò, colicis, dysentericis ac mulieb. profusua adhibent.

LYCIUM



LYCIUM Hispanicum.

Spinae Burgundicae aut Philyreae angustifoliae non ita abfimilem perelegantem fruticellum, folijs tamen multo angustioribus & ramulis exilioribus studiose alunt in Belgio D. Joannes Brancionus, D. Dilphius, & Georgius Ryensis. Extrema infesta spiculis virgulta; folia Thymelaeae Monspelliacae, exiliora, atronirentia, gustanti astringentia. Apud Belgas nullum fructum edit.

RHAMNVS prima species tertius, & forte Rhamnus niger Theophr.
apud Clusium. Hisp. Spino negro.



Hunc fruticem folijs viridibus, astringentibus, perpetuo virentibus, Rhabarbari saporem referentibus, pluribus & confertis herbaceis iuxta folia floribus; fructu nigro pruno sylvestri simili, rotundo & acerbo; non diuersum opinor à Lycio Hispanico Belgij nuper inquilino factio.

MALVM punicum. Aduers. 319.

DIOSC. Malum punicum omne boni succi est, stomacho utile, perexiguum sufficiens alimentum. Dulcia stomacho utiliora habentur: sed aliquantulum in eo calorem gignunt. inflationes pariunt. vnde in febre abdicantur. Acida adstringunt. astuanti stomacho auxiliantur, & multo magis contrahunt, ac vrissem cient. ora gingivaeque laedunt. Vinosa verò mediam sortiuntur naturam. Nuclei acinorum acidi punici in sole siccant, & edsonijs insparsi, concocti, fluentem aluum stomachumq; sistunt. caelesti aqua madescunt, bibunturq; commoda à sanguinem excrementibus. ad defessus dysentericorum, foeminarumq; fluxione vulua laborantium viles sunt. expressus nucleorum succus coquitur cum melle, ad oris, virilitatis, & sedis vicia, nomas, redumias, & ea qua in corpore extuberant, autium dolores, & naturam vicia; praesertim acidorum.

Huius flores cytini vocantur. qui adstringunt, siccant, cohibent. sanguinolentia glutinant. quas punicum, praesertim vtilitates. humida gingivarum vicia nobilisque dentes decocto colluuntur. herniam prolapsu iure fini erumpentem caecaplasmate repellunt. Memoria tradunt, qui tres quam minimos cyminos deuorauerit nulla eo anno Hippicitudinem passurum. eliquatur hypocistidis exemplo.

Mallicorium, asperum est mali punici putamen, quod aliqui fidion appellant. id spissandi vini habet, & quos cyti- Mallicorium ni, praebet vsus. decoctum radice potu latus ventris tinas pellit, & easdem euocat.

Balanitium sylvestris punici flos est, cytino similis. Cuius complura genera reperuntur, candidum, fulcens, colore B. laetum, rososateo. succus ex eo exprimitur, hypocistidis modo, cui adstringentia vis inest, eadem siccans qua hypocistidis & cy-

Malum pu-
nicum.



STROPHYLUM

MALUM PUNICUM. *Advers.* 419.
Angl. Pomegranate tree. *Hisp.* Granada.

LIGUSTRUM. *Belg.* Weelkrup, mond'houde,
& Aepn'willegen. *Ger.* Weinholtzlin &
Mundthales. *Angl.* Prunet. *Gall.* Troesne.
Gallobelg. Pucelage d'homme. *Hisp.* Alfena
& Hallena. *Ital.* Conastrello Oliuella, Gui-
strio Cambrossene. *Advers.* 420.



PHILLY-
REA Narbo-
nensis flor-
ida.



DIOSC. Folia adstringentia vim habent; quare com-
manducata a ulceribus oris medentur. Ultra servida in inflam-
mationibus, carbunculosis, profunt. Decocto eorum lea igni
ambusta siccantur. Capillum ruffant trita folia, qua in
radicula succo inducuntur. Flos ex aceto fronti: ibitus capitis
dolorem sedat. Cypsinum oleum quod ex eo fit odoratum,
excelsat, emollitq; neruas: si qua fermenti natura praedi-
ta sint, assitnat.

PHILLYREA Narbonensis florida. *Advers.* 420.

DIOSC. Folia astringunt, ad eadem resita ad quos
oleaster, cum adstrictione ali opus. Maxime ad oris ulcera,
commanducata, aut si decocto coquantur. Pota vrinam ac
menses cient.


Varietas. Belgicis hortis Hispano semine ca-
gustioribus folijs gemmae Phillyrea visitur.

Item laxifoliae et tenuifoliae munitae
Georgij Ryoplentiae habent in viretis Belgicis.

P. H. L.

PHILLYRIAE *angustifolia* Flores. *Advers.* 420.


MACALEB *Gesneri & Math.*
Advers. 421.



MACALEB *Gesneri & Math.*

Quale Matthioli depingit Macaleb Muttonsalit dono Petri Quthi pharmacopœi Lutetiani peris-
sissimi, hyeme decidua populnea fronde: fructum nondum edidit.

FAGARA *Auicenna.*



Alterius Macalebi meminit Clusius qui Fagaram
Auicennæ statuit his verbis.

CIVS. Fagara fructus est Ciceris arietini ma-
gnitudine, cortice tenui constans ex cinereo, ni-
gricante, cui subest tenue putamen nucleum con-
tinens satis solidum, & tenui nigra; membrana
obductam. Integer fructus eum magnitudine turri
forma, & colore aded spissis est eique nostræ offi-
cinæ Cuculū Indū Itali Coccole di leuāte appellāt,
vt primo aspectu fallere, & pro eo sumi possit.

MEMINIT huius Auicenna cap. 266. in hunc
modum. Fagara quid est? Granum simile Ciceri
habens granum Mahaleb, & in cōcauitate eius est
granum nigrum sicut Scenedenegi, & asportatus
de Sofale. Collocat verò eam in tertio calefacien-

tiam & siccantium ordine, atque stomachi & hepatis frigiditati valere esse, concoctionem; ius-
te, & aluum constringere scribit.



BOURGESPINE ^{Monspel. Advers. 421.}
Alaternus Plin. *Clusio & Anguil.* *Spina Ceruina*
quorundam. Lusit. Calca.

Secunda ALATERNUS humilior lato folio Clusij.

OLEA. *Advers. 422.* *Sylvestris & sativa.*
 angl. Olive tree. Ital. *Oliua.* Belg. *Oliue-*
boom. Germ. *Olbaum & Olusbaum.*
 Hisp. *Azeytuna & Oliuo.*



Varietas. Laticoribus folijs, rotundioribus & minore frutice, variat.

OLEA.

Diosc. *Olea* folia adstringunt. *Trita autem & imposita, ignem sacrum, vlcera qua serpunt, epinyctidas, carbunculos, redunias nomasq, cohibent: crustas emarginant cum melle illita: quinetiam sordida vlcera repurgant. Inflammationes panosq, cum melle imposita discutiant. cutem à capite vulsam conglutinant. oris vlceribus, & priuarum infantium, comenducata medentur. Succus & decoctum, eosdem habent effectus. sanguinis eruptiones, ac mellebre profusum, ad morus succum inhibet. vna oculorum, pustulisq, prodest. vlcera & veteres defluxiones sistit. quapropter in collyris additur. ad genarum erosiones perquam vtilis. Exprimatur succus suis folijs, affuso vino aut aqua, sicca usque sola in pastillos digeritur. sed longè validior ad recondendum succus habetur, qui cum vino quàm cum aqua expressus est. auribus subuenit, sine vlcere, sine pus effluat. Folia conuenienter coliacis cum farina hordeacea illinantur. vruntur cum floribus sola, vt spody vicem cinis praestet, in cruda olla, oblitio ore luto, vsque dum solum percoquatur. residuaq, vino & rursus subacta, eodem modo vruntur. postremo crusa modo eloca coguntur in pastillos. Huiusmodi cinerem in medicamentis oculorum constat spodio non cedere. sed eiusdem virtutis praedictum esse putandum est. Foliorum sativa olea eadem via intelligitur, sed auquero inferior vnde ocularium medicamentis ob seiatu mltior est vim conuenientior est. Sudor ligno virenti accenso manans, illu sanat ludenas, strisures, & scabtem. Oleaginum semen illud medetur surfuribus, & vlceribus qua depasit vorantq, quod autem intra nucleum est, ex adipe & farina scabros pugnos excutit. *Colymbades trita & ambustis illita pastillas gigni prohibent, sordida vlcera purgant, murie succus calceas gingiuae contrahit: & motus dentium firmat. Olea solum & recens stomacho vtilior est: venterq, as-**

Stilis. nigra autem & matura, corruptioni opportuna est. Stomacho aduersatur. oculis non conuenit. capitis dolorem mouet. arefacta illitu depascentia viscera sistit. & carbunculos emarginat. Oleum syluestris oliua gingiuis putri vixi-
ne laborantibus colluitur. dentium mobilitates stabilis. calfacti foras, gingiuis fluxione laborantibus utilis est. Lanam
enim spicillo circumligatam oleo madefacere oportet, & gingiuis admoerere, donec alba spectentur.

Lachryma aethiopica olea Dioscor.

Lachryma quam aethiopica olea stillat, scammonia similis est, fulua, stillis excilibus constans, mordax. qua autem
ammoniaci, aut gummi similitudinem refert, colore nigricans, nec gustu mordens, superuacua est. Nostrates olea, olea-
fricq, similem lachrymam sudant, qua commodè ad oculorum hebetudines illinitur. cicatrices albuginosq, illitu emen-
dat. vrinam & menses ciet. canis dentium impressa, ad dolores efficax est. inter venena scribitur. partus pellit.
lepras & impetigines sanat. Appellatur autem aethiopica & agreffis olea.

Amurca Dioscor.

Amurca expressa oliua recrementum est. decocta in cupreo vase ad crassitudinem mellis adstringit, ceteros pra-
bens lycij effectus. insuper dentium dolori & vulneribus, cum aceto, vino aut melle commode illinitur. additur in me-
dicamenta ocularia, & meatus inductu suo obstruentia. vetustate meliorem fieri constat. vtiliter insanditur sedis, geni-
tium, ac vulua exulcerationi. si vero cum omphacino recoquatur ad mellis crassitudinem, cariosos dentes extrahit.
iumentorum scabiem cum decocto lupini & chamaleontis illitu sanat. cruda & recentis amurca podagras articulariosq,
dolores foueri vtilissimum. peruncta in villosa pelle, & hydropicis imposta, tumoris molem reprimat.

O L I A syl. Septentrionalium. Eleagnos Matth.

Sizypha Cappadociae Bellonij. Sizypha candida Clusij.

Eleagnos Theoph. folio Viticis. Ital. Zeingole.

S A L I X Diosc. Hisp. Salce & salguero. Gall. Saulx.

Ital. Salice & ialcio. Belg. Witgheborn.

Germ. Weidenbaum. Aduers. 422.



OLEA Syl. Septentrionalium.


Lutetia, Londini, Antuerpia & alibi in Belgio passim hortensis est, saligneo candido folio, aspectu iucundo, floribus albis muscosis in nitidis argenteis alabastriculis, suave spirantibus, secundum foliorum exortus prodeuntibus: fructus & nuclei oliuis aut Alaræ Daracchi similes, qui non apud nos maturefcunt. regno Granatenfi sponte oritur.

SALIX.

Diosc. Semen, folia, cortex & succus spissandi vim habent. Trita folia cum exiguo pipere & vino pota, illois subueniunt: sumpta per se & cum aqua praestant mulieribus ne concipiant. Salignum semen in potu sanguinem expul-
tibus praestit: cortex eosdem praebet effectus. Corticis cinis admixto aceto maceratus, illien clauos & callos tollit. Ex
folijs & cortice succus cum rosaceo in calyce punici calcifatus, aurium doloribus auxiliatur. Decocto eorum podagras
foveri utilissimum: furfures purgat in corpore. Excipitur succus qui manat ex ea cum floret, exciso cortice. in plaga
enim concretis humor inuenitur, qui ad purganda, qua obstant oculis, suam vim praebet.

SALIX humilis repens angustifolia.

PERSICA Malus, Gall. Pêche & Pêchier.
Ital. Perfiche. Germ. Pfirsich. Hisp. Pexegos.



Ericetis Antuerpiani agri palmaribus & sesquipalmaribus cauliculis repit: folio rhamnii pinnis &
loribus muscosis Salicis, gustanti amara.

ONAGRA Diosc. Advers. 423.
Salicaria Germanica



PERSICA Malus.

Diosc. Persica poma matura sunt stomacho, quam ventri vitia sunt. Acerba alvum cohibent, sed sicca vehementius, decoctum è siccis alvi, stomachiq; fluxiones sistit.

Gal. folia trita & super vmbilicum imposita* lumbricos necant: alioqui sanè discutiens medicamentum est. Pomorum verò eius succus & veluti caro facilè corrumpitur, omninoque noxam infert; quapropter haud post alios cibos vitimoque sicut nonnulli solent, illa offerri oportet: nam in summo matantia corrumpuntur. Huius verò quod omnibus commune est meminisse oportet. Quaecunq; vitiosi succi, quæ humida & lubrica sunt, facilièque descendant, succeduntur, præ alijs comedenda esse: sicut enim & ipsa celeriter subeunt, & alijs præeunt, ac quasi iter muniant. Postremo autem sumpta, vna secum alia quoque in corruptionem trahunt.

* **Plin. Valer. subdit,** eadem sicca & in puluerè tusa, recentes plagas cruentorum vulnerum claudunt.

Idem: Nucleus capitis dolori cum oleo & aceto tritus, illinitur. Gummi gutta, quam Persici truncus illacrymat, fluenti aluo medetur. Eadem mixta cum vino, etiam in vesica lapillos frangit. Trita ex aceto impetigines reprimat. Decocta cum croco tumores faucium mitigat. Asperam arteriæ canalem leuiorem facit. Excreantibus sanguinem miro modo subuenit. Thoracis obstructos sinus referat, & vitia pulmonis expurgat.

Syrupusè floribus eadem potest quæ & Rosatus.

AMYGDALA. Angl. Almond tree. Hisp. Almendras.
Ital. Mandole. *Aduers.* 423.




Diosc. Amygdala amara radicum tritarum decoctum, vitia cutis in facie corrigit. illa nuces idem manus præstant. menses adnota ciunt. capitis dolori auxiliantur, illita fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo. epinyctidas sanant ex vino. nem putrescentis vlcera, & qua serpunt. & morsus canum cum melle. earum autem esu dolores finiuntur. alvum emolliunt. somnum faciunt. vrinam ciunt. contra sanguinis reiectiones cum amylo assuntur. renum vitijs, & pulmonum inflammationibus ex aqua in potu aut eclegmate cum resina terebinthina dantur. calculosis dissilijs, vrima in passo auxiliantur. & illinctu cum melle & lacte, hepaticis, tussi, & inflationibus coli, nucis auellanae magnitudine. quinis septenisue præsumptis ebrietatem non sentiant potores. vulpes si cum quadam esca eas vorauerint, emoriuntur. Gummi eius cassacis & adstringit. reijcientibus sanguinem, potum auxilio est. impetigines qua summum corpus occupant, illitum cum aceto tollit. tussi vetusta cum diluto vino potum medetur. calculosis cum passo bibere prodest. E nucibus græcis, dolces cibo idonea: sed multo minus valent in remedijs quam amara. atramentum excreant. vrinam ciunt. recentium esu cum suo putamine, humida stomachi vitia emendantur.



Gal. Quae quidem palam amara sunt, omnino extenuandi vim possident, quod & qualitas ipsa indicat, & experientia comprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum Commentariorum proditum est. Ceterum duo experientiae exempla proponi satis est, unde vim eorum possis discere. Si quidem ephelin expurgant, & excretiones ex pectore pulmoneque, crassorum lentorumque humorum impendio conferant. Porro ostensa haec sunt genere quidem incidentis, specie vero extergentis esse facultatis. Quin & quod per accidens facultatem item habeant ab obstructione liberandi, & ipsam supra demonstratum est. Sed & experientia monstrat. Nam in icore crassorum viscosorumque humorum in extremis vasis impactorum obstructiones abunde expurgant expediuntque. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causa-natos, & lienis & coli, & renum (sanant.) Porro & ipsa arbor similem sortita vim est: nam huius radices coctae atque illitae ephelis purgant. Quotquot vero sunt amygdala dulcia, & ipsa leuiculam amaritudinem possidet, quae tamen dulcedine superate occultatur. Ceterum id temporis spacio clarum sit. Demonstratum autem retro est qualitatem dulcem moderatissime calidam.

NUX MOSCHATA, siue Nux odorata & aromatica.
 Germ. Muscat nuch. Belgis Noix muschateu.
 Gal. Noix Muscade & mugnette.
 Hisp. Nuez de especie & Nuezes moscadas.
 Ital. Noci Moscade. Advers. 544.



Mas oblongior.

Vinas cetero cerebro, ventriculo, hepate, utero, cordi, omnibusque visceribus peramica. Cariosas & leues nuces oleaginosas & grauibas preferbat Rondellecius ad ventriculi & cerebri affectus, quae quia immatura, plus adstrictionis habent qua robur ventriculo conciliatur, & vapidi fumi cerebrum ferientes praepediuntur. Oleaginosae enim cerebrum vaporibus obruunt. Memini generosam Anglam gravidam esur 10. aut 12. nucum myristicarum ebriam delirasse. Oleum pressudant nervorum morbis utilissimum.

Mas oblongior gustu astringente, odore ferè nullo. Macis marem obducens colore est saturiore, gustu & odore non diuersis, acerbo, calido; cariota magis. Deute demorsa cere coctione, minus oleosa: ad affectus ventriculi & capitis commodior & aptior.



ARBUTVS.



Diosc. Esu acerosus. Stomacho adversatur: capitis dolorem mouet.

LAVRVS. Angl. Laurel or bay tree. *Hisp.* Laurel. *Lusit.* Laureiro.
Ital. Lauro. *Belg.* Laurus boom. *Gall.* Laurier. eius bacca
Hisp. Vayas. *Belg.* Wap & haechelaer.
Geru. Loozbeeren. *Aduers.* 424.

Diosc. Laurus quadam tenui folio constat: altera latiore. Vtraque, excaesalboriam naturam habet, & emollientem. Unde decoctum earum in muliebres infusus additum, vulua & vesica vitiosonant. Vrantia folia sensum substringunt: illa quoque ac trita vesperum apiumque, ictibus opulatur. eadem cum polenta & pene illa inflammationem omnem mitigant: sed pota stomachum effundunt, & vomitiones mouent. Lauri bacca magis, quam folia caesaliunt: ergo in eclegmate trita cum melle vel passo profunt tibi, ortopnoea, & omnibus thoracis rheumatismis: contra scorpionum ictum ex vino bibuntur. virilgines emaculant. Succus haecurum vtilissimè atrium dolori, & grauitati infillatur, cum vino vetere, & rosaceo. In medicamenta autem adijciuntur, qua nervorum lassitudine efficiunt, acopa vocant: & ad vnguenta, qua caesaliunt, & discutiunt. Cortex radicis calculus rumpit. portus vocat. hepaticus prodest, tribus obolis ex vino adorate potus.

CC 3

T. 170

TINUS *Lusitanica* Clusij.

MEDICA Malus. Malum Persicum forte Theophr.
 Malum Aegyriacum Plin. Malum Hespericum, Citreum
 & Chrysomela, Athenai. Ital. Cedri, & Citroni.
 Angl. Citron tree. Ger. & Gall. Citron. Hisp. Cidras.
 Belg. Citroenen. Advers. 425.



Tini aliud genus exhibet Clusius Corni feminae proceritate, firmiteribus & frequentioribus ramulis, cortice ex rubro vitescente tectis, circa quos folia superioris angustiora & oblongiora aliquantum, & venulis pluribus distincta, sibi inuicem opposita ut in priore: flores extremis ramis umbellatim etiam nascuntur, colore non nihil purpurascente, neque adeo odorati, uti superioris; fructus etiam minor, plenior, nigrior. Piz memorie D. Braucion huius Tini macrum saepe verba fecit, sed ingenuè fateor mihi incognitum, & minime animaduersum.

MEDICA Malus.

Diosc. Semen in vino potum, venenis resistit: alium moneo. Oris sensum commendat, decocto sine col-
 -lato, aut succo.



LIVONIA.
Angl. El-
montree.
Gal. Limosa.



ARANTIA, Angl. Orange tree. Gall. Orange
& Orenger. Belg. Krangie appel. Germ. Bo-
merantzen. Hifp. Naranzas.



PONTUM
Allyrium.
Gal. Pency-
na.



CINNAMOMVM & CASSIA.


Advers. pag. 325.

Diosc. Cinnamonum enim excoctum, emollit, &
concoquit, urinam viet: tam menses quam partus postea
aut ex myrrha impostum pellit. Contra bestias quoque virus
circulantur, venenaq; conuenit, caliginem pupillis oculo-
rum obuersantem dissipat, crassitiam extenuat: leuitigmes
& vitia cutis in facie ex melle illitum detergit. Contra rui-
ses, desquationes, arthan subter cutem susam, verum vitia,
& vrina diffidentem efficax est, vnguentis pretiosis in-
seri solet. Et in summa magna aegritudine vsus.

Gal. Cinnamonum summe tenuium partium,
non summe calidum, sed ex tertio ordine.
Nihil autem velle desiccat eorum que pari sunt
excocti faciliat; propter tenuitatem, sed
ter: essentia. At Cinnamonis est velut imbectillat.
Cinnamonum,


SCS

CASSIA



CASSIA, Germ. Zimmt Roselira. Belg. Cannel.
Hisp. & Ital. Canela. Gall. Cannelle.

XYLOCASSIA, Adverf. 426.
an PSEUDOCINAMOMUM
Dioscor.



Diosc. Vim obtinet calfaciendi, urinam cisendi, siccandi, & leniter astringendi. Convenit ad medicamenta oculorum, quae praestanda claritatis gratia concinnantur, & ad malagmata. Lentiginos tollit cum melle illita. menses trahit. contra viperarum ictus pota auxiliatur. adversus intestinas inflammationes omnes, & renum vitia, pota proficit. Feminis in solis desolentibus, aut suffimentis, prodest ad dilationem uteris. Ea duplo pondere medicamentis mixta, cum amari picem supplet, si ipsum desit. nam eosdem effectus praebet, ad plura perquam utilis.



Gal. Cassia exsiccatur & excalfacit, tertio quodammodo ordine; sed & tenuium admodum partium est: gusto vero plurimum habet acrimoniae. leniter quoque nonnihil adstringens: quamobrem haec omnia incidit, simulque digerit quae in corpore sunt recrementata: & adhuc robur etiam instrumentis addit. Idoneum etiam suppressis menses, cum videlicet a copia simul & crassitudine excrementorum quod sufficiat euacuari nequit.



PIPER nigrum & album. Ger. Pfeffer. Belg. Peper. Gall. Poivre. Angl. Pepper. Hisp. Pimienta. Ital. Pepe. Aduers. 426. 427.

GARYOPHYLLI cum suo folio & fructu. Belg. Groffels naghel Gall. Clous de gyroffles. Germ. Saagehel. Ital. Garofoli & Garofani. Hisp. Clauillos & clauos di esperia.

Calfacit or-
dine quarto,
desiccatur ter-
cio.



anthophylli.

Candidum Piper, oculari bus remedijs aptum, antidotis & medicaminibus quæ contra venenata patantur, Theriaca vocant.

Longum subamarum, antidotis & theriacis medicaminibus expetitur.

DIOSC. Nigrum odoratum esse constat candido suauis, acius, & ori gratius, necnon ad condimenta vtilius. sed candidum, & adhuc in acerbum vergens, antedictis infirmius est. Eligi oportet grauisimum, plenum, nigrum, sine multis rugis, recens, minimè sursurosum. Inueniuntur etiamnum in genere nigri semina nutrimento defæcta, casta, inania, minima, ponderis, quod vocant brasma. Vis † omnium excafcit, urinam ciet, concoquit, extrahit, discutit, adberget caliginem quæ oculis obuersatur. piper febri tum horribus circuitu repetentibus, sine potu, sine illu, subuenit, serpentium moribus auxiliatur, partus extrahit, conceptum adimere creditur, statim à cordaciliu suppositu, nisi omnibusque pectoris vitijs, siue eclegmate, siue potu, succurrit. angina eo & melle continenter periguntur, potum cum recentibus lauri folijs, tormina discutit. cum vna passa manducatum pituitam à capite elicit. valetudinem tuetur, dolores finit, appetentiam mouet, concoctionem adiuuat, ad intrinsecus esculentorum additum. strumas cum pice discutit. vitiligines ex nitro emaculat. Fictili nouo, vt aiunt, motum torretur. Non est huius arboris radix gingiber, vt aliqui excelsim. suero, sicuti paulo post ostendemus. Nanque piperis radix costis simili est. ora gustantiam accendit, salutam ciet. hæc lienem reprimat, cum aceto illita, aut pota. caput etiam purgat, manducata cum semine pediculis, hæc herba quam flapidem agriam vocant.

† valenter tum excafcit, tum desiccatur Gal.

Oleo è piperibus, spina dorsi ad horrores quartanæ febris illinitur.

* Gal. Piperis radix Costo similes vires obtinet.

CYBBE officinarum. Aduers. pag. 427.

Piper Hippocratis simpliciter, & Piper rotundum Theoph. Guiland.

Calfaciant, exsiccant secundo ordine completo vel initio tertij. Frigidis morbis à pituita oris prodest. Dentibus attrita pituitam cerebri eliciunt: hanc discutiant; ventriculorum & viscera roborant.

ASPAL

ASPALATHVS. *Aduers. pag. 427.*

DIOSC. *Vim calefaciendi cum adstrictione obtinet, unde decoctum cum vino ad terra^a oris vlcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium & sordida vlcera insunditur. Subiectum^a in pefso, partum extrahit, aluium sistit eius decoctum: & sanguinis reiectionem potu cohibet: vrina^a difficultatem, inflationesque discutit.*

^a Gal. docet cur calefaciat & adstringat his verbis: Actis simul & adstringens est gustu; facultate vero ex dissimilaribus constat, nempe partibus suis acris calefaciens, partibus vero alijs, austeris scilicet, refrigerans. Itaque vtriusque ratione desiccatur, & proinde ad putredines & fluxiones est utilis.

Vincit in eo caliditas, ob id calefacere dicit, sed cum adstrictione, quia adstringit.

^b Ad *apthas*, id est calida aut ignea vicera; quia cum adstrictione siccat, aut cum adstrictione refrigerat. Vlcus istud depascens est cum putrefactione & defluxione in parte laxa & loco perpetuo madente: ideo medicamento vehementer exsiccante & astringente opus est. Eadem ratione practici nuperi aqua fortis illita soloque contactu oris & pudendorum apthas, & potētissimè exsiccantibus medicamentis & astringentibus medentur.

^c Quasi velit dicere, ad pudendorum vlcera simplicia, & ad ea quæ serpunt, aut depascuntur, & coluuias. Omnibus his partibus quia laxæ sunt, excrementis suscipiendis aptæ, desiccantibus & adstringentibus, recrementorum copiam arcentibus & cohibentibus, occurritur.

^d moderatè ob adstrictionem cum calore mixtam.

^e Acria si decoquantur, mitescunt, ob aqua mixturam, quæ diluit vim medicamenti.

^f Dysuriam sua acrimonia, & flatus discutendo soluit.


XYLOALOES *sive Lignum Aloes Officinarum.*

AGALLOCHVM. *Aduers. 428.*

DIOSC. *Mandatur, aut decocto os colluitur, commendandi halitus † gratis. Sudores arceat toto corpori inspersum. pro thure ad sassa menta substituitur. Radix epota drachma, minus pondere, humida stomachi vitia, & inbecillitatem, seruoremq; mulcet. si lateris, iocinarisue dolor excruciat, si dysenteria, aut terminis infestant, ex aqua bibere prodest.*

Aegineta
eadem.

AGALLOCHVS *præstantissimus verior. sive XYLOALOES.*




Istius Xyloaloes quæ officinis notissima, altera species Antuerpianam aduecta, primùm nobis visa, & mu nerii data ab optimo pharmacopæo Antuerpiano Francisco Pennino, in cuius instruatissima officina prostat.

Frustum, quod habemus è trunco auulsam, ponderosum est multis venis constans probatissime Xyloaloes officinarum ferè concoloribus, fuscis, odore & sapore non dissimilibus, sed grauioribus amaris, & pinguioribus multò, quæ commaducatur lentescunt cere modo. Reliqua ligni materia & superficies alba est, fragilis & fractu facilis, minus aromatica. Istud sanè lignum Aloes est omnium quæ unquam vidi, sapore & odore vegetissimum.



Arabum LACCA, an sit Diosc. Cascarum? Aduers. 428.

LACCA cum suis Bacillis.



Diosc. Vestes eo ex styrace & myrrha suffum-
tur. Vinum proditur obtinere extenuandi obesos, si ternum
obolorum pondere ex aqua, aut mulso aceto plusculos
dies ebibatur. lienosis datur, comitialibus, & suspirio-
sis. menses cum aqua mulsa pellit. oculorum cicatrices
confestim emendat. vino madefactum medetur eorum-
dem hebetudinibus. aduersus gingiuas humore pregnan-
tes, dolorisque dentium, non aliud efficacius.

MYRRA. Aduers. 428.

Diosc. Myrrha lachryma est arboris quae in Arabia gignitur, Aegyptia spina non dissimilis. è cuius vulnere
desluit lachryma in subiectas tegetes. alia circum caudicem concreuit. Dicitur ex his aliqua pedasimos, praepinguis, quae
expressa, stacte emittitur. alia gabirea, pinguis, lato & pingui solo nascentis. ea copiosam sudat stactem. Omnium
prima est, quae troglodytica appellatur, accepto cognomine ab loco, in quo prouenit, splendens, subviridis, ac mordens.
quinetiam legitur tenuis quadam, quae à troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, aprici
nascentis. Alia caucalis cognominatur, praeter modum excoleta, nigra, & retorrída. Omnium deterrima, quae ergasma
dicitur: pinguis, carens, cano sicut obducta, acris, ad gummis imaginem vergens, & viribus eius proxima. improbatum amin-
nae cognomine. ex his pastilli fiunt, sed è pinguis pinguis, & odorati: è siccoribus haudquaquam pinguis, & in-
odorati. minus odore pollet, quae oleum non admittit, cum in pastillos digeretur. Adulceratur macerato gummi aqua,
in qua myrrha maduerit. Eligenda est recens, squallore obsita, leuis, vnicuique concolor, quae confracta venas vnguum
modo candidas & laues ostendat, minutis globis, amara, acris, odorata, calfaciens. superuacua & inutilis est ponde-
rosa, coloris piceae. Calfacit, sopore & gignit. glutinat. siccit. astringit. vultum emollit, & praecusam aperit.
menses & partus celeriter extrahit, cum absinthio, lupinorum cremore, vel succo ruta admota. tuberculo faba deuo-
ratur in vetere iusti, orthopnea, in laterum postiorisq; doloribus, in alui profusio, & dysenteria. horrores discit, dua-
bus horis ante febriam accessiones, faba magnitudinis pota cum pipere & aqua. subdit lingua liquataq;, scabritiem
arteria expolit. obtusam vocem expedit. ventris sinus enecat. contra grauem osis halitum mandatur. & aduersus a-
larum tadia, cum liquido albumine illinitur. gingiuas & dentes stabilis, colluto cum vino & oleo oro, vulnera capitis illi-
to glutinat. medetur fractis auribus, ac osibus nudatis, peruncta cura cochleae carnibus. item parulentiis auribus infla-
matisq; cum meconio, castorio, & glaucio. ad varos autem cum castia & melle illinitur. impetigines sic aceto perget.
desucentes capillos cum lactano & vino myrreo illita, firmat. diuernas destillationes lenit, illiti pinna naribus. oculo-
rum vicia compit. albugines tollit. caliginem discit. scabritiem lanigat. Sic è myrrha, peruncta atq; ebure, fuligo,
& ut postea ostendimus, ad eadem conueniens.

Faba vete-
ram salicet.*emphacino
legodumyr
suo capite
doct, alio-
qui non es-
sent.

Baotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdam in Baotia nascentis. Mellior est quae myrroram odore repraesentat,
vix ei calfacentia inest, emollis discitq;, suffumensis commodissime inseritur.

Soporem gignit.] Capitis grauiestem & dolorem etiam olfactu cum inducat, Galieno teste, lib. secundum ad natam thuris, à ratione alienum videtur, quia contrarij effectus, soporem & dolorem gignere. In dolore sensus acutus: in sopore verò hebes; & sensus & motus priuatio. Cum Myrrha excalfaciat, non videtur somnum posse conciliare. Soporifera autem & narcotica humida perquam frigida sunt. Sed quam multa calida quibusdam soporem inducunt, vapidis famis imbuto cerebro; & nonnullos senis capitis doloribus infestant, potissimum eos quibus sicior & calidior cerebri temperies. Quibus verò caput frigidius & humidius, pituita eliquatur; cerebrum irrigatur, obstruuntur & meatus, per quos spiritus ad sensus mittuntur: & cessante illa spirituum emissionem, assiduo vigiliarum tempore fieri solita, somnum conciliant. Quemadmodum Myrrha, vinum immodicè sumptum, Crocus, Iris & omnia calida quæ caput tentant, eadem ratione dolorem faciunt, somnū & vigiliis pro cerebri temperamento & natura. In quibusdam neque somnum neque vigiliis inducit, quia vapores absumuntur.

Glutinat] viscida sua substantia & exsiccante vi, superfluum humorem absumendo, collectiones puris discutendo.

Siccatur, astringit.] quod astringat, à veritate alienum videtur, quia menses & partus celeriter extrahit, expectorat. Id fieri videtur secundis qualitatibus, siccando scilicet; humidam superfluum purgationis menstruæ absumendo.

Vulvam emollit & præclusam aperit.] malaestica calida sunt excessu secundo & sicca, qualis myrrha est. Tenuem vulvam emollit ob mensium retentionem, & fortè refrigerationem; ob id calefaciendo, humores eliquando & extergendo, atque venarum orificia referendo, præclusam vulvam aperit.

Menses & partus.] quia amara acris, tenuium partium, Gal. subdit; & lumbricos tum enecat, tum eijcit.

In vetere tussi orihopnaa.] Hæ affectiones fortiora remedia vel maiore dosi exoptulant, quia multum distat, & medicamēti vis permeando imminuitur vel deperditur. Memini senē quendam Anglum qui ob retentionē & crassitiē pituitæ suffocabatur, à me medicamēto parato ex Myrrha selecta, pipere, succo Porri, sapo, & syr. capillorū veneris cōcoquebat, expectorabat & magnā pituitæ colluuiē eijciebat. Myrrha enim Gal. teste lib. 8. simpl. detergendi vim habet, tracheā arteriā, non tamen exasperat, sicut abstergentium nonnulla que abstergendo tussim, aut fluxiones mouent, vt acris, cepe, mel magis quam sapa. Concoquendi & extergendi vim habet pulmonum & arteriæ affectibus necessariam, nec dispari fortè ratione ad alui profutua efficax.

Alui profutua.] Alui tria profutua, dysenteria, diarrhœa & lienteria. Nō potest de dysenteria intelligi, quia addit *καὶ δύσεντερίας*. Diarrhœa non videtur conuenire, quia laxat; ad lienterias autē coquendo & constringendo; dysenterias verò detergendo & astringendo efficax.

Horrores discutit.] Horror quartanæ, compositæ, spuria hemitritæ, & bili vel melancholice diffusa in sensiles partes vel pituitæ permixta febrilis est. Quemadmodum acris & biliosus humor, qui celeri inota fertur & diffuit, rigores efficit: sic quæ crassior, tardius mouetur, minus pungit, sed perditurnus & maiore cum refrigeratione. Frigus quotidianæ est debilis rigor, vel medium quoddam inter rigorem & horrorem. Quæ omnibus febrium accessionibus contingunt, in quibus materia à venis sine magna agitatione diffunditur in habitum corporis; quia fit cum sanguinis retractione & corporis refrigeratione: calida spinæ dorsū imposita, horrores, rigores & frigora soluat, corporis habitum calfaciant, meatus referant, materiam præparant & extenuant, vt partes frigiditate transitum non remouentur. Exiguam materiam copiam horrores leuissimos efficere cernere est in febrium declinatione, & materiam sensim commotam horrorem vel rigorem non facere. exemplo erūt febrium initia, quibus propter obstructions maiores materiam defluentis, nullus pater aditus. Rigores vel horrores non à solis cruditatibus oriri manifestum; nam vel maximi rigores & horrores materia concocta sunt in febrium solutione, quibus copiosus sudor superueniens, vt in causone post sextum, morbum soluit, vt Hipp. scriptum reliquit. *À causone rigor superueniens morbum soluit*, quia multa materia concocta assilim discutitur.

Sic Myrrha, cum pipere & aqua (& vino albo in quartana) post duabus horis ante accessionem, calfacit materiam horrores, obstructions soluit, quæ transpirationem impediunt, & horrores discutit.

Subdica lingua liquat.] Scabridem arteriæ expolit vel lenit circa ruffim, quia sensim penetrat & leniter deterget humiditatem quæ vocem rauam facit.

Ventris tinea.] vermes occidit amaritudine & acrimonia.

Contra grauem oris halitum.] fetores putredinis soboles amaro & siccitate emendat. Ex moscho nō die patantur quæ putredinem non odient, sed regunt.

Alueolis alarum talis.] Cacoehymicis hic effectus accidere solet, quorum excrementa putrida fetē, ob partis laxam & raram texturam, quia non refrigeratur magis que sudat, & calidior hic locus est, non multas arterias non procul à corde remotas. Odoreus fetor deservit. Verum quia pars laxa, alutem addit à maiorem adstrictionem.

Gingiuæ & dentes stabilis.] quia astringit & siccat, caruolē non conuenit, nisi leges emplacis, quod dentes & gingiuæ firmat astringendo, vt testis est Diosc. cap. De emplacis.



Medicis fractis suribus.] melius contusis, nam cartilaginea fracta curacionem non admittunt.

BDELLIVM. Aduers. pag. 419.

Diosc. Calfacit & emolli: & duritias ¶ & turgentia guttura, humidatq; * veritas discutit cum ieiunia salina † Aegin: dilatum. Valsa spiracula laxat appositu & suffitu: & partus, humiditatesque omnes extrahit. Calculos potu commi- scirros e- nit: urinam mouet. Tussientibus, a serpente percussis, vtilissimè datur. Valet ad rupea, vulsu, laterum dolores, & dis- molli: cursantes spiritus. Malagmatu inferitur, qua contra duritias & neruorum nodos profunt. Conrasum resoluatur affuso * eadè Gal. vino aut aqua calida.

BDELLII fructus.

STYRAX. Ital. Storace. Hisp. Estoraque. Aduers. 419.



Bdellij fructus descripsit Carolus Clusius in aromatum historia, Iuglandis nucis magnitudine, aut etiam ampliores, triangulari ferè forma, oblongiore tamen & ad ficum quodammodo accedente, odoratos, colore subcinereo, durissimo putamine, quod pragnans esse & nucleum continere videtur.

STYRAX.

Diosc. Lacryma inuenitur gummiu similitudine, perlucida, & myrris annila: verum perpana manat. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, & istis sedimento, & quibusdam alijs. Alij coram aut adipem odoribus imbutum, fragrantissimis solidis cum syraxe subigunt, & per laxa cribra foramina in frigida aqua vermiculos exprimunt, venundantq; Syracem hunc, quoniam in vermiculorum speciem coram habet, scilicet cognoscunt, que taquam sincerum imperiti approbant, non anniduerentes ad prapriam odoris fragrantiam, siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Syrax calfacit, emolli, & concoquit: * in adter tussis, destillationibus, rauridini grauedini, & intercepta voci. Valsa praclusa nonnisiue laboranti, conuenit. cit inen- ses potu appositu que aluum leuiter molli, & exigua cum resina teredintina catapotij modo deuoretur, misceatur vtiliter discutientibus malagmatu, in opijq; adoleto autem & igni torretur, vt fiat exco, veluti ex † rione, sulgor ad eadem conueniens ad qua thuris sul: o. ex eo etiam in Syria Syracinum oleum componitur. quod calfacit vehementer, & emolli, vocum caput dolere afficit, adgruatq; & soporem adfert.

* Gal. cauter
addit pan-
dorem n. e.
daturq; ubi
† Gal. Gal.

DD & Core;

Soporem gignit.] Capitis gravitatem & dolorem etiam olfactu cum inducat, Galeno teste, lib. secundo *de nat. reb. hum.*, à ratione alienum videtur, quia contrarij effectus, soporem & dolorem gignere. In dolore sensus acutus: in sopore vero hebes; & sensus & motus privatio. Cum Myrrha excelsa faciat, non videtur somnum posse conciliare. Soporifera autem & narcotica humida perquam frigida sunt. Sed quam multa calida quibusdam soporem inducunt, vapidis fumis imbuto cerebro; & nonnullos senis capitis doloribus infestant, potissimum eos quibus siccior & calidior cerebri temperies. Quibus vero caput frigidius & humidius, pituita eliquatur; cerebrum irrigatur; obstruuntur & meatus, per quos spiritus ad sensus mittuntur: & cessante illa spirituum emissionem, assiduo vigiliarum tempore fieri solita, somnam conciliant. Quemadmodum Myrrha, vinum immodicè sumptum, Crocus, Iris & omnia calida quæ caput tentant, eadem ratione dolorem faciunt, somnū & vigiliis pro cerebri temperamento & natura. In quibusdam neque somnum neque vigiliis inducit, quia vapores absumuntur.

Glutinat] viscida sua substantia & exsiccante vi, superfluum humorem absumendo, collectiones puris discutendo.

Siccit, astringit.] quod astringat, à veritate alienum videtur, quia menses & partus celeriter extrahit, expectorat. Id fieri videtur secundis qualitatibus, siccando scilicet; humidum superfluum purgationis menstruæ absumendo.

Vulvam emollit & præclusam aperit.] malactica calida sunt excessu secundo & sicca, qualis myrrha est. Tumidam vulvam emollit ob mensium retentionem, & fortè refrigerationem; ob id calefaciendo, humores eliquando & extergendo, atque venarum officina referendo, præclufant vulvam aperit.

Menses & partus.] quia amara acris, tenuium partium, Gal. subdit; & lumbricos tum enecat, tum eijcit.

In vetere tussi orthopnea.] Hæ affectiones fortiora remedia vel maiore dosi expostulant, quia multum distat, & medicamēti vis permeando imminuitur vel perditur. Memini senē quondā Anglum qui ob retentionē & crassitiē pituitæ suffocabatur, à me medicamēto parato ex Myrrha selecta, pipere, succo Porri, sap., & syr. capillorū veneris cōcoquebat, expectabat & magnā pituitæ colluviē eijciebat. Myrrha enim Gal. teste lib. 3. simpl. detergendi vim habet, tracheā arteriā, non tamen exasperat, sicut abstergentium nonnulla quæ abstergen non tussim, aut fluxiones movent, ut acria, cepe, mel magis quam sana. Concoquendi & extergendi vim habet pulmonum & arteriæ affectibus necessariam, nec dispari fortè ratione ad alui profuūna efficax.

Alui profusio.] Alui tria profusio, dysenteria, diarrhœa & lienteria. Nō potest de dysenteria intelligi, quia addit *naï d'ore l'opas*. Diarrhœa non videtur convenire, quia laxat; ad lienterias autē coquendo & constringendo; dysenterias vero detergendo & astringendo efficax.

Horrores discutit.] Horror quartanæ, compositæ, (puræ hemicriticæ, & bili vel melancholicæ diffusæ) in sensiles partes vel pituitæ permixtæ febriam est. Quemadmodum acris & biliosus humor, qui celeri inota fertur & diffundit, rigores efficit: sic quæ crassior, tardius movetur, minus pungit, sed perditur & maiore cum refrigeratione. Frigus quotidianæ est debilis rigor, vel medium quoddam inter rigorem & horrorem. Quæ omnibus febrium accessionibus contingunt, in quibus materia à ventis sine magna agitatione diffunditur in habitum corporis; quia fit cum sanguinis retractione & corporis refrigeratione: calida spina dorsi imposita, horrores, rigores & frigora solvant, corporis habitum calfaciunt, meatus referant, materiam præparant & extenuant, ut partes frigidæ transitum non remorentur. Exiguam materię copiam horrores leuissimos efficere cernere est in febrium declinatione, & materiam sensim commotam horrorem vel rigorem non facere, exemplo erūt febriam initia, quibus propter obstructions maiores materię defluentis, nullus patet aditus. Rigores vel horrores non à solis cruditatibus oriri manifestum; nam vel maximi rigores & horrores materia concocta sunt in febrium solutione, quibus copiosus sudor superueniens, ut in causone post sextum, morbum soluit, ut Hipp. scriptum reliquit. *A causone rigor superueniens morbum soluit*, quia multa materia concocta assatim discutitur.

Sic Myrrha, cum pipere & aqua (et vino albo in quartana) pota duabus horis ante accessionem, calfacit materiam horrores, obstructions soluit, quæ transpirationem impediunt, & horrores discutit.

Subdit a lingua liquat.] Scabritiem arteriæ expolit vel lenit citra rursim, quia sensum penetrat & leniter deterget humiditatem quæ vocem rauicam facit.

Vestris tinea.] vermes occidit amaritudine & acrimonia.

Contra grauem oris halitum.] fetores putredinis soboles amaro & siccitate emendat: Ex more no hodie parantur quæ putredinem non dolent, sed tegunt.

Adversus alarum tadia.] Cacochymicis huius affectus accidere solet, quorum excrementa pterida & rursim ob parvis huius & rursim texturam, quia non refrigerantur magisque sudat, & calidior hic locus etiam ob multas arterias non procul à corde remotas. Odoratis fetor deletur. Verum quis pars laxa, aliter ad dita à maiorem astringentem.

Gingivas & dentes stabilis.] quia astringit & siccit, cum aliis non convenit, nisi legas omphacis, quod dentes & gingivæ firmat astringendo, ut testis est Dioscor. cap. De omphacio.



Melior fructus arboris.] melius conuulsis, nam castilaginosa fructu extrationem non admittunt.

BDELLIVM. Aduers. pag. 419.

Diosc. Calfacit & emollit: & duritias† & urgentia guttura, humidatq; * bernius discutit cum ieiunia salina † Aegin. dilutum. Valsa speracula laxat apposita & suffita: & partus, humiditatesque omnes extrahit. Calculos poru commi- deirros e- nit: urinam mouet. Insistentibus, à serpente percussis, vtilissimè datur. Valet ad rupta, valsa, laterum dolores, & dis- molle. cur sanctos spiritus. Malagmaticis inseritur, qua contra duritias & nervorum nodos profunt. Concasum resoluitur affuso eadè Gal. vino aut aqua calida.

BDELLII fructus.

STYRAX. Ital. Storace, Hisp. Estoraque. Aduers. 419.




Bdeleij fructus descripsit Carolus Clusius in aromatatum historia, Inlandis nucis magnitudine, aut etiam ampliores, triangulari ferè forma, oblongiore tamen & ad ficum quodammodo accedente, odoratos, colore subcinereo, durissimo putamine, quod prægnans esse & nucleum continere videtur.

STYRAX.

Diosc. Lacryma inuenitur gummiu similitudine, perlucida, & myrrha autula: verum perpetua manet. Adulteratur ligni scobe, quam vermiculi erodentes excusserunt, melle, & iridis sedimento, & quibusdam alijs. Alij ceram aut adipem odoribus imbutum, fragrantissimis folijs cum styrace subigunt, & per tassa cribri fortissima in frigida aqua vermiculos exprimunt, vanuuntq;. Syracem hunc, quoniam in vermiculorum speciem edër albat, scolocicon cognominant, què tãquam sincerum imperiti approbant, non animaduertentes ad præcipuum odorem fragrantiam, siquidem acer admodum est, qui adulterationis vitio caret. Syrax calfacit, emollit, & concoquit: * in aceto ruffi, destillationibus, rancedini, grauedini, & intercepta vocè, valsa præclusa duritiæ laboranti, conuenit. et in rufes poru appositæque aluum leuiter molle, si exiguum cum resina terèbintina catapertu modo tenoretur, misctur vtiliter discutientibus malagmaticis, acopisq; adoleto autem & igni torretur, vt fiat exco, veluti ex† ture, singor: ad eadem conueniens ad qua thuris sul: o. ex eo erant in Syria Syracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit, verum caput dolor afficit, adgmatq; & saporis asfert.

* Gal. emollit
addit quod
obtem n e
detur cull
† Eadè Gal.

Kudwira mala. COTONEA & *Cydonia mala.* Germ. Quitten & Witten ostel.
 Gallis Coingz. Belg. Que appel & Queperre boora.
 Ang. Quince tree. Hisp. Membrillos. Ital. Me-
 lecotogne. Aduers. 430.



Diosc. Cotonea stomacho utilis. urinam cient.
 verum tosta mitiora habentur. profunt colicis, dysen-
 tericis, purulenta extusis, cholericis, praesertim
 cruda. maceratorum liquor, commode in stomachi aut
 ventris fluxionibus, potui datur. Succus crudorum asu-
 ptus orthopnoicis salutaris est. decocto fouentur vulua
 & sedes, si procidant. Cotonea qua melle † conduntur,
 urinam mouent. mel autem sibi constringentem illo-
 rum vim & inspissantem adsciscit. qua cum melle co-
 quuntur, stomacho atq; origriatiora sunt, sed minus
 inspissant. cruda cataplasmatu adijciuntur, ad cohi-
 bendam aluum; aut si stomachus esluet, aut in vom-
 itiones effundatur, ad mammarum inflammationes, pra-
 duros liones, & condylomata. Fit vinu ex ipsis suis ex-
 pressisq; sed quod perduret, quindecim sextarijs succi
 vnus mellis adiungitur. alioquin, in acorem dege-
 nerat. Pr^oest ad omnia qua dicta sunt. Fit & oleum
 * ex ijs, quod melinum vocauimus, quo vinnur quociens
 adstringentioles est opus. Eligi oportet vera, qua sane
 sunt rotunda, parua & odorata. qua vero struthia dicu-
 tur, magna quidem sunt, sed minus vilia. Flos & vi-
 ridis & sicci cataplasmatu imponitur: ijs conueniens
 qua adstrictionem desiderant, inflammationibus ocu-
 lorum, reiectionibusq; sanguinis. contra citam aluum,
 & mensium impetus, in vino bibitur.

† Eadem
Gal. & Plin.

* Eadem
Plin.

Plin. addit, Lanugo eorum carbunculos sa-
 nar, cocta in vino & illita cum cera.

THYS. Aduers. 430.

Diosc. Primarium tenet in eo genere masculum, suapte natura rotundum: tale autem individuum est,
 candidum, cum frangitur, intus pingue, in suffitu statim ardens. Inducian vero fuluescit & colore lincis, sed rotundum
 industria faciliant. nam in quadrangulas formas dissecum flicilibus versant, donec rotunditatem contrahat. verum
 huiusmodi tibus tempore flauescit, quod atomum aut syagrum appellant. Secundum locum habet Arabicum, & in Smi-
 lo nascens, quod aliqui copiscum vocant, minus multo & sulcius. Est & genus alid, cui amannita cognomen est, alio-
 qui candidum: quod dum mollitur, mustiches more digitis cedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gummi. quod
 facile deprehendi potest: si quidem suffitum gummi flavum non ei aculat, & resina in fumum euanesce. tibus vero
 statim ardet. idem maleficium odor prodi. Ad calcificandum & astringendam pollet. oculorum caliginem discit. ca-
 sia viscera complet, & ad cicatricem perducit. cruenta vulnera glutinat, infra atque cunctas sanguinis eruptiones,
 etiam si cerebri membranis effluat. vlcera qua cacochilia vocantur, & sedis & reliquarum partium per-
 mulcet tritum cum eo & lacte linamentum. fornicantes verrucas inter initia, imperiginosque, ex aceto &
 pice illitum, tollit. ambusta igni, perniosisque cum suillo adipe aut anserino, & vlcera in capite manantia
 cum nitro, si infricetur, sanat. paronychijs cum melle, auribus fractis cum pice medetur. ad reliqua ar-
 rium dolores cum dulci vino transfunditur. inflammata a partu marum cum cumulo. & rosacco magna vtilitate per-
 tinguntur. additur ad arteria v, corumq; medicamenta. prodest sanguinis excretionem potum, sed in secunda vlcera
 me haustum insaniam mouet, & largius cum vino potum interficit. In flicis mundo dicitur crematur, siagr. nore glab.

succensum à iusticia, donec exuratur, post perfectam vilitatem operire oportet, usque dum restinguatur. sic enim in cineres non redigitur. Aliqui ollulam aeneo vase cauo circa medium perforato cingunt ad excipiendam fuliginem, ve in eius mentione mox ostendemus. alij crudo fictili turo oblitto, & in fornacem indito, cremant. Fictili etiam novo vitacibus prunis torretur, dum non amplius bullet, aut pinguitudinem vaporibus emittat. facile enim comminuitur quod perustum non est.

Thuris cortex Diosc.

Præfertur thuris cortex crassus, pinguis, odoratus, recens, lavis, minime scaber, sine membranis. Adulteratur admisso pini aut nucis eius cortice, sed horum index ignis est. siquidem reliqui cortices suffiti nequaquam incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris vero cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem ei aculatur. thuris modo visitur, & vis eadem quæ thuri, sed validior adstringentiorq;. Quare potu cruentis excretionibus, vulvis fluxione laborantibus, in pefso confert, ad cicatrices oculorum, & cana, sordescens, efficax est. costus scabru lippitudinibus auxiliatur.

Manna thuris Diosc.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim aque suffitu acrum vaporem, sed fuliginosum & impurum expuit. & permistum sua uolentia balitus virtus habet.

Thuris fuligo Diosc.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas in nouam fictilem ollam concauam imposito: & aereo vase in medio perforato, deterfa diligenter sorde, obtegito. alteram adnouero, ex altera eius parte aut utraq;, subiectis quaternum digitorum altitudine lapillis, quod facilius perspici queat, si vrantur. & qui locum capax fuerit, glebularum alias supponito. & antea quam prorsus prior gleba restinguatur, aliam imposito: donec sufficientem fuliginem videaris coegisse. Continuo tamen externa aramenti partes spongia, aqua frigida madefacta, abstergantur, ita enim temperato aris feruore, fuligo omni inhaerebit. qua alioquin leuitatem decidua, thuris cineribus admiscetur. Dersa itaque fuligine, cinis cremati thuris seorsum substrahendus est. idem opus, quo ad satisfactum tibi videbitur, obtemperandum. Oculorum inflammationes mitigat, fluxiones suspendit, vlcera purgat, cana explet, carcinomaa sistit.

Simili modo è myrrha, resina, styrace, reliquisq; lachrymis, fuligo excipitur, ad eadem conueniens.

Gal. Thus exalfacit ordine secundo, desiccatur primo, habet quoque adstrictionem pusillam. Sed minimum manifesta adstrictio est candido. cortex eius euidenter adstringit: proinde sanè strenuè quoque desiccatur, aded vt ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autem crassiorum partium quam ipsum thus, & minimum habet acrimoniam. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates multus est eius vsus apud medicos in hæmoptoicis, st omachicis, cæliacis, ac dysentericis nõ tantum ijs quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscetes, sed ex ijs quæ intrò in corpus sumuntur. Ramus eius tum succioris, tum calidioris est facultatis quam ipsum thus, aded vt ad tertium usque excessum perueniat. Habet verò etiam absterforium quiddam. Itaque eo nomine & expurgare & implere quæ in oculis consistunt vlcera videtur, velut & myrrhe, & styracis.

Coccus insectoria, Coccus baphicos, Narbonensibus & Galloprovincialibus Vermillon. Hisp. Coçcoia frutex dicitur. Gallis graine d'escarlate. Aduers. 430.



Coccus insectoria.

Diosc. Vis huic spissanda, vniuersibus nervisq; praticis, conuenienter ac recte. T. Illiusmodi vilitur.
Gal. T. alij cum oxymelita.


Indet. Cal. & Phalaris.

Aquifolium
sive Agrifo-
lium.



AQUIFOLIUM sive Agrifolium. Rhus seu hyl.
Aquifolium Plin. Paliurus 2°. Lacuna. Angl. Holly.
Ip. Belg. Guis. Ger. Walddistel, vel Dorn-
palmen. Gall. Hous. Hesp. Azabo.
Ital. Aquifolio. Adans. 431.
Radicis cortex herniis medetur tritus & impe-
fitus, vel alijs commixtus.

ILEX ARBOR. Ital. Ellici & Lecini. Hesp.
Enzina. Gall. Yeuse, Eoule & chesne
verd. Germ. Stenpalmen. Adans. pag. 431.




Quercus
vulgaris.



Diosc. lignae glandes virides quernas antocellome.
Lignae radices cortex cum aqua coctus dum mollior, inta-
bescat, & tota nocte elictus, conegrat capillos, primum cinolla
terra purgatos. Folia om. nium rufa & trita tomatis. pro lege. Garenm.
funs, & imbecillas membrorum partes reberant. cata lucas.

Quercus vulgaris cum suis excrementis fungosa.
Belg. Eibenboort. Gall. Chesne Ital. Quercia
Hisp. Robble & Souzo. Angl. Ollivete.



QUERCUS cum glande & musco suo.

BEDEGUARIIS effigie
Excrementum spongiosum & muscosum, sive Bedeguar
* Quercu. *



QUERCUS perpetua fronde virens. Gall. Chesnes verdz.

Huius querceta in Gallofrancia oriri audio. Glandes nostratibus similes sunt, quales D. Christophoro Plantino hoc anno ferendas misit eruditissimus D. N. Rache apud Lutetianos medicus & chirurgus clarissimus, & stirpium omniumque Naturæ opum, ut si quis alius, gnarus.

* E quercubus Romano agro collegi.

Anciqui cuiusdam è Quercu instar Ledi pullulantis meminerunt excrementi quod purgat & adstringit summopere.


Quercus, glans. Aduers. 431.

DIOSC. Quercus omnia adstringentiam vim habet, præsertim liber qui corticis & ligno intercedit. quinetiam multa potamini glande subiecta decoctum exijs datur dysentericis, colicis, sanguinis excrementibus, etiam pefso, semini fluxione valua laborantibus subijcitur. Glandes eosdem effectus exhibent. vrinam crant. capitis dolorem & fluxus in cibum sumptu aperiunt. resistunt estata venenatorum cibibus. decoctum carum & corticis cum lacte vicino potum prædest contra toxica. Intra cruda, inflammationes illi ueniunt, ad duricias quas cacæthæ vocant, & malefica vicerarum salsa axungia conueniunt.

Folia omnium rufa & uita tumoribus profunt & imbecillis membraorum partes roborant.

332

CERRIS Plin. *maiore glande.*
Aduers. 431.




CERRIS Plin. *minore glande*
& calyce molliter echinato.



CERRIS *glaus immatura.*

CERRIS Theoph.



Valerandus Doncez Iustinopoli Venetias rediens ramulos Quercus duorum generum asportauit, quibus me donauit. Vterque Quercui nostrati admodum assimilatur, folio & ligno, sed glandes ipsi ramo inhaerent. Vni qui minor, calyx hispidus & molliter echinatus, hinc subpar; alteri vero glandes praegrandes calycem habent echinatum, ambitu squammis praeduris sibi mundo incumbentibus, horridum, semicono Laricis longè maiore, cuius nonnullam similitudinem retinet. Valde crassus est, interiore sui parte lenis: glans quam claudit, nisi magnitudine differt: folia autè maiora, eadem atque Quercui. Huius speciei obseruasse memini publica via qua itur Pesaro Romam, in conuallibus celsissimas arbores, alibi minus obuias nec valde notas; è cuius ramos praegrandi & duro calyce glandes non exerebat, sed clauderet, forte quia immaturae erant. Huiusmodi folia & glandes anno 1561. liberalissimè communicauit C. doctissimus medicus Lugdunensis D. Dalescampius, qui Cerrim Plinij me docuit.



Hæc Cisti historia reponenda est proximè suas effigies supra Observat. pag. 551. & 552.
 qua operarum incuria fuerat prætermissa.

CISTVS folio Lavendula: plerumque cubitali est altitudine, admodum ramosus, sed brevibus ramis, & foliis confertim nascentibus, angustis, incanis, sapore adstringente: flores parvi, non multum à superiore differentes, albo colore: semen non observavi.

EST hic frutex adeò Lavendula: similis, ut nisi odor & sapor prohiberent, pro Lavendula sumi possit: & cerè quas plantas sine flore primùm conspexit, pro Lavendula habui, ideoque negligebam, donec floribus quos in plantis aliis conspiciebam admonitus, diligentius observarem.

Hunc ego solummodo Valentini regno inveni aridis & petrosi locis quarto à Valentia miliari, Aprilis initio.

CISTVS folio Sampfuci, planta fruticosa est, multos tenues ramulos proferens: folia in his parva, quasi rotunda, incana, Sampfuci similia, minora paulò, & dorso eminente, cum quadam aciditate & faldedine adstringentia: flos in summis ramis copiosus, candidus, villis & staminibus luteis, ut in reliquis Cisti generibus medium florem obtinentibus, quinque foliis constans, quorum medium macula ex purpura nigricans occupat: capitula exigua lini ferè, trigona, in quibus semen minutum Hyoscyami, ex nigro candicans siue cinereum continetur: totus ille oblongus ramulus qui florem & fructum sustinuit, arefcit eo maturo, ut in singulis Cisti generibus.

Cistus folio
Sampfuci.

Primùm hunc inveni in Castella veteri, supra S. Martin del-Castañal: deinde copiosum in Castella nova circa Carajesejo, & toto Bætico agro inter Tagum & Anam flumina.

Hispani *Quiviel*, aut *quiviela* appellant, communi ferè cum Ericæ minoris vocabulo, quoniam fortè inter Ericas recenseant.

CISTVS folio Thymi, pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, quæ magna ex parte sine foliis conspiciuntur, præter quàm circa summitates, in quibus confertim nascuntur exilia admodum, viridia, Thymi æmula, gustu adstringente: florem summis ramis superiori similem, minorem, neque maculis insignitum fert: semen non observavi.

Cistus folio
Thymi.

Hic mihi solum conspectus est extrema Bætice parte, qua Castellam & Lusitaniam spectat: potest tamen & aliis locis nasci.

SUPERIORISVS haud dubiè coniungendæ sunt etiam quas hic subiciam, cum & forma & sapor respondeant.

Cisti femina
næ 3. classis.

PRIOR exigua est planta, tenuibus virgulis lignosis, & humi sparsis prædita: foliis Helyanthemo vulgo dicto similibus, minoribus tamen, omnino candicantibus, adstringentibus: flores extremis ramis insident, quinque foliis constantes, & staminibus in medio, ut in Helyanthemo, colore nunc albo, nunc pallido: semen in capitulis triangulis Lini, exiguum, rufum. Radix lignosa & fibrosa.

Cistus humi
lis 1.

ALTER à priore non differt tum magnitudine, tum ramulorum exilitate: flores item & semen similia: sed folia omnino angusta & tenuia, Cisto foliis Thymi respondentia, gustu etiam adstringentia, acerbæ, & incana.

Cistus humi
malis 11.

Frequens est utraque plantula agro Salmanticensi, ubi *perdiguera* ab incolis appellatur, quod perdisces iuxta eam frequenter sese volent, & pulverent.

AD primum genus referenda est ea planta, quam nonnulli Helyanthemon Plinij esse volunt, alij Panacen Chæronium, foliis hyssopi vulgaris ferè, hirsutis tamen & adstringentibus, quam Germani, quod locis incultis inter Ericas nascatur, & foliis hyssopum æmuletur, *Hepden pflor* appellant, cuius flos aut albus est, aut pallidus, aut aureus; idè vulgo herbariorum Germanicorùm *Consolida aurea* nuncupata.

Helyanthemo.
Panax Chæronium.

Consolida aurea.

Cistus an-
gustus 1.

EST & alia quædam plantula his congener, in vinetorum Salmanticensium marginibus, & Granatensis regno mihi observata, longioribus & rarioribus virgulis, rectis, foliis amplioribus Helyanthemo, & virentioribus, gustu adstringente: cuius flos superiori forma similis, pallidus, aut albicans: semen minutum rubescens in capitulis trigonis duplo quàm Helyanthemi maioribus.

Castellani *turnera* vocant, Granatenses *yerna del quadrillo*.

ALIA item invenitur in sylva Madritiana, secundo ab vrbe Lutetia militari, ad Cisti genus referenda, pedali altitudine, exilibus cauliculis, rectis tenellis, non admodum ramosis, foliis oblongis, angustis, hirsutis, virentibus, quæ cum ramulis per Caniculæ æstus humore quodam pingui & leno sunt obfusa, flos pusillus, quinque foliis constans, ut Helyanthemi, pallido colore, & macula punicante insignitis: capitula tenella admodum, triquetra, semen pusillum & cinereum continentia.

Cistus an-
gustus 11.

Annua utraque est hæc postremò descripta, aut altero à saturo anno floret, deinde perit.


Florent verò omnes isti Cisti eodem quo mas tempore, & semen etiam ad maturitatem perducunt.

SUNT autem omnes perpetuo foliosi: sed eorum flos admodum caducus, statimò; senescens: radices duræ, lignosæ, diuisæ, in diuersa tendentes.



QUERCUS pumila fructu specie, fronde-
llicis molliore.
ROBUR quinta Clusij.

GALLA maior.
Robur secunda Clusij.




Hic subiicienda *Quercus pumila* siue *Robur quinta* Clusij, aded humilis, ut raro pedis magnitudine superet: glandoso semine amarulento, & calyce laui: stequens oritur prope Vlyssiponem solo arenoso.

Kurze. GALLA. *Advers.* pag. 432. Gal. Galles. Germ. Gallocypseli, & Epchoeffei. Hisp. & Ital. Galla, & bughala.

Diosc. *Galla* fructus est *quercus*. Aliqua *omphacitis* appellatur, parua quidem, sed tuberosa; solida, nullo foramine perua. altera plana, leuis, perforata. Eligi debet *omphacitis*, qua efficacior est. Vtriusque vis vellementer adstringere. trita excrescentia in carne, fluxiones gingivarum & vna, atque oris vlcerationem cohibent: nucleus, dentium caruicinis indidus dolorem sedat. cremata carbonibus donec igne flagrent, & vino aut aceto aut acida mulla extulsa, sanguinem supprimunt. decoctum quibus incidere expedit, efficax est & contra vulvas prociuentes, fluxionesq; capillos demigrans, aceto aut aqua macerata. dysentericis colicisq; cum vino aut aqua trita conuenienter illinuntur, aut bibuntur. obsonis addi debent.

GALLA maior.

Robur secunda siue *pumila* Clusij, humanam altitudinem non excedens, copiosas, & fragranses gallas ferens ramis ipsis inhaerentes, grandioribus frondis incisuris, & insinuatibus extrafructibus.

GALLA
Ilicis.GALLA maior altera.
Robur angustifolia Clus. 3^o.Foliis Ilicis Aquifolij sed maioribus, aucta par-
te candidantibus.GALLA minor. Advers. pag. 432.
Robur 4^o. angustifolia, siue minor Clusij.Galla minor sine tuberculis, quales in officinis
vulgatissimæ prostant: caudice contorto, magis que
rugoso.

FAGVS.



FAGVS. Advers. pag. 433.

Angl. beeherr. Germ. Buchbaum. Belg. Bus-
kenboom. Gal. Pau. Hisp. Haja. Lusit. Faya.
Ital. Faggi.Diosc. Quercus generi assignatur, & consimile
in usus obis.

CASTANEA. *Aduers.* pag. 433.
Angl. Chestnut tree. *Germ.* Kestten. *Belg.* Castanie-
 boom. *Gal.* Chastaignes, Marons & Chastai-
 gniers. *Ital.* Castagne.

CASTANEA *equina*. *Aduers.* pag. 433.



Diosc. *Adstringens*, glandibus similes effectus præbent, præsertim tunica qua carnem & corticem media, in-
 tercursat. Cava his qui Ephemera videntur, conueniens est.

Adstringit & siccatur ut cæteræ glandes. calida primo ordine & sicca.

Gal. Inter omnes glandes principatum tenent, solæque syluestrium fructuum alimentari inemo-
 rabile corporibus præbent.

Tardè transeunt, & difficulter concoquuntur crudæ potissimum, flatu gignunt.

* *Matthiol.* Anhelosis, tussientibus, & sanguinem reticientibus equis, plurimum auxiliij afferre ait.

SAMBUCUS *Aduers.* pag. 434. *Angl.* elder tree. *Germ.* Hüller. & holder. *Belg.* Wier. *Gallobelg.* Suyn,
 & schu. *Gal.* Sufyer. & Suleau. *Hisp.* Sauço, Sabuca, & caninezo. *Ital.* Sambuco.


Sambucus alba.

Varietas. In Belgij nonnusquam agris & hortis acinis albis variat.

SAMBUCUS & *blanca.*

ead. Aegin.
 & *Plin.*
 ? *ead. Plin.*
 342 *Plin.*

Diosc. *Eodem viris que facultas, & par vsus, exiccans scilicet, aquam auarctis.* ? *Hermacibo nocens.* *Fæta ele-*
rum modo decocta, pituitam & bilis purgant. *Quiescentem teneri caries in illic cocti, eadem præstat.* *Radiis viris de-*
cocta, & in sibi data hydropicis auxiliatur. *Eodem modo pesa viperarum moribus subactis.* *Radice emolus &*




aperit, & qua circa eas sunt affectiones, decoctis cum aqua in festione corrigit. Præsertim cum vino potus eadem efficit. Illius capillos denigrat. Folia recentia ac tenera cum poleuta illis inflammationes mitigant. Ambustis etiam & canis moribus illis succurrunt. Profunda & qua in cavernas dehiscunt plera agglutinant. Podagricis, cum taurino hirci-
 * Rad. Plin.

† Polypodij ritu visceribus molesta.

EBVLVS. *Advers.* pag. 414.

Angl. Walwart, & blodwart. Germ. Kitzig.
 Belg. Gadpelt. Gal. Hyeble. Hisp. Yezgos.
 Ital. Ebullo.

SAMBVCVS foliis laciniatis.



Gal. Vtraque exiccandi, conglutinandi, modicèque digerendi facultatem obtinet.

Plin. addit: Succus cerebri collectiones, priusquam membranz que circa cerebrum est lenit infusus. Acini poti acetabuli mensura urinam mouent. Cortex † interior tritus, ex vino albo potus, alium soluit. Ebuli fumo fugantur serpentes. Tenerum cum foliis tritum in vino potum, calculos pellit. Impositura testes sanat.

† Corticis radice infusum ex vino Ellebori modo purgat supernè & infernè. Decoctum verò longè imbecillius est purgando.

SAMBVCVS foliis laciniatis.

Foliis minutim dissectis in Belgij hortis variat, ceteroquin fructu, flore, & ligno à vulgari non ab-
 Similis.



MAZA Diosc. *Advers.* pag. 434.
 Angl. & Belg. *Kyysl.* Germ. *Äpfel.* Gal. *Pomme.*
 Hisp. *Manzana, Manzanas.* Ital. *Pomi.*

PYRA Diosc. *Advers.* pag. 434.
 Angl. *pear.* Germ. *Pyra.* Belg. *Pörra.* Gal. *Poire.*
 Hisp. *peras.* Ital. *pere.*



Diosc. Folia, flores & germina, cum omnis mali, tum maxime *Cotonea*, adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis inest; maturis vero longe seorsus. Ex iis verna bilem gignunt; nervos omnes laedunt; inflationes pariunt.

Meli saporis dicuntur S. Iohannis.

Melimela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt, stomacho negotium exhibent, astuosa: ea multis dulcia mala vocantur. Epirotica mala, quae Latine orbiculata dicuntur, stomacho vitia. Siftunt aluum. Urinas euocant, malis tamen cotoneis inuaditoria. Syluestria mala similia sunt vernis & adstringunt. sane in hunc usum immatura omnia opus sunt.

Gal. Malus non omnis eiusdem est naturae velut nec eiusdem fructus: quippe quaedam mala dulcia sunt, quaedam austera, nonnulla acida, alia extrema exoluta & aquea, & sane in istis aqueum exuperat: ut temperies eorum sit tum humidior, tum frigidior: in acerbis autem terrenum frigidum. In austertis vero tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoque succi, cortices, foliaque arborum inter se dissident. Itaque, si austeriora sint, atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmionarum principio influxione repercutere, ac stomachum, ventremque, exolutum ac languidum laborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes & gliscentes remittere. Sed haec iam ad curandi rationem attinent: proinde ea citius relinquenda. Porro quod plurima pomis orantibus extremum frigidumque insit humiditas, vel hinc liqueat, quod eorum omnium nullus omnino succus durare, ac vetustate ferre possit, verum accescant corruptanturque; vniuersi. Solus enim cydoniorum & strachorum (utpote quae propter vincens adstrictionem minus ceteris sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: inaequalis ipse per se non ita durare queat.

PYRA.

Diosc. Pyrorum multa genera, quae tamen omnia adstringunt: proinde adduntur conuenienter in repellentibus cataplasmatibus; decoctum de succo & cruda ipsa aluum sistunt; ieiunios est et a laedunt. Acbras pyrastris genus est, quod tardissime maturum fit. Vim pyro adstringentiorum habet, & ad haec conuenit. Stringit etiam eius folia. Ligni pyrastris vim efficaciter hic auulsiatur, quos fungi strangulant. Alit fungos, si syluestria pyra cum eis coquantur, innoxios fieri.

Gal. Proinde sane maiora vulnera glutinabit, si usque que repellit.

Gal. Pyri folia pariter ac turiones austera sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet, aqueus, ex quibus clara quoque temperies est, inaequalis secundum partes. Nam pars una terrea est, alia aquea, ceterum veraciter frigidiorum alia temperata. Proinde esu pyra stomacho grata sunt, & strim prohibent. Illita autem desiccant, & modice refrigerant. Nam ego ex illis vulnus glutinasse me memini, cum aliud ad manum esset nihil.

Masperius

Urtica
Lactuca



Evonymus
Taceph.



Urtica vul
Galorum
Ruellij.



Cornus
Dioica.



MALA Diosc. *Advers.* pag. 434.
 Angl. & Belg. *Appel.* Germ. *Apffel.* Gal. *Pomme.*
 Hisp. *Manzana, Manzanas.* Ital. *Pomi.*

PYRA Diosc. *Advers.* pag. 434.
 Angl. *pear.* Germ. *Birne.* Belg. *Perre.* Gal. *Poire.*
 Hisp. *peras.* Ital. *pere.*



Diosc. Folia, flores & germina, cum omnium mali, tum maxime Cotonea, adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis inest; maturis vero longè secus. Ex his verna bilem gignunt; nervos omnes laedunt; inflationes pariunt.

Mellei saporis dicuntur S. Iocunis.

Melomela ventrem molliunt, & ab eo animalia expellunt, stomacho negotium exhibent, astuosa: ea multis dulcibus mala vocantur. Epirotica mala, qua Latine orbiculata dicuntur, stomacho vitiosa. Siftunt aluum. Urinas euocant, malis tamen cotoneis inualidiora. Sylvestria mala similia sunt vernis & adstringunt. sanè in hunc usum immatura omnia opus sunt.

Gal. Malus non omnis eiusdem est naturæ velut nec eiusdem fructus: quippe quedam mala dulcia sunt, quedam austera, nonnulla acida, alia extrema exoluta & aquea, & sanè in istis aqueum exuperat: ut temperies eorum sit tum humidior, tum frigidior: in acerbis autem terrenum frigidum. In austereis vero tum istud, tum aqueum frigidum, sicut in dulcibus aqueum temperatum. Sic quoque succi, cortices, foliaque arborum inter se dissident. Itaque, si austeriora sint, atque acidiora, vulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio influxionem repercutere, ac stomachum, ventremque; exolutum ac languidum laborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipientes & giscentes remittere. Sed hæc iam ad curandi rationem attinent: proinde ea citius relinquenda. Porro quædam plurima pomis omnibus extremè vitia frigidaque insit humiditas, vel hinc liqueat, quædam eorum omnium nullus omnino succus durare, ac verustate terre possit, verum aciescunt corrumpanturque; vniuersi. Solum enim cydoniorum & stathorum (vix potest quæ propter vincentem adstrictionem minus ceteris sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: tamen si ipse per se non ita durare queat.

PYRA.

Diosc. Pyrorum multa genera, qua tamen omnia adstringunt: proinde addantur convenienter in repellentia cataplasmata; decoctum è siccis & cruda ipsa aluum sistunt; ieiunos est etiam laedunt. Acheras pyrastri genus est, quod tardissime maturescit. Vini pyro adstringentioris habet, & ad eandem coenit. Stringunt etiam eius folia. Ligni pyrorum vitia efficaciter his auxiliatur, quos fungi strangulant. Alii fungos, se sylvestria pyra cum eis coquantur, innocuos fieri.

Gal. Proinde sanè maiora vulnera glutinabit, si yxeritque repellat.

Gal. Pyri folia pariter ac turiones austera sunt: fructus dulcedinis quidam obtinet aqueæ, ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars vna terrea est, alia aquea, cetera vitiaque frigida: nisi alia temperata. Proinde esu pyra stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem deficiunt, & modicè refrigerant. Nam ego ex illis vulnus glutinasse me meminisse, cum aliud ad manifestum nihil.

M. ASPILVS

Masticva
Dioscor.



Evonymus
Touph.



Viviana vul
Gallorum
Ruellij.



Cornus
Dioscor.



MESPILVS. MESPILVS. *Aduers. pag. 434. Angl. Medder tree, & medalet. Gal. Nesples, & Nespier. Ital. Nespou.*
Diosc. Pomum esu adstringit, stomacho gratum est, aluumq; supprimit.
Gal. subdit: Quin & in germinibus & foliis acerba hæc qualitas non pauca reperitur.
Ευωνυμ. ΕΥΩΝΥΜΟΣ Theoph. Aduers. pag. 433. Carpinus Theoph. Tragi.
Angl. spindel tree. Gal. Fulin & bonnet de prestre. Ital. Fusano.
Varietas. Fructu albo variat in horto D. Dilsij. Pecori veterinariae uocuem quidam asserunt.
VIURNA. VIURNA vulgi Gallorum & Ruellij: an Viburnum Virgilij? *Aduers. pag. 436.*
Germ. klepuzmaibaum Tragi. i. Fraxinus minor.

Gallorum hanc Viurnam admodum lentam asserit familia & literis illustris Carolus de Houchin, D. de Longaste harum peritissimus.

Vbi adfrictione opus est, Viurna commendatur Myrthi, Pyrastrii & Rhois rim.

CORNVS. CORNVS. *Adu. p. 436. Angl. Cornetree. Ger. weisshirslen, Cornelbaum, kuhherbaum, Thirelinbaum. Belg. Cornelieboos. Gal. Cornier, & Corniole. Hiff. Cerezo lylaeestre, & Cornizolos. Ital. Cornai, & Cornioli.*
Diosc. Baccas ferè oliua modo olongas, qua primùm virent, dein per maturitatem rubescunt, aut ceræ* colorem representant. In cibo adstringunt: profusio alui atque dysenteria salutaris, siue in edulio, siue in defrato exhibeatur. Muria vt oliua conduntur. Sanies, quam virentia folia torrendo resudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

Varietas.

* In Neruiensi agro fructu albo, aut ceræ colore vifitur.

† Addit Gal. Folia quoque & germina gustu acerba sunt, valenterq; desiccant. Itaque maxima vulnera glutinare possunt, potissimùm durorum corporum: at paruis vulneribus & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus satis desiccant.

CORNVS femina. *Ευωνυμίου Cordi. Aduers. p. 436.*

CERASIA. *Aduers. pag. 436.*

Germ. spindelhortz, & faulbeer. i. fusaria.

Angl. Cherish. Germ. hirslen. Belg. kriecken. Gal.

Coriariis expetitus frutex Cordo. Hartiegel Tragi.

*Cerises. Hiff. Ceresas. Ital. Cirege.**





Gummi co-
 ratorum.
 * vii & nu-
 cid.

* **Diosc.** Aizo vilis fana se viridis sumantur. eadē sicca uilē sifunt. Gummi quod cerasæ resuarit, cū vino dilato, risti vetusta medetur. colorē comendat. vifum exacuit: appetentiam auuat. Idem ex vino potum t calculosis auxiliū est.
Gal. Quæ dulcia sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed miads grata stomacho sunt. Contra austera acida pituitosis excrementosisq; stomachis sunt apta. Siquidem austeris magis desiccant. Scilicet nihil etiam incidunt. Potrò ipsius arboris gummi comuante omnibus viscosis & mordacitatis experibus medicaminibus facultatē obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accommoda est. Propriè autē siquidē quod quidē scribunt, verū est, calcuis vexatos adiuvat, nā sic illi tenuiū partium inesset facultas quædam.


CERASA

CERASA
tropica
Linn.



CERASA
centrif.
Linn. 436.

CHAMAE-
CERASVS.
Linn. 436.



CHAMAE-
CERASVS
Alpigena.
Aduerl. 436.

Xylostem
alteru quorundam.

Chamaecery-
sus Cordi.



CERASA uno pediculo plura.
In vicis quibusdam Belgij visitur. flositem duplicatus est.

CHAMÆCERASVS.


Eiusdem item cum *Cerasis* generis *Chamæcerasus*: in hortis Belgicis denique frugicat: omnia *Cerasi* similitudo habet; sed quadruplo minora, fructus austerus est.

CERASVS autumn Herbariorum.

Virgas mitis plures cortice pullo, vestitas homine procero longiores, ramulis brachiatas, folijs *Cerasi* arouirentibus, & floribus non absimilibus, pariter albis, sed congestis, virentes acinos initio, deinde rubentes per autumnum nigros *Rhamni* infectorij pares, relinquentibus: sapore & odore iniscundis.

ALNVS nigra. Faulbaum Tragi. FRANGULA.
Biel haubt Brabant & Sporkenhaubt.
Advers. 440.

Alni nigra
in scripto
Advers. 440.
reddenda fe-
quenti capi-
te, & al-
nux auella-
na.
Alni inferti-
gio proxime
Betulam in-
scenda.



legere quos so-
cula deter-
bant.




Tragi. Huius arboris flavus & medius cortex cum aceto vitus, & scorbis illitus intra paucos dies illam sanat & exsiccat. Estq; hoc experimentum singulare. Idem cortex in aceto decoctus puritatis estibus collatione prodest; nam & dolorem minuat, & dentes ipsos purgat.

PRINCE



PRUNUS *fol.* Germ. & Belg. Diebedorn.
Angl. Slootter. Ital. Prunifalvatici.
Aduerf. 436.

PRUNUS *domestica; communis.* Germ. Blaumen
Baum. Belg. Deumbeom. Hiff. Ciruelo & An-
drino. *fructus autē* Ciruelas & andrinas. Gal. Pru-
nier & Irune. Ang. Plumtree. Ital. Prune fusino.
Fructus vero fusino.



Diosc. Prunus arbor est nota, cuius pomum estur, sed stomachum rursū habet. alium mollit. Syriaca pruna
& precipue qua Damasci gignuntur, exiccata stomacho vitia sunt, alium adstringunt. Folia pruni in vino decocta
callusione & gargarizaturam, gingivas, & tonsillas † fluxione laborantibus reprimunt. præstant idem sylvestris
prunorum bacca, post maturitatem exiccata. cum sapa verò decocta, stomacho vitiores redduntur, aliumque magis
adstringunt. Gummi prunorum agglutinat. potum in vino calculis comminuit. Ex aceto quoque illam, lichenas ur-
farium sanat.

† Eadē Gat.
lege Prune-
pêches, &
peitchenoix.
pag. 436.
17. 40.


Eadem adfert Gal. rationes quas de Cerasis & pomis.

Masv. Pruna alium subducunt, & alterant: sed alba, flava, rubra, minus sunt medicamento-
sa, quàm nigra: quorum quæ *pisum*, id est, dulcicida sunt, alterant magis. Dulcia verò solvunt largius,
tamen vtraque alterant & solvunt, magis scilicet & minus. Damascena verò, & Armena, vtrūque
præter cetera præstant: humida tamen potius quàm sicca, quæ etiam in ventriculo promptius quàm
sicca corrumpuntur. Dulcia calido frigido temperata, aut paulò frigidiora, humida ordine secundo:
pisum, id est, dulcicida frigida, principio secundi. Omnia tamen lauant, leniunt, refrigerant: bilem edu-
cunt, ob hæc duo biliosis, tum febribus, tum morbis aliis sunt *salubria*: stomacho nocent, pauci
sunt alimenti: quia imbecilliter solvunt, eis addunt præsertim infusione. Tartar Indii, cassia situla,
manna, violæ condite. Ex horum succo fit syrupus, & ex carnibus electacium in eadem salubre. Ar-
meni truncum pruni arboris locis duobus vel tribus parvis vni intervallo tenuiter perforant: im-
missoque scammoio lauant, pruna ob id purgantiora evadunt. Dantur sacco seu decocto cum sac-
charo ad libram vnam.



ARMENIACA *Malm. Gall. Abricos. Angl. Nbre
cot's tree. Hisp. Alvarcoques, & Aluerchigas,
Catalon. Albercoqs. Ital. Bacoche, Armeriache
& Albricochi. Germ. D. Johans Pflersch.
Belg. Broeghen Dieren & Abricos. Adu. 436.**

PERSEA.
Aduers. pag. 437.



* *Diosc. Supradictis stemacho veibera sunt.*

SABRESTEN officinarum. MYXA Aegineta.
Aduers. pag. 437.

AGRIK. Facultate prunis consimilis. Serapio. epoum decoctum calidæ russi confert, peccus lenit, catarrhum calidum mulcet: ardores urinæ & vesicæ reprimat.

Catarrhis, mordacibus biliosisque defluxionibus arcendis accommodatur. Ventrem subducit.

PERSEA.

Perseam nunquam nobis visam fatemur. De qua egregie disseruit C. Clusius in sua rariorum stirpium doctissima historia in hunc modum.

CLUS. Valde rara etiam hæc est arbor, cuius ramum hinc expressum damus: nam solo Valentino regno unicum arborem vidi, in monasterio Duz Virginis, cui cognomen de Lasey, primo ab urbe Valentia lapide. Ex America eò delata fertur.

Porro hæc arbor Pyro similis est, in latum diffusa, perpetuæque æoma virens, ramulis ex viridibus pellescentibus. Folia illi Lauri latifolia, parte superiora virentia, inferiore verd cinerei coloris, firma

heretis



nervis aliquot per obliquum discurrentibus, odore & sapore commendata, cum adstrictione linguam mordicantia. Flos Lauri ferè, copiosus, racematim compactus, pallidus, sex foliolis constans. Fructus per initia Pruno similis, deinde successu tēporis pyri in modū oblongus, nigro colore, jucundoq; sapore: nucleū cordis effigie continet, gustu Castaneæ, aut duici Amygdalæ haud absimili. Vere florentem conspexi, Autumno maturum fructum ferè intellexi à Cl. V. D. Ioanne Placa Medico & Professore Valentino, qui mihi illam quo nunc dixi loco commonstrabat, incolisq; *Mamay* dici assererat: tamen si qui nobis Americam descripserunt Hispani, aliam atque ab hac diversam arborem hoc nomine insigniant. An verò hæc arbor Veterum *Persea* sit, nec ne, dispiciendum est.

Theophrastus lib. 4. de Plantatum histor. cap. 2. *Perseam* in hunc modum describit:

Est in *Ægypto* alia quoque arbor *Persea* dicta, aspectu magna formosaque: folio, flore, ramo, totaque figura, potissimum pyro vicina, nisi quod altera folio perpetuo, altera deciduo est. Fructū abunde parit, omniq; tempore perficit: quippe novus anniculum semper occupat. Maturitas Etesiarum flatu conficitur: reliquum crudiores auferunt & recondunt. Est magnitudine pyri, figura oblongus, amygdalæ modo, colore herbidas, nucem intus quemadmodum prunus continens, verū longè minorem mollioremq; carnem vehementer dulcem, suavem, concoctuq; facilem: nihil enim eos qui comederint tentat. Radice arbor exsuperat, tum longitudine, tum etiam crassitudine multitudineq; materiem robustam, & visu gerit decoram, atram vt lotus, &c.

Simili modo, iisdemq; ferè verbis eam Plinius describit lib. 13. cap. 9. sub *Perseæ* arboris nomine, voces ipsas cōmiscens, quas tamen lib. 15. cap. 13. apertissimè sejungit & distinguit.

Perseæ, inquit, arbores seipò & cum difficultate transiere, vt quæ in Rhodo nihil ferant, quod primū ab *Ægypto* earum fuerat hospitium. Falsum est venenata cum cruciatu in *Perseis* gigni, & pœnarum causa à regibus translata in *Ægyptum*, & terra mitigata. Id enim de *Persea* diligentiores tradunt, quæ in totum alia est, myxis rubescentibus similis, nec extra orientem nasci voluit. Eam quoque eruditiores negauerunt ex *Perseide* propter simplicia translata, sed à *Perseo* *Memphi* satam: & ob id *Alexandrum* illa coronari victores ibi instituisse. in honorem atavi sui. Semper autem folia habet & poma, subnascentibus aliis.

Qui sanè locus, eorum sententiam apertissimè refellit, qui *Perseam* arborem cum *Perseia* malo eandem esse cerebrosus asserere volunt, vt taceam vtriusque arboris historiam diversissimam esse.

Perseæ item meminit Strabo Geograph. vltimo, perpetuam illi comam tribuens, & fructū pyri magnitudine, figura oblonga, amygdalæ modo putamine inclusum, & corio.

Eiusdem meminit & Galenus lib. 2. de Aliment. eamq; se *Alexandriæ* vidisse asserit: meminit & aliis locis.

In eo omnes cōveniunt, vt *Perseæ* perpetuam comam tribuant, oblongum fructum, inclusum amygdalæ putamine & corio. Hæc quam exhibemus arbor perpetua quidē est coma; folia aut & flore Laurū magis refert quam pyram: fructu etiam oblongo est, sed qui myxis (qualem ei Plinius loco jam adducto tribuit) aut oblongis prunis similior sit, quam amygdalis, & colore (vt Placa referebat) nigro, non herbido. hæcenus Celsus.

Dicosc. Arbor fructum ferens cibo idoneam, stomacho vilem. Arida folia in farinam redacta illitu sanguinis eruptiones sistunt. Arborem hanc prodiderunt aliqui in *Perseide* exsitosam esse, translataque in *Ægyptum*, mutata natura in cibos receptam.

* Gal. quia adstringentem vitam modicè participant.

ΙΥΙΥΒΕ Arabum. ΖΙΖΥΡΗΑ Græcorum, Ζίζυρα, Paltorus Africanus Theoph. Lotus secundus Polybij. Cratægus serice Theoph. Linguæ otticæ Guindoulier. Gall. Iuubier. Hisp. Acoseifo. Ger. Brustbeeren & Acopiturbeeren Aduers pag. 437.



Consimile
murus cum
Sebestia
prunæ: &c.



Palurus.



PALURUS: Aduers. 437.

Diosc. Palurus fructus cognoscitur aculeosus, fructus
 durus, cuius semina pinguis & fuliginosa inuenitur,
 quod potum tussi opitulatur. vesicae calculos commo-
 uuit. serpentium ictibus aduersatur. Folia & radix a-
 strictoriam vim habent. quorum decoctum potu ni-
 mum * silit. vimam trahit. contra venena & serpen- Gal.
 tium morsus. auxiliatur. Radix recentia tubercula, in-
 more que onnes discutit, tria & imposita.
 † Gal. tantam obtinet incidendi vim.

Gal. adeoque digerunt ut phymata curent,
 quae quidem non admodum phlegmonode sunt
 & calida.

RHAMNUS primus Diosc. creditur. Aduers. 438.
 Oleaster Germanicus Cordi. Batanus Sept. delect.
 id est acini purgatiues.

Rhamnus
 prioris spe-
 cies alter,
 Clusij.




RHAMNUS
 secundus
 Diosc. Mon-
 spiliensis
 dicitur, est
 praeus Rha-
 mni. Dicitur
 Clusij.



Rhamni prioris species alterum genus Clusij.
 Hae differunt duas annexit Clusius:
 quorum prior humili frutice sed densa fruti-
 ca; foliis item angustioribus & minoribus, can-
 didioribus, & magis carnosiss; floribus gilli-
 dem cum illo formae, sed purpureo plene colo-
 re. Testatur recensuissimas in Lycij mentione.

Diosc.



Diosc. Omnia folia igni sacra & serpentibus & ceribus, efficaciter illinuntur. Jamis est ramos huius raris -
 fessitissis impositos, veneficia depellere.

Gal. deliccat & digerit excessu secundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente,
 proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Caterum ad hac tenoris vitandum est
 folijs.

PYRACANTHA Herbariorum.

Advers. pag. 438.

Videtur, ut sedalus Muretus annotavit, Rhânus tertius Diosc. & Theoph. frondibus sempervirentibus
 minimè deciduis ut Paliuri, siue Rhamni tertij recepti & agniti, nigrioribus, latioribus, & qua-
 dam tenuis rubentibus: fructu Asphodeli simili (ut veritè Ruellius). Que omnia sanè adumbrant no-
 gram Pyracantham.

SPINA Insectoria. Cerni spina Corii.

Nestpraym & Bourgespine Gallobelgicum.

Belg. Spijn besien & simpliciter besien boom.

Germ. Wegheboombeck & Creutzboer.

Advers. pag. 438.

BERBERIS. Crespinus & Spina sancta quorundam.

Angl. Berberis. Germ. Erbzel, Berlich, Saurich,

& Daislebeer. Belg. Saukrboom. Gall. Espine

zigrette: id est Oxyacantha. Advers. 439.

Oxyacantha Diosc. Fuchs.



Baccas pulvere aluminis inspergant pictores, terant, biduum macerant, succum exprimunt, &
 in pensilibus vesicis recondunt.

BERBERIS.

Aestuantis stomacho, bilem euomentibus, & picocolis febribusque biliosis, indeque ortis morbis,
 non modò acinis, sed etiam folijs peruenis. Sitim arcent; dysentericis auxiliantur. Radices lixiuo Regie
 traserate cinem flagum efficiunt: cuius cortex officinis Bugia vocatur.

34730



MYROBOLANI quinque.
Advers. 439.

MESVE.



Myr. flava.



Myr. malica.



Myr. balfatica.



Myr. chepula.



Myr. enollica.

MYROBOLANI EMBLICAE.



Sunt etiam hæ medicamēta benigna. Tartum enim abest, ut purgando vires deiciant, ut etiam cor, ventriculum, hepar, corpusque reliquum confirmet, cogendoque in unum roborent, qua re vnica his incommodant, qui sunt obstructionibus obnoxij, has enim excitant. Præterea medicamentis acerbis, & purgando exoluentibus, ut scammonio perfectè corrigendis rectè miscentur: sed huic præsertim citrinæ sunt miscendæ. Id enim contraria tum substantia, tum qualitate frangit, & purgationem inuat. Citrinæ autem colore sunt multum citrino, in viridem inclinante, graues, quia magnæ, & carne multa densa: si frangitur gummosa, osse exiguo. Cepulæ subnigræ in rubrum inclinantes: quod maiores, eò meliores, carne multa, ob hæc etiam graues, ad eò vtraque emergunt. Indæ sunt nigra, magnæ, carne densa, graues, tamen exolles. A quibus notis quod harum singulæ absunt longius, eò sunt deteriores: hæ autem omnes sunt frigida primo gradu, sicca secundo. Siccandò enim excrementa partium putrida valèter absumunt, mollesq; partes & laxas dant, & densant, multa que adstrictione cogunt. Cor, stomachum, reliquumq; ventriculum, & hepar roborant: quapropter exhilarant, colorem cutis, odorem oris, & sudoris commendant: corpus floridum & iuvenile diu trahitur, tremori cordis conferunt, hæmorrhoidibus commodant. Purgant ventriculum bile, ab eaq; tertianam, & reliquas febres biliosas & ardorem extinguunt, præsertim citrinæ. Hæ enim præter cæteras sunt cholagogæ: ob id calidis & biliosis naturis salubres. Ex æm omphacio, vel aqua rosarum, vel succo feniculi macerata, confriatæ, oculum tergent, intemperiem eius calidam auferant. Earum quoque puluis tenuissimus, per se quidem delachrymationem stringit, oculum ab humore multo laxiorem inuat: cum mastiche verò, vlcera siccandò sanat. Cepulæ verò sunt phlegmagogæ, ventriculum purgant, & roborant, rationalem animæ partem vegetant, visum [& sensus alios] acuunt: præsertim conditæ, hydropi & febribus diurnis conducunt. Nigræ melancholiam purgant, & bilem visam, tremori, tristitia, lepra, quartana, & cæteris effectibus melancholicis prosunt, coloremque cutis viuidum efficiunt. Quia verò hæc myrobolani omnes obstructionem promptè excitant, in corpore obstructioni opportuno, & villis ventriculi, & intestinorum facillè adhaerentes, ceu rugis quibusdam ea exasperant, non dantur obstructioni obnoxij: aliis verò datur cum diueticis

ticis, vel infusæ sero lactis, vel succo fumarizæ, vel cum absinthio, agarico, rhabarbaro, spica nardi. Oleo autem amygdalarum dulcium, vel rosato, vel violato, vel sesamino imbutæ & conficatz, vel cum amygdalis dulcibus, aut visis passis, aut hatum melle tritzæ, vel cum cassia, vel manna, vel tamarindis, vel violis conditis, vel alio leniente medicamento sumptæ, ventriculum & intestina leniunt, & citò per ea lubricant, etiam si quibusdam aliter visum est: neque amplius his adherent, aut rugas inducunt.

Datur citrinarum tritarum pulvis à drachmis duabus ad drachmas quinque: maceratarum verò expressum, à drachmis quinque ad drachmas viginti. Indarum & cepularum pulvis à drachmis duabus ad drachmas quatuor: expressum infusarum à drachmis quatuor ad drachmas decem.

Veruntamen harum decoctum promptius, & valentius obstruit, quàm maceratarum expressum. Assæ item ipsæ minùs purgant, potentiùs constipant, & adstringunt, & his magis vstæ. Harum quoque tritarum pulvis quò tenuior, eò vehementius adstringit: maceratarum verò expressum, minùs adstringit, omnium maximè purgat. Cepulæ verò conditæ purgant quidem minùs, partes nutritorias roborant magis: non conditæ contrà.

De Emblicis.

Emblicæ parum frigent, siccant ordine primo, pituita etiam putri ventriculum purgant, eumque & cerebrum, nervos, cor, hepar, & partes laxas constringendo roborant: ob id tremori cordis conferunt, appetentiam inuitant, vomitum sistunt, furorem & latratus eius cohibent, vim animæ rationalem augent, calorem viscerum insigniorem, & inde natam sitim extinguunt. Præstantiores sunt magnæ, carnis multæ, densæ, graues, ossium paruorum: largius purgant, & rugis ventriculo minùs incommodant, si aqua in sole macerentur, donec amectatz tuesant. Postea expressæ multa bi duo macerantur, igni lento coquantur: vbi coctæ tefixerint, mellis albisimi parte quarta exceptæ reconduntur: aromatis quoque cinnamomo, xylaloë, cardamomo, croco, gallia, & similibus nonnulli condiunt.


De Bellericis.

Bellericæ etiam sunt benignæ, & roborant: frigida primo gradu, sicca secundo, cætera emblicis viribus proximæ. Optimæ sunt magnæ, multa & densa carne, graues.

GG

TAMARINDI





Tamar-Indorum semina recentia Cassia quadamtenus, sed maiora & angulosa, quadrati pisi ritu, compressiora tamen è siliquis carnosis & multis fibrarum cirris implexis Phaseli nostratis maioribus, quales in G. Driesch, & aliis instructissimis officinis Antuerpiæ prostant (minimè è palmulis aut eius generis fructibus, vt multi credidere, qui non viderunt) in horto lata præfati G. Driesch nobis perelegantes arbusculas sesquipalmares sæpè pepererunt, quæ hyemis rigoribus periere. Eorum vnum hîc pictum damus. Foliis vtrinque ex aduerso oppositis ordine secundum costæ aut pediculi longitudinem Osmundæ vocatæ filicis modo digestis, virentibus, & gustu acidis, quæ contrahuntur & clauduntur per imbres etiamque ad Solis occasum.


Picrocolis saluberrimi. Infusione purgant biliosum humorem extinguntque, & pituitam incidunt, attenuant: sitim delent: exsiccant & refrigerant initio tertij ordinis.

De Tamar Indis.

MESVE. Medicamentum excellens ac innocens, frigidum siccum ordine secundo. Ob id humorum acrimoniam reprimit, bilem purgat, eiusque & sanguinis feruorem furoremque compescit, febres acutas lenitione egentes & icterum sanat: sitim ac omnem ventriculi hepatisque ardorem extinguunt: vomitum sistit.

Ne ventriculum frigidum lædant, cauerat mistis hunc roborantibus, spica nardi, mace, mastiche, succo abanthij, feniculi, apij, inrybi, cichorij agrestis. A cationem verò eorum imbecillam intendit serum lactis capriol, vel succus fumariz, lupiue salictarij. Mâcerantur autem sextuplo prædictorum liquorum, vel aliorum simplicium, aut compositorum, vt triplicis granatis deinde manibus seicantur, post se mel ferueant: postremò colantur, donec potio sit liquida & clara, præsertim quando sanimentum calorem citius extinguere libet: quando etiam rosæ, santalis præcipud, citrea, spodium simul cum his macerata, vt potentius refrigerent. Non colati quoque dantur, quando potentius ardor ille extinguendus est.

GVANABANVS Scaligeri forte Clusio.



Thamarindis annectere visum fuit simili de dote, consimiliq; vsu, graphicè à G. Clusio nostro, stit-
pium rariorum huius ætatis doctissimo depictos Canabanos: vt cuius folia lautina, renis effigie semi-
na durissima, & Thamarindi albidam saporis medullam fragilem, præficcam, sæpius degustarim, etiam
apud Guilielmum Driesch pharmacopœum & ciuem Antuerpianum peritissimum.

Clusij autem verba hæc sunt ex Ouiedo.

GVANABANVS procera arbor est, & formosa folio eius Medicæ mali quam Limoneram appel-
lant, virente: fructu pulcherrimo, mediani Melonis magnitudine, qui tamen interdum in capitis pue-
ri crassitudinem excrescat. Cortex huic fructui viridis, & qui certis quibusdam squamis distinctus vi-
deatur, vt Strobilus, lentioribus tamen neque ita tumentibus, quandoquidem totus cortex tenuis sit
neque crassior quàm in piris. Caro candidissima saporisque delicatissimi, quæ faciliè pinguedinis lactis
instar, in ore resoluitur. Per eius carnem sparsa sunt semina magna, Cucurbitarum seminibus aliquan-
to maiora & nigricantia. Frigidus est hic fructus, & per æstus utilis. Nam tamen quis integrum Gua-
nabanum deuoret, nihil inde sentiet nocumentum. Infirma est ligni materies. Hæc Ouiedus.

CETERVM hic Gvanabanus diuersus est ab eo, cuius Cæsar Scaliger lib. de Subtilitat. aduersus
Cardanum exercitatione 281. part. 6. meminit in hunc modum.





GVANABANVS arbor est Pini stipite, procera, folio magno oblongoq; fructus Melonis magni-
tudine: cortici color viridis, splendor Cydonij, digitalis crassitudo. Caro intus candida, dulcedine la-
ctis coacti, semina continet phasolacea. Hunc enim esse puto qui superioribus annis ex Æthiopiae Mo-
zambicæ Antuerpiam allatus est. fructus crassus, sesquipedali longitudine, cui densus durusque cor-
tex tenui molliq; vt in cydoniis, sed viridi lanugine obductus, aliquot per longitudinem excurren-
tibus venis, siue potius sulcis vt in Melonibus. Extrema parte in mucronem definit: superiori verdè,

qua videlicet è ramis dependet, pediculo inhaeret firmo duro & fibroso. Continet hic fructus palpata candidantem, quæ *Aethiopes* in febrium ardoribus videntur suis sedandæ gratia, iucunda etenim aciditate prædita est. Hæc siccata friabilis est, sic vt digitis trita in pollinem resoluatur, remanente tamen perpetuo aciditate. Per hanc sparsa sunt semina renibus, aut *Anagyridis* legitimæ fructui similima, nigro tamen colore nitentia, ac ex umbilico fibris quibusdã suspensa, vt in eius icone conspiciere est. Hæc terre commissa, plantulas folio *Laurinis* simili protulerunt, sed quæ subsequente hyeme perierint.

Plura pete ex Clusio in suis doctiss. Garcia versionib.

Fructus FIGVERO apud Clusium.

ΑΝΟΥΑΥ ΤΗΕΥΕΤΙ apud Clusium.



CIVS. Porro apud me *seuo* ex huius fructus aut huius similis seminibus, quibus exempta est medulla, lora duo filo xylino contexta: alia item bina è fructu quædam angulosa. Constant verò singula lora duplici aut triplici filorum xylinorum ordine reticuli modo contextorum, è quibus dependent vacui fructus eo quem exprimi iussimus modo. His Canibales ad curia alligatis in suis saltationibus vt solent, quemadmodum apud Mauritanos atque etiam Hispanos polaram & tintinnabulorum vsus est: mirum etenim quantum hi fructus ex mutua collisione sonitum edant. Posterioris meminit Thevetus cap. 36. Singular. Americæ in hunc modum.

ΑΝΟΥΑΥ nomen est arboris fructu venenoso & lethali, magnitudine vulgaris Castaneæ candido, forma literam Græcam Δ representante. Huius nucleus præsentissimum est venenum, quod alter alteri in mutuis oditis & dissidiis, præsertim verò viri vxoribus insensu, aut contra vxores viri indignate propinare solent. Peregrinis sanè nullo modo eum fructum recens collectam communicant, atque ab eius etiam contactu liberos suos arcant, nisi cui exemptus sit nucleus. Eo etenim exempto, fructus pro nolis vtuntur, quas è cruribus suspendunt, tantumq; sonitum edunt, quantum tintinnabula aut nolæ nostrates. Arbor ipsa *Piri* magnitudine, folio ternos aut quaternos digitos longo, duos lato, semper virente: cortex ligno candidans. Recisi rami succum emittunt lacteum. Arbor præcisa teterissimum spiritum odorem: quam ob causam nullius est vsus, imò ne igni quidem struendo idonea.

ΑΝΟΥΑΥ Theveti mihi communicauit præclarus vir D. Ioannes Dilsius, qui Clusio acceptum referrebat.

LOTUS arbor. Aduers. pag. 439.
 Mansfellianis catervis, Linguagottis Micocoulier.
 Gallis nonnullis Alytiet. Hisp. Almez. Ital.
 Bagolauro, & Perlaro.

GVAIACVM Patavinum. Vera LOTVS Theoph.
 Aduers. pag. 439. & 440.



DIOSC. Alium ficit baccis: ramentorum ligni decoctum siue potus siue infusione dysentericis, ac seminis fluxione vulna laborantibus, auxilio est. Rufas capillos: citam aluum cohibet.

GVAIACVM INDI CVM.

Omnibus morbis ex humore praesertim frigido ortis medetur: amaritudine, acrimonia, incidit, attenuat, terget, vacuat, sudores mouet, cutis vitia emendat.

EG. EBENVS. Gal. Ebene noir. Hisp. Ebanca.
 Lege HEBENVM, siue XYLADES Officinarius.

DIOSC. Ebenus optima habetur aethiopia & nigra, nullis habens venarum distractus, foliisq; cornu ianore. cum frangitur densa apparet, mordens gustu, atque astringens. si ficitur in oleo odore supra carbones. sine sumis adio. recens autem ad ignem prolata, ob pinguitudinem accenditur. & erit ad eorum flammam. altera est indica, interuentis fragmentis candidioribus, & modice fuluis, uem frequentibus maculis. cateris prior, bonitate antecedit. Apud quosdam sesamini, aut spinos ligna consimilia pro ebena vaneunt. quod discernitur ex eo, quod sanguis sunt, & in purpureis asfelas resoluuntur, nihil mordacitatis in gustu, nec redolentia in suffitu praesentia. Cuiusmodi officinarum nosseger. ad veteres de-

res de stillatione, pustulatiq; mirum in modum pōllēt. si quissiem facta ex eo corticula collyriis utatur: melius proficiet. ad oculorum medicamenta efficacē est, si scobes ramentave vino Chio die noctiq; macerata, in collyria digerantur. Nonnulli per trita ipsa excolant, reliquaq; eundem in modum peragunt. alij pro vino aqua utuntur. Vritur in felle natio, donec in carbonē redigatur. laenatur plumbi vsti modo, & ita siccis scabruq; lippitudinibus conducit.

πυρίπα. TILIA semina Theophr. Aduers. pag. 440.
Angl. Linden tre. Germ. & Belg. Ainden. Gal.
Tillet, & Tilleul. Hisp. Teja. Ital. Tilia, & Teio.

TILIA mas. Aduers. pag. 440.
Germ. Steinelinden. à natalibus.
Ital. Tilia Maschio.



Tilia cortex commansus & appōsitus vulnera glutinat. Tumores pedum, decoctum foliorum discutit. Dissēctæ arboris è medulla defluens humor illitus alopecis medetur; defluentem capillum retinet. Math. Aqua è floribus distillata epilepticos pota, sua peculiari dote, iungit.

πυρίπα VLMVS. Aduers. pag. 440. Angl. Elm tre. Germ. Elmst, Effenholz,
Rissenholz, Aindhaß. Belg. Olmdoorn. Gal. Omcau. Hisp. & Ital. Olmo.

Dioscor. Vini & felle & cortex & rami, vinu habent spissandi. Folia trita ex arce ad lepras efficaciter
linuntur. vulnera glutinant, sed multo magis corticis tilla, si fascia leca interqueantur. nam in iori morem sticti potest.
crassior cortex in vino aut aqua frigida vicietum potus, pituitas trahit, fracta ossa celerius solidosunt, si decoctio fo-
licum corticis aut radicis sponantur. humor in folliculis enascens prima & germinis erupit, cuti illius visorem in dactis
facit.

faciemq; splendidiorē præstat, quæ dum siccat, in animalia abis, quæ culicium formam gerunt. Folia cum teres-
rescunt cocta, olerum more ad obsonia vsurpantur.

CARPINVS. *Aduers.* pag. 410.
Gallobeigis Carne. Ital. Carpino.



Substantia Vlmi duriori, cortice subalbicante.

BETULA



BETULA. *Aduers.* pag. 440.

Germ. Birkenbaum. Belg. Berkenboom,
Gallobeigis Bouleau, & bouillet. Ital.
Betula, Bettola & bidollo.

Creinati ligni emanans liquor oculorum albes-
cines & cicatrices ceter.




Καύσις. ALNVS inscribatur lin. 43. Aduers. pag. 440.
 Germ. Eulenbaum. Belg. Elyen. Gal. Aulne. Ital. Alno.

Humor cerebello caudice perforato emanans diutiùs epotus ad comminuendos vesicæ & renum calculos Matthiolo commendatur. Cutis vitia emendat, & nitorem conciliat: collutione oris vlceribus medetur.

AMELANCHIER Gallorum. Aduers. pag. 441.
 Auclancques Lingu. agottorum.
 Lege an eadem Alifict Gallorum?

CORYLVS persimilis Alno. Angl. Hazel tree.
 Aduers. pag. 441.



CORYLVS.

Anellanz concoctu difficiles, quemadmodum ceteri duriore nuclei.

Diosc. Stomacho infesta sunt: ipsa tamen trita & in aqua truisa pota, tussè veteri medentur. Tosta & cum exiguo piperis pete distillationem concoquunt. Crematorum cinis cum arungia aut adipe vrsi perunctus alopecia & capillum redat. Aunt nonnulli vsta earum putamina, & in cinere specieo redacta, cum auro, castoreum oculorum pupillas infecibus denigrare, partuso facipies.



αἰϋλὸν, POPVLVS alba. Gallobelgic Obcau, Aubel, ou Obel. Belg. Abzelboom. Hisp. Almano blanco. Germ. Abzelbaum, Doppelbaum, weis alberbaum, weispopel weyden. Ital. Popolo bianco. *Aduersf. pag. 441.*

αἰϋλὸν. POPVLVS nigra. Gall. Penphier. Angl. Asp, or poplar tree. Ital. Popolo negro. Germ. Aspen & popel weiden. Hisp. Alcano negro. Belg. Populier & Populierre. *Aduersf. 441.*




Diosc. Populi albae cortex vnicia vnius pondere, ischiadicis ac vrinae stillicidio prodest. Abortiuum fieri tradunt, si cum mulino rene bibatur. folia quoque, cum vino post purgationes pota, idem praestare produntur, tepens foliorum succus vtiliter aurium dolori instillatur. Pitula qua primo foliorum partu exiliunt, illa cum melle oculorum hebetudini medentur. Memoria prodiderunt, corticem albae populi & nigrae, particulatim casum, & salis Heracoris mandatum, omni tempore anni edules fungos proferre.

POPVLVS nigra.

Diosc. Populi nigrae folia cum aceto illa magna vtilitate podagricis doloribus illuantur. Resinam populus fundit, qua in malagmata additur. Semen possum ex aceto comitialibus vtile est. Embryonans populorum contingunt qua in Padem annem destuat, durari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij ebryphoram, id attritu incensum odorem spirat, & acrisa colore imitatur. tritum potumque stercoribus ventrisque fluxiones sistit.



Populus Ly-
bica.



Populus Libica. Ital. Popolo montana.
Libica Plinij, Crataegus Theopb. quorundam.
Quibusdam Gallobelgis Nicip: Flandris item
Aispenboom. Aduers. 441.

ARBOR Indica. Siliqua fyl. Clusij.
Acacia Matth. Aduers. 441.

lege Xeran-
peli.

Floribus albis variat.

Morus a ἠρυνάκων. MORVS candida.
Morus celsa officinarum.
Germ. Maulbeerbaum. Angl. Mulberry tree.
Belg. Meerbeesten boom. Gall. Meurier.
Hisp. Morai: Mora autem Moras.
Ital. Moro. Aduers. 441.

MORVS.




lege facit
dulcia in 12
& 18. A-
pocini; &
pud. ant.
lege similes
in 12. in 12.
continuo
he.



MORVS.

Diosc. Morus arbor nota est: cuius fructus aluum soluit. Stomacho inutilis est, & facile corruptionem sentit. Hoc idem praestat mori succus, decoctus autem aro vase atque insolatus, adstringentior redditur. facit ad fluxiones, moruas, & tonsillarum inflammationes, addito mellis exiguo. Sed inolefit vis eius, adiecto scissili aluarine, galla, croco, & myrrha, item myrica semine, iri, & thure. Immatura mori poma siccantur, tusaq; acinorum hoi vice obsonijs miscentur, ut colicacos iuuent. Radicis cortex decoctus in aqua & potus aluum resoluit. latus ventris tinea excutit. hic quoque auxiliatur qui aconitum hauserunt. Folia trita ex aceto illita, ambustis igni medentur, tinguntq; capillur, vitium & fici nigra frondibus simul coctis in aqua caelesti. Succus foliorum cyathi mensura potus contra phalangiarum morsus auxilio est. Feruofacti corticis & foliorum iure dentes aprissime in dolore collauntur. Radix circiter messem incisa, facta in ambitu scrobe, succum emittit, qui posttridie concretus inuoniri solet. Is in dolore dentium efficax est. tartzcula discutit. & aluum purgat.

SYCOMORVS.



Sycomorum aliqui etiam sycaminam, id est morum, vocant. cuius fructus sycomorum etiam propter inefficacem gustum appellatur. Arbor est magna, fico similis, frondosa, multo lacte abundans, folijs mori, pomum ser aut quater anno fert: non ramis, ut fici, sed caudice ipso, caprisico non dissimile, dulcius grossis, sine granis interioribus, quod non maturescit, nisi vngue aut ferro scalpatur. Nascitur plurimum in Caria, Rhodo, locisq; non multum tritici feracibus: ubi proventus sacundo restibilia, inuamentum adfert, cum annona caritas premit. Pomum aluo vile est, sed perquam exilem prabet alimoniam. Stomacho aduersatur. Succus primo vere tenera arbore, ante quam fructum ferat, eximitur, lapideus ista summo cortice desquamato: si enim altiore plaga violetur cortex, nihil effluet. Spongia aut vellere lachryma excipitur: qua siccata & in pastillos coacta fictili vase reponitur. Vis succi emollit. vulnera congelat. discutit collectiones coctioni repugnantes. bibitur etiam aut illinitur contra serpentium morsus, duratos lienes, stomachi dolores, & persfrictiones, celerrime terebinthum sentit. Cignitur & in Cypro arbor genere distans, qua cum sit vltimus, praedita tamen est folijs sycomorae, fructu prami magnitudine, multo dulcioro, supra dictis caetera simills.



est exprimentur: & siccatu in umbra reponitur. Et lac & succus imponantur exulceratorij medicamentis. Decocti cum bubulis carnibus ramuli ficulni, faciliem afferunt decoctionem: lac efficiunt quod magis soluat, si inter coquendum ficulneo furculo spatula loco moueatur.

* omnia ferè eadem Plin. * Plin. eadem subdit: aut potus cum amylo pilos quoque detrahit, palpebrarumque scabiem emendat. * Plin. aduersatur crabronum, vesparemque, & similia venenis, priuatim scorpionum.

epurati, Grossi. Aduers. 442.

Diosc. Grossi, qua erinei nonnullis vocantur, cocta, illita firmas nodosq; omnes emolliunt. cruda sermiceas, verrucas & thymos, nigro farinaq; additis, tollunt. Folia eadem pessunt, illita cum sale & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanant. iis sicose exuberationes, & genarum scabritia persfricantur. Nigra ficius folijs cauliculisq; candida vitiliginis perunguntur. faciunt ad canum morsus, & vlcera qua ceria, id est sanos, vocant. Grossi cum syluestris papaueris folijs ossa extrahunt. furunculos cum cera discutunt. contra muris aranei morsus, & scolopendra venena, cum eruo & vino illita, auxiliantur. Fit ex cinere ficius tam syluestris quam satiuæ lixiuuium, crematis ramorum cauliculis: quod subinde macerari opus est & inueterascere. siquidem inter caustica intelligitur. Gangranis prodest: namque expurgat & consumit qua excreverunt, eoque sic vtendum est: Spongia asidua hoc lixiuuium imbuita superponitur. Interdum dysentericis, & inflexiones vetustas, & sanis cuniculatum exedentes, magnoq; instillari conueniet. Etenim purgat, congluinat, carne replet, & oras committit, non secus atq; emplastra qua aruentis vulneribus iniiciuntur, enama vocant. bibitur ad discutendum sanguinem concretum: & contra precipitationes, rupta, conuulsi, cum cyatho aqua recenter colatam, addito olei exiguo. celiacis, dysentericis per se cyathus datus prodest: neruorum vitij, conuulsionibus commodè illinitur ex oleo, vt pote quod sudores moueat. aduersus gypsi potum & phalangiorum morsus bibitur. Hac eadem praestant reliqua lixiuua, praesertim quernum, omnia tamen adstringunt.

Syce. Ficus arbor.

GAL. Ficus arbor calidæ tenuitumque partium temperaturæ est, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum vterque calidus est. Itaque non mordicat tantum, aut vehementer abstergit, sed & vlcera, & ora vasorum reserat, & verrucas quas myrmecias vocant, eiicit, sed & purgare potest. Porro ficus agrestis, quam erineum Græcè (Latine caprificum) nominant, tum opus, tum succus ad omnia quam satiuæ valentior est. Sed & cradæ carum aded sunt calidæ, tenuiumque partium, vt carnes bubulas duras, si coquendis adiiciantur, friabiles ac teneras efficiant.

* ramus ficulnei.

Syca. Ficus.

Gal. Ficus aridæ vim habent exalfaciendi ordine primo etiam cōpleto, aut secundo incipiente: habent verò etiam partium tenuitatem quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt quæ tubercula dura concoquant: statim verò etiam ea digerant. Atq; ipsæ per se illitæ eiusmodi vim obinent. Sed & decocti earum eiusdem vique naturæ est. Verum vbi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea: vbi verò plus digerere, hordeacea: panis horum in medio. Sed hæc magis sunt propria tractatus De medicamentorum compositione, & rationis curandi: verum in præsentiarum hæc de ischiadibus nouisse sufficiat. Porro scire oportet, quod quæ pinguiora sunt, magis possunt concoquere: quæ verò gustu acriores, magis tum extergere tum digerere. Cæterum quod ex iis plurimum in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentiâ, sed & facultate. Porro ficus vitides comesæ propter admistam humiditatem facultatis sunt imbecillioris: subducunt tamen aliam vtræque tum humidæ, tum sicæ. Porro ficus caprifici acris & digerentis facultatis sunt: sic etiam domesticatum grossi, Græcè vocant ἀλύβης: inest enim illis nonnihil etiam succi ex ficu arbore.

PLATANVS. Gall. Plane. Ital. Platanò. Germanis incognita.

Aduers. pag. 442.

Diosc. Tenerimus Platanus folia in vino decoctis, max. illita, & oculorum fluxiones sistunt. Tumores & inflammationes leuant. Decoctus cortex in aceto, dentes in dolore colluit. Virides pilula in vino pota, Serpentinum morsibus auxiliantur. Excepta autem adipe, igni ambrosia fiant. Insidens foliorum pilularumque lanugo oculos & aures offendit.

Gal. Platanus humidioris frigidiorisq; essentia est, non ita multo quam symmetra. Proinde folia viridia trita & illita, non obscure phlegmonas nascentes adiuuant. Cortex autem & pilula magis desiccantem vim obtinent, vt ille quidem in aceto coctus ad dentium adhibeatur dolores, pilula verò cum adipe ad vlcera ambusta. Sunt autem qui cortice combusto medicamentum desiccatorium & adsterforium efficiunt, vt cum aqua lepras sanet: per sese autem illitum, ob humorem nimium vlcera vetera & fordidâ. Vitandus est puluis folijs arboris insidens: alioqui si spiritus attrahatur, arteriam offendit, valenter desiccans & exasperans, vocemque lædit, sicut sanè etiam visum & auditum, si in oculos aut aures incidat.

Acer majus
Cordi.

leg. frequen-
ter. h. 39.



ACER majus Cordi. *ακτιζοζον* Anguillara.
Gall. *etiam* Plane, quasi i latane. Ital. *Pie d'oca*
& *Platano aquatico*. *Advers.* 443.

SORBUS terminalis Plin. *Advers.* 443.
Cratagus Throop. *Angill.*



Ox. scutic.



OXYACANTHA. *Cynobatos* Tragi.
Hisp. Espino de maucelas. *Angl.* *Baudhojntre;*
& *Advers.* pag. 443.
Sorbus aculeata Cordi. *Spina* appendix Plin. *Gesnero.*

Diosc. *Huius* baccæ potu aut cibo alui profusionem
& abundantiam sanimarum sistunt. Radice illa aculeos
& spicula extrahit. Abortu fieri tradunt, si ter radice ven-
ter, aut sensim feriatur, aut perungatur.

Varietas. Augusto, & ipsa bruma nonnusquam
in Anglia floret, alioqui non absimilis.

Gal. Arbor ut Pyre sylvestri similem habet spe-
ciem; ita & facultates micimè dissimiles: quin &
ipsi fructus Pyri quidem sylvestris prorsum & ab-
solutè austerus est; Oxyacanthæ autem tenuiter
partitur est, & modicè incidit. Porro arboris huius
fructus Pyri syl. similis non est, sed Myrti potius
fructui habet verdè & u. oleos. Ceterùm non tantum
esue, sed & bibitus omnes fluxionum affectus
cohibet & sistit.

SAMBUCVS aquatica sine rosea. Lycostaphylus mas & familia Cordi.
Belg. Gelbers rooten. Aduers. 444.

AMOMVM. Aduers. 444.

Diosc. Vin. habet calfaciendi, astringendi, exiccandi. Somnum allicit, & illius frontis, doloris sensum auferit. inflammationes & meliceridas concoquit, discutitq; iuuat quos scorpium percussit, ex otimo illitum. & podagricis confert. inflammationes oculorum viscerumque lenit ex vna passa, ad vitularum vitia in pectus, aut in seffionibus vitale est. decoctum iocineri, renibus, podagrae, potu conuenit. Antidotis immiscetur, & preciosissimum vnguentu. Adulteratur herba amomo simili, qua amomis vocatur, sed sine odore, sine fructu, nascitur in Armenia, flore origani. Quare in huiusmodi probationibus fragmenta fugienda sunt: eligenda autem, quae ab vna radice integre surculos emittunt.

MESPILVS Aronia.
Monsbelliensibus Pommetz.
Ital. Azaroli.
Aduers. 443.

RIBES Arabum: Gallis & Gallobelgis Grouseilles rouges & Grouseilles d'outremer. Ital & Hisp. Ribes.
Germ. D. Johans treubel & Treublin. D. Johans beerlin. Belg. Zelbellen. Aduers. 445.



lego Colaniz.
lib. 12.


Ribes Arabum.

Gustus & vires Berberidi similes, ad acres alui fluores, scilicet & vomitus arcena. Anglies vdis illis gaudet.

Varietas. Candidioribus folijs & ramulis Ribes in hortis Belgicis alitur, cuius acini dulces afferuntur. Apud nos floret, fructum tamen nullum edit.



Rosa Hiemalis
virens.




ROSA HIERICONTIA. *Advers.* 445.
Folia parva Olea aut Monspelliacae Phytocomas-
tis, & flosculos albos, cauliculo palmari inhaerent-
es Bamia ritu, quatuor foliolis conflatos Erythimo-
pares in alabastriculis oblongis habet.

CARDAMOMUM.
Advers. 445.

Diosc. Cardamomum optimum est, quod ex Co-
magene, Armenia, Eosphoroq; denebitur. in India quoq;
& Arabia provenit. Eligi debet plenum, fragentis conti-
max, ocllusum, siccumq;. quod enim huiusmodi non est,
exoletum indicatur, & gustu acre, subamarum, & odore
caput tentans. Excelsioriam vim habet, pituitumq; ex a-
qua facit ad comitiales ischiadicis, tussis, neruum res-
olutionem: item ad rupta, vulsa, tormina. Latas ventris ti-
nos excutit. Hoc vino autem potum remibus, difficultati
vrinae, a scorpione ictis, neque non omnibus venenarum vi-
brantibus, auxilio est. Cum cortice radice latri epota dra-
chma calculos comminuit: partus suffitu enecat: scabiens
ex aceto illitum admittit. Et ad unguentorum spissamentum
additur.

Gal. Est & ipsum sanè facultatis admodum ca-
lida, non tamen usque adeò ut Nasturtium, sed
quanto si vius magisq; fragrans est Nasturtio, tã-
to & imbecillior ei calida facultas inest. Nec enim
vicerare idoneum est vel ipsum per se illitum: por-
ro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis,
qua lambricos interficis, & cum aceto valenter
psoras detergit.


Cardamomum minus vulg.



Cardamomum minus vulg.



Cardamomum minimum.



Cardam-
mum.



Millegna
Grana par-
dit. *Advers.*
pag. 445.



Piper longum Monardi.

Piper longum. Μακροδύ τιππερι, Matropiper. Aduers. pag. 445. & 426.
Angl. Long pepper. Germ. Lang pfeffer. Belg. Lange peper. Hisp. Pimienta.



Diosc. Vehementius mordet, subamartum relinquitur, antidotis & theriacis experitum.
Gal. Humidius * est: humiditatis eius indicium est, quod facile repositum perforatur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, verum plasculum duret.
Calidum & siccum secundo ordine cum leni acrimonia & adstrictione.

* De recens
intelligend-
um.

Piper longum quoddam Monardi.

In doctissimis C. Clusij versionibus Monardi his verbis aliud Piperis longi genus describitur.

Toto continentis tractu in quo Nata, Carthago, & etiam in nouo regno, magnus est vsus piperis cuiusdam oblongi, quod maiore acrimonia præditum est Orientali, magisque aromaticum, & iucundiore odore spirat, quam Axi seu Capsicum; quinetiam præferatur piperi nigro, cum saporis, tum suauitatis causa. Alæ cuiusdam plâte fructus est oblongus, crassitie quidem funiculi, at dimidij pedis longitudine, constans veluti multis granulis, circa pediculum oblongum & continuo ordine dispositis, seminibus Plantaginis modo; quibus ademptis, pediculus nitidus conspicitur. Recens viridis est. Sole maturescit & nigrescit. Calidum est tertio gradu.

Legè *Vva crispa*, Aduers. pag. 445. *Vitis precia* Plin. Angl. *Goos berry*. Ger. *Wegdorn*, & *Crutzherr*. Belg. *Drechselbessen*, & *hroesbessen*. Gal. *Groiseliier*. Hisp. *Vua crispa*, sive *Espina*. Ital. *Vualpina*.



Refrigerat cum modica adstrictione. Viscerum æstus compescit; ideo febribus ardentibus vtilis saccharo conditi. Sanguinis & ventris eruptionibus opem ferunt. Folia tenera calculum & vrinæ pellunt. Cum Berbere, Omphacio & Rube consimile munus obit.



Idem. ROSA. Angl. Germ. & Belg. Rosenbaum.
Gal. Rosier. Hsp. & Ital. Rosa. Advers. pag. 446.
ROSA DAMASCENA.

ROSA sylvestris pomifera.
Advers. pag. 446.
Belg. Dennen Rosen.



Damascena varietas.

Rosam Damascenam siue Provincialera vulgi odoratissimam niceis omnino floribus vel tantillo candore & rubore confusis, maximo proventu aiebat Gandavi D. Adrianus vander Gracht horum peritissimus, & studiosissimus.

Diosc. Rosa refrigerat & astringit, sed sicca multo magis. Succus recentibus foliis exprimitur, desectis forfice vnguib; (sic appellantur candida foliorum partes) reliquum in pila premi & teri debet in umbra donec cogatur: & ita ad oculorum circumalitionen recendi. Sic canitur etiamnum folia rosarum, continuè versata, ne maseant, neve sitis in eis insidiat. Arida rosas & in vino decoctis expressus liquor facit ad dolores capitis, aurium, oculorum, gingivarum, sedis, rechi intestini, ac vulva pinnâ illitus aut insusus, eadem sine expressione tusa, pro acordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitis, igni sacro illini prodest. sicis ac tritu semina asperguntur, miseri solent videri arith antelotis, atq; vpositionibus quas antheras vocant. Folia vruntur in calliblephara. Flos qui in medijs rosis inuenitur, siccatu; gingivaru fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota cum cinam. & cruentas reiectiones fistunt.

Commodior & efficacior Syrupus ex multis infusionibus in sole ut violaceus paratur.

Gal. Rosarum vis ex aqua substantia calida mixta duabus alis qualitatibus, adstringendi videlicet & amarae composita est. Flos eorum magis etiam ipsis rosis adstringit, & proinde etiam sanè exiccatoz est.

Sylvestris Rosa, & CANINA ROSA odrata. Advers. pag. 446. Angl. Wildrose or Dogrose, sus
Hsp. Wilder Rosen, & Hechrosen. Belg. Wilde rosa. Gal. Esulentie
Hsp. Rosa saluage. Ital. Rouo canino, Rose saluatico & canine.

Rosa sylvestris & Caninae fructus oblongi, cum teretes, tum orbiculati, & spongiosum villositate
excrementu in pollinem ducta, calculum comminuunt cum garrista fœmine pota, vias propellunt,
vnguis prodena sistant.

ESULENTINE.

Flore multiplici in hortis nostris variat.

Esulentine à sylvestri odore differt. Sponte oritur in Bathonia Anglie proximis collibus non
cul adradibus generosi vici D. Laurentij Hyde.

ROSA MOSCHATA. Nervis Serapionis Anguillare.

Eadem fere
PEn.
ad oris medi-
camentum con-
uenit illa.



RUBVS. *Advers.* pag. 446. *Offic. Morus bassus.*
Angl. Bramble bush, & black berry bush.
Ger. & Bel. Ronce, & Ronce. *Gal.* Ronce.
Hisp. çarça, *fructus* verò çarçamoras. *Ital.* Ronce.

RUBVS Idæus. *Advers.* pag. 446.
Angl. Strawberry, & Pinckberry.
Germ. & Belg. Dinnrbjamen. *Hisp.* çarça
 llamada lida.



Diosc. *Vim* habet sicca & adstringendi: capillum tingit: Ramorū decoctum, potu* alium sistit, & semin-
 arum profutura, praeteris marsui accommodatissimum, gingivas firmat. Oris vitis folia commanucata medentur, cobi-
 bēt vicera qua serpunt, vicribus in capite maxillaribus, oculiq; proidentibus, remedio sunt. Condylomatibus & hamer-
 rhoidibus solia illinuntur, cardiacis & stomachi doloribus, trita convenienter imponuntur. Caules cum foliis trunduntur,
 exprimiturq; succus, mox sole cogitur, singulari remedio, contra omnia qua modo dicta sunt. Mox in rivo nascentis, quē
 optime maturi succus, ad oris medicamenta convenit, sistitur alius pransatur rivo, necnon flore in vira potō.

* Eadem Plin. laborantes dentes firmat. Cinis crematorum vram reprimat Plin. Eadem & plu-
 ra apud Plin.

Eadem Gal. Radix praeter adstrictionem non paucam in se habet substantiam tenuem, propter quā
 etiam in renibus lapides comminuit. Folia, germina, flos, fructus & radix qualitate adstringente par-
 ticipant, eaq; non obscura: Sed hoc inter se differunt, quōd folia mollia & recens nata plurimum in se
 habeant aquae substantiae, parum verò adstrictionis, eadem ratione & germina. Itaque si mandantur,
 aphthas & alia oris vicera sanāt, quin & alia vulnera glutinate valent. Est enim eorum temperies, par-
 tim ex terrea frigida essentia, & aquae tepida. At fructus si quidem maturus fuerit, non parum habet
 succi calidi temperati, qui dulcis est, uti monstrauimus. Itaque ob hoc & ob modicam adstrictionem
 eius non insuavis est. At immaturus à frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est ac exic-
 catorius. Et sanē vtrique reconditur validius quā recens desiccans. Sed & flos eandē vim fructui im-
 maturo possidet, vtraque ad dysenterias, & ventris profusum, tum rebur deperditum, & sanguinis
 eruptionem idonea remedia.

RUBVS Idæus.

Diosc. *Insuper eandem praestat qua spiracillus.* Caterum flos cum molle oculem tibi. Stomachum committit
 illinunt, ignem sacrum extinguunt, stomachicis, et aqua bibenda datur.



ERICA quam multa differentia.

Multò plures Ericæ quam præcis memorare varietates, præsertim in Gallia Narbonensi & Hispania conspiciuntur; quarum qui unam nouerit, cunctas cognitæ facile habebit: distant quippe fruticis proceritate, folio Myricæ, Iuniperi aut Laricis, & floris colore: non modò in Gallia, Angliæ & Belgij syluis, ericetis & strigosis desertisque locis, sed etiam in Gallia Narbonensi, Galloprovincia, Italia & Hispania frequentissima.

*Vulgatior humilis Septentrionalium & Meridionalium Erica folio Myrica descripta Aduers. pag. 447.
Angl. Beth. Germ. & Belg. Bepde. Gal. Bruyere. Hisp. Queiro. Ital. Erica.*

ERICA pumila densè fruticans calyculato
Vnedonis flore. Erica 6^a. Clusij.

ERICA Iuniperifolia altera. Lusit. Lemetinha,
Erica octaua Clusij.



Saxosis montibus Angliæ humilior tota, dedrantem vix superans densè fruticat, flore calyculato, longiore, Vnedonis ferè, hilarius purpurante: foliis Iuniperi exilicribus multò. Eius magna glisseit copia prope Bristolium ad collem vernaculè Brandon Heil vocatum.

Varietas. Albo flore D. Ioannes de Limoges, aliàs Nonnius, alit.

ERICA pumila Vnedonis flore albo.

Floribus albis variat Louanij hæc in horto C.V.D. Ioannis de Limoges, aliàs Nonnij.

ERICA pumila altera Belgarum, nona Clusij.

Non multum diuersa quæ multò frequentior in sabuleis sterilibusque agris Flandriæ & Brabantiz, medio itinere quo Anruerpia Gandauumitur, paribus cauliculis & foliis non dissimilibus, sed breuioribus & hirsutis. Flores amœni purpurantes, simul compressi, Octobri etiamque hyeme persunt extremis ramis, vbi etiam gignit compacta lanosa capitula.

ERICA Iuniperifolia densè fruticans Narbonensis. Erica 1^a. altera Clusij & Matth. 2^a.

Quasi gaudeat aridis & squallidis speciosior, fruticosior, Romano, Tusco, & Narbonensi agro, cubitalibus, crassioribus, caudatis, comosis & prolixioribus caulis, Iunipero ferè paribus, flores edentibus calyculatos, venustè purpurantes, similitudine item Vnedonis, apiculis fibratum ospatis.


ERICA

ERICA *Juniperifolia altera.*

Altera extat apud Clusium non ita diuersa fruticosa cubitali ferè altitudine & tendibus ramulis qui terni semper circum maiores ex intervallis nascuntur; folia etiam similiter terni nascuntur, exigua quidem, sed latiora, inferiore parte nonnihil candicantia, hirsuta. Summi ramuli ad foliorum exortus verticillatim exornantur per intervalla ternis semper floribus æquali distantia inter se nascentibus & in vnam partem spectantibus, maioribus quàm in reliquis generibus, concavis prominulo magis ventre, colore ex rubro purpurante. Arenosis Lusitaniz locis oritur, floret Octobri, vt auctor est Clusius.

ERICA *baccifera.* *Erica septima* Clusij.
Camarinhera Lusitanorum.

ERICA *maior flore albo.* *prima* Clusij.



Erica *pumilæ* nigriora posita terna canaliculos ambient folia, fructus aut bacca alba margaritæ instar notula subnigra inscripta. In syluis pedalis ramis fruticat, autumnò colligunt fructus quem esitant mulieres & pueri. Gustu acido adstringente Lusitani *Camarinhas* vocant.

ERICA *baccifera* Matth.

Ad me missa ex Italia *Erica* *baccifera* arida planta, quam eandem cum Lusitanica existimabam, nisi monitus, Matthioli *bacciferam* *Ericam*: quia superiori admodum similis & fruticosa tota erat, rigidis ramulis *Myrthi* minoris similibus, foliis duriors *Thymi* angustis striatis: *Baccarum* colorem, qui Matthiolo ex purpura nigricat, ob ariditatem non noui discernere.

ERICA *maior flore albo.*

Calidarum regionum indigena plerisque proueniens collibus Vallene sylue Monspelliensium, & ad radices montis Lupi, quarto à Monspelio miliari, vbi humanam præcitatam vt plurimum assequitur. Clusius eam inuenit in Lusitaniz solitudinibus inter Vlyssiponem & Conimbricam celebrem eius regni academiam, virgis duris ex rubro nigricantibus, folia exilis *Erica* *pumilæ*. Comosi hoscult vnanità candicantes racematim totis summis ramulis.

ERICA maior floribus strontantibus. *Erica* 3^a. Clusij.



Iisdem locis desertis huius altera varietas, eiusdem ferme magnitudinis; exilioribus tamen ramulis & foliis; floribus purpurantibus.

ERICA maior floribus herbaceis purpurantibus. *Erica* 3^a. Clusij.



In Grammōtia sylva, & insule natalibus foliis maiusculis & atrouiretib. quaterno ite litu ceterorum riga ramulos ambiensibus, secundū quos flores erumpunt herbacei ante quā explicantur, deinde diluē purpurascunt.

Ibidem loci huius speciei altera, flosculis herbaceis, sed racematim & spicatis coherentibus.

ERICA quinta Clusij.



Alteram Clus. adit superioribus nitore, cubitali tunc altitudine, gracilibus ramulis fruticosam, quos terni per intervalla ramuli ambiunt, ternis foliis admodū exilibus circa eos disposito quodam ordine & serie perscribitur; flores superius paulo maiores, & alii & cōserti circum ramulos lōgis pediculis inhaerentes, colore purpureo obsolete.


ERICA

ERICA scoparia, flosculis item herbaceis. *Erica* 4^a. Clusij.



Grammōtio item lūco, ericetis, & plerisq; locis incultis binos cubitos sequat, & succiat. densa; fruticans. flores exigui herbacei secundū ramulos.

ERICA peregrina Brancionis.

ERICA Alexandrina Italicorum.
Sanamunda 3^a. Clusij.

Præter omnes hæc differentias, est quædam rarior species in vrceis pensilibusque hortis D. Joannis Brancionis fruticans, cæterarum ritu, folio longiusculo & iuxta ramos fasciculis purpurantibus, si bene memini, quaternis foliolis constantibus. Nescio unde delata, eoque propter raritatem peregrinam appellauimus.

ERICA peregrina altera, superius exhibitæ pro Vermiculato exiliori frutice Observat. pag. 207.

Illi ferè similis, sed omnino minor & exilior, alitur etiam in fidelibus vasis D. Joannis Dillij, fasciculis ex luteo herbaceis.

ERICA. Advers. pag. 447. Anz. Geog. Ital. Erica.

Diosc. Eius flore apes reprobum mel efficiunt. tam flos quam coma serpentiura. Tribus illis modis.

Gal. Digerendi per habitum facultatem obtinet. flore eius potissimum ne foliis utendum.

H. Tragus: Aquam de floribus distillatam colica laborantibus, præsertim si calor & sitis adsint, vtiliter exhiberi expertus est. Eandem oculorum dolorem tollere, & illorum dolorem mitigare.

Addit quosdam de recentibus, Ericæ floribus, fomenta & balnea sudorifica podagricis & paralyticis membris concinnare: persudant namque sibi hoc pacto inueteratos impactos & viscosos humores, unde morbus articulorum oritur, dissolui & discuti.



ERICA Alexandrina Italicorum.

Alexandrinam vocatam Ericam, arbutum & obrudant Itali quidam periores peregrinitatis & nobilitatis titulo, cum vixet in Galloprovincia & Hispania maritimis passim admodum eius facilis proveniens. Nos eam recensimus inter varietates Vermiculati fruticis acris Observatorum pag. 207. & Adversariorum pag. 163.



SANAMUNDA prima Clusij.

SANAMUNDA altera Clusij.



Huius insuper duas differentias exhibet Clusius; quas quia non vidimus, & quia illi debentur, eius hic verba subiiciemus.

PRIMA multis cubitalibus ramis ab eadem radice fruticat obsequiosis, flexibilibus, cortice exteriori nigrescente obductis, alium interiorem lentum & in tenuia fila se dissoluentem complectentes: folia Chamelæ æmula, multò tamè minorà, breuiora carnosaq; Tithymalo paralisio aut Myrto proximè accedentia, sed hirsuta aliquantulù, circa ramulos cõfertim & serie quadam vt in Myrto distributa, gummosa si mordeantur, & gustu amaro, deinde admodum acri & adurente: flores inter folia Oleæ similes, oblongi, in quatuor foliola per extremum diuisi, colore luteo: fructu. (quemadmodum ex relatu accepi) Thymelææ ferè, sed nigricante colore, radix crassa, lignosa.

Frequens est regnis Granatensi & Valentino, vere florens, hoc est, Martio & Aprili.

ISTIC ab herbariis Sanamunda vocatur, à rusticis verò *mirta crux*, propter purgandi facultatem, cuius causa rusticis eius regionis adprimè in vsu est.

ALTERA ad cubiti altitudinem etiam fruticat, ramis lentis & flexibilibus, cortice denso & carnosointectis, qui (sublata exteriori cute) per vniuersam plantam, & præsertim circa radicem, Lini aut Cannabis modo in fila diduci potest: superiores ramusculi densorum confertorumque & lanuginosorum & veluti tomento quodam obditorum foliolorum comam pariunt, superiore minorum, & mucronatorum, gustu aliquantulum salso, sed tamen acri deinde & calido: hæc coma flauescensium flocculorum Oleæ similium numerosa sobole exornatur: radix crassa & lignosa superiori similis.

Istius fructum non obseruavi quoque, quandoquidem Februario florentem inueni petrolo solo maritimis Baticæ, inter Calpen, & Estepona, & montibus Granatæ proximis.

GRANATENSIBVS Mauritaniis Sanamunda vocatur, apud quos purgandorum corporum gratia magno est in vsu. Dracinae etenim pondere cum decocto cicerum sumpta, mirificè purgat per inferiora.

Circa Calpen, vbi vulgò, *mirhalaga* appellatur, nullo in vsu præter quàm exalfaciendis fornacibus.

Myrica. TAMARISCUS. *Hisp.* Tamaray. & *Gall.* Tamaris. *Ital.* Tamarigio.
Germ. Tamarisken. *Angl.* Tamarisk. *Advers.* pag. 447.

Sponte vberè proventu fruticantem Germanicam Tamariscum non procul ab arce Venetorum vulgò Citadella inter Vincentiam & Patavium, legit Adrianus Beyerlinck pharmacopœus Antuerpianus peritissimus.

Diosc. *Myrica seu tamarix arbor vulgo cognita est, cum apud pigras & stagnantes aquas enascatur, fructu quasi florem ferens compage muscosum. Aegyptus Syriaq, alteram gignunt mitiorem, sylvestri cetera similem. Fructum parit galla proximum, inaequaliter adstringentem gustu, quo convenienter utitur vice galla in medicamentis oculorum orisq, datur cruenta excretioni in potu, & colicis, & contra profusiva seminarum, regium morbum, & phalangiorum morsus. illius tumores inhibet. Cortex in eisdem vsus adhibetur. Decoctum foliorum cum vino potum, lienem absumit. ad dolorem dentium in collutionibus salutare: & mulieribus fluxioni vulva opportunis, in defensionibus, phthiriasi lendibusq, circumfusum prodest. abundantiam seminarum sistit impositus † arboris cinis, poteries calices è caudice lienosis moluntur, quò datus in his potus proficiat.*

† Gal. admodum desiccatoriae facultatis est, plurimam habens abstergendi facultatem, paucillam adstringendi.

Gal. abstergentis est ac incidentis facultatis, absque perspicua desiccatione: habet verò etiam adstrictionem nonnullam. has ob qualitates facultatesq, admodum prodest lieni indurato decocta in aceto aut vino siue radice, siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat porro dentium dolores. Ceterum fructus & cortex non paucam sortita sunt adstrictionem, adeo ut gallae omphacitidi proxima sint, nisi quòd acerbitas evidens est in galla; sed myricæ fructui temperatura inest inæqualis. Immista enim est naturæ eius multa partium tenuitas, atque vis abstergendi: quod sanè gallæ non accidit. Attamen ubi galla fortè ad manum non erit, ut liceat ad omnia ad quæ illa utitur, in eisdem & cortice.

Eadem Plin. *Ad lienem*] Adeoque mirabilem eius antipathiam contra solum hoc viscerum faciunt, ut affirmant, si ea alveis factis bibant sues, sine liene inveniunt. Et ideo homini quoque splenetico cibum, potumque dant in vasis ex ea factis.

SABINA. *Hisp.* Sabina *Gall.* Savinier.
Ital. Savina. *Germ.* Sèbendaum. *Belg.* Saueboom.
Angl. Savin tree. *Advers.* 447.

Genuina SABINA baccifera
atrocerulea.




Genuus SABINA baccifera atrocarulea.

Vulgata sterili Sabine, (quæ tamen flosculos ex herbido luteos promit) ortu totaque facie simili-
ma; sed folio paulò minus acuto minusque rigido & pungente. Bacca siue grano resinoso Junipero no-
strati parè & concolori. Nostra vireta Belgica cultiora hanc alunt munere Ioannis Mutoni.

*SABINA baccata altera, grano item
atrocarulo.*

*CEDRVS phænicea, altera Plin. & Theoph.
Oxycedrus folio Cupressi aut Sabina maior Montispollenzis.*




Alterâ superiori coniungenda, ramulorum exilitate & foliorum lenitate duntaxat diuersa; media in-
ter Sabinas & Cedros phæniceas folio Sabinae aut Cupressi vocata, videtur sed folia tenuiora & deli-
catoria minimè aspera & pungentia sunt. Fructus Juniperi minoris par, similis, & concolor. Natalibus
gaudet montosis Calabriae & Apuliae, ni labat memoria.

CEDRVS phænicea.

Huius ternae è sola magnitudine obseruantur differentiae, vna ramis & folijs habitioribus magisque
carnosis, & bacca per totos ramos quadruplo maioribus, resinosis, phæniceis, auctum ponticam
& quantibus.

CEDRVS

CEDRVS Phœnicea media.



CEDRVS phœnicea media.

Juniperus maior folio Cupressi inter nos

Dioscoridis Clusio.

Altera superiori planè similis, sed omnia longè minora. flos omnibus luteolus, herbidus, & caudex scaber contortus, multis ramis brachiatus. In Aduersarijs nostris Sabinam baccatam dixeramus: melius tamen quaerere videtur cum altera Cedro minori Theoph. Meo tēpore Monspellensibus vocabatur Oxycedrus folio Cupressi.

CEDRVS Phœnicea minor.

Tertia eodem modo fruticat, ramis & folijs tenuioribus, granis item Sabinæ baccatæ altereque paribus & similibus, sed phœniceis: Calidioribus montosis maritimisque omnes gaudent Galloprovinciæ, Narbonensis Galliæ Cetero mōse, & Apuliz.

SABINA.

DIOSC. *Vtriusq; folia vomas sistunt, collectiones illitu mitigant, & cum melle nigritias sordese, expurgant. Sanguinem per vrinam eliciunt, partus opposita exerant, & suffitu idem prastant. vnguentis calfacientibus inmiscuentur & priuatim glaucino.*


Gal. ex numero est fortiter exsiccantiura, idque secundū tres qualitates quas in gustu præsert, similiter cupresso, nisi quod ea & acrior est, & vt sic dixerim, magis aromatica, seu odorator. Igitur huius quam modo dixi qualitatē est particeps, nempe acrimoniz consistentis in temperamento calido, præterea amaritudinis & adstrictionis quam in cupresso. Siquidem quanto magis acrimonia superat, tanto etiā potentius digerit. Itaq; glutinare nequit ob siccitatis & caliditatis robur. Nam vtriusq; illi tantum inest, vt etiam tendat, & inflammationem afferat. At putredinibus similiter cupresso accommodari potest, maximè vbi rebelliores fuerint & diuturniores: nam hæc citra noxam vim medicamentis perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodum sordida, ea cum melle expurgat. Carbunculos item soluit.

¶ Porro essentiz tenuitate menses quoque prouocat, vt si quid aliud, & sanguinem per vrinas trahit: fetum etiam viuentem interficit, & mortuam eiicit. Esto autem hoc medicamen tertij ordinis tum ex calfacientium, tum desiccantium; ex numero eorum quæ vel maximè tenuitatem sunt partium.

Quidam etiam Cinamomi vice * duplum eius subiiciunt. Est enim extenuandi & digerendi facultatis si eorum fuerit.


Addit Plin. Gallinacei generis pituitas fumo eius herbæ sanari tradunt.

KK 2 CYPRES-



κρησσοει. CYPRESSVS. Germ. Cypressen. Gall. *Αρκαδία.* IUNIPERI. Germ. Kermesbaum & Wechaltz. Gall. Genevre. Belg. genener boom. Angl. Juniper tre. Ital. Genevro. Hiss. Enebro. Aduers. 445.

Αρκαδία. IUNIPERI. Germ. Kermesbaum & Wechaltz. Gall. Genevre. Belg. genener boom. Angl. Juniper tre. Ital. Genevro. Hiss. Enebro. Aduers. 448.



DIOSC. Refrigerat, & adstringit. Cuius folia ex passo & exiguo myrrha pota, vesicae rheumatismis, & vrina^a difficultati auxiliantur. pilulae autem ex vino tusa in dysenteria, alui fluxione, tussi, & orthopnoea, aut si reijciatur sanguis, conuenientissime bibuntur. earum decoctum eosdem praebet effectus. tusa cum fico duritias^b emolliunt, nauis inq; polypo medentur. in aceto cocta & cum lupinis detrita scabros vngues eijciunt. bernias intestinorum prolapsu erumpentes illitu reprimunt. Folia eadem praestant. Pilula cum arboris coma suffusa, ^c culices abigere existimantur. folia trita & imposta, vulnera conglutinant. sanguinem supprimunt. capillum ex aceto tingunt, illuminantur per se aut cum potentilla ignibus sacris, vlceribus que serpunt; carbunculis, & oculorum inflammationibus. admoda cum cerato stomachum roborant.

^a Plin. Radix cum folijs trita potaque, vesicae & stranguriae medetur, & contra phalangia. Ramenta pota menses ciunt, Scorpionum ictibus aduersantur.

^b Item victoriatu pondere in vino potus illitusq; cum fico sicca pingui, exemptis granis vitia testium sanat, umores discutit, & cum fermento strumas.

^c aduersus serpentium ictus bibuntur Plinio, aut si eijciatur sanguis. ^d eadem Gal. tanquam absumat eos morbos facientem humiditatem. ^e Plin. exprimitur succus tusus cum iemine, qui mixto oleo caliginem oculorum aufert.

Gal. Cupressi folia, germina, pilulae recentes & molles magna viscera conglutinant in duris corporibus: ex quo clarum est quod resiccandi vim habeat absque insigni acrimonia, aut caliditate, sicut certe & gustus testificatur. Apparet enim in ea leuis quidem acrimonia, sed plurima amaritudo, multoque etiam plus acerbitalis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia, caliditasque, quanta facis sit deducenda in altum acerbitali, ac nullam tamen mordicationem aut caliditatem in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in haccidis putrescentibusque affectibus humiditates innoxie tutoque depulsantur, atque absumit: cum quae calfaciunt simul desiccantque, eas quidem quae contentae sunt absumant; caeterum acrimonia & caliditate alias attrahunt. Sic enterocelicos iuuat. Siquidem exsiccat, roburque addit corporis partibus praeter humiditate laeis, ut pote cum ad frigidum in altum subeat deducen-

et ipsa caliditatem quæmixta est, cum seruante modum, vt deducere quidem valeat, non tamen mordicare queat.

Plin. addit. serpentium ictibus trita folia imponuntur, & capiti cum polenta si à sole doleat: item ramici, qua de causa bibuntur. Testum quoque tumori cum cera illinuntur. Eadem uita cum duabus partibus panis mollis, & c. vino Aminæo subacta, pedum ac neruorum dolores sedant.

IUNIPERI.

Diosc. Iuniperi genera duor: altera maior, altera minor. vtraque æris est. Excalfacit, & urinam mouet. accensa serpentes fugat. Baccarum nonnulla nucis inglandis magnitudine nonnunquam grandescere, alia nucem Ponticam aquare inueniuntur, rotunda, odorata; in mandendo dulces, subamara, qua arceuthides etiam, id est bacca iuniperi nominantur. Modicè calfaciunt & astringunt, stomacho vtilis. contra pectoris vitia, tussim, inflationes, tormina & serpentium ictus efficacissimè bibuntur. urinam ciens. vnde ruptis, conuulsis, & vulua strangulata subueniunt. folia acrimoniam habent. ideo tam ipsa quam eorum succum ex vino contra viperarum morsus, illini aut bibi prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit. Ramena ligni denora interficiunt.


Gal. Calida & sicca, vtrinque tertij ordinis. At fructus similiter quidem calidus est, sed non similiter siccus, vetùm in hoc primifuerit ordinis. Iecur renesque † expurgat: nimirum crallos & glutinosos humores extenuando, ea de causa salubribus medicamentis immilcetur; per exiguum corpori humano alimentum ex eo apponitur. Affatim sumptus hic fructus stomachum mordicat, caputque calfacit: ex quo illud quandoque implens, dolore diuexat. Alui excrementa nec retinet, nec propellit. Urinam ciens mediocriter.

† Plin. Stomachum, pectus & lateris dolores, inflationes languotesq; discutit, tusses concoquit & duritias: Illitum tumores sistit: Item aluum baccis ex vino nigro potis, item ventris tumores illitis.

Gummi Iuniperi siue Vernix Scriptorum calfacit & siccat ordine 2. suffiibus hodie miscetur fluxiones calidas à capite prohibentibus. magnæ Scriptoribus & pictoribus vtilitatis & vsus. Succini vicem supplere volunt nuperi.

IUNIPERVS maximus, Illyricus, carulea bacca videtur Dioscoridia maior Iuniperus aut congener. Aduers. 448.

IUNIPERVS maior Morspel. CEDRVS phanicia Matth. Ital. Cedro minore. Aduers. 448.





Iuniperus primus
Diosc. Oxycedrus
Theoph. Guiland.

Iuniperus secunda
Diosc. cedria
Theoph. Guiland.

CEDRVS Lycia. Advers. 448.
Arbor vitæ, & Tuya Theophr. herbar. orum.

CEDRVS Libani & Palaestina præcedis.
Ital. & Hisp. Cedri. Gall. Cedre du Liban.
Angl. Cedre tre. Advers. 448.



lega Lyciam cedrum iam diu vidimus Lutetia in quibusdam hortis, folio Cupressi compresso semper nitentibus squamulis, loricatis capitulis, semen Laricis claudentibus; Belgici herbariorum vitæ hodie notissima Arboris vitæ nomine. Eius folia trita suavissimum fundunt odorem.

Diosc. Cedrus arbor magna est, ex qua picem colligunt, quæ cedria vocatur. iuniperi modo baccas parit, baccarum myrti magnitudine, rotundas. Cedria optima est crassa, perlucida, gravis odoris. quædam effunditur, guttatim non dissipata coit. Cui ea vitæ ut de defuncta corpora conseruet, & vitæ corruptat, quæ ex causa mortuorum vitam aliqui appellauerunt, vestimenta quoque, & pelles eximia calfaciendi & siccandi dote, corrumpit. magis ad ophthalmia medicamentum vsus. quippe illa oculi claritatem affert, albugines citricæque, detergit. instillata autem cum aceto, vermes aurium necat. cum byssopi decocto infusa, somitus sibilosus, sedat. canis dentium induræ eos frangit, & dolores lenat. idem facit cum ex aceto colluitur. peruncto anse coitum genitali abortivum fieri constat. angina ea paranguntur. tonsillarum inflammationibus auxilio est. lentes pediculosa, illita necat. ceratâ morsitum cum sale imposta subvenit. contra hauritâ leporis maximi venena, in passo sumpta, auxiliatur. in elephantia, aut imbecili aut perniciosa proficit. pulmonum vitæ purgat. & si cynthia eius sorbeatur, persanat vermes & timeo subter incerta necat, & partus extrahit.



Oleum Narbonensib.
Cade vocat.

Fis & oleum, a cedria separatim, dum coquitur, velleribus supra lignum eius expansis, vel in pice. Eiusdem ad omnia vsus. primum vehementer perunctum scabiem quadrupedum, canum, bovinumque persanat. inherentes vicinas enecat. vitæ que ex tonsillis acciperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfacti in vino habent. stomacho adversantur. auxilio sions cunctis, convulsis, ruptis, stranguis. menses evincit, ex polline pipæris positi. contra hauritâ leporum in urinum in vino sumantur. serpentes fugantur, peruncto cum adipe cervino, aut viridilla, corpore, in antidoto adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet. quæ eadem quæ picea fuligo rize probat.

P. 175.

PINUS
vulgaris.
Germ.
Parholz.
Kerchbaum.
Il legunt
singho ty.
Sic. Pinap
paleona.
Angl. Spruce
Fr. Pin.
Gal. Pin.
Adverf. 449.

PINASTER.



PINUS fyl.
dura.

PINUS fyl.
Mugo
Muth.
Ad. p. 449.



PINASTER. Germ. Wildfichtenbaum. Gal. Pin sauvage.

Pinus syl. montana Theopb.

Alpigena hæc in Pini arboris præcellæ æmulatione caudice recto & lævi accrescit : folia Pini oblonga gemino ordine sita. Conus strobilus & nucleus Pini minor putamine minimè duro, sed cortice molliore, ceterarum ferè ritu obductus. Montibus Galloprovinciæ, Liguriæ, Alpibus & Pyrenæis gaudet.

PINUS *syl. altera Maritima Pini primum genus Martii.*


Pinaster secundus Clusij.

Aduers. 449.

lege æquabili plurimum exorta binolin. 10. & demè manipulatim, & paulo post ceparum instar.

PINASTER *tertius Clusij pumilus, omnium minimus.*

PINUS *Maritima Theopb.*




Tertium humanam proceritatem vix superans etiam exhibet Clusius, gracilibus ramis & foliis lævis, gnis perpetuè virentibus, non differre opinor à Pinastro humili Galloprovinciæ & Narbonensis collibus ad Lapum montem oriundo.

Pinus maritima Theopb.

Suæ vite, ramorum, & foliorum facie vndequeque persimilis videtur Pinastro montano, sed ramis glabris caudice nigrioribus. Conus pumilicæ, brevis, & superne latior.


PINUS

Pinus
Germ.
Pinne
Nig. P.
Boorn
Dirch
Gal. P.
Garp
Ital. P.
Hap
N. gro
N. 4



LARIX.
Germ. Kna-
stubaum.
Gal. Meize
& Meize.
Ital. & Hisp.
Larice.
Aduerf. 449.

FICA.
Germ. Kna-
stannenbau.
zolg Deck-
baum Angl.
Dirhe etc.
Gal. Pesse &
Garipole.
Ital. Pazzo.
Hisp. Pino
ngro Ad-
uerf. 450.



ABIES.
Germ. Ta-
menbaum.
Belg. Mark-
boom Angl.
Mastre &
Drie. Ital.
Abete. Gal.
Sapin Ad-
uerf. 450.



PINVS Idae Theopb.

Videtur Pinus Maritima alterum genus Matth.

Facile dignoscitur caudicis & ramorum cortice scabro, circa ramos foliorum fertura, & maloribus longioribus speciosioribusque numerosis conis. Hanc, cum coniferarum arborum omnibus iconibus, affabre è viuis naturæ typis expressis, Roma rediēs mihi liberalissimè communicavit commilito eruditissimus Nicolaus Espilletus D. Medicus Insulanus.

PINVS & PICEA.

Aduers. 449.

DIOSC. Pinus & picea generi eidem adscribuntur, sed quaedam flagitant specierum distinctionem. Arbores vulgè cognita: quarum cortex astringit, prodest tritus & illitus intertrigini, viceribus summū corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma argenti & manna, vlcera delicatularum acrimoniam recusantium, cerato myrthino exceptus, ad cicatricem perducit. tritus cum sutorio atramento serpentina cohibet, suffitu partus & secundas eicit, potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammationes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicant. Trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores pulcent. Hepaticis vtilia sunt drachma pondere in aqua mulsā pota. Pinnae nuci cortex & folia potu idem praestant. Teda earum particulatim secta sicut in aceto coquatur, & decoctio dens colluatur, dolores lenat. Ex his etiam fit spatha acoporum pessorumq; compositionibus idonea. Quinetianus earū crematarum fuligo ad librarij atramenti confectiōnem excipitur. Ea circumlitionibus efficacissimè imponitur, quibus palpebras ornant, coloremq; mentiuntur. Atrosio oculorum angulis, callosis glabrisq; genis, & collachrymationibus opitulatur. Pityides appellantur Pinorum Piceaq; fructus, qui in conis inueniuntur. Vim adstringentiā & habent & aliquantum calfacientem. Tussē & pectoris vitijs auxiliantur, per se, aut ex melle sumpti. Noces pinnae repurgatae manduntur, aut cum passo, aut succumeris semine bibuntur; vi. m. uent, acrimonias in renibus & vesica bebentans, stomachi rostones leniunt. Data cum portulacæ succo, virium infirmitatem roborat. Corruptorum quoque humorum labem obtundunt. Pinnae noces integræ recenter arboribus decerptæ in passo stranguantur, & decoctæ, natus & tussē ac tabitudinē conferunt, si quotidia ex eo liquore terni cyathi bibantur.

Fuligo.

alij, coque-
di.

RESINÆ alia.

DIOSC. Liquida Resina è pinu & picea à Gallia & Hetruria conuehi solet: atque olim à Colophonia sibi cognomen vindicauit. à Gallia quoq; Subalpina, quam vernaculo nomine Laricem vocant incolæ. Ea in linctū & per se magnopere prodest tussē veteri. Colore inter se distant, siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine: ut Larigna. Cupressus etiam liquidā fundit resinā, qua ad eandē pollet. Quæ verò aridatū generi ascribitur, quaedam ex pineis nucibus, alia abiete, alia picea & pinu exierunt. Eligi debet longè omnium odoratissima, crassiuscula, non retorrída, neque diluta, quaedam cere faciem præbens, & friabilis. E pinu & abiete resina, ceteras antecedunt, odorata enim sunt, atque thuris odore imitantur. Præstantiores à Pitynsa insula deferuntur, quæ secundum Hispaniam fita est. Sed quæ è picea, nucibus pineis & cupresso manant, nihil ad illas, nec tantis viribus potiuntur. Verantamen eorundem gratia quorum & illa sumi solent. Lenissima cerebintina respondet. Vtitur resina omnis liquida in vase quadrupla capacitatis ad humorem, qui insunditur. Itaque resina congruis in quibus aqua plura coquitur, subiectis lenibus prunis: resina assidue mouetur, donec omnis odor aboleatur, & friabilis & retorrída reddatur, ac digitis cedat. Ceterum vbi resifixit, in fictile non picatum, quod aconitum vocant, id est non illitum, reconditur. Fiet etiam eximij candoris, si resina omnis eliquata præcoletur, quo faculenta sordēs excernantur. Vrantur quoque sine aqua primū lento igne: & vbi coire ceperunt, maior carbonum fixus supponitur, & citius intra intermissionem discoquuntur, vsque dum antedictas naturæ suæ notas exuerint. mox, ut dictum est, reponuntur. Aridas vnus dici spatio decoxisse satis est. Vtā odoratis malagmatibus, & scopis & vnguentorum colorationibus magnopere vtilis sunt. E resina perinde atque thure fuligo excipitur, ad circumlitiones idonea: quibus palpebras faciant, & colorem mentiuntur, prodest glabris genis, collachrymationibus, crosisq; oculorum angulis. Ex ea fit atramentum scriptorium.

Pix liquida Diosc.

Pix liquida, quam alij conem vocant, è pinguisimis pini piceaq; lignis congregatur. Optima est, splendens, & ceræ, leuis. Contra venena, phobisim, purulensā excretionem, tussē, & pectoris humores qui difficiliter curantur.



fiuntur, efficax est, ecclēgiato cyathi mensura cum melle dato. tonsillarum & vna inflammationes, anginaq; vilitate perunguntur. purulentis auribus infunditur cum rosaceo, & illinitur cum trito sale serpentium morsibus. adiecta vero pari cera scabros vngues extricat, impetiginosq; emendat. vniue duritias ac sedis tubercula discutit. cum farinaq; hordeacea & pueri impubis vrina decocta, strumas rumpit, cohibet vlcera qua serpunt, cum pineo cortice, aut sulphure, aut furfuribus illita. ceterum cum thuris manna & cerato profundos vlcera sinus conglutinat. rimis sedis & pedum, magno auxilio illinitur. vlcera replet, & cum melle purgat. quin & cum vna passa & melle carbunculos, & putrida vlcera emarginat, disrumpitq;. Erodentibus medicamentis, quas septas vocant, probe immiscetur.

Picinum oleum Diosc.

Epice fit quod pisselaon appellant, separato liquore aquoso, qua supernatat pici, sicut serum lacti. Nam expansa quamdiu pix coquitur supra cortinam vellera pura madescunt, acceptoq; halitu eius exprimentur in vas. Quas pix liquida prabet vtilitates. alopecias capillo replet eam farina hordeacea illitum, quibus & liquida pix inedetur, uenentoram vlcera scabiemq; emendat.

Fuligo liquida picis, Diosc.

Fit hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua que elychnium habeat, nonnihil picis incendio, lucernam q; fictile vase in clibanum speciem conformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, vt clibanus esse solent, operito, & adoleri sinu: consumptoq; liquore nouum infundito, quoad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vt ei astringens, acrisq;. vsui est ad pigmenta quibus palpebras linunt & venustant, & ad circumlitiones. item vbi glabris genis pilos restitui oportet. ad imbecillas lachrymososq; oculos, usuper ad eorundem vlcera non inuitus est.

Pix arida Diosc.

Liquida pix decocta in spissam coit, quam vocant aliqui palimpissam. quo in genere quadam visci modo lentescit, boscas cognominata. altera sicca est. Probatur pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinaq; simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet. dura emollit, pus mouet, tubercula panosq; discutit, vlcera replet, vulnerariis medicamentis commodè permiscetur.

Zopissā Diosc. officinarum Pix naualis.

Zopissam aliqui aiunt de rasam nauibus resinā cum cera, quam alij apochymia appellant. Ea dissipandi naturam habet: quoniam marino sale macerata fit. Alij pineam resinam hoc nomine vocauerunt.

Bitumen Diosc.


Bitumen Iudaicum ceteris antepositur. Cuius probatio est, vt purpura modo splendat; sicq; ponderosum, ac validum odorem vibret. nigrum autem & sordidum, vitiosum est. Adulteratur pice. Gignitur in Phœnice, Babylone, Zecyntho, & Sidone. Liquidum inuenitur in Agragantino Sicilia, fontibus inmatans. quo vtuntur ad lucernarum lumina, olei vice. Hallucinantur qui id Sicilicum oleum nominant: namque liquidum bituminis genus esse constat.

Pissasphaltum Diosc.

Nascitur in Apolloniatarum agro circa Epidaurum qua pissasphaltos appellatur: ea Ceraunius montibus deuoluta, impetu fluminis rapitur, atq; in litus exspuitur: illic coacta in glebas mixtam bitumini picem reolet. Pissasphaltos eadem qua pix & bitumen, si misceantur, potest.

Naphtha Diosc.

Naphtham vocant Babylonij, bituminis colamen, colore candidum. Inuenitur etiam nigrum. Vt et ignium rapax ita vt ex spatio protinus in eam trāsiliant. ad suffusiones oculorum & albugines vtilis. Bitumen omne discutit, glutinat, emollit, ab inflammatione tuetur vuluarum proidentia, strangulationesq; afflatu, suffitu, impositu emendat. Comitiales morbos suffitum deprehendit, gagata lapidis more purgationes multierum cum vino & castoreo potans efficit. Tusim veterem, & anheltrum adiuuat. serpentium morsibus, coxendiculis laterumque doloribus auxiliatur. Datur coliacis in catapotio deuorandum cum aceto potum. discutit sanguinem concretum. Dysentericis cum pisanis liquorum infunditur: destillationibus suffusione medetur. Mitigat dentium dolores oblitum. Ceterum pillos incommodos siccum replicat, specillo impositum. concalfactum autem, & cum farina hordeacea, nitro & cera illitum, podagra, articulorum doloribus, lethargicisq; prodest.




Quod est pix coniferis arboribus, idem est Bitumen terræ sui generis viscosibus; est namque glabrum pinguedo ex multa æreæ permixtione, rauca terrea, nonnulla aquæ, multum diuque à calore terræ visceribus insito excocta, ut in arborum fibris, sic in saxorum pinguiumque terrarum interueniis; quod qui non credit aut miratur, mixetur succos argenteos & aureos non alia vi & modo ortos. Sunt verò quamplurima eius genera recentiorum sedulitate inuestigata, præsertim eruditi Medici Reiperij Solinadri, qui huic argumento luculentam posuit operam. Quod verò Matthiolus Senensis in Italiâ adduci genuinum Iudaicum negat, veritati alienum videtur; nâque superioribus annis cum Veronæ & Bononiæ essemus, patres cursores qui è Hiericho nuper nauî reuecta essent, Asphaltum satis multum, præsertim iam induratum, nobis copiam videndi & habendi fecerunt. Et meminij me vidisse in officinis Ioannis Pomelli & Bellicoqui doctissimorum pharmacopœorum: ostensumque à præceptore exercitatissimo Vlyssæ Aldroandæ Bononiæ.

Hicce verò annis Valerandus Dorez Flander insulanus perquam doctus Lugdunensis pharmacopœus Venetias liquidi multam copiam misit. Ipseque in Angliam, alij verò Antuerpiam in medicos vsus curauimus. Cuius pars liquida desijt esse, duritiem, soliditatemque ferè adepta. Istud puto viribus nulli Iudaico cedere. Neque tamen in maritimis, sed montanis fontibus ignatæ iuxta vrbeculam Aluerniæ, vernaculè Claremout, vnde hodie Lugduenses petunt.

AGARICVM. Advers. 449.

Diosc. Duo eius genera, samina qua præfertur, rectis visus nervorum discursibus constat? Mas rotundus est, & vniq; compactior. Viriq; gustus in initio dulcis, mox in amaritudinem transit. Adstringendi calfaciendiq; naturam habet. efficax est contra tormina, cruditates, & rupta. prodest itidem concussis & ab alto deuolutis. datur duobus obolis in vino mulso febrim non sentientibus; febriculosis verò, in aqua mulsa. arguatis quoque, spiritibus iocineris, renumq; vitio laborantibus, dysentericis. item si vrina agrè reddatur, si vulue strangulatus vergeat, si pallor membra decoloret, drachma vna dari solet: si tabes infestat, ex passo: si lien negotium exhibes, ex aceto mulso. si dissolutio stomachi est, ita ut cibi tenax non sit, man' ur, & sine vlla humoris serbitione deuoratur. simili modo acida ructantibus propinatur. sanguinis reiectiones sistit, tribus obolis ex aqua sumptum, facit ad coxendicam & articularum dolores, & comitiales morbos, si cum aceto mulso pari pondere assumatur, menses ciet. feminis, quas inflatio vulue vexat, vtiliter aequali modo datur. horrores soluit dantem ante febrim accessiones. aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur. venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta portione sumptum. si serpentes ictum vibrarunt, morsumq; subfixerunt, tribus obolis ex vino potum, mixè auxiliatur. in summa, internis omnibus vitijs conuenit, præ viribus & ætate datum, nunc ex aqua, nunc ex vino: hys ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Mesue. Agaricus medicamentum efficax oritur in truncis arborum magnarum, vetustate iam putrescentium, & erosarum, tanquam earum vel apostema, vel fungus. Est autem is duplex: mas, & femina. Mas est malus, præsertim qui longus, niger, durus, densus, grauis, & in fragmentis ceu villos nervorum ostendit. Femina si rotundior, alba, porosa, & rara valde, & frangi facilis, leuis, dulcis primo gustatu, mox amara & styptica, est melior, præcipuè summa corporis sui parte. Nam, stipes quòd ligni putrefacti aliquid præferat, malus est, ut erolus agaricus. Calidus est ordine primo, siccus secundo, constatque substantiâ duplici, æreâ superficiali, dulci primo gustatu percepta: & terrea styptica, sed tenui ob Vincentem in hac igneam substantiam, amaritudinis effeetricem, quibus incidit, tenuat, terget, obstrueta omnia liberat, flatus dissipat, purgat. Pituitam autem crassam, lètam, putrem, & bilem flauam, & atram purgat Galeno, à cerebro, neruis, musculis, sensorijs, spina dorsu, thorace, pulmone, ventriculo, hepate, liene, renibus, vtero, iuncturis. Ob hæc medicamentum familie Democrito est dictum, quòd ad omnes omnium partium internarum affectiones, præcipuè cephalalgiam veterem, epilepsiam, vertiginem, maniam, melancholiam, & alios cerebri ac nervorum affectus etiam cum tumore coniunctos: ad asthma item, & spirandi difficultatem, & thoracis, aut pulmonis vicera: ad effectus ventriculi, & vasorum aliorum: ad icterum, hydropem, lienis duritiem, & dolorem, & tumorem, tam ipsius, tum hepatis, & renum, & reliquos morbos obstructioni succedentes. Vrinam quoque mouet, ac menses vterumque expurgat. Cutis colorem floridum reddit, lumbricos necat, ischiadi, & cæterorum articulorum doloribus confert, & febribus diuturnis ex materia varia natis, easque ad typum aliquem reduci, præsertim potus cum idoneis illi materiæ alijs medicamentis. Viscera reddit imbecilla, ob id tergentibus miscetur, ne in ea virtus eius altius penetret. Tardè quoque & imbecilliter vacuat Diosc. nisi cum tercia parte salis gemmæ, & manna in trochiscos cogatur. Per se tamen eisdem saluber dicitur ob substantiam & dulcem & stypticam legitima portione mistam. Humain verò mulsa ei vires & celeritatem addit. Haly autem ex agarici parte vna, ligustici vel dauci parte sexta, salis gemmæ parte quarta, cum polypodii recentis mucagine trochiscos virtutis mirè facit, quandò est eo opus. Iudæus oxymelire scillitico vires eius auget, & acibus alijs. Galenus puluerem eius vino (cui infusum est zingiber) madorat, & cogit in trochiscos efficaces multum. Additur eadem ratione & spica & serum lactis, præciouè caprini. Cochionem & vituram mediocrem sustinet. Datur purè drach. vna ad drach. duas: decocto à drach. duobus ad drachmas quinque: seruatur annos quatuor.




Diosc. Smilax à Græcis, sæuis à Latinis appellatur, arbor abietis magnitudine, & foliorum eiusdem figura, in Italia & Narbonensi Gallia Hispanie continenter nascens. Avicula qua Italianæ taxibaccas denotant, denigrantur: & qui ederint easdem homines, alii profusio corrumpuntur. Narbona tam presentis est veneni, ut si qui dormiant sub ea, aut eius umbra subsideant, ledantur, & sæpenumero moriantur: quare de taxo hac traduntur, ut ea calcantur.

PALMA. Germ. Dattelbaum. Belg. Dapeloont.
Ang. Dates tre. Gall. Dattier, & Palmier.
Hisp. Palmera. Ital. Palma.
Aduers. 457.



Tenerri
Palme.

PALMARVM
fructus, sive
Dactylis &
alias flores.



Palma Elee
& Dactyl.



PALMA.

In Museo legendum Dactylis Keyron, à Chayero oppido, ut habet vetus codex. Secus Chayrum autem maximus est Palmæ prouentus. Ideo Sylius male legit Cytron, & vertit fuluum.

Diosc. Palma acerba est & astringens, contra alui hæmorrhoidæ, profusio, in vino austero bibitur, hæmorrhoidas sistit, vulnera glutinat illiæ. Phœnicobalani recetis plus siccis adstringunt, capitis dolorem afferunt. copiosiores in cibo inebriant, sicciores sanguinem excreantibus, stomachicis & dysentericis utiles in cibo. illuminantur cum cotoneo, & cerato ananthino vesica vitij. Caryota, præsertim esu, faucium asperitati medentur. Thebaicarum decoctum potu astuationem sedat, vires recreat cum hydromelite veteri sumptum, cibo idem faciunt. Fit ex eis vinum ad eadem conueniens. Decoctum per se potu & gargarizatione magnopere adstringit, & cohibet. Nuclei palmarum, cæterorum more, cremati in crudo fictili, & vino restincti, cinere loto, spody vicem efficiunt, miscenturq; in calliblephara, quod si non iustam vitionem acceperint, denuo cremandi. Vim adstringendi habent, & spiracula cutis obductu suo claudunt, contra oculorum vnam & pustulas, palpebrarum desuunt, cum nardo effectum præbent, corporis excrescentias cum vino reprimunt, ulcera ad cicatricem perducunt. Sed inter primas utiles ex palma humilibus Aegyptia.


Gal. Phœnix arbor adstrictoria facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorum succus est, ex aquea substantia tepida & terrea frigida consistans similis facultatis est encephalos quem vocant, [hoc est cerebrum siue medulla] esui aptus. At fructus eius, & maxime dulcis, non paucam obtinet caliditatem. Cæterum cum edendo sit, multo est vsui, non tantum foris impostum, ubi quid roborare & desiccare, contrahere, stipare, densareque consilium est; sed & tanquam cibis sumptus & simul cum aliis & per se. Porro quod elate vocant, nempe tenerum illud palmæ germen, eandem cum cerebro eius facultatem possidet. Quod verò velut decoctum eius est, adstringentem & ipsum qualitatem habet, verum plus quam dicta omnia exiccit: utpote quod & essentia consistentia illis siccius est, & nimium habet humiditatis. Itaque iure vtuntur illo ad vlcera putrescentia, miscenturque medicamentis articulos plus iusto laxatos contrahentibus: ad hæc facultatibus hepaticis & stomachicis, seu intro sumantur, seu foris admoueantur. Sed & radix plantæ desiccatoria circa mortuum facultatis est, adiunctum habens & ipsa adstrictionis quippiam.

PALMA Elate.


Diosc. Palma quam aliqui Elaten aut Spatham appellant, fructus palmarum adhuc florentium involu-
crum est calyxque, quo in spissamenta unguentarij vtuntur. Optima habetur odorata, adstringens, ponderosa, præ-
clusa, intus pinguis. Vis ei adstrictoria, sistit ulcera qua depascunt. Laxatos artus committit, trita misceatur catapla-
smatis & malagmatis. Prodest præcordijs, imbecilli stomacho, & iecori affecto, mixta conferentibus cataplasma-
tis. Eius decoctum subinde detersum, capillos denigrat, datur bibendum, congruè rennis vesica, & viscerum vi-
tij. Vultus ac ventris fluxiones sistit, scabiem cum resina & cera sanat, si viginti diebus recens apponatur. In-
uolutusque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Ad-
stringit, & Spatha effectus præstat, non sic unguentis expositus. Alba medulla caudicis recens in cibo aut decocta

Borassus,
medulla cum
eadem facit que Borassus,
dicitur Palmæ.




MUSA
Serapioides

DRACO arbor.

MUSA fructu.
Adans. 451.

MUSA.

Folius est Cannæ Indicæ maioribus, quibus
G. Elëni involuitur, sesquipedalibus, duos pe-
des longis, infernè compressis.



DRACO arbor, & eius lacrymæ, vulgo Sanguis
draconis dicta.

Creuit hæc aliquot abhinc annis in cultissi-
mo Coldenbergij orto, Antuerpiæ, ex Hispani-
jæ delata, talis omnino qualem eam eleganter
& scitè Clusius descripsit.



CAVS. Est verò Draco proceræ arbor, Pinum procul inuentibus referens, ad id æquales, semperque virentes sunt rami. Huic truncus crassus, octo aut nouè bicubitales ramos, æquales & nudos sustinet: hi rursus in summo finduntur, & in alios ternos aut quaternos ramos cubitales aut paulo ampliores, brachialisque crassitudinis desinunt, nudos item & sine foliis, qui in summo gestant capita plena cubitalium foliorum, masculi pollicis latitudine, in medio densiorum & eminentiore quodam modo costa, vt sunt Iridis folia, tenuium verò & rubentium in lateribus, quæ mucronem planè repræsentant, semperque virent; nascuntur verò ea Albès aut Iridis modo, altero alteram amplexante. Truncus perquam scaber est, multisque rimis deliiscentis, ex quo per Casiculæ æstus humor emanat, qui in rubram lacrymam densatus, Sanguis Draconis appellatur, ob quam sanè causam, ipsam arborem Draconem nuncupauit. Materia trunci firma est, ferrumque difficile admittit, quòd veluti fibris transversim & obliquè excurrentibus constat: at rami, cum multo succo prægnantes sint, satis facillè cedi possunt.

Eam arborem Olyssipone primùm vidi anno humanæ salutis 1564. post monasterium Diuæ Virginie sacrum, cui nomen à Gratia, octo palmorum crassitie, monachis ignotam & neglectam; quamque neque florem neque fructum ferre assererent: rem tamen aliter se habere postea deprehendi, ramulo sine racemo ex illa ipsa arbore anno sequente reuulso donatus ab amico. Est autem hic ramus pedali amplioriue longitudine, cui inhærent alij ramuli multo fructu racematim compacto onusti. Fructui color flauescens, sapor aliquantulum acidus, magnitudo exigui cerasi. Eum in summis capitibus nasci veri simile est; vt in Palma Dacæyli nascuntur: spathæ tamen vti illos includi non intellexi.


Et sanè id gummi quod apud diligentiores quosdam pharnacopolas inuenitur, quodque Sanguinem draconis in lacrymis appellat, magna ex parte è Madera & Canariis insulis in Europam inuehitur: & forsitan etiam ex Aphrica, quæ Cinnabarin Dioscoridis tempore subministrabat.

An hæc arbor alicuius momenti sit in vsu medico, neminem scribere memini: fructus tamè aciditas argumento est vtiliter in febribus præberi posse.


Eius lacryma adstringèdi vi pollet, ejusque vsus non infelix ad muliebres & dysentericas fluxiones, cruentas excreationes, firmandos commotos dentes, & roborandas gingiuas.

Quæ facultates admodum similes sunt eas quas Dioscorides Cinnabari tribuit, quamque Hæmarite lapillo efficaciorum facit. Hanc ob causam, non abs re existimant celebriores Medici, Sanguinem illum Draconis, exquisitum, legitimam Dioscoridis Cinnabarim esse, præsertim cum ejus tempore à nonnullis etiam Sanguis Draconis appellata sit.


PALMITES. *Hisp. & Neapolitanis*
Cephaglioni. Palmæ minor Matth.



NYX INDICA.



AVFEL cum suo involucre, & eodem exutum.



* AVELLANÆ Indicae genus oblongum Clusij.

Videtur idem cum nucleo palmæ Pini nostræ Advers. pag. 450. cuiusmodi præduros nucleos apud me seruo in musarum thesauris munere Valerandi Donnez Insulani.



Palmæ effigie arboris fungosæ substantiæ Fausel D. Garcia Lestano teste fructus est: cuius speciem Antuerpiæ apud Petrum Quickelbergium videndi & habendi copia fuit. Facie nucleum myricæ can refert, sed nigrior, altera parte sessilis: crasis & corporatura autior, lignosa, molliore & villosa involucre putaminève clauditur, quale olim videre memini in officina P. Coldenbergij. Gustu sibi stringente, nonnihil aromatico: initio primi ordinis excalescentium: immensam superficere & inebriare dicunt. Noui generosam Anglam vtero gerentem vapidâ aromaticitate decem vel duodecim nucleum myrificarum eisdem comestorum cerebri ventriculis imbutis, ebriam esse redditam.

AVELLANA Indica. Advers. pag. 449.



Mehenbothene, sive AVELLANÆ Indicae varietas.

Inter nuces Moschatas Antuerpiæ aliquando reperitur quæ pro Mehenbothene D. Cortusius Patavio misit. Colore, figura & magnitudine nucem myristicam refert, sed triangularis forma osseo & prae duro cortice nuclei Indicæ nostræ; sed effracta tres cellulas habet, unica conspicua nucleum dulcem claudente; quales acceptas refero consobrinio amicissimo Nicolao de Fourmestraux mercatori Insulano.

Lege PALMALINUM. Advers. pag. 451. linea 37.

EUPHORBIVM.



Lege CERES ab effigie descriptus Adu. pag. 453. est EUPHORBII arbor.

Quem Cereum superius diximus, Euphorbium statuit & asserit Antuerpianus mercator Philippus Asseliers, qui congenerem stirpem unâ cum Anteuphorbio ex Indiis Peruvianis asportavit. Cuius folium depactum, non secus ac ficus Indica, in plura folia & radicem crassiorem fusè humi sparsam, exit; & præclaro viro Ioanni Boisseto perquam in hac palestra versato Bruxellis cultissimo & ditissimo horto (ut mihi idè retulit) annû integrû viruit, sed tandè hyemis sæuitia perit. A Cereo nostro tantum dissidet spinarum geminata serie & positu. Folia teretia, crassa, carinata & canulata, cucumerina, pedalia & sesquipedalia.

Dioscoridem minùs novisse arborem eùm Ferulaceâ plantam dixerit, minimè mirû: eùm ne nobis quidem, cuius plantæ vel arboris succis foret Euphorbium, hætenus comperû fuerit; quippe eùm sit peregrina & ex novo orbe aduehi solita.

Diosc. Sucus illius suffusiones discutit. Porus tota die exurit, quare melli collyriis, pro acrimonia ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera positione haustus, squamas ostium eadem aëo eximit. Verùm eo utentes, necesse est linamentis aut ceratis commovere corpus quo offa convalescunt. Aliqui interiori proclerent, percussos à serpente nihil molesti passuros. Si incisæ offe tenuis capitis cute, intritus succus infundatur, vulnus postea constat.


Gal. Causticæ siue vrentis & tenuium partium facultatis est.

Idè vitur in alopecia lib. i. comp. pharm. Li- quor est stirpis cutaliam spinosæ qui erectiades regionibus affertur. ʒ. lb. componend. pharm. gener.

ANTEUPHORBIVM.

Esop. M. VSCVS, Arborumque villi: item saxorum
& terra. Vides Arabum & Officin.

MUSCVS Quercus.



Indidem aduectum Anteuphorbium D. Boifeto doctissimo creuit, quod admirabilis, prudens & dardala natura aduersum Euphorbij rabidas omnium longè fetidissimas & inurentes vires indigenis largita est. In pluribus carnosis virentibus teretibus caulibus folia Portulacæ. Radices item latè humi impactas fundit. Lento frigidoque succo turget, quo vrida Euphorbij vis cohibetur.

MUSCVS.

His nominibus significantur canthaborum villi, quales in quercu videmus. Videntur è genere earum plantarum, quas parasiticas festinè quis dixerit, propterea quia non nisi aliena quadra maxima ex parte vescuntur. Qui innascitur* Cedro, Larici, & Piceæ primæ nobilitatis, odoratissimi sunt. * Diosc.


Secundum locum † Populneus sibi vendicat, in quo genere candidum & odoratius præstat; Nigri. † Diosc. cans improbat: Rutilans inter vtriusque medium tener. Quercus omnium villosissimus, præter eam qui faxis & ydis terræ glebis adnascitur, quum à natali atque parente suo muscus naturam imitetur.

Horum omnium varietates quaraplurimæ villorum esilitate, differentia, & figura discreta.

Quædam enim Corallij emulacione ramosa.

Alia cincinnis & capillamentis fimbriata, vel capillitium densissimis, fusè sparitis, luxuriantibus exitum vellus sericeum delicatissimum referunt.

Muscus terrestris denticulatus.




Alia denticellis & sarmentosis viticellis pinnatis compressis arguta naturæ solertia elaborata, reptata serptuque innumeris flexibus implicata.

Diosc. *Alstringendi vim habet. Decoctum insidentium vuluis v. de: unguento balanino, olei q, in spissandi gratia inseritur. Thymianatum, acoperum q, compositionibus conveniens.*

Arabes inter cordis medicamenta inserunt, quod odoris fragrantia animi defectus iuuet, Ventriculum roborat, vomitus compescit, & aluum fistit.

Gal. Pro calamo aromatico substituit.


*Muscus terrestris denticulatus alter.
Mascus terrestris repens Lusitanicus Clasi.*




Ortus & modus superiori non ab similibus: sed ramuli toti densissimis foliorum quasi denticellis compressis, vel squammulis, illecebræ multò minoribus, attractatu fericis, conferti sunt. Sommerseti Angliæ sterilibus montibus (Mendip vernaculè) vbi plumbum effoditur, non nusquam magna gl'ia seorsim, in aggeribus, & saxis.

Muscus

Muscus claustrae. Pes Lepinus.
Perperam Chamapence Cordo.



Muscus scoparius.



Non minus scitè potest hic recentioribus vocari Lupinus Pes, quam alia planta Lepotinus, propter
 7 conini pedis vel vnguis emulationem. Muscidorum & opacorum est hic soboles nemorum, & steri-
 lium vdorum. Obsequiosis iubarisque sarmentis, muscoso capillitio, viridi pallente, aspero, latè de fixis
 per interualla, hinc inde radicibus sese propagat, atque gyros neçtit, spiratue anfractuofas multas, at-
 que superne emittunt ramulos comosos, ternos aut quaternos, villosos pedes & vngulas Lupinas imi-
 tatos; è quibus singulis hirsuta cruscula eriguntur & prominent, vngulas foreipulâque emicrorum aut
 luporum effigiantia: procurrentibus flexilibus ab latere viticulis albidis & glabris, vnde pendula cor-
 riuntur spicata nucamenta, muscosis floribus albicantia: vnde Spica Celtica Officinis & impostoribus
 falsò dicta & vsitata, tum etiam quia summè ad caloulum, & renum inflammationes facere sciunt.
 In Angliâ, Normaniâ, Germaniâ & Belgiâ nemorosis salibus frequens occurrit.

Muscus scoparius.


Muscidorum item & vdorum Belgij & Frisiæ orientalis hic sectator, multis dodrantalibus pedali-
 bus etiamque amplioribus ramulis, purpura aurea nitentibus, innumera circumata tenuium sobole co-
 mosis, è quibus singulis exerantur capitula Lini, Ericæ aut Selaginis iniora.



Muscus capillatus aureus minor.


Minor, minusve specioso nitore, coloreque viuido, tristioreque aspectu visitur in complutis ru-
detibus, asperginosisque limbis parietinorum venustiorum Galliz, Germaniz, Belgiz, & Angliz.

LICHEN, HEPATICA.




Lichen diſta, quia faxis vdis, opacis parietinis, aut petrosis asperginibus innascatur aut quod Dios-
coride interprete Lichenis impetigine affectis medeatur, quod sane facit, adeoque multa difficiliora
efficit, depellitque affectus hepaticos admodum difficiles. Eapropter Hepatica recentioribus dicta
notissima vel plebecula, non tamen illa Muscus dicenda, quia capillares cauliculos, fosciculosque can-
didos, radiatos complutes, Iunio & Iulio profert, è radice perpusillis fibrillis succum è faxis lingit su-
gitque, quibus foia arctè rota superficie squammatim sibi incumbentia adherent, quasi agglutinata,
virentia, crassa, laciniis lactucinis sinuata, Quercusve terrenæ, aut potius marinæ similitudine: gu-
stu herbido, refrigerante, exsiccante: quare Syrupum de Cichorio cum Rhabbaro ingreditur.

Diosc. Illius sanguinis profusa sistit. inflammationes arctæ impetigini medetur. iuuat regio morbo corre-
pta, cum mella illius. oris & lingua deflexiones inhibet.



BRYON *Lactuca folia* Plin.
 MUSEVS *Intybacus crispus marinus*.
Faci prima species Diosc.
Lactuca marina herbariorum.




BRYON *Lactuca folia* Plin.

Saxosis & conchis marinis Mediterranei & Oceani hæc, cuius meminit Theophrastus, in strata reperitur. Eius siue facies, siue ortus non ita dispar à Lichene & Pulmonaria: lætiora tamen sunt folia, viridiora, maiora, & Lactucæ crispæ æmula, valde flaccida, teneriuscula & tenuia. Facultate itidem refrigerandi & siccandi non dispari Lichenis aut Pulmonariæ, sed propter saluginem magis digerente: Eapropter magno commodo tumoribus feruidis & arthriticis biliosis & sanguineis ad-mouetur.

Perperam notatur Plinius, quoddam Bryon, id est, Muscum marinam herbam dixerit, Lactucæ foliis rugosis & veluti contractis, quæ sine caule exeunt; minimè Lichenem, ut quidam putant, describens, qui auctore Diosc. Bryon nonnullis dicitur, quoddam petris adhaereat ut muscus.

Plin. Præcipua siccandi ei, spissandi que vis, & collectiones omnes, inflammationes que cohibendi, præcipuè podagræ, & quicquid refrigerare opus est.

MUSEVS *Pulmonarius, siue PULMONARIA officinarum.*




Simillimus Muscus & de Hepaticæ collatione cuiuslibet nouissimus ad Pulmonum morbos, quæ sinuosis meatibus & punctis, superficie que concolore, quadamtenus expellit multum merito prodesse

MUSCVS capillifve aureus minor.

Minor, minúsvé specioso nitore, coloreque viuido, triftioreque aspectu vifitur in compluris radicibus, asperginofis que limbis parietinorum venustiorum Galliz, Germaniz, Belgiz, & Angliz.

LICHEN, HEPATICA.



Lichen dicta, quia saxis vdis, opacis parietinis, aut petrosis asperginibus innascatur: aut quòd Dioscoride interprete Lichenis impetigine affectis inedeatur; quod sane facit, adeoque multa difficiliora efficit, depellitque affectus hepaticos admodum difficiles. Eapropter Hepatica recentioribus dicta: notissima vel plebecula; non tamen illa Muscus dicenda, quia capillares cauliculos, flosculosque candidos, radiatos complures, Iunio & Iulio profert, è radice perpusillis fibrillis succum è saxis lingit fugitque, quibus folia arctè tota superficie squammatim sibi incumbentis adhaerent, quasi agglutinata, virentia, crassa, laciniis lactucinis sinuata, Quercúsvé terrena, aut potius marinae similitudine: gustu herbido, refrigerante, exsiccante: quate Syrupum de Cichorio cum Rhabarbaro ingreditur.

Diosc. illius sanguinis profusa sistit, inflammationes arctat: impetigini modetur, inuat regio morbo correpta, cum melle illius, oris & lingua defluxiones inhibet.



BRYON *Lactuca foliis* Plin.
 MUSCVS *Intybaceus crispus marinus*.
Faci prima species Diosc.
Lactuca marina barbariorum.




BRYON *Lactuca foliis* Plin.

Saxosis & conchis marinis Mediterranei & Oceani hæc, cuius meminit Theophrastus, instrata reperitur. Eius siue facies, siue ortus non ita dispar à Lichene & Pulmonaria: lætiora tamen sunt folia, viridiora, maiora, & Lactucæ crispæ æmula, valde flaccida, teneriuscula & tenuia. Facultate itidem refrigerandi & siccandi non dispari Lichenis aut Pulmonariæ, sed propter saluginem magis digerente: Eapropter magno commodo tumoribus feruidis & arthriticis biliosis & sanguineis ad-mouetur.

Pesperam notatur Plinius, quòd Bryon, id est, Muscum marinam herbam dixerit, Lactucæ foliis rugosis & veluti contractis, quæ sine caule exeunt; minimè Lichenem, ut quidam putant, describens, qui auctore Diosc. Bryon nonnullis dicitur, quòd petris adhæreat ut muscus.

Plin. Præcipua siccandi ei, spissandi que vis, & collectiones omnes, inflammationes que cohibendi, præcipuè podagræ, & quicquid refrigerare opus est.

MUSCVS *Pulmonarius*, siue PULMONARIA officinarum.





Simillimus Muscus & de Hepaticæ collatione cuilibet notissimus ad Pulmonum morbos, quos sinuosos meatibus & punctis, superficie que concolore, quadamtenus expernit multum merito produbis.

desse creditus. Annosis rimosisque caudicum Quercus, Fagi, aliarumque, corticibus non modò, sed etiam lapidibus, & duris paucisque germinibus, instar cruste aut lorice inducuntur coriacea, duriora, densiora, & anfractuosa folia, cartilaginea, Lichenis ritu & effigie hærentia capillamentis radicantibus tamen cauliculis aut floribus vestigiis conspicuis extantibus. Multi nominis & usus apud Belgas medicos, qui ad vicia pulmonum, tabemque, & sanguinis importunas eruptiones immoderatas ex aqua puluerem dant, frequens etiam decoctionibus indunt. Siccatur admodum, moderatius adstringit & refrigerat.

LENS Palustris Aduers. 129. in Malabathro.
Angl. Dupck meat.

MVSCVS Marinus vulgarissimus.



Muscus candidus Ceratoides similibus multis locis.

Minuto circinate rotunditate Lenticulæ folio, cui perquam tenues cirrorum villi radice loco subsunt. Magna commendationis & usus ad viscerum & febriles æstus Nymphæ de pari dote, decoctis, stillatimã pota & apposita. Ad faciei, oculorum, corporis rubores & capitis dolores apponitur.

DIOSC. In aqua non fluente muscus lenticule simili inuenitur, refrigeratoria natura: propter quod conuenienter collationibus igni sacro, & potageri illinitur per se & cum poluere glutinat & prociencia puerum inter aquas.


MVSCVS marinus.

Nec secus ac telluri & arboribus muscus inuenitur, sic pelagi sub variis nature munifico iuxta scopulis, testaceis, sine conchyliis, Corallis, Miralis, Algis, Fucis, aliisque marinis plantis. Musci Intybacei crustaceis oris, pulmonarij, fruticosi, sirculosi, Corallois, capillacei multiplex differentia adheret.

Dioc.

CORALLIS

CORALLINA.



CORALLINA.

Quæ Corallina dicitur, Officinis hodie notissima: citratis copiosis Corallij æmulatione implexis tenuibus furculis, caulis expers, colore rubicundo, aliàs luteolo, herbaceo, cinereo, aut candido, ossæ duritiæ, ad vermes profligandos decantatissimis viribus.

Muscus.

Diosc. Præcipua ei spissandi vis; & collectiones cohibenti, & podagras quas refrigerare opus est.

Gal. compositus est ex terrea & aquea essentia, utraque frigida. Siquidem & gustu adstringit, & calidis quibusque illitus, ea evidenter refrigerat & adiuuat.

CORALLIVM.

Multò plura quàm antiquis prædita Corallia & Corallinæ reperiuntur: quæ nec in tempestivè Muscis succedent ad seriem plantarum continuandam; ut quæ se offerant similima, ita proxima serie ex nostro instituto annectenda. Corallium fruticis forma colore Rubiæ radicis æmulum, vniuersæ Europæ perculatum, maximèque vsus & commodi.

Varietas è colore. Reperitur & pallidum flavescent.

Diosc. Adstringit, refrigerat modiciter; excrescentia coarctat; ocolorum cicatrices abstergit; veterum casus & cicatrices explet, contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est. vena difficultatis auxiliatur, quæ & potum ex aqua lionem adsumit.

Math. Comitibus commodè adalligatur, exhibeturque in potu. Corallio ædes à fulminum iniuria tæri supersticiosum & fabulosum. Quoties sic candam, sistendum, eructandum eruptiones qualis menstruas, dysenterias, & cruentas deiectiones, ad corallia resugunt.

Vstum efficacius siccatur: Torminibus & vesicæ calculi malis medetur Plinio ex aqua potum. Similimodo ex vino potum, aut si febris sit * ex aqua: somnum conciliat.

Si febris ex aqua. * } quia refrigerat, & aqua humidat; febris ætuosos vapores somnum perturbantes & inhibentes cohibet.

Plinius videtur ignorasse poliri & concinnari baccas & grana coralli globulis nestendis, quibus filio traiectis preces fundebant & supplicabant, moniliaque parabant.




ANTIPATHES sive *Corallium nigrum*. Diosc.



Masilis inter coralla occurrit, insigni leu-
re perpolitum, colore nigerrimo.

Diosc. Specie tantum distans, est autem color
nigro arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti
habet.

CORALLINA rubens *Antipathi facie*,
An Quercus marina folio Myrica Theop.



Corallina
alba.



Corallina Antipathi facie varietates.


Alba, rubra, lutea, torulo intus corneo
Antipathi concolori & non dissimili reperitur non
modo Narbona & Galloprovincia mediterra-
neis littoribus, sed etiam Angliae occidentis &
Normanniae.

CORALLIVM album.

Hicdem Tyrrheni pelagi sub vndis Corallium
candidum evellit, similibus crebris furem-
lois anfractibus & flagellis, sed accutibus in-
scutigrum Polypi piscis annulatione. Non longe
magis refrigerare proclit.

Cor

CORALLOIDES, sive Corallij albi variolati.



Stipite longè crassiore brachium æquante, & materia magis fungosa, multis acetabulis insculpta aut inscripta.

Vniuersa planta pedem, vnum longa est, vixque cubitum proceritate superat.

CORALLIORVM solutio & Vniomina,
Chymistice ex G. Alder.

Eodem modo quo margaritas in liquorem redigimus. Alij vel vniomnes, vel corallia minutim contusa in aqua ardenti siue viridi salis liquore soluant prius in calcem: deinde hanc abluunt stillando, donec nulla amplius salsedo percipiatur: postea puluerẽ vini spiritu excipiunt, & per balneũ sexies aut septies refundendo abstrahunt. Alij corallia in calcem subigunt: hanc resolunt, & ex vi-

ni spiritu nouies exstillare sinunt, dum salis instar dissoluantur. Quicquid autem in fundo remanet, id recenti vini spiritu perfundunt, & priore modo euocant, vsque dum tinctura coralliorum proueniat, quam ipsi animam appellant, summum medicæ facultatis mysterium: quo omnes interiorum partium affectus radicitus euelluntur, & corpus cælesti quadam vi in temperatum habitum, absolutamque & exquisitam commoderationem restituitur. Sic igitur quinta Coralliorum essentia quemlibet morbum comitalem à pueris & ætate prouectioribus in quinque septimanis prorsus subtrahit. Sic etiam omne alui profluvium à quacunque causa ortum, tam in pueris quam in adultis, cohibet, etiamsi morbus ad extremum peruenerit. Ita sanguinem à quacunque parte manantem coëctet, quouis modo adhibita. Sic denique fluores vterinos quoscunque sistit, & ad probam naturæ temperationem reducit, ne quid mali recidui in reliquis corporis partibus vnquam, quemadmodũ ex alijs medicamentis omnibus, consequatur. Adhæc idem oculis superimpositum, eorum dolores sequat: defluxiones mirifice compescit & pustulas discutit. Intra corpus sumptum eisdem propemodum, sed non tam efficaciter præstat, vt tinctura. Hæc enim decem guttarum instar ex liquore aliquo idoneo exhibita, mirabilia tam in vires, quam feminis, iunioribus & adultis efficit. Quinetiam corallia ex singulari facultate qua donata sunt præ cæteris corpori foris aut alligata, aut appensa nimios vteri fluores, tum albos, tum rubicundos ad moderatum statum reducunt, ventris profluvia adstringunt partum facilem reddunt: spiritus animi recreant, melancholiam, tristitiamque abigunt: sanguini profusenti ex venis, vulneribus, hæmorrhoidibusq; subueniunt: convulsiones, morbumque comitalem mitigant, præcauentque.



Vnionum solutio est Aldernac.

Primum in puluerem rediguntur & vitro oris angusti induntur, perfundunturque aceto distillato optimo, ita vt hoc ad duos digitos superemineat: deinde in cineres calidos ponuntur donec soluantur: postea quod solutum est, in balneo extillatur ad siccitatem vsque; & super calcem hanc vnionum, aqua pluuialis stillatitia funditur, rursusq; distillatur, dum omnis humor emanarit: tunc iterum affunditur recens aqua stillatitia, rursusque detrahitur vt antea: atque is labor ter quaterue repetitur, quoad nihil aceti subesse percipiatur. Tandem puluis siue calx vnionum, aut in loco humido supra marmor dissoluitur, aut ex spiritu vini maceratur, distillaturque dum in liquorem olei instar redigatur: Cuius grana sena ex humore aliquo ad resolutionem neruorum, conuulsionem, marcorem senilem & phrenitidem dantur: corpus sanum conseruat: laesum pristinae sanitati restituit, lac muliebre emendat augetque naturalium partium vitia, & semen corrigit. Abscessibus, vlceribusque exedentibus, cancro, & haemorrhoidibus medetur.

Auri dissolutio.

Per spiritum vini quidam Aurum potabile fieri affirmant; dum foliorum auri drachmae duae ex aceti spiritu prius soluantur: deinde purgantur. Postea in aqua vitae vncijs sex per dies triginta digeruntur, redigunturque in liquorem auri praestantissimum.


Vræk Nortmanorum videntur FVCI PLINIANI.

Vniuerso illo littore occidentali pelagi Gersæ & Garnesæ Angliæ amœnissimis insulis inter Britanniam & Nortmaniam tantus prouentus in scopulis, vt eminus tanquam syluæ spectentur, vbi defluo mari secatur & auellitur, vritur Kali ritu, & cinere lato solum & veruastatiora & pinguiora redduntur.

Maximo folia vt plurimum terna. Peti binum, ternum & quaternum cubitorum, latitudinis palmaris in caudice binum, & ternum cubitorum, sesquianciam & duas vncias crasso, corneo, rubiginoso, vti & folia.

Plin. enim Fuci marini genera, latum & alterum longius quadamtenus rubens: tertium crispis folijs quo in Creta vestes tinguntur.


Nascuntur in mari frutices, arborese; minores in nostro: rubrum enim est: totius orientis Oceanus refertus est sylua.

FVcus marinus folijs Abrotani maris.*QUERCVS Marina.*

Quamplurima genera spectantur, quorum altera à quæna fructus similitudine Quercus marina dicitur, fructu oliuari, tereti, membranaceo folliculo ducitorio.


Aliæ folijs laciniatis, fimbriatis, alioribus diuisuris, Absinthij, Artemisise, & Abrotani maris: folliculis non dissimilibus; sed nonnunquam triplo maioribus radicem Asphodeli æquantibus, colore quadamtenus rubentibus vel ferrugineis.

Fucus ferulaceus.




Ferulaceum diximus ob folia ferulacea minutius divisa. Scapum emittit pedalem in quo Cordilina candida sæpius innascitur.

LENTICULA marina Serapionis & Vaæ
marina quorundam.



LENTICULA marina serrate folijs.



Tyrsheni maris & Adriatici indigena hæc; folijs angustis Scopariae dictæ Olycidis, in flexilibus lobaticis petiolis sesquipalmaribus referis & ovatis copiosis bacis vacuis melleis tenibus lenticulis similibus & paribus, unde ei nomen.

Varietas, Perfoliata & eadem, nisi latiora & breviora, nonnihil ambitu serrata, aliis folia.



Vnionum foliis ex Aldernac.

Primum in puluerem rediguntur & vitro oris angusti induntur, perfundunturque aceto distillato optimo, ita vt hoc ad duos digitos superemineat: deinde in cineres calidos ponuntur donec soluantur: postea quod solutum est, in balneo extillatur ad siccitatem vsque; & super calcem hanc vnionum, aqua pluuialis stillatitia funditur, rursusq; distillatur, dum omnis humor emanarit: tunc iterum affunditur recens aqua stillatitia, rursusque detrahatur vt antea: atque is labor ter quaterque repetitur, quoad nihil aceti subesse percipiantur. Tandem puluis siue calx vnionum, aut in loco humido supra marmor dissoluitur, aut ex spiritu vini maceratur, distillaturque dum in liquorem olei instar redigatur: Cuius grana scna ex humore aliquo ad resolutionem neruorum, conuulsionem, marcorem senilem & phrenitidem dantur: corpus sanum conseruat: laesum pristinae sanitati restituit, lac muliebre emendat augetque naturalium partium vitia, & semen corrigit. Abscessibus, viccribusque exedentibus, cancro, & hamorrhoidibus medetur.

Auri dissolutio.

Per spiritum vini quidam Aurum potabile fieri affirmant; dum foliorum auri drachmae duae ex aceti spiritu prius soluantur: deinde purgantur. Postea in aqua vitae vncijs sex per dies triginta digeruntur, redigunturque in liquorem auri praestantissimum.

Vrck Nortmanorum videntur FUCI PLENIANI.

Vniuerso illo littore occidui pelagi Gersae & Garnesae Angliae amenissimis insulis inter Britanniam & Noremariam tantus proventus in scopulis, vt emius tanquam syluae spectentur, vbi defluo mari secatur & auellitur, vritur Kali rita, & cinere lato solum & veruactaliora & pinguiora redduntur.

Maximo folia vt plurimum terna Peti binum, ternum & quaternum cubitorum, latitudinis palmaris in caudice binum, & ternum cubitorum, sesquianciam & duas vncijs crasso, corneo, rubiginoso, vti & folia.


Plin. enim Fuci marini genera, latum & alterum longius quadamtenus rubens: tertium crispis folijs quo in Creta vestes tinguntur.

Nascuntur in mari frutices, arboreseq; minores in nostro: rubrum enim est: totius orientis Oceanus refertus est sylua.

QUERCUS Marina.

Quamplurima genera spectantur, quorum altera a quernae fructus similitudine Quercus marina dicitur, fructu oliuari, terebi, membranaceo folliculo duricorio.

Aliae folijs laciniatis, fimbriatis, alioribus diuisuris, Absinthij, Artemisiae, & Abrotani maris: folliculis non dissimilibus; sed nonnunquam triplo maioribus radicem Asphodellaequantibus, colore quadamtenus rubentibus vel ferrugineis.


Fucus marinus folijs Abrotani maris.

Fucus ferulaceus.



Ferulaceum diximus ob folia ferulacea minutius diuisa. Scapum emittit pedalem, in quo Corallina candida sepius innascitur.

LENTICULA marina Scopionis & Vasa
marina quorundam.




LENTICULA marina serrate folijs.



Tyrrheni maris & Adriatici indigena hæc; folijs angustis Scoparie dictæ Olyridis, in flexilibus floratis petiolis sesquipalmaribus refertis & onustis copiosis baccis vacuis in æternateis teretibus lentis similibus & paribus, vnde et nomen.

Varietas. Perisimilis & eadem, nisi latiora & breuiora, nonnihil embrya serrata essent folia.



CONFERRA.

Plin. Peculiaris est Alpina maximè fluminibus Conferua appellata à ferruminando, spongiæ aquarum dulcium verius quàm muscus aut herba, villosa densitatis, atque fistulosa. Curatum ea scio omnibus. ferè ossibus cōfractis prolapsum ex arbore alta putatorem, circumdata vniuerso corpori, aquam suam inspergentibus quoties inaresceret, raroque nec nisi deficientem herbam mutationis causa resoluētibus conualuisse, vix credibili celeritate.

Spongiosis, flexuosis sesquicubitalibus & longioribus quasi ellychniis & fusco virētibz staminibus villorū citris lenè fluentibus aquæ fluitans, scitè Pli. spongiæ aquarū dulcium verius, quàm muscus aut herba, villosa densitatis. In lacu maiore Mediolanēsis agri reperitur.

CONFERRAE marinae genus videtur.




In Angliæ littore meridiano insulae Portlandiæ vocatae, ex aduerso Nortmaniae, inter fluitantes Algas reperimus plantæ quoddam rudimentum; cuius si spectes, & atrectes surculos palmares & sesquipalmares, pustulosos, molles, flexiles, Spongiam prorsus dicas, cui etiam concolor est, & vixisse putes: sui habitum & ortum ramis brachiatum, Corallinis affiniorem dicas, vnde quidam apud Plinium Plocamon Isidos Corallio similem, sine foliis, præcisum mutato colore in nigrum durescere, cum cadat frangi solitum, coniectarunt. Ea tamen videtur Antipathes Dioscoridis, cuius etiamnum ramulum paulo antè exhibuimus è Massiliensium piscationibus.



Visum est subdere aliquot rarissimas icones ex nostris rerum Britannicarum antiquitatis naturæ observationibus.

BRITANNICAE Concha Anatifera.
Gallis Macreusæ.
An Sapinettes Nortmannorum eadem.

LITHOXYLEA, lignæ lapideæ Anglica.



Facit specimen istud Naturæ quippiam boni vel è sordibus meditâtis, vt iam multa labeat credere quæ alioquin risissemus, si legissemus apud rerum Septentrionalium Historicos: quanquam paulo secus hi narrant, duntaxat in Scotia aut Orcadibus maris Caledonij Arctici, olim à Romana classe deuictis, compertum. Nos verò non solum ex Scotia, sed etiam hic ad Tamesim amnè, quæ Londinum præterfluit, conchas pediculo rugoso crassiore è nauis annoisæ carina auulsas habemus. Sunt eæ admodum pusillæ circinatæ ferè rotunditatis conchæ, foris albidæ, lucidæ, læues, tenuitatemque testæ ouaceæ fragilem, biforem, Mituli modo præferentes, nuci Amygdalæ compressæ pares; pendulæ autem erant hæ foris ad imum ventricosæ nauium carinæ, cui musco & limo semiputridæ innati erant quasi fungi pedicelli, quos ferè ouracum vmbiliculi dixisses, cuius extremum fructuum ritu inferebatur latiusculæ conchæ basi, quasi vitam alimoniam que inde fugerent auiculæ, quarum rudimenta è summa parte conchæ huius, conspiciuntur. Pediculos istos ferunt Historici primùm è vermiculis concreari, quod non potuimus scire, neque dum credere: tamen scimus has easdem conchulas elegantissimè efformatas in sarculis arborum, quales dono mihi dedit Londini superioribus annis industrius iuuenis Andreas de Fourmestraux bonus ciuis & mercator Insulanus, quæ maris æstus alluit temerè proiectorum, aut depactorum sobolem esse. Earum autem quæ humi, in sicco labuntur, emori: quæ verò alluionibus maris rapiuntur, concha excludi, & in Anatem, aut ei congenerem auem adulescere. Has volunt esse *Barnacles* Angli & Britanni Galli: *Clekis* vocat Scotia: vbi abundant & capiuntur dum per brumam concreuerunt gelu paludes. Sapit nobis estantibus Anatem aut Anserem syluestrem, Alij Anati similitam, sed minorem, fusci coloris rostro croceo maritimam auem.

LITHOXYLEA, lignæ lapideæ Anglica.

Compertum nobis est esse amnes & riuulos, vbi merli pali lignei, ridicæ, aut conti, aliquot mensibus lapidescunt: imò ferè, vt sic dicam, ferrescunt, eadem persistente superficie, situ striatum & fibrarum ductu pristino: vt eminus, quas assulas ligni dices, atre stracho & lapidi illidendo dicas esse lapidem ferri mineræ immixtum, soliditate, grauitate, duritie & duracione lapidea, nec fiamis obnoxia: cuiusmodi magna frustra videre est in illo monticulo affabrè multiplici lapidum mineralium structura planè visenda, constato, ad tubulos & elices transmittendos fontis perantoni, qui scaturit Londini in horto eximie literaturæ & prudentiæ inuocabilis Cæcilij Angliæ meritisissimi Cæcellarij. Mirificas hæc aquas è montibus præfecturæ Bedfordiæ & in Cambria siue Angliæ Occidua, quam Valliam vocant, emanare multi asserunt.

F I N I S.



DE SUCCEDANEIS, IMITATIONE RONDELETH.

E CUIVS FRAGMENTIS ET PRÆLECTIONIBVS

HÆC FERÈ DECERTA SUNT.

Cum attentiore lectione animaduertissem vulgatum Succedaneorum libellum, quem nonnulli Galeno, alij Paulo acceptum ferunt, scaterere mendis, & plerisque locis inutilium esse; utpote qui ex Græco in Arabicum, & de Arabico sit denuo Latine versus, aut potius peruersus, à Mauro quopiam, vel Maurogræco, qualis fuit & Actuarius: visum fuit, quæcunque Dioscorides, Galenus, Aetius atque Paulus literis mandassent, experimentaque tum veterum tum recentiorum confirmassent, seligerè; eaque sic digerere, ut quid alteri cuius æquipolleat, studiosis in posterum pateret.

Hunc autem libellum neoterici cuiuspiam esse vel id plus satis arguit, quòd nonnulla addita inibi sint quæ Galeni tempore ignota fuere, uti Anacardia, aliaque complura: nullo tamen ordine aut defectu, ac sine iudicio. Ut, quòd fortè Chamæmelini legerant alicubi, nominis decepti affinitate, Melinum subdiderunt, quàm inscitè, nullus est qui id ignoret: illud enim laxat & moderatè calfacit, hoc verò refrigerat astringitq;. Eadem ineptia quòd fortè Cæpæam Portulacæ similem legissent, illius vires huius facultatibus responsuras putarunt. Itidem leporem fluuiatilem cancri loco usurpari; vel, ut alius quispiam correxit, marinum: indoctè, ut qui ignorasse videatur cancrum alimentum & antipharmacum esse; leporem verò vel odore solo vomitorium & venenum. Nec hoc falsum solummodò, at & discriminis plenum, cum loco Opobalsami Opocarpatum substituunt, quod venenum frigidum est Dioscoridi, vinoque, uti Cicuta, expugnandum, teste Gal. lib. De antidotis. Verùm si hinc Carpason legamus, vera fuerit lectio, est enim tenuium parrium. Cinnamomo item Behen rubrum respondere nequit. Neque placet ordo seriesque collationum: nam olea oleis, non resinis aut aquis sunt conferenda, ut, quoad eius fieri potest, sint simillima. Deinde si non licet ex specie proxima, saltem è genere, cum abundemus probis remediis. Nec parui facio regionum ubi nascuntur proprietates, veluti Creticarum plantarum, quas Italicis efficaciores puto, nisi squallida admodum fuerit æstas: tum enim Polium Italicum aut Stœchas non cedunt Cretico aut è Stœchadibus insulis.

Imperitiæ fatuæ est, substituenda præcipere rarioribus inuentu, ea quibus careremus, aut adulterata, ut loco cinnamomi, amomum. Infantiæ itidem, ubi abundamus lactuca, opocarpatum optare. Licuerit tamen, si qua sint rarius obuia aut minus trita, eorum loco usurpare viribus similia, uti Terebinthinæ veræ loco, Lentiscum, qui frequentior & feracior est.

Quum autem succedaneis uti non rarò cogamur, nec enim omne fert omnia solum, nec ubiuis medicamenta oportuna occurrunt, (turi enim *in vitro* videndum: & quæ medicamenta necessaria ad repentinos casus ad manum minimè sint, presentibus utendum) eligenda erunt quæ nostris simplicibus substitui possunt, ut Galenam fecisse legimus, cui Euphorbium cum ad spicula, aculeos & infixæ eximenda decisset, ex alueariis Propoli pro Euphorbio felici successu usurpauit.

Succedaneorum verò vsus hodie magis est necessarius quàm vquam fuit; cum multis quæ antiquis in regionibus suis exortiuis & exoticis diues & vber proventus sufficiebat, hodie careamus; tum supposititia Hebræorum & mercatorum vasto ingenio adulterata transfrahantur, quæ si relicienda, alia substituere necesse est. Adhæc pleraque prisca simplicia medicamenta exolera, antiquitus notissima & vltatissima, hodie ignorantur.

Permultæ Arabibus excogitatæ & viles inuentæ compositiones efficacissimaque remedia in vsu recepta, quorum simplicia barbarie vocum nobis prorsus ignota sunt.

Quid

Quid enim nominibus illis barbaris significare voluerint, nescimus; aut illis catemus. At in succedaneorum delectu & usu pessima illa medicorum consuetudo merito reicienda, quæ iam à multis annis inualuit, magno ægrotantium incommodo; qua in compositione remediorum omnia quæ commendata sunt vel ad morbum, vel ad partem affectam, vel aliquod symptoma, congerunt temere; & cum omnia similia usurpant, haud habent amplius quod pro ea herba aut medicamento substitui possit.

Quod si vna, duabus, vel tribus herbis contenti essent, nunquam succedaneis destitueretur pharmacarius. Sin autem quantitas necessaria foret, pro manipulo adde duos, pro duobus tres vel quatuor. Hinc duo consequentur commoda; certior medicamenti operatio, facilior & citissima præparatio; pluribus remediis & succedaneis summo artis Medicæ ornamento abundabit medicus, cui iterare, immutare, supponere pharmacæ licebit, & plura quam vulgus Medicorum & Clinicæ sapere. Ut si in suo decocto Borraginem præscribat, ea si defuerit, Buglossum agreste substituet, vel contra: si scario-la desit, succum substituere vel syrupum licebit: si Cichoriû, Dens Leonis, vel Endiuia: si Chamæpitys, Chamædryes substituatur, si desit, vel contra. Sed quid faciet si omnia congerantur in vno eodemque medicamento? certe nihil aliud erit, quam poeticum illud chaos,

Rudis indigestaque moles.

Illud Villanouani ante oculos voluant, vbi in promptu habentur simplicia, dolum esse si quis compositis utatur.

A praua igitur consuetudine recedant, & illos tanquam scopulos vitent: caueant item malos, auaros, improbos, indoctos & impudentes pharmacarios, qui nummi & lucri rapaces, farraginem medicamentorum etiam semipuriorum collaudant.

Quidam hoc faciunt ut copiam ostentent, vel ignorantia, vel superbia, & aliqui docti, ne videantur in remediorum cognitione minus exercitati.

Porro cum sint quædam compositiones viles præcis medicis excogitatae, experientia & ratione receptæ & comprobatae, nonnulla succedanea inuestigare, agnoscere, & sufficere oportet, ut parari possint nobilissima pharmaca, quæ ea ratione minime excludenda & reicienda: cum non tanta infelicitate succedanea quædam illis non inferiora interdum æquè bene expleant omnes pollicitationes genuini medicamenti.

S V C C E D A N E A, Q V A N T V M F I E R I
potest, eiusdem sint generis
& speciei.

Rondelet. Herba pro herba.
Radix pro radice.
Flos pro flore.
Semen pro semine.
Succus pro succo.
Lachryma pro lacryma.
Resina pro resina.
Muccago pro mucagine.
Metallum pro metallo.
Lapis pro lapide.
Terra pro terra.
Pix pro pice.
Axungia pro axungia.
Medulla pro medulla.
Auis pro aue.
Serpens pro serpente.
Pars animalis pro parte.



COMPOSITIO PRO COMPOSITIONE.

Puluis pro puluere.
 Trochiscus pro Trochisco.
 Opiata pro opiata.
 Electuarius pro electuario.
 Pilulae pro pilulis.
 Eclegma pro eclegmate.
 Tabella pro tabella.
 Confectio pro confectione.
 Conseruatio pro conseruatione.
 Syrupus pro syrupo.
 Emplastrum pro emplastro.
 Oleum pro oleo; siue simplex, siue compositura.
 Vnguentum pro vnguento.

THEOREMA VNIVERSALE VEL COMMUNE.

Medicamentum quod substitui debet,
 siue in internis, siue externis conuenire debet

viribus occultis,
 manifestis,
 & consistentia.
 Sit etiam simile in
 Sapore,
 Odore,
 Aetate,
 Natalitiis & regione
 Natura & temperamento.

Nonnulla in externis remediis supponuntur, quibus in internis vti non licet: vt succus Carpaci substitui potest pro Lactucæ succo in externis: cum tamen venenum sit, nõ introsumitur.

Non totum simplex; sed aliquæ partes substituuntur.

vt Mucago seminis Psyllij pro mucagine seminis Cydoniorum: non totum semen, quia pars interior temperamento differt à mucagine, & venenata putatur. Neque etiam Cydonium malum conuenit pro semine suo; quia viribus & consistentia differt.

Formulæ quædam in quibusdam remediis sibi mutuo succedunt. vt

Conseruatio, pro syrupo eiusdem simplicis, fructus, floris, vel radice.

Conseruatio Capillorum veneris, pro syrupo in opiata substitui potest: Sed in syrupo consistentia non potest; quia remedij formula non patitur.

Pro liquidis liquida substitui debent: quare deficiente syrupo, aqua vel herba decoctum substituantur.

In quibusdam conditis supponere licet syrupum Conseruationis, quia in syrupo conseruantur. Vt syr. Conseruationis Citri, pro syrupo à corticibus Citri. Syr. Conseruationis radice Buglossi, pro syrupo de Buglossi.

Emplastris item pro vnguentis vti licet; & contra, modo pars affecta assentiat, vt Emplastro filij Zachariæ, pro vnguento Resumptiuo, & Resumptiuo pro emplastro. In thoracis verò affectibus, nisi dissoluatur aut malaxetur, non vtendum, quia emplastra imposita dilationem costarum & respirationem impediunt.

Emplastrum è Cerusa, pro vnguento albo, nisi inflammatio prohibeat, quæ neque dura neque graua ferre potest.

VARIA ALIA MEDICAMENTA PRO ALIIS
substituere licet, modò vires correspondéant.

Pilulæ pro confectionibus : & Confectiones pro pilulis. vt
Hyera simplex pro pilulis de Hyera & Benedicta, & contra.
Et pro pilulis pituitosis, Electuarium Diacarthami, de Citro solutium.

Pro biliosis, Electuarium de succo Rosarum & contra, obseruata cuiusq; quantitate.
Hyera & similia Electuatiorem doses augenda, ob mellis molem, quæ medicamenti vires minuit.

Syrupus pro eclegmate, si lambendo assumi debeat, vt
Syr. Iuiubarum pro Looch sano & experto.
Syr. è Papauere, pro Diacodio.

Puluis pro trochisco, & contra, vt
Diarrhodon pro trochiscis diarrhodon.
Trochisci de Squilla, pro eclegmate de Squilla, aucta vel imminuta quantitate pro
ratione, indicatione morbi, & scopo medici.

In simplicibus partes aliquando religiosè non obseruantur.
vt Turbith pro Agarico trochiscato, & contra. Hic simplex pro composito ponitur, vel
compositum pro simplici.
pro Agarico Colocynthis in minori quantitate.
Carthami duplum & triplum pro Agarico, & contra.

Difficile tamen inuentu simplex medicamentum substituendum quod verè vnde-
dequaque omnique ex parte conueniat; vt testatur Auicennas in suo canone; vbi vix
reperies duo simplicia medicamenta, aliorum facultate similia penuria, substitui tu-
to possint. Quod cum difficillimum foret, ille aliquando duo, interdum tria, pari pon-
dere & mensura, nonnunquam duplicato & triplicato, addita quinta aut octaua parte
alterius medicamenti, supponit. Quia paucissima sunt medicamenta quæ omnino si-
mile temperamentum obtineant, aut eandem consistentiam, crassitiem, tenuitatem
partium, & proprietates occultas.

Variis in compositionibus est medicamentorum vsus.
Vel ob calorem, frigus, humiditatem, siccitatem; in principio primi, in medio & primo
gradus, & sic de aliis.


Vel ob partium tenuitatem, vel crassitiem, lentorem, saporem, odorem, colorem;
quare id quod temperamento respondet, sæpe dissidet crassitie vel tenuitate partium,
vel alia facultate. Vt pro Asaro Acorum substituendum censent. At in omni operatio-
ne non conuenit. non enim omnia potest Acorus, quæ Asarum. Urinas quidem & men-
ses ciat: (quare in vetricis tantum supponendum) vomitum verò excitare, aquasque
educere, vt Asarum, minimè valet.

Eadem ratione Hyacinthus pro Anchusa substituitur. Sed si ob colorem Anchusa o-
pus sit, vt in vnguentis, Hyacinthus non conuenit.

Eius verò loco Lacca supponitur, vel Brasilia, Santala rubra, Lacca pictorum, vel
Coccus baphicæ.

Asa dulcis pro fastida non conceditur propter odorem, vt Auicennas substituit, in
affectu

pro Asaro
Acorus.



affectibus veteri, quia odore iucundo vterum sursum alliceret: sequitur enim odorata, fugit foetida.

Propter saporem quaedam usurpantur, sed non conveniunt vndequaque.

Pro Saccharo Mel & Manna substitui poterit in quibusdam remediorum formulis, ut in medicamentis laxantibus: minimè autem in adstringentibus, quia manna ventrem solvit magis quàm Saccharum vel Mel.

Pro Saccharo mel & manna.

Muccus utilis est in fluxu sanguinis, & ob lentorem usurpatur Fœnumgræcum, quod mucaginem reddit, sed calidam: ideo in sputo sanguinis reiicienda, quemadmodum in externis remediis, ut Ophthalmia, in qua oui albumen praefertur quidem in principio & incremento, in statu verò & declinatione muccago Fœnigræci commendatur.

Quæ supponuntur, non in omni formula remedij substituuntur. ut Myrrha pro Bdellio in pilulis & vnguentis.

Sed in pilulis è bdellio nullo modo conceditur, quia sanguinis fluorem & hæmorrhoidarum, ut menses Myrrha, elicit.

In substitutis igitur hæc obseruare oportet, ut supposititium in locum adulterati genuini penuria, eadem efficiat quod ipsum genuinum præstabat.

Ut si calfaciebat, refrigerabat, humectabat vel siccabat, adstringebat vel laxabat, vel concoquebat.

Pro Absinthio simpliciter dicto in compositionibus Græcorum, Seriphium vel Santonicum.

Pro Absinthio è Ponto vel Tauro monte, Romanum.

Pro Romano, illius loci vbi habitas.

Hoc licet in omnium herbarum delectu præstare, quæ sunt alicuius regionis; modò illam ipsam herbam regionis finitimæ, vel saltem similitimæ assumas. Cuiusmodi est *Craux* vulgò Gallo-prouinciæ, siue Creta, vbi *Thymus nostras angustifolius* & *Epithymus* optima & copiosissima.

Secundo loco herbæ regionum humidarum, modò æstas squallida fuerit, in locum calidarum substitui possunt. Quod fecisse Galenus docet in præparatione Theriacis.

Pro Macedonico Petroselino, Petroselinum alterius regionis.

Sed regionis similitudinem obseruare oportet. nam regio auget vel minuit medicamenti efficaciam & bonitatem.

Pro Iride Illyrica, Venetam sumemus. &

Pro Africana, Florentinam.

Gal. de An. p. d.

RADICES.

Rhapontico, Radix Centaurij maioris, vel nostri Rhabarbari magna, siue Rhabarbarum ad alios vsus prius infusum & expressum. Rhabarbarum torrefactum improbatum à multis propter empyreuma.

Zingibere, Costus, & contra, vel Helenium, vel Pyrethrum.

Costo, Pyrethrum.

Aristolochia longa, Rotunda, & contra, vel vna pro omnibus.

pro Acoro, Calamus aromaticus Officinarum, & contra.



Acoro in laxantibus & cientibus urinas & menses; Radix Afari.
 Afaro, quando purgare & vomitum ciere opus est; Elleborus, Semen genifae &
 Raphani, vel hæc tria fimul.
 Galanga; Cyperus rotundus, & contra.
 Calamo odorato Libani; Schœnanthum; calamus siue Acorus officinarum: si ad
 odorem solum; Santalum citrinum officinarum.
 Alchæa; radix malux hortensis, vel syl.
 Asparago altili; Corrua imminuta quantitate, quia acrior & efficacior.
 pro Rusco; Radix Asparagi, & contra.
 Cortice radice Capparis; Cortex radice Tamarisci, Sambuci, Ebulli, Populi &
 Lauci.
 Apij; Petroselini, vel Macedonici.
 Gentiana; medietas Afari & radice Capparis.
 Turbith; Thapsiæ radice, siue Turbith Mesux, Agaricus trochiscatus, vel Colocyn-
 this minore dose.
 Zingibere, Mechin.
 Serpentaria, Iarus, Draunculus.
 Lapatho, Oxalydis radice.
 Rhabarbaro ad laxandum, succus Rosarum.
 Rhabarbaro ad adstringendum; Hydrolapathi radice, vel Galangæ maioris, si ca-
 lore opus est; si refrigeratione, radice Bistortæ.
 Nardo, Nardi species.
 Secacul, radice pastinacæ marinæ.

SUCCEDANEA QUANTVM FIERI POTEST SINT SIMILIA
 omni ex parte, vitibus, genere, & specie. vt,

Omnes Dauici species,

Inrybi,
 Adianti,
 Condrillæ,
 Hierachij,
 Rumicis,
 Absinthij,
 Abrotoni,
 Sideritidis,
 Aconiti,
 Veratri,
 Anagallidis,
 Anchusæ,
 Anemones,
 Asparagi,
 Brassicæ,
 Calaminthæ,
 Capæ,
 Chelidonij,
 Costi,
 Nardi,
 Betæ,
 Blicij,

Iuniperi,
 Sabinæ,
 Cedri,
 Rhamni Diosc.
 Myrthi,
 Piperis,
 Cyclaminis,
 Ranunculi,
 Hederæ, excepta Hederula terrestri.
 Rutæ,
 Sefeli,
 Apij,
 Rosmarini,
 Marrubij,
 Leucij,
 Orcheæ,
 Malæ,
 Polygoni macis & feruinae.
 Symphyti,
 Tribuli,
 Rubi,
 Equiseti,
 Vrticæ,



Tithymalorum,
 Mercurialis,
 Heliotropij,
 Origani,
 Aristolochiaz,
 Valerianæ,
 Bituminis,
 Picis Resinæ,
 Allij,

Porti,
 Plantaginis,
 Panacis,
 Pastinacæ,
 Lychnidis,
 Conisæ,
 Nymphææ,
 Anthemidis,
 Verbasci.

Et denique omnes, nisi quid proditum inhibeat, vt de Clematide; quarum altera v-
 rere, ventrem laxare, bilem, pituitam trahere scribit Diosc.

Prior verò alui profluvia & dysenterias sedat.

Sic cucumis agrestis, & satius: pepo & colocynthis. sed hæc paucis euenire solent.

De partibus etiam obseruandum. nam aliquæ facultatibus differunt, vt Radix me-
 dij: menses decocta sistit per aliquot dies sumpta. Semen autem in vino sumptum men-
 strua pellit.

Iuniperi fructus introsumentur, ramenta vero occidere produntur.

Coriandri herbæ succus interficere creditur: semen verò medicatum.

Qua ratione medicos minimè vniuersalibus, sed potius particularibus niti præstaret:
 Name eorum plerunque est maxima differentia quæ eadem esse putantur.

Sume igitur

Pro folio Indo & Malabathro, folia Citri, Cancellæ vel Malabathri vulgaris.

Pro foliis Lauri; Citri folia:

Papaueris albi; Solani folia; Papaueris nigri minore quâtitate, vel folia Hyoscyami albi.

Lactuca; Scariolam; & contra.

Cichorio syluestri; Dentem Leonis.

Pro Dytamni prima specie; secundam, tertiam, vel pulegium.

Calametha montana prima, secundam, & tertiam. Sic de similibus.

Chamæpity; Chamædryn, & folia Eupatorij.

Malua syluestri; hortensem.

Malua arborecente; Althæam.

Thlaspi; Nasturtium.

Mentha; Balsamitam.

Pulegio Regali; Ceruinum, & contra.

Lepidio Pauli Æginetæ; Drabam, vel Iberida, vel Nasturtium.

Phyllitide; Asplenium siue Scolopendrium, Ceterachæ, & contra.

Foliis Oleæ vel Lentisci	} Folia	} nucum Iuglandis, Cupressi, Pini, vel Pinastris


Foliis Myrthi	} Baccas Myrthi, vel Iuglandis nuce immaturas.

Thymo; Saureiam, vel Origanum.

Ruta syl. Ruta domesticam siccatam maiori quantitate, vel contra.



- Spica Lauendula; Lauendulae species hortenses.
 Adianto; Saluiam vitam, Polytrichum, Adiantum nigrum Plin.
 Telephio; Portulacam.
 Portulaca; Umbilicum Veneris.
 Foliis Terebinthi; Lentisci folia.
 Myrtho alba; nigram, & contra.
 Foliis Myrthi; folia Pyri syluestris, Sumachi, Lentisci, Cotinos, Sorbi, Cydoniorum.
 Foliis Olcastris; Oleae folia.
 Foliis Sambuci; Ebuli, & contra.
 Beronica; Verbenacam.
 Melissa; Marrubium, & contra; Corticem Citri.
 Apio montano; domesticum siccum in maiori dosi.
 Caepe; Portulacam.
 Nardo montana; Nardum Gallicam.
 Philyreae foliis; Oleae folia, & contra.
 Foliis Caprifici; Ficus domesticae folia, & contra.
 Thymbra; Thymum vel Serpillum.
 Coriandri foliis; Petroselini hortensis folia, in externis remediis tantum.
 Hypomarathro altero; Coriandrum vel Petroselinum domesticum.
 Foliis Dauci; pastinacae agrestis vel domesticae folia.
 Conisa prima; secundam.
 Conisa secunda; tertiam maiori quantitate & siccata.
 Sanguinalis foeminae foliis; folia maris, & contra.
 Hippuride prima; secundam, & contra.
 Semperuino maiore, paruum Umbilicum veneris, & contra.
 Foliis Labruscae; domesticae vitis folia minus culta.
 Chamæla; Thymelæam, Chamæpitym primam Diosc. Laureolam.
 Diosc. Alsinæ foliis; Helxines folia, & contra.
 Vite alba; nigram, & contra.
 Rondel. Bubonio, siue Inguinaria, siue Astere Attico, Antirrhinum, & contra.
 Foliis Sabinæ; folia Cupressi, Iuniperi, & Cassiam.
 Dorycnio; Mandragoram, & contra.
 Draguntio; Ari.
 Foliis Abieris; Populi folia.
 Eryfimo; Erucam, & contra.
 Foliis Hippolapathi; Lapathi folia.
 Foliis Piceae; folia Pini.
 Lathyridis foliis; Tithymali folia.
 Libanotide sterili; folia Libanotidis coronariz.
 Lepidij foliis; Nasturtij folia.
 Nymphæa alba; luteam, & contra.
 Sorbi foliis; Mespili folia, & contra.
 Oxyacantha vera; Pyrastrum.
 Foliis Pepli; Tithymali folia.
 Pityusa foliis; Tithymali folia.
 Polygoni maris foliis; foeminae folia.
 Filice foemina, marem.
 Seride; Condrillam.
 Smyrnio; Apium aut Petroselinum.
 Solano hortensi; Halicacabum.
 Symplyzi Petrosi foliis; alterius folia.



- Pro Beta alba; nigram.
 Pro Vnius speciei Tithymali foliis; folia aliorum in laxando.
 Pro Tragorigano; Origanum, & contra.
 Pro Foliis Tribuli terrestris in refrigerando; folia aquatici; non in humectando.
 Pro Hypecoi foliis; folia Papaueris.
 Pro Verbasci vnius foliis; aliorum folia.
 Pro Spica Indica, Syriaca; Valeriana.
 Pro Viticis foliis & semine; Rutæ folia & semen.
 Pro Seridis foliis; Lactucæ folia.
 Pro Bugloſſo ſiue Borragine latifolia; Bugloſſum anguſtifolium.
 Pro Soncho leui; Sonchum aſperam, & contra.
 Pro Fumaria; Senam.
 Pro Hyſſopo; Origanum, Sampsucum.
 Pro Hyperico; Androſemum, Aſcirum, Schoenanthum.
 Pro Stæbe Dioſc. Stæben herbariorum, Iaccam, Scabioſam, Paſtoream burſam, Bellides; & Graphalia.
 Pro Halyca, Auenæ piſanam totam.
 Pro Amylo; farinam filiginis ſiccam.

TABVLA PRIMA REFERENS CAPSVLAS
 RADICVM ET CORTICVM.

5	Costus		Cinnamomum ſiue offic. caſſia tenuis	Cortex internus nucis moſchatae	Aſarum	
4	Zedoaria	Calamus odoratus	Caſſia ſiue offic. cinna- momum craſſum.	Nux muſchata	Schoenanthum	R Cortice thuris
3	Zurumbet	Galanga maior	Phu	Macis	Spica Nardi	Cortex Pini
2	Mequin	Galanga minor	Anthophylli	pro Folio Malabathri	Spica Celtica	vel Lentici
1	p Zingibere	Cypero	Caryophyllis			

Cortic. quercus	Cortic. maligranati	Cortic. myrobal. Citrinarum
Ilicis	Cortex nucis Iuglandis	Kebularum
Suberis		Indarum
		Emblicarum
		Bellieticarum

In hac tabella primum reſpoſuimus Zingiber, quia frequentius eo vtimur quàm Mequin (quod ſpecies eſt Zingiberis) ſi fortè alterum pro altero ſumatur, niſi inde



mali inde sequetur. Zerumbet, Zedoariam & Costum in vitimis capsulis reposuimus, quia eis minus frequenter utimur. Hoc modo medicamentis dispositis multò minori negotio medicamenta parabuntur, ut quæ frequenter in compositionibus simul ponuntur, simul inueniantur. Adde quòd hæc medicamentorum dispositio *artificiosa* indicabit. Nam quæ in prima capsula ponuntur, pro secunda poni possunt, & è contra diminuto pondere. Cum dicimus quantitatem augeri, nolumus duplum substitui; quia hæc medicamenta non sunt duplo fortiora, quamquam pro Cinnamomo duplum Cassiæ iusserint antiqui substitui: nam si medicamenta sint aded imbecilla, satius est eis nõ uti, quàm duplo pondere substituere ea: nam moles medicamenti augetur, & vis aliorum medicamentorum minuitur. Ut omnia medicamenta ordine digerantur, oportet locum in multas classes diuidere, & in vna classe partes superiores atque inferiores. In iisdem classibus distinguenda erunt medicamenta calida, frigida, sicca & humida, tam simplicia quàm composita.

Capsula radicum secunda.

5	Costus dulcis Arabum		
4	Tussilago	Pistlochia	
3	Helenium	Clematidis	
2	Iris Florentina	Arist. longa	Hermodactylus
1	pro radice Iridis Venetæ	Aristolochiæ rotundæ	Asphodeli

Capsula radicum tertia.

5	Graminis						Glycyrrhizæ
4	Asparagi			Scaphisagritæ			Tussilaginis
3	Rufci	Oenanthes	Aristolochiæ ois	Bryoniæ	Zeduarie	Cyperii	Helenij
2	Petrose- lini rad.	Rubiz maioris	Asari	Pyrethri	Costi	Galangæ mi- noris	Venetæ radix
1	pro Apio	Pentha- phylo	Cappari	Mequin	Zigibere	Galanga crassa	Iride Florentina

Capsula radicum quarta.

3	Cucumeris agrestis	Centaurei minoris	Polypodij	Ellebori variaſq;		
2	Aſphodeli	Suc. Roſa- rum	Turbith	Ebuli	Aſari	Hermodactylo- rum
1	pro rad. Gentianæ	Rhabarba- ri	Agarico	Hermoda- ctyli	Cyclaminis	Aſphodelorum

Capsula radicum quinta.


3	Borraginis		Malvarum	Thapſi barbati	Sphondylii	Radix Vini.
2	Bugloſſi	Behen rubri	Bismalvarum	Biſtortæ	Pancreatij	Conſolidæ minoris
1	pro rad. Gly- cyrrhizæ	Behen albi	Liliorum	Quinque- folij	Squilla.	pro radice Con- ſolidæ maioris

Capsula radicum ſexta.

5		Corticis rad. lauri	Aſari	Staphidis agrizæ	Behen rubri
4		Cort. rad. Sam- buci, & Ebuli	Ari	Clematidis alte- rius ſive Flammulæ	Behen albi
3		Fraxini, vel Po- puli	Serpentarizæ	Rad. Dentillarizæ	Ferraginis
2	Rubizæ mi- noris	Thamatifci	Raphani agre- ſtis	Pyrethri	Bugloſſi
1	pro rad. Ru- biæ maioris	Cortice rad. Capparis	Cortic. Sam- buci		Glycyrrhizæ

TABVLA SIVE CAPSVLA SEMINVM.

1	pro ſem. Cucurbitzæ	Melonum	2	Citrulli	3	Cucumeris
	Lactucæ	Portulacæ		Endivizæ		Scariolæ
	Violarum	Papaueris albi		Papaueris nigri		Hyofcyami
	Bombacis	Maluzæ, Biſmaluzæ		Psyllij		Cydoniorum
	Lini	Fenigræci		Lauendulæ		Roxyi rubri vel Citrini



5	Citrium	Xylobalfamum	Scobs Buxi
4	Rubrum	Surculi Lentisci	Ebenum
3	pro Santalo albo	Aspalathus	Guaiacum
2		Ligno Aloes	Echinæ rad. c.
1			Salsaparilla

Purgantiū

1 pro Scammonio	2 Diacridium	3 Colocynthis	4 Ammoniacum
Sena	Semen Chartami	Folia Brassicæ maritimæ	3 Sal gemmæ
Folii Scammonij.	Thymelææ	Chamelææ	2 Sal petræ
Semine hederæ	Sem. Afari	Semen Genistæ	1 pro Sale nitro

4					Coccus Cnidii	
3	Thymus	Chryfocolla vel. fortè Chrysolith.	Elleborus albus	Alhandal	Semen Cataputiæ	Rhaponticum
2	Epithymus	Lapis Armenus	Niger	Diacridium	Rad. Tithymali	Myrobalani ꝑ.
1	ꝑ Cassia	Lapide Lafuli	Colocynthide	Scammonio		Rhabarbaro

Polypodium	Rhabarbarū	Chamelææ	Efula
Turbith album	Lapatio	Thymelææ	Turbith
Turb. cineritio		Brassica maritima	Polypodio

Seminum.

5	Capita papaveris	Acerosæ				
4	Semen Mâdrago.	Portulacæ	Citrulli			Semen violarum
3	S. Hyocyami	Scariolæ	Meloni	Bismalæ	Farnigæ	Cnici
2	Papaveris nigri	Endiuiz	Cucumeris	Meluarū	Lin.	Voicæ
1	S. Papaveris albi	Lactucæ	Cucurbitæ	Bombacis	Sesami	Cythionifur.

5	Cumini	Pastin. syl.	Rutæ agrest.				
4	Carui	Pastinæcæ dō- mesticæ	Rutæ dōme- sticæ	Sina- pi	Semē contra vermes.	S. Paliuri	
3	Fœniculi dulcis	Petrofelini	Animeos	Erucæ	Caulium	Hyperici	
2	Anisi	Apij	Seseli Æthiopicæ & Peloponesis	Thlas- pi	Rapæ agre- stis	Milij Solis	
1			Seseli Malsilen- sis	Nastur- tij	Rapæ dōme- sticæ	Alkekengi	

Seminum.

Piper lon- gum	Cardamomi maioris	
Piper al- bum	Cardamomi minoris	Granorum pa- radisi
Pipere ni- gro		Cubebarum

3	Berberis	Sorba- rum
2	Vuarū im- maturarū	Mespilorum
1	Spinæ albæ	Corno- rum

pro { semine Myrti; Berberis, & contra-
Napi; Rapi.
Carthami, Vriticæ, vel Agariæ non trochiscatus.

pro { Mandragoræ, Cicutæ.
Semine Afari, Semen Genistæ.


5	Geni- stæ	Aceto- sæ	Gallarum	Cytini	Vinæ Corinthia		Ficus
4	Afari	Citri	Su- mach	Balaustiarum	Passulæ mun- data	Thamar Indi	Seben- sten
3	S. He- deræ	Berberis	Myrtillorum	Cortic. ma- ligranati	Dactyli	Prunis acidis	Iulibæ
2					Pruta dulcia		Passulis mūdaris
1					Ficubus		

Seminum
& fructu.

3	Oenan- thes	Cichorij	Nymphet luteæ	Sambu- ci		Salicæ	
2	Myrti	Buglossi vul- garis	Nymphet albæ	Melile- ti	Balau- stiarū	Stæchadis	Genistæ
1	Florib. Rosarū	Buglossilatifolij sive borraginis	Violarum	Chamæ- meli	Cytini	Anthos	Sambuci

Capsula
florum.

3	Leucoij			Flor. Ci- chorij		Spicæ vulgo dicitur
2	rubri		Flor. Tama- risi	Flor. Incybi domesticæ		Esquendula
1	Leu. lutei		Flor. Genistæ			Flor. Salicæ



DE SYCCIS.

- Pro Acaciae succo; succus Prunellorum probatur. & Rhois. Diosc.
- Avicenna
item. Dioscorides succum Hypocystidis substituit: verum aliquāto magis adstringit & siccat
si in antiquorum pharmacis recipiatur.
- Pro Opio, Meconium; vel succus Lactucæ syl. vel domesticæ, quantitate maiori.
- Pro Absinthij succo; Abrotani, Eupatorij, vel Centauri minoris vtriusque vel Agerati.
- Pro succo Absinthij Pontici, Nostratis Romani succus: differt tantum regione, vt Macedonicum à Pontico. In externis remediis, Sanctonicum & Marinum; vel ablutum leuiter in internis concedatur.
- Pro Opobalsamo; Staete. i. styrax liquida non adulterata, vel oleum Myrrhæ. In suffusionibus ad digerendum; Oleum Spicæ Lauendulæ, quod æquè tenuium est partium.
- Pro Glycyrrhizæ succo, infusum & decoctum eiusdem; vel succus yuarum passularum: vel vinum coctum, siue sapa.
- Pro Lycio, Amurca.
- Pro Citri succo; Limonum.
- Pro Thymelææ: Chamelææ succus.
- Pro Cyclaminis; Iridis.
- Pro Omphacij; Rhois, & contra.
- Pro Aloe; Absinthij succus.
- Pro Semperuiui; Cotyledonis succus & contra. Vel Solani, Lactucæ.
- Pro Sanguine Draconis; Laccam sustinuit Auicennas.
- Pro Elaterio; succus cucumeris agrestis aliquantum coctus.
- Pro sapa; vinum dulce, & contra.
- Pro Licio; Gentianæ succus in vlcetibus.
- Pro aqua fontana; fluuiatilis.
- Pro aqua plu. fluuij potius quàm fontana, contra quàm Galenus præcipit in Diacodio, quia composita est partim ex pluuia, partim ex fontibus.

DE LIQVORIBVS ET LACHRYMIS.

- Pro Opobalsamo, Staete siue myrrha liquida natura vel arte parata: Liquor Terebinthi.
- Non { Opocarpatum, vt auctor Succedaneorum præcipit,
Oleum laurinum.
Liquor myrthi.
- Non semen Myrti, & Zedoarie, vt præceptores nostri statuerunt, pro Carpobalsamo semen Lentisci vel Terebinthi, cuius multæ sunt species. Cubebe in minori dosi, vel Terebinthi partes dux, vna Cubebarum.
- pro Cedria { Oleum è ramentis Iuniperi paratum per descensum.
vel Gummi Iuniperi.
- Pro Xyobalsamo, furculi Lentisci.
- Pro Olez lachryma; G. Elemni.
- Pro Myrrha; Bdellium, vel succus Smyrni, vel Api.
- Pro Opopanace; Ammoniacum, vel Galbanum; vel Bdellium, maxime cum emellire volumus. Gal. vsus est Propoli in externis.
- Pro Manna thuris; cortex cui adheret aliquid thuris.
- Pro Thure; Mastiche & resina pini sicca.
- Pro Styrace; Benzoinum.
- Pro Terebinthina; Mastiche.

Pro Mastiche; Abietina resina indurata aut frixa, vt docet Diosc.

Pro Cupressina, Laricina.

Pro Abietina, Resina pini.

Pro Pice, Resina pini cocta.

Pro Pice liquida; pix oleo dissoluta, vel pix ex oleo Iuniperi liquefacta.

Pro Pissasphalto; pix & bitumen.

Pro Mumia, Pissasphaltum.

Pro Asphaltu; Petroleum; vel Gagates, & contra. Et carbones petraei e terra visceribus, quibus fabri ferrarij vtuntur.

Pro Lacca, Myrrha.

DE MINERALIBVS.

Pro Antimonio; plumbum vsum & contra. Auicen. & Stagnum vsum.

Pro Lithargyro; plumbum vsum, Molybdæna.

Pro Plumbo, Stannum.

Pro Flore æris, ærugo.

Pro Spodio; Antispodium ex myrto, lentisco, olea, oleastro, malo cydonio, vel cornu cerui vsum.

Pro Pompholyge; Spodium Diosc.

Pro Cadmia; Lapis calaminaris.

Pro Sandaraca Græcorum; Auripigmentum, & contra.

Præsens examen stirpium nihil habet S. Romanae Ecclesie fidei contrarium aut Reipublice offensiuum: poterit ergo in multorum commodum typis excudi.

Sebastianus Baer Delphius insignis Cathed. Ecclesie S. Mariae Antuerpiensis plebanus & Canonicus.

