

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: CURS 2020-21



1a VOLTEIG REFLEX

<p>Xiquet en decúbit supí asimètric.</p> <p>Pròxim a la vora de la llitera.</p>	<p>Terapeuta en el costat facial.</p> <p>Subjecta amb la seua mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el seu gir.</p>	<p>CAP</p> <p>Gir de 30º mirant cap al terapeuta</p> <p>EXTREMITATS</p> <p>Relaxades sobre la base de suport</p>	<p>Zones desencadenament:</p> <p>ESPai INTERCOSTAL 5a-6a (6-7) COSTELLA del costat facial</p> <p>Direcció de la pressió cap a dorsal, medial i cranial</p>	<p>Resposta motora:</p> <p>Desplaçament del centre de gravetat</p> <p>Flexió de malucs i genolls</p> <p>Elevació mantinguda de les cames contra gravetat, fora de la base de suport del tronc</p> <p>Apertura dels braços en rotació externa</p> <p>Braç costat facial fa moviment cap a línia mitjana</p> <p>Mans obertes</p> <p>Moviments laterals dels ulls</p> <p>Moviments de deglució</p> <p>Activació de la musculatura abdominal: respiració més profunda</p> <p>Retroversió pèlvica</p>
---	--	--	--	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del fisioterapeuta	No es situa del costat correcte de la llitera.	Es situa del costat correcte de la llitera, però no subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni resisteix el gir del cap.	Es situa del costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap, però presenta algun descuit en la manipulació.	Es situa del costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació perfecta.
Posició del pacient	La posició de partida del pacient no és correcta.	La posició de partida del pacient és correcta, però no està col·locat pròxim a la vora de la llitera.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però presenta algun descuit en la manipulació.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera. Manipulació perfecta.
Zones de desencadenament	No coneix les zones de desencadenament.	Coneix les zones de desencadenament, però no són del costat que se està estimulant.	Coneix les zones de desencadenament del costat que se està estimulant.	Coneix les zones de desencadenament del costat que se està estimulant i la direcció de l'estímul és correcta.
Resposta motora	No sap que ha de produir-se una resposta motora.	Desconeix la resposta motora.	Coneix part de la resposta motora.	Coneix la resposta motora completa.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: **CURS 2020-21**



2a VOLTEIG REFLEX

<p>Xiquet en decúbit lateral. Pròxim a la vora de la llitera.</p>	<p>FT per darrere del xiquet. El terapeuta resisteix el moviment cap a davant del xiquet i manté els punts de suport</p>	<p>BRAÇ del COSTAT DE DAVALL Flexió de muscle, roman a 90º con respecte al tòrax. Colze estès o flexionat. Mà en posició mitjana</p> <p>CAMA del COSTAT DE DAVALL Maluc flexionat 30º-40º. Genoll flexionat 40º. Taló alineat amb tuberositat isquiàtica</p> <p>BRAÇ del COSTAT DE DAMUNT Al llarg del tronc. Muscle en lleugera rotació interna. Colze estès. Avantbraç en lleugera pronació. Canell i dits en posició mitjana.</p> <p>CAMA del COSTAT DE DAMUNT Maluc flexionat 30º-40º. Genoll flexionat 40º. Taló alineat amb tuberositat isquiàtica</p>	<p>Zones desencadenament:</p> <p>1ª opció: estiloides radial i acròmion del braç superior</p> <p>2ª opció: costat ventral de l'acròmion i EIAS de l'hemicòs de dalt.</p>	<p>Resposta motora:</p> <p>Augmenta el suport sobre el muscle de davall, desplaçant-se cap al colze i la mà.</p> <p>Pronació de l'avantbraç, la mà es prepara per al suport.</p> <p>Augmenta el suport sobre l'hemipelvis de davall, desplaçant-se cap a la cama.</p> <p>Extensió de l'eix axial</p> <p>Desplaçament del centre de gravetat</p> <p>Redreçament del cap contra la gravetat.</p> <p>Flexió de maluc i genoll de la cama de dalt.</p>
---	--	--	--	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del fisioterapeuta	No es situa del costat correcte de la llitera.	Es situa del costat correcte de la llitera, però no subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni resisteix el gir del cap.	Es situa del costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap, però presenta algun descuit en la manipulació.	Es situa del costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació perfecta.
Posició del pacient	La posició de partida del pacient no és correcta.	La posició de partida del pacient és correcta, però no està col·locat pròxim a la vora de la llitera.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però presenta algun descuit en la manipulació.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera. Manipulació perfecta.
Zones de desencadenament	No coneix les zones de desencadenament.	Coneix les zones de desencadenament, però no són del costat que se està estimulant.	Coneix les zones de desencadenament del costat que se està estimulant. Requisit de valoració ≥2	Coneix les zones de desencadenament del costat que se està estimulant i la direcció de l'estímul és correcta.
Resposta motora	No sap que ha de produir-se una resposta motora.	Desconeix la resposta motora.	Coneix part de la resposta motora.	Coneix la resposta motora completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MMII: membres inferiors; RP: reacció postural

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: **CURS 2020-21**



REPTACIÓ REFLEXA

<p>Xiquet en decúbit pron. Pròxim a la vora de la llitera.</p>	<p>Terapeuta en el costat nual. Subjecta amb el seu cos el clatell del xiquet i resisteix el seu gir. El terapeuta resisteix el moviment amb el seu cos per a frenar el gir del cap i amb les seues mans per impedir que el xiquet menege les extremitats de suport.</p>	<p>Cap en extensió passiva del coll i gir de 30º Tronc alineat amb el cap. Braç facial: Flexió de muscle entre 120-135º i abducció 30º Epicòndil medial recolzat El colze del xiquet està a l'altura de l'orella. Mà alineada amb muscle i maluc Avantbraç recolzat per la seua cara palmar Braç nual: Al costat del cos L'avantbraç es recolza per la seua cara dorsal. Cama nual: Maluc en flexió de 30-40º. Cuixa en rotació externa i abducció, còndil medial del fèmur recolzat. Peu alineat amb el maluc i el muscle El taló alineat amb la tuberositat isquiàtica homolateral. Cama facial: Relaxada i estesa al llarg del cos.</p>	<p>Zones desencadenament: Tuberositat externa calcani del costat nual i epicòndil medial de l'húmer del costat facial</p>	<p>Correcta direcció de l'estímul propioceptiu cap a les zones de desencadenament.</p>	<p>Resposta motora: Suport sobre les extremitats: colze del costat facial i calcani del costal nual. Extensió i rotació axial Endreçament del tronc contra la gravetat Moviment de pas de les extremitats: flexió del maluc i genoll lliures, i de muscle nual. Desplegament de les mans i dels peus (extremitats lliures). Retroversió pèlvica. Respiració més profunda: augment respiració costal i de l'amplitud de la caixa toràcica. Resistència al gir del cap: contracció de músculs de la cara, llengua i ulls cap al costat nual.</p>
--	---	--	--	--	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del fisioterapeuta	No es situa del costat correcte de la llitera.	Es situa del costat correcte de la llitera, però no subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni resisteix el gir del cap.	Es situa del costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap, però presenta algun descuit en la manipulació.	Es situa del costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació perfecta.
Posició del pacient	La posició de partida del pacient no és correcta.	La posició de partida del pacient és correcta, però no està col·locat pròxim a la vora de la llitera.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però presenta algun descuit en la manipulació.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera. Manipulació perfecta.
Zones de desencadenament	No coneix les zones de desencadenament.	Coneix les zones de desencadenament, però no són del costat que se està estimulant.	Coneix les zones de desencadenament del costat que se està estimulant. Requisit de valoració ≥2	Coneix les zones de desencadenament del costat que se està estimulant i la direcció de l'estímul és correcta.
Resposta motora	No sap que ha de produir-se una resposta motora.	Desconeix la resposta motora.	Coneix part de la resposta motora.	Coneix la resposta motora completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MMII: membres inferiors; RP: reacció postural

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: **CURS 2020-21**



REACCIÓ DE VOJTA

Posició de partida: Xiquet mantingut verticalment pel tronc, amb l'esquena cap a l'examinador.	Desencadenament: Gir sobtat del xiquet a la posició horitzontal. Es realitza de forma bilateral, primer d'un costat, i després d'altre.	<u>1a fase: 1a-10a setmana</u> Moviment d'abraç tipus Moro amb els braços i apertura de mans. MI superior en flexió de maluc i genoll, flexió dorsal de turmell, pronació del peu i abducció de dits. MI inferior en extensió, amb flexió dorsal de turmell, supinació i flexió de dits.	<u>1a Fase de transició: 11a - 20a setmana</u> Disminueix el moviment d'abraç tipus Moro, les mans estan obertes. Fins a la fi de la 1ª fase de transició: els braços estan en flexió relaxada, els MMII adopten una posició de flexió i els dits del peu superior ja no es separen.	<u>2a fase: des de 4 mesos i ¾ fins al final de 7è mes</u> Totes les extremitats adopten una posició de flexió relaxada. Mans obertes o tancades de manera relaxada. Peus en flexió dorsal, en la major part dels casos supinats. Dits dels peus en posició mitjana o flexionats	<u>2a fase de transició: després del 7è mes fins a la fi del 9è mes</u> Braços flexionats de manera relaxada. Cames amb flexió de malucs. La flexió de genoll disminueix. Peus en flexió dorsal. Dits dels peus en posició mitjana.	<u>3a fase: després del 9è mes fins al 13è-14è mes</u> Extremitats del costat de dalt s'estenen. Peus en flexió dorsal. Després d'aconseguir la bipedestació, la reacció de Vojta en un xiquet sa a penes aporta informació, ja que el xiquet és capaç de modificar voluntàriament la seua postura a pesar de las aferències massives.
---	---	---	--	--	---	---

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del bebè	La posició de partida del bebè no és correcta.	Col·loca al bebè en posició vertical de cara a l'examinador.	La posició de partida del bebè és correcta, però presenta algun descuit en la manipulació.	La posició de partida del bebè és correcta. Manipulació perfecta.
Reconeixement de la RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP, però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del bebè. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix la RP i la fase, però no l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP, la fase i l'edat cronològica del bebè.
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament però no avalua bilateralment la reacció. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i avalua bilateralment la reacció.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i avalua bilateralment la reacció. Manipulació perfecta.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures a observar)	No sap realitzar la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anter superior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MMII: membres inferiors; RP: reacció postural

Nom de l'alumne/a:

Grup:


Data:

Observacions: CURS 2020-21	
-----------------------------------	---

REACCIÓ DE TRACCIÓ					
Posició de partida: decúbit supí, cap en posició mitjana.	S'ha d'aprofitar el reflex de prensió de les mans: s'introdueix un dit en la mà del xiquet des del costat cubital. Amb els altres dits es subjecta la part distal de l'avantbraç sense tocar el dors de la mà (eixe estímul exteroceptiu frenaria el reflex de prensió). Realització: lentament s'eleva al xiquet fins uns 45°.	<u>1a fase: 1a-6a setmana</u> El cap penja cap a darrere. En el període perinatal les cames estan flexionades i lleugerament abduïdes. Després del període perinatal: posició de flexió inert de les cames.	<u>2a fase: 7a setmana fins a la fi del 6è mes</u> Flexió del cap amb moviment de flexió de tot el tronc. Flexió de les cames.	<u>3a fase: 8è i 9è mes</u> Disminueix el moviment de flexió del cap, del tronc i MMII. Extensió intermèdia del genoll. Les natges es converteixen el punt de suport. El centre de gravetat es trasllada – activament – cap a les natges.	<u>4a fase: 9è/10è mes al 14t mes</u> El xiquet s'incorpora cap a dalt. El cap està alineat amb el tronc. El moviment de flexió en la zona de la xarnera lumbo-sacra. MMII en abducció i les articulacions dels genolls estan en extensió relaxada.

RÚBRICA				
	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del bebè	La posició de partida del bebè no és correcta.	La posició de partida del bebè és correcta, però no se li agafa de les mans de forma correcta.	La posició de partida del bebè és correcta i se li agafa de les mans de forma correcta.	La posició de partida del bebè és correcta i se li agafa de les mans de forma correcta. Coneix el motiu de fer esta presa.
Reconeixement de la RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del bebè. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix la RP i la fase, però no l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP, la fase i l'edat cronològica del bebè.
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament però no deté la tracció als 45°. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i deté la tracció als 45°.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i deté la tracció als 45°. Coneix el motiu: la postura làbil o inestable permet valorar tot el cos del bebè no només la seua capacitat de sostenir el cap.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures a observar)	No sap realitzar la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.


EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MMII: membres inferiors; RP: reacció postural

Observacions: CURS 2020-21					
REACCIÓ A LA SUSPENSIÓ VERTICAL DE PEIPER					
<p>Posició de partida: en els primers 4-5 mesos en decúbit supí, després en decúbit pron. Cap en posició mitjana. Les mans han d'obrir-se.</p>	<p>Realització: s'agafa al xiquet dels genoll o de la part distal de la cuixa i se li alça ràpidament a la vertical amb el cap cap avall.</p> <p>En el nadó i lactant jove es subjecta la part proximal de la cuixa.</p>	<p><u>1a fase: 1a setmana fins a la fi del 3r mes</u></p> <p>Fase 1a (6 primeres setmanes): moviment d'abraç tipus Moro.</p> <p>Fase 1b: reacció de Moro incompleta dels braços (sense "abraç").</p> <p>El coll està estès i la pelvis flexionada</p>	<p><u>2a fase: 4t a 5è-6è mes</u></p> <p>Braços elevats cap als costats.</p> <p>Mans obertes.</p> <p>Coll i tronc estesos fins a la xarnera toracolumbar.</p> <p>Posició de flexió de la pelvis disminueix</p>	<p><u>3a fase: 7è fins al 9/10/12è mes</u></p> <p>Extensió i elevació dels braços amb mans obertes.</p> <p>Extensió simètrica de coll i tronc fins a la xarnera sacrolumbar.</p>	<p><u>4a fase: a partir del 9è mes</u></p> <p>El xiquet de forma activa intenta agarrar-se a l'explorador i alçar-se.</p>
RÚBRICA					
	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)	
Posició del bebè	La posició de partida del bebè no és correcta.	La posició de partida del bebè és correcta, però no sap per què (edat).	La posició de partida del bebè és correcta i sap per què (edat).	La posició de partida del bebè és correcta i sap per què (edat). Sap explicar-ho	
Reconeixement de la RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del bebè. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix la RP i la fase, però no l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP, la fase i l'edat cronològica del bebè.	
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament, però les preses no són correctes (proximal en cuixa si és molt xicotet). REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes. Coneix el motiu: evitar la luxació del maluc del què es tracciona.	
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures a observar)	No sap realitzar la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.	

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: CURS 2020-21									
REACCIÓ A LA SUSPENSÍO VERTICAL DE COLLIS									
Posició de partida: decúbit supí. Una vegada elevat, el bebè es col·loca d'esquenes al fisioterapeuta.		Realització: es subjecta al xiquet per un genoll (en nadons joves per la cuixa prop del maluc) i se li porta ràpidament a la vertical amb el cap cap a davall. No traccionar sobtadament (plor), sinó suaument.		<u>1a fase: 1a setmana fins al 6è/7è mes</u> El membre inferior lliure adopta una posició de flexió de maluc, genoll i turmell. En el període perinatal pot aparèixer una extensió sobtada de la cama lliure, que pot passar, també sobtadament, a la flexió.			<u>2a fase: a partir del 7è mes</u> La cama lliure adopta una posició d'extensió relaxada del genoll, el maluc es manté flexionat.		
RÚBRICA									
	INADEQUAT (0)		A MILLORAR (1)		ADEQUAT (2)		AVANÇAT (3)		
Posició del bebè	La posició de partida del bebè no és correcta.		La posició de partida del bebè és correcta, però no avalua bilateralment la reacció.		La posició de partida del bebè és correcta, i avalua bilateralment la reacció.		La posició de partida del bebè és correcta, i avalua bilateralment la reacció. Manipulació perfecta.		
Reconeixement de la RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del bebè.		Reconeix la RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del bebè. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1		Reconeix la RP i la fase, però no l'edat cronològica del bebè.		Reconeix la RP, la fase i l'edat cronològica del bebè.		
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.		Realitza la seqüència de la maniobra adequadament però les preses no són correctes (proximal en cuixa si és molt xicotet). REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1		Realitza la seqüència de la maniobra adequadament. Preses correctes		Realitza la seqüència de la maniobra adequadament. Preses correctes Manipulació perfecta		
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures a observar)	No sap realitzar la lectura cinesiògica de la imatge.		Lectura molt incompleta.		Lectura quasi completa.		Completa.		

EIAS: espina ilíaca anteriosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MMII: membres inferiors; RP: reacció postural

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: CURS 2020-21



REACCIÓ A LA SUSPENSÍO HORIZONTAL DE COLLIS

<p>Realització: es subjecta al xiquet per el braç la cuixa del mateix costat (el més prop possible de l'articulació).</p> <p>Per a evitar una distensió de la càpsula articular del muscle cal esperar fins que el xiquet tire del braç subjectat per l'explorador cap al seu cos.</p> <p>Es realitza de forma bilateral.</p>	<p><u>1a fase:</u> 6 primeres setmanes: Moviment tipus Moro del braç lliure</p> <p>7a a 8a setmana: Abducció tipus Moro del braç</p> <p>10a -12a setmanes Lleugera flexió del braç lliure</p>	<p><u>2a fase: 4t al 6è mes</u></p> <p>Avantbraç lliure va cap a la pronació.</p> <p>Al final de la 2a fase: la mà de suport assumeix la carrega de pes.</p> <p>La cama manté la posició de flexió.</p>	<p><u>3a fase: 8è al 10è mes</u></p> <p>Suport en el costat extern del peu.</p>	<p><u>3a fase: principi del 4t trimestre</u></p> <p>Suport sobre tota la planta del peu.</p>
--	---	---	---	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del bebè	La posició de partida del bebè no és correcta.	La posició de partida del bebè és correcta, però no avalua bilateralment la reacció.	La posició de partida del bebè és correcta, i avalua bilateralment la reacció.	La posició de partida del bebè és correcta, i avalua bilateralment la reacció. Manipulació perfecta.
Reconeixement de la RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del bebè. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix la RP i la fase, però no l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP, la fase i l'edat cronològica del bebè.
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament, però la manipulació no és correcta (preses i/o no a que el bebè tire del braç).	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes. Espera a que el bebè tire del braç. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥2	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes. Espera a que el bebè tire del braç. Coneix el motiu: evitar la luxació del muscle.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures a observar)	No sap realitzar la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MMII: membres inferiors; RP: reacció postural

Observacions: **CURS 2020-21**



REACCIÓ DE LANDAU

<p>Realització: es subjecta al xiquet per l'abdomen, mantenint-lo sobre el palmell de la mà, en posició horitzontal. Se li flexiona el cap.</p> <p>El xiquet ha d'estar tranquil: L'extensió de les cames o la postura d'opistòton del tronc, que apareix durant el plor, no té significat.</p>	<p><u>1a fase: 1a-6ª setmana</u></p> <p>Cap lleugerament flexionat.</p> <p>Tronc lleugerament flexionat.</p> <p>Braços i cames en flexió relaxada.</p>	<p><u>2a fase: 7a setmana a 3r mes</u></p> <p>Extensió simètrica del coll fins a la línia dels muscles.</p> <p>Lleugera flexió del tronc.</p> <p>Flexió relaxada de braços i cames</p>	<p><u>3a fase: 6 mesos</u></p> <p>A l'extensió del coll, s'uneix l'extensió simètrica del tronc fins a la xarnera toraco-lumbar.</p> <p>Cames estan en angle recte i lleugera abducció.</p> <p>Braços relaxats</p>	<p><u>4a fase: 8 mesos</u></p> <p>El xiquet està en la fase de "estranyar" pel que es plega i estira (cames estirades en l'horitzontal). Hi ha que flexionar-li suaument el cap i les cames aniran a flexió, al soltar-li, les cames, el tronc i el coll es col·locaran rectes en l'horitzontal.</p> <p>Cames en extensió relaxada.</p> <p>Braços en flexió relaxada.</p>
---	--	--	--	---

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del bebè	La posició de partida del bebè no és correcta.	La posició de partida del bebè és correcta, però no el situa sobre el palmell de la mà oberta del fisioterapeuta.	La posició de partida del bebè és correcta, situat damunt del palmell de la mà oberta del terapeuta. Presenta algun descuit en la col·locació.	La posició de partida del bebè és perfecta.
Reconeixement de la RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del bebè. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix la RP i la fase, però no l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP, la fase i l'edat cronològica del bebè.
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament, però no li flexiona el cap abans de l'exploració.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i li flexiona el cap abans de l'exploració.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament i li flexiona el cap abans de l'exploració. Sap que el bebè ha d'estar tranquil.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures a observar)	No sap realitzar la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: CURS 2020-21



REACCIÓ A LA SUSPENSÍO AXIL-LAR

<p>Realització: posició vertical. Es subjecta al xiquet pel tronc, el cap dalt i d'esquenes al explorador. El xiquet no ha d'estar penjant a nivell de les aixelles.</p> <p>Explorador no toca la part inferior del trapezi del xiquet amb els seus polzes (estímul propioceptiu que provocaria una extensió de les cames).</p>	<p><u>1a fase: 1a setmana fins a la fi del 1r trimestre</u></p> <p>Les cames en posició de flexió "inert".</p>	<p><u>2a fase: 3r/4t mes fins a la fi 7è mes</u></p> <p>Les cames flexionades cap al tronc – Sinèrgia flexora de les cames</p>	<p><u>3a fase: des de final 8è mes</u></p> <p>Cames en extensió relaxada.</p> <p>Peus en flexió dorsal</p>
---	--	--	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	A MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del bebè	La posició de partida del bebè no és correcta.	Col·loca al bebè en posició vertical de cara a l'examinador.	La posició de partida del bebè és correcta, però presenta algun descuit en la seua col·locació.	La posició de partida del bebè és perfecta.
Reconeixement de la RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del bebè. REQUISIT DE VALORACIÓN ≥1	Reconeix la RP i la fase, però no l'edat cronològica del bebè.	Reconeix la RP, la fase i l'edat cronològica del bebè.
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament, col·loca els polzes en la vora inferior del trapezi del xiquet.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament, evita col·locar els polzes en la vora inferior del trapezi del xiquet.	Realitza la seqüència de la maniobra adequadament prestant atenció d'on col·loca els polzes. Coneix el motiu.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures a observar)	No sap realitzar la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.