

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



1a VOLTEIG REFLEX

<p>Xiquet en decúbit supí asimètric.</p> <p>Pròxim a la vora de la llitera.</p>	<p>Terapeuta en el costat facial.</p> <p>Subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el seu gir.</p>	<p>CAP Gir de 30° mirant cap al terapeuta.</p> <p>EXTREMITATS Relaxades sobre la base de suport.</p>	<p>Zones de desencadenament:</p> <p>ESPAI INTERCOSTAL 5a-6a (6-7) COSTELLA del costat facial.</p> <p>Direcció de la pressió cap a dorsal, medial i cranial.</p>	<p>Resposta motora:</p> <p>Desplaçament del centre de gravetat.</p> <p>Flexió de malucs i genolls.</p> <p>Elevació mantinguda de les cames contra gravetat, fora de la base de suport del tronc.</p> <p>Obertura dels braços en rotació externa.</p> <p>El braç del costat facial fa moviments cap a la línia mitjana.</p> <p>Mans obertes.</p> <p>Moviments laterals dels ulls.</p> <p>Moviments de deglució.</p> <p>Activació de la musculatura abdominal: respiració més profunda.</p> <p>Retroversió pèlvica.</p>
---	---	--	---	---

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del fisioterapeuta	No se situa al costat correcte de la llitera.	Se situa al costat correcte de la llitera, però no subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni resisteix el gir del cap.	Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap, però comet algun error en la manipulació.	Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació perfecta.
Posició del pacient	La posició de partida del pacient no és correcta.	La posició de partida del pacient és correcta, però no està col·locat pròxim a la vora de la llitera.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però comet algun error en la manipulació.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera. Manipulació perfecta.
Zones de desencadenament	No coneix les zones de desencadenament.	Coneix les zones de desencadenament, però no són del costat que s'està estimulant.	Coneix les zones de desencadenament del costat que s'està estimulant. Requisit de valoració ≥2	Coneix les zones de desencadenament del costat que s'està estimulant i la direcció de l'estímul és correcta.
Resposta motora	No sap que ha de produir-se una resposta motora.	Desconeix la resposta motora.	Coneix part de la resposta motora.	Coneix la resposta motora completa.

EIAS: espina ilíaca anter superior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



2a VOLTEIG REFLEX

<p>Xiquet en decúbit lateral. Pròxim a la vora de la llitera.</p>	<p>FT per darrere del xiquet. El terapeuta resisteix el moviment cap avant del xiquet i manté els punts de suport.</p>	<p>BRAÇ DEL COSTAT DE BAIX Flexió de muscle, es manté a 90° respecte al tòrax. Colze estès o flexionat. Mà en posició mitjana</p> <p>CAMA DEL COSTAT DE BAIX Maluc flexionat 30°-40°. Genoll flexionat 40°. Taló alineat amb tuberositat isquiàtica.</p> <p>BRAÇ DEL COSTAT DE DALT Al llarg del tronc. Muscle en lleugera rotació interna. Colze estès. Avantbraç en lleugera pronació. Canell i dits en posició mitjana.</p> <p>CAMA DEL COSTAT DE DALT Maluc flexionat 30°-40°. Genoll flexionat 40°. Taló alineat amb tuberositat isquiàtica.</p>	<p>Zones de desencadenament:</p> <p>1a opció: estiloide radial i acròmion del braç superior.</p> <p>2a opció: costat ventral de l'acròmion i EIAS de l'hemicòs de damunt.</p>	<p>Resposta motora:</p> <p>Augmenta el suport sobre el muscle de davall i es desplaça cap al colze i la mà.</p> <p>Pronació de l'avantbraç; la mà es prepara per al suport.</p> <p>Augmenta el suport sobre l'hemipelvis de davall i es desplaça cap a la cama.</p> <p>Extensió de l'eix axial.</p> <p>Desplaçament del centre de gravetat.</p> <p>Redreçament del cap contra la gravetat.</p> <p>Flexió de maluc i genoll de la cama de damunt.</p>
---	--	---	---	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del fisioterapeuta	No se situa al costat correcte de la llitera.	Se situa al costat correcte de la llitera, però no subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni resisteix el gir del cap.	Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap, però comet algun error en la manipulació.	Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació perfecta.
Posició del pacient	La posició de partida del pacient no és correcta.	La posició de partida del pacient és correcta, però no està col·locat pròxim a la vora de la llitera.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però comet algun error en la manipulació.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera. Manipulació perfecta.
Zones de desencadenament	No coneix les zones de desencadenament.	Coneix les zones de desencadenament, però no són del costat que s'està estimulant.	Coneix les zones de desencadenament del costat que s'està estimulant. Requisit de valoració ≥2	Coneix les zones de desencadenament del costat que s'està estimulant i la direcció de l'estímul és correcta.
Resposta motora	No sap que ha de produir-se una resposta motora.	Desconeix la resposta motora.	Coneix part de la resposta motora.	Coneix la resposta motora completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REPTACIÓ REFLEXA

<p>Xiquet en decúbit pron. Pròxim a la vora de la llitera.</p>	<p>Terapeuta en el costat nual. Subjecta amb el cos el clatell del xiquet i resisteix el seu gir. El terapeuta resisteix el moviment amb el cos per a frenar el gir del cap i amb les mans per a impedir que el xiquet menege les extremitats de suport.</p>	<p>Cap en extensió passiva del coll i gir de 30° Tronc alineat amb el cap. Braç facial: flexió de muscle entre 120°-135° i abducció 30°. Epicòndil medial recolzat. El colze del xiquet queda a l'altura de l'orella. Mà alineada amb muscle i maluc. Avantbraç recolzat per la cara palmar. Braç nual: al costat del cos. L'avantbraç recolza per la cara dorsal. Cama nual: maluc en flexió de 30°-40°. Cuixa en rotació externa i abducció, còndil medial del fèmur recolzat. Peu alineat amb el maluc i el muscle. El taló alineat amb la tuberositat isquiàtica homolateral. Cama facial: relaxada i estesa al llarg del cos.</p>	<p>Zones de desencadenament: Tuberositat externa del calcani del costat nual i epicòndil medial de l'húmer del costat facial.</p>	<p>Correcta direcció de l'estímul propioceptiu cap a les zones de desencadenament.</p>	<p>Resposta motora: Suport sobre les extremitats: colze del costat facial i calcani del costat nual. Extensió i rotació axial. Adreçament del tronc contra la gravetat. Moviment de pas de les extremitats: flexió del maluc i genoll lliures i de muscle nual. Desplegament de les mans i dels peus (extremitats lliures). Retroversió pèlvica. Respiració més profunda: augment de respiració costal i de l'amplitud de la caixa toràcica. Resistència al gir del cap: contracció de músculs de la cara, llengua i ulls cap al costat nual.</p>
--	---	--	--	--	---

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del fisioterapeuta	No se situa al costat correcte de la llitera.	Se situa al costat correcte de la llitera, però no subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet ni resisteix el gir del cap.	Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap, però comet algun error en la manipulació.	Se situa al costat correcte de la llitera, subjecta amb la mà cranial el clatell del xiquet i resisteix el gir del cap. Manipulació perfecta.
Posició del pacient	La posició de partida del pacient no és correcta.	La posició de partida del pacient és correcta, però no està col·locat pròxim a la vora de la llitera.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera, però comet algun error en la manipulació.	La posició de partida del pacient és correcta i està col·locat pròxim a la vora de la llitera. Manipulació perfecta.
Zones de desencadenament	No coneix les zones de desencadenament.	Coneix les zones de desencadenament, però no són del costat que s'està estímulant.	Coneix les zones de desencadenament del costat que s'està estímulant. Requisit de valoració ≥2	Coneix les zones de desencadenament del costat que s'està estímulant i la direcció de l'estímul és correcta.
Resposta motora	No sap que ha de produir-se una resposta motora.	Desconeix la resposta motora.	Coneix part de la resposta motora.	Coneix la resposta motora completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REACCIÓ DE VOJTA

Posició de partida: Xiquet mantingut verticalment pel tronc, amb l'esquena cap a l'examinador.	Desencadenament: Gir sobtat del xiquet a la posició horitzontal. Es fa de forma bilateral: primer d'un costat i després d'altre.	<u>1a fase: 1a-10a setmana</u> Moviment d'abraçada tipus Moro amb els braços i obertura de mans. MI superior en flexió de maluc i genoll, flexió dorsal de turmell, pronació del peu i abducció de dits. MI inferior en extensió, amb flexió dorsal de turmell, supinació i flexió de dits.	<u>1a fase de transició: 11a-20a setmana</u> Disminueix el moviment d'abraçada tipus Moro, les mans estan obertes. Fins al final de la primera fase de transició: els braços estan en flexió relaxada, els MIs adopten una posició de flexió i els dits del peu superior ja no se separen.	<u>2a fase: de 4 mesos i ¾ al final del 7è mes</u> Totes les extremitats adopten una posició de flexió relaxada. Mans obertes o tancades de manera relaxada. Peus en flexió dorsal; en la major part dels casos supins. Dits dels peus en posició mitjana o flexionats.	<u>2a fase de transició: després del 7è mes fins al final del 9è mes</u> Braços flexionats de manera relaxada. Cames amb flexió de malucs. La flexió de genoll disminueix. Peus en flexió dorsal. Dits dels peus en posició mitjana.	<u>3a fase: després del 9è mes fins al 13è-14è mes</u> Les extremitats del costat de dalt s'estenen. Peus en flexió dorsal. Després d'aconseguir la bipedestació, la reacció de Vojta en un xiquet sa a penes aporta informació, ja que el xiquet és capaç de modificar voluntàriament la postura a pesar de las aferències massives.
---	--	--	--	---	--	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del nadó	La posició de partida del nadó no és correcta.	Col·loca el nadó en posició vertical de cara a l'examinador.	La posició de partida del nadó és correcta, però comet algun error en la manipulació.	La posició de partida del nadó és correcta. Manipulació perfecta.
Reconeixement de l'RP	No coneix la reacció postural, ni la fase ni l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del nadó. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix l'RP i la fase, però no l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, la fase i l'edat cronològica del nadó.
Execució de la maniobra	Realitza la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament, però no avalua bilateralment la reacció. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i avalua bilateralment la reacció.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i avalua bilateralment la reacció. Manipulació perfecta.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures que cal observar)	No sap fer la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anter superior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REACCIÓ DE TRACCIÓ

<p>Posició de partida: decúbit supí; cap en posició mitjana.</p>	<p>S'ha d'aprofitar el reflex de prensió de les mans: s'introdueix un dit a la mà del xiquet des del costat cubital. Amb els altres dits se subjecta la part distal de l'avantbraç sense tocar el dors de la mà (eixe estímul exteroceptiu frenaria el reflex de prensió).</p> <p>Realització: lentament s'eleva el xiquet fins a uns 45°.</p>	<p><u>1a fase: 1a-6a setmana</u></p> <p>El cap penja cap arrere.</p> <p>En el període perinatal les cames estan flexionades i lleugerament abduïdes.</p> <p>Després del període perinatal: posició de flexió inerta de les cames.</p>	<p><u>2a fase: de la 7a setmana al final del 6è mes</u></p> <p>Flexió del cap amb moviment de flexió de tot el tronc.</p> <p>Flexió de les cames.</p>	<p><u>3a fase: 8è i 9è mes</u></p> <p>Disminueix el moviment de flexió del cap, del tronc i dels MIs.</p> <p>Extensió intermèdia del genoll.</p> <p>Les natges es converteixen en el punt de suport. El centre de gravetat es trasllada –activament– cap a les natges.</p>	<p><u>4a fase: del mes 9è/10è al 14è</u></p> <p>El xiquet s'incorpora cap amunt.</p> <p>El cap està alineat amb el tronc.</p> <p>El moviment de flexió en la zona de la xarnera lumbosacra.</p> <p>MIs en abducció i les articulacions dels genolls estan en extensió relaxada.</p>
--	--	---	---	--	---

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del nadó	La posició de partida del nadó no és correcta.	La posició de partida del nadó és correcta, però no li agafa les mans de forma correcta.	La posició de partida del nadó és correcta i li agafa les mans de forma correcta.	La posició de partida del nadó és correcta i li agafa les mans de forma correcta. Coneix el motiu de fer aquesta presa.
Reconeixement de l'RP	No coneix la reacció postural, ni la fase ni l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del nadó. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix l'RP i la fase, però no l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, la fase i l'edat cronològica del nadó.
Execució de la maniobra	Executa la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament però no deté la tracció als 45°. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i deté la tracció als 45°.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i deté la tracció als 45°. Coneix el motiu de fer-ho: la postura làbil o inestable permet valorar tot el cos del nadó, no sols la capacitat de sostenir el cap.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures que cal observar)	No sap fer la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REACCIÓ A LA SUSPENSIO VERTICAL DE PEIPER

<p>Posició de partida: en els primers 4-5 mesos en decúbit supí; després en decúbit pron. Cap en posició mitjana. Les mans han d'obrir-se.</p>	<p>Realització: agafem el xiquet pel genoll o per la part distal de la cuixa i l'alcem ràpidament a la vertical amb el cap per avall.</p> <p>En el nadó i lactant jove se subjecta la part proximal de la cuixa.</p>	<p><u>1a fase: de la 1a setmana al final del 3r mes</u></p> <p>Fase 1a (sis primeres setmanes): moviment d'abraçada tipus Moro.</p> <p>Fase 1b: reflex de Moro incomplet dels braços (sense <i>abraçada</i>).</p> <p>El coll està estès i la pelvis flexionada.</p>	<p><u>2a fase: del 4t al 5è-6è mes</u></p> <p>Braços elevats cap als costats.</p> <p>Mans obertes.</p> <p>Coll i tronc estesos fins a la xarnera toracolumbar.</p> <p>La posició de flexió de la pelvis disminueix.</p>	<p><u>3a fase: del 7è al 9è/10è/12è mes</u></p> <p>Extensió i elevació dels braços amb mans obertes.</p> <p>Extensió simètrica del coll i el tronc fins a la xarnera sacrolumbar.</p>	<p><u>4a fase: a partir del 9è mes</u></p> <p>El xiquet, de forma activa, intenta agafar-se a l'explorador i alçar-se.</p>
--	---	---	---	---	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del nadó	La posició de partida del nadó no és correcta.	La posició de partida del nadó és correcta, però no sap per què (edat).	La posició de partida del nadó és correcta i sap per què (edat).	La posició de partida del nadó és correcta i sap per què (edat). Sap explicar-ho.
Reconeixement de l'RP	No coneix la reacció postural ni la fase ni l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del nadó. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix l'RP i la fase, però no l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, la fase i l'edat cronològica del nadó.
Execució de la maniobra	Executa la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament, però les preses no són correctes (proximal en la cuixa si és molt xicotet). REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes. Sap el motiu de fer-ho: evitar la luxació del maluc que s'estira.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures que cal observar)	No sap fer la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REACCIÓ A LA SUSPENSÍO VERTICAL DE COLLIS

<p>Posició de partida: decúbit supí.</p> <p>Una vegada elevat, el nadó es col·loca d'esquena al fisioterapeuta.</p>	<p>Realització: subjectem el xiquet per un genoll (en nadons joves per la cuixa prop del maluc) i el duem ràpidament a la vertical amb el cap per avall.</p> <p>No estirem sobtadament (plor), sinó suaument.</p>	<p><u>1a fase: de la 1a setmana al 6è/7è mes</u></p> <p>El membre inferior lliure adopta una posició de flexió de maluc, genoll i turmell.</p> <p>En el període perinatal pot aparèixer una extensió sobtada de la cama lliure que pot passar, també sobtadament, a la flexió.</p>	<p><u>2a fase: a partir del 7è mes</u></p> <p>La cama lliure adopta una posició d'extensió relaxada del genoll i el maluc es manté flexionat.</p>
---	---	--	---

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del nadó	La posició de partida del nadó no és correcta.	La posició de partida del nadó és correcta, però no avalua bilateralment la reacció.	La posició de partida del nadó és correcta i avalua bilateralment la reacció.	La posició de partida del nadó és correcta i avalua bilateralment la reacció. Manipulació perfecta.
Reconeixement de l'RP	No coneix la reacció postural, ni la fase ni l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del nadó. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix l'RP i la fase, però no l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, la fase i l'edat cronològica del nadó.
Execució de la maniobra	Executa la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament, però les preses no són correctes (proximal en cuixa si és molt xicotet). REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Executa la seqüència de la maniobra adequadament. Preses correctes	Executa la seqüència de la maniobra adequadament. Preses correctes Manipulació perfecta
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures que cal observar)	No sap fer la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REACCIÓ A LA SUSPENSÍO HORITZONTAL DE COLLIS

<p>Realització: subjectem el xiquet pel braç i la cuixa del mateix costat (tan prop de l'articulació com siga possible).</p> <p>Per a evitar la distensió de la càpsula articular del muscle cal esperar fins que el xiquet estire el braç subjectat per l'explorador cap al seu cos.</p> <p>Es realitza de forma bilateral.</p>	<p><u>1a fase</u></p> <p>Sis primeres setmanes: Moviment tipus Moro del braç lliure.</p> <p>7a a 8a setmana Abducció tipus Moro del braç.</p> <p>10a a 12a setmana Lleugera flexió del braç lliure.</p>	<p><u>2a fase: del 4t al 6è mes</u></p> <p>L'avantbraç lliure va cap a la pronació.</p> <p>Al final de la 2a fase: la mà de suport assumeix la càrrega de pes.</p> <p>La cama manté la posició de flexió.</p>	<p><u>3a fase: del 8è al 10è mes</u></p> <p>Suport en el costat extern del peu.</p>	<p><u>3a fase: principi del 4t trimestre</u></p> <p>Suport sobre tota la planta del peu.</p>
---	---	---	---	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del nadó	La posició de partida del nadó no és correcta.	La posició de partida del nadó és correcta, però no avalua bilateralment la reacció.	La posició de partida del nadó és correcta i avalua bilateralment la reacció.	La posició de partida del nadó és correcta i avalua bilateralment la reacció. Manipulació perfecta.
Reconeixement de l'RP	No coneix la reacció postural, ni la fase ni l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del nadó. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix l'RP i la fase, però no l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, la fase i l'edat cronològica del nadó.
Execució de la maniobra	Executa la seqüència de la maniobra inadecuadament. No identifica la maniobra.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament, però la manipulació no és correcta (preses o no espera que el nadó estire el braç).	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes. Espera que el nadó estire el braç. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥2	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i les preses són correctes. Espera que el nadó estire el braç. Sap el motiu de fer-ho: evitar la luxació del muscle.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures que cal observar)	No sap fer la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REACCIÓ DE LANDAU

<p>Realització: subjectem el xiquet per l'abdomen i el mantenim sobre el palmell de la mà en posició horitzontal. Li flexionem el cap.</p> <p>El xiquet ha d'estar tranquil: L'extensió de les cames o la postura d'opistòton del tronc, que apareix durant el plor, no té significat.</p>	<p><u>1a fase: 1a-6a setmanes</u></p> <p>Cap lleugerament flexionat.</p> <p>Tronc lleugerament flexionat.</p> <p>Braços i cames en flexió relaxada.</p>	<p><u>2a fase: de la 7a setmana al 3r mes</u></p> <p>Extensió simètrica del coll fins a la línia dels muscles.</p> <p>Lleugera flexió del tronc.</p> <p>Flexió relaxada de braços i cames.</p>	<p><u>3a fase: 6 mesos</u></p> <p>A l'extensió del coll, s'hi uneix l'extensió simètrica del tronc fins a la xarnera toracolumbar.</p> <p>Les cames estan en angle recte i lleugera abducció.</p> <p>Braços relaxats.</p>	<p><u>4a fase: 8 mesos</u></p> <p>Com que el xiquet està en la fase d'<i>estranyar</i>, s'arronsa i s'estira (cames estirades en horitzontal). Cal flexionar-li suaument el cap i, així, les cames aniran a flexió; en soltar-lo, les cames, el tronc i el coll es col·locaran rectes en horitzontal.</p> <p>Cames en extensió relaxada.</p> <p>Braços en flexió relaxada.</p>
--	---	--	---	--

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del nadó	La posició de partida del nadó no és correcta.	La posició de partida del nadó és correcta, però no el situa sobre el palmell de la mà oberta del fisioterapeuta.	La posició de partida del nadó és correcta, situat damunt del palmell de la mà oberta del terapeuta. Comet algun error en la col·locació.	La posició de partida del nadó és perfecta.
Reconeixement de l'RP	No coneix la reacció postural, ni la fase ni l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del nadó. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix l'RP i la fase, però no l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, la fase i l'edat cronològica del nadó.
Execució de la maniobra	Executa la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament, però no li flexiona el cap abans de l'exploració.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i li flexiona el cap abans de l'exploració.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i li flexiona el cap abans de l'exploració. Sap que el nadó ha d'estar tranquil.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures que cal observar)	No sap fer la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anter superior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.

Nom de l'alumne/a:

Grup:

Data:

Observacions: Rúbriques 2021-2022



REACCIÓ A LA SUSPENSÍO AXIL·LAR

<p>Realització: posició vertical. Subjectem el xiquet pel tronc, el cap per amunt i d'esquena al explorador. Ei xiquet no ha d'estar penjant de les aixelles.</p> <p>L'explorador no toca la part inferior del trapezi del xiquet amb els polzes (estímul propioceptiu que provocaria una extensió de les cames).</p>	<p><u>1a fase: de la 1a setmana al final del 1r trimestre</u></p> <p>Les cames en posició de flexió <i>inerta</i>.</p>	<p><u>2a fase: del 3r/4t mes al final del 7è mes</u></p> <p>Les cames flexionades cap al tronc. Sinergia flexora de les cames.</p>	<p><u>3a fase: des de final del 8è mes</u></p> <p>Cames en extensió relaxada.</p> <p>Peus en flexió dorsal.</p>
---	--	--	---

RÚBRICA

	INADEQUAT (0)	CAL MILLORAR (1)	ADEQUAT (2)	AVANÇAT (3)
Posició del nadó	La posició de partida del nadó no és correcta.	Col·loca el nadó en posició vertical de cara a l'examinador.	La posició de partida del nadó és correcta, però comet algun error en la col·locació.	La posició de partida del nadó és perfecta.
Reconeixement de l'RP	No coneix la reacció postural, ni la fase ni l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP però no reconeix ni la fase ni l'edat cronològica del nadó. REQUISIT DE VALORACIÓ ≥1	Reconeix l'RP i la fase, però no l'edat cronològica del nadó.	Reconeix l'RP, la fase i l'edat cronològica del nadó.
Execució de la maniobra	Executa la seqüència de la maniobra inadequadament. No identifica la maniobra.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament. Col·loca els polzes en la vora inferior del trapezi del xiquet.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament, evita col·locar els polzes en la vora inferior del trapezi del xiquet.	Executa la seqüència de la maniobra adequadament i té en compte on col·loca els polzes. Sap el motiu de fer-ho.
Lectura cinesiògica de la imatge (coneix les estructures que cal observar)	No sap fer la lectura cinesiògica de la imatge.	Lectura molt incompleta.	Lectura quasi completa.	Completa.

EIAS: espina ilíaca anterosuperior; FT: fisioterapeuta; MI: membre inferior; MIs: membres inferiors; RP: reacció postural.